



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele II

XXVIII

F

19

NAPOLI

4

1

יהוה

PLANTARVM QVILIBET SPECIES VIXIT S: DEVS INDIDIT, ATQVE
FRASSENTEM ESSE ILLVM, QVILIBET HERBA DOGET.

CAROLI CIVIS ATREBATIS,
IMPP. CESS. AVGG.
MAXIMILIANI II.
RVDOLPHI II.
Aulae quondam familiaris,
RARIORVM PLANTARVM
HISTORIA.

Quae accesserint, proxima pagina docebit.

ANTVERPIAE
Ex officina Plantiniana
Apud Ioannem Moretum
CIO. MDCL.

VIRTUTE ET GENIO

THEOPHRASTVS

DIOSCORIDES



**RARIORVM Plantarum Historia sex libris descripta à
Carolo Clusio.**

Ejusdem Commentariolum de Fungis.

**Additæ doctissimi viri Honorij Belli Medici percelebris
aliquot ad Car. Clusium Epistolæ de variis stirpibus
agentes.**

**Alia item eruditissimi viri Thobiaz Roelsij Medici, de
certis quibusdam plantis, Epistola.**

**His præterea accessit accurata Montis Baldi agro Vero-
nensi descriptio, auctore Ioanne Pona, pharmacopæo
urbis Veronenfis diligentissimo.**

PRIVILEGIUM CÆSAREVM.

RVDOLPHVS SECVNDVS diuina fauente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germania, Hungaria, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Sclauonia &c. Rex, Archidux Austria, Dux Burgundia, Stiria, Carinthia, Carniola &c. VVrtembergæ &c. Comes Tirolis &c. Agnoscimus, ac vigore presentium notum facimus vniuersis: Quod cum Doctus noster & sacri Imperij fidelis dilectus Carolus Clusius humillimè nobis exponendum curauerit, pra manibus se habere scripta quadam, qua in publicam utilitatem edere statuerit, vereri autem ne cum magnos sumptus in Pictores & Sculptores fecerit, lucri causa alij, quod fieri solet, sibi in fraudem eadem imprimant, aut imitentur, sicq; laboris ipse atque industria sua pramio fraudetur ac destituatur; nos considerantes, quàm praeclaram iam antè operam in quibusdam lucubrationibus, qua iam antè fuerunt edita, posuerit, & quàm nobis exquisita ipsius ac varia eruditio, praeipue vero etiam in indaganda stirpium & herbarum natura sedulitas atq; industria commendentur, quòd multa peregrinis ac remotis in locis didicerit & obseruauerit, multa secum attulerit, qua rara & luce digna sint, quòd assiduis adhuc studiis in hoc incumbat, ut qua in antiquis auctoribus abdita & obscura sunt, eruat atque illustret, ut praeclaram nominis sui memoriam posteritati relinquat, benignè ipsi, quod rogat, Privilegio nostro aduersus omnem fraudem consulere cupientes, presentium vigore scienter animòq; benè deliberato, pro autoritate nostra Cæsarea serio decreuerimus, edixerimus ac statuerimus, quemadmodum presentium vigore decernimus, edicimus ac statuimus, ne quisquam Typographorum, Bibliopolarum aut aliorum, qui sine imprimendis sine vendendis libris aliàve quacunque ratione negotiationem exercent librariam, intra viginti annos, à prima editionis die numerandos, Caroli Clusij opera duobus tomis expressa, quorum prior Stirpium &c. historiam continet, altero plerique libelli, &c. ab ipso Latini facti comprehenduntur, & quacunque praeterea idem Clusius edet opera, ipso inscio aut inuito typi seu quocunque alio modo aut charactere, sine integra, sine aliquam eorum partem imitetur, exprimat vel in publicum edat, nève ab alijs edita vel expressa vel aliunde allata intra Sacri Romani Imperij fines vendat, ac distrabat aperitè vel occultè. Si quis autem praesens edictum nostrum transgredi aut violare, & praedicta opera recudere & in fraudem praenominati Caroli Clusij edere aut vendere ausus fuerit, eum non solum eiusmodi libri exemplaribus, tanquam qua in commissum ceciderint, memorato Carolo Clusio eiusq; heredibus, vel mandatam ab iis habentibus, ope Magistratus eius loci, ubi deprehensa fuerint, vendicandis priuari, verum etiam multa decem Marcharum auri puri fisco nostro

Imperiali fraudum vindici, ac parti laesa ex aquo soluenda ac pendenda puniri volumus, ea tamen lege, ne quideam opera Orthodoxa Catholica Religioni contrarium habeant, & ut tria cuiuscunque operis aut libri exemplaria, ubi excusa fuerint, ad Imperialem nostram Cancellariam transmittantur. Quod si negligatur hac nostra gratia ac Priuilegio ipse, ipsiusque haeredes excidisse censeantur. Mandamus proinde vniuersis & singulis nostris & Sacri Romani Imperij subditis & fidelibus dilectis, tam Ecclesiasticis, quam Secularibus cuiuscunque status gradus, Ordinis & Conditionis extiterint, praesertim verò iis, qui in Magistratu constituti sunt, ac vel suo vel superiorum suorum loco ac nomine Iuris vel Iustitia administrationem exercent, ne quemquam hoc Priuilegium seu interdictum nostrum impunè violare, spernere aut negligere patiantur. Sed si quos contumaces compererint, praescripta poena plecti, & quibuscunque, rectè fieri potest modis, coërceri curent. Quatenus & ipsi grauissimam indignationem nostrā euitare voluerint. Id quod testamur praesentibus literis manu propria subscriptis & Caesarei sigilli nostri impressione munitis. Datum in Arce nostra Regia Praga, die decima quinta mensis Februarij. Anno Domini millesimo, quingentesimo nonagesimo tertio: Regnorum nostrorum Romani decimo octauo, Hungarici vigesimo primo, & Bohemici itidem decimo octauo.

RVDOLPHVS.

Ad mandatum S. Caesareae M^{ti} proprium.

Iacobus Curtius à Senfftenau.

Io. Baruius.

TIBI, Ioannes Morete, qui haud exiguos sumptus pingendis & sculptendis Plantis mecum pariter impendisti, tibi inquam permitto, vt hanc meam Rariorum Plantarum Historiam, & adjunctos huic libellos, typis tuis excudas ac evulges: nec alibi alius quispiam intra viginti annos, cupio, siue iubeo, sub poenis & multis, quae S. Caesareae Majestatis litteris mihi concessis continentur.

Carolus Clusius A.

SVMMA PRIVILEGII PRINCIPVM BELGARVM.

ALBERTI, & ISABELLÆ Infantis Hispaniæ, Archiducum Austriæ, Ducum Brabantiae &c. priuilegio cautum est, nequis Caroli Clusii, Impp. Caes. Augg. Maximiliani II. Rudolphi II. Aula quondam familiaris, Rariorum Plantarum Historiam, præter voluntatem Ioannis Moreti, Typographi Antuerpensis, intra duodecim annos villo modo imprimat, aut alibi terrarum impressam, in has inferioris Germaniæ ditiones importet, venalemve habeat. Qui secus faxit, confiscatione librorum, & alia graui poena multabitur: vti latius patet in litteris datis Bruxellæ, III. Martij M. DCI.

Signat. I. de Buschere.

CARO.



MAGNAM voluptatem mihi semper attulit, in variis quas peragravi regionibus, Plantarum observatio. Nam quum nulla sit Provincia quæ peculiare quædam, & quodammodo sibi proprias non alat, insignis varietas ubique meis oculis seseingerebar, quæ non potuit non esse delectabilis, viro à primâ propè ætate ad Plantarum observationem propenso, præsertim quum aliqua occurrerent à veteribus Auctoribus neglectæ, vel ab ipsis quidem descriptæ, nondum tamen à quopiam Neotericorum satis cognitæ: tum etiam aliæ, quæ ad plantarum à veteribus proditarum classem referri posse viderentur. Non minus enim gaudium afficiebar, quàm si ingentem Thesaurum reperissem.

CETERVM quum indecorum, & liberali ingenio minimè dignum arbitrarer, voluptatem quam ex ea observatione percepissem, mihi dumtaxat servare, & apud me quasi premere velle, quin potius aliis simili studio sese oblectatibus esse communicandam censerem: facere non potui, quin quâ potuerim fide & sedulitate, primùm illarum, quas in Hispanicâ meâ peregrinatione observaveram, Historiam, publici juris facerem: deinde, earum, quæ partim in Austria, Stiria, & Pannoniâ, partim vicinis Provinciis postea sese obtulerunt.

EAS porro Observationes, cùm Hispanicas, tum Pannonicas, quum animadverterem plerisque gratas fuisse, imò illarum exempla adeò avidè expetita, ut nulla amplius sibi superesse Typographus conquereretur: consultum fore existimaui, si eas recognoscerem, atque aliarum plantarum, quas ab illis evulgatis observavi, historiam adderem, omnes veluti in unum corpus contrahens, singulas tamen in sua genera & species, commodâ quadam serie (quantum quidem fieri potuit) distribuens. Mihi etenim persuadeo, non minus gratum futurum eum laborem, quàm priores.

PLANTARVM autem Historiam in sex Libros divisi, ut commodius in suas classes distribui possent. Quum verò Plantarum historiam dico, neminem existimare velim, universam Plantarum historiam me intelligere: sed earum dumtaxat, quæ à me primùm observatæ, aut ab aliis nondum fuerant

prœdicæ, antequàm eas publicarem: exiguæ enim laudis esse arbitratus sum, earum historiam repetere, quæ ab aliis esset prodita. Non negaverim tamen, quin interdum nonnullas inseram, quarum alij meminerunt, earum autem historiam non satis plenè conscripsisse mihi videntur. Quarundam præterea mentionem facere me profiteor, quæ ab aliis fuerunt descriptæ, atque etiam illarum icones in meum librum interdum intulisse, quia ad seriem earum, quas describo, servandam, commodæ videbantur.

BON I igitur consulatur, quem (studiosæ juventuti gratificandi studio) in hac senectâ multis morbis obnoxia sumpsi, labor, & alios juniores ad similia, vel etiam majora tentanda excitet: libenter enim alteri hanc lampadem trado, ut qui annum sextum & septuagesimum jam agam. Si quæ tamen supererit vita mediocri valetudine constans, eam omnem ad publicam utilitatem impendendam profiteor. Kal. Feb. cld. lxx.



AD CAROLVM CLEVISVM

A TREBATUM.

DIGNVM est opellâ, nec pretio caret
 Famâ æstimando, quas juvenis vigil
 Gnavusque lucubrationes
 Extudens alacri labore
 In lucem apertam, fasciculo senex
 Iam comprehendas artius unico,
 Ut cuncta repræsentet unum
 Dispositâ serie volumen.
 Postrema certè cûraque lima
 Sudore tanto, totque molestiis
 Vix hercle credo, culte CLEVIS,
 Constiterit, velut hæc & illa
 Prior: tametsi sæpe animis ratum
 Nisi voluptas in medio solet
 Præbere delectamen ultro,
 Nedum opere ingenij supremo.
 Nam gaudet in se mens generosior,
 Cum laude si quid magnificum inchoat,
 Fructuque finit; extimosque
 Haud patitur temerè umbilicos,
 Desiderantes fortè manum ultimam,
 Vel impolitos vel nimium rudes
 Manere: quamvis ceteroqui
 Parvulum opus quoque terminatum
 Industriorum judicio virum
 Ainet probari. Nos malè confita
 Spineta castramus malignè,
 Quasdam etiam bene collocatas
 Runcamus herbas cum lolio gravi,
 Tristi que avenâ. Tu tua digeris
 Feliciori, prout decorum est,
 Ordine seminia herbarum,
 Stirpesque raros, quidquid & externa
 Et nostra gignit per species humus
 Distinctiores. Singulorum
 Cernere jam videor redactus
 Quincunce iusto reticulata per
 Diuensa fines alveolataque,
 Id est, ad unguem rectiorem.
 En, quid erit, quod oporteat te
 Transferre? Planum est omne, sibi que opus
 Aptum est favorem scilicet omnium.
 Aient nepotes, te fuisse
 Mirificè, puto, diligentem.

*Paulus Melissus Franc. Comes Pal.
 & Eq. cis Rom.*

IN PLANTARVM HISTORIAM

CAROLI CLVSII.

VOS ò Radices, vos ò cum Floribus, Herbae,
Pulcræque ramis Arbores,
Nunc agite, ambrosij succi exhalate sapores:
Nunc pandite altiùs comas:
Vngue nunc calices distendite, nectaris auxit
Quod parte quinta Amor sui.
Vestra etenim, prius haud ulli bene cognita, virtus,
Fame quadrigis astra obit.
Parsque adeò vestrum, cecà hæcenus obruta uolte,
In rueste lucet aurea.
Assertori igitur tali pro munere quænam
Grates habebitis pias?
Fallor? an omne genus morbi ilicet, agmine facto,
Trudetur ad Dis lacus?
Et dabitur, summo vos qui gustaverit ore,
Semelve naribus hauserit:
Sic Clusi nomen virtutesque imbibat inuis
Animis potenter; ut nihil,
Quàm Clusi laudes meditetur, & omnibus oris
Dicat bona in eum plurima?
Annulte, una Deum nam si Glancum facit herba,
Quid non simul præstabitis
Vos ò Radices, vos ò cum Floribus, Herbae,
Pulcræque ramis Arbores?

Ianus Gruterus.

CLVSII, delicias amorque DIVI
Maximi Æmiliani, Opimitate
Quo nil, nil Sipientiâ, orbe toto
Aut est, aut fuit, aut erit secundum:
Quàm rectè tua nomina omne implet:
Quàm rectè, puto, Clusius vocaris?
Non quòd sacra oculis tuis Apollo
Aonumque Machaonumque cludat;
Non quòd sint tibi Hygææ operta templa,
In quæ & Venus & colit Iuventas;
Non quòd Pallados arcearis aris,
Quas Prudentia mensque recta servat.
Sanè, Sacra oculis tuis Apollo
Aonumque, Machaonumque nudat.
Sanè, sunt tibi Hygææ aperta templa,
In quæ & Venus & colit Iuventas.
Sanè, Pallados aggregaris aris,
Quas Prudentia Mensque recta servat.
Sic dictus potius; quòd unus ipse es
Cuius corde animoque continenter
Se Phœbus, Medicina, Athèna cludent.

Idem Gruterus.

M. p. m.

Μὲν μὴ βλαστῶν φραμμένται γὰρ αἰήσθ
 Εἶδεν, τῶν πάλιν ἀνθρώποις μέγ' ἔκτος τε ἐξ ἔδρας
 Ταῦτα δὲ κατὰ τοσσην ἀκαλυμμένα, τὸν ἀνελθόντων
 Κλαύσος ἀτρεκέως χρησάτης σελίδισσι φαίνεται.

Νικόστος ὁ Ἑλληβόδιος.

In C. Clusij Clarissimi & amicissimi viri
 opus Botanicum.

Donec erunt Herbae, donec florentia Serta,
 Clusiadū cunctis floridissima Libri.

Franciscus Vermanianus Med. D. P. Ravienfis.

Quam longum sparsi flores, quam pulchra vireta
 Germine Clusiaci, & stirpe virente virent
 Tam patet & Clusi nomen, tam fama recluso
 Celo sparsa clucens, flore virente nitet.

Paschalis le Coq. Med. D. P. Ravienfis.

In Caroli Clusij Plantarum Historiam.

Passa graves quondam fuerat Medicina dolores,
 Et ferè opus medicū, prò dolor! ipsa habuit:
 Quid faceret? post erratas vaga, pervaga terras
 Clusij in Aerebatū ducitur hospitium.
 Clusius agrotam, mora nulla, potentibus herbis
 Adjuvat, hinc medicas fert Medicina manus.
 Hinc etiam extremos se Clusia fama per Indos
 Dididerat, volitans docta per ora virum:
 Ille tuas Europa, tuas America plantas,
 Africa sive tuas, sive tuas Asia
 Novit, & hinc toto latè notissimus orbe est
 Clusius, Aerebatum Clusius ille oculus.
 Ergo animosus abi Liber, & si forte, quis auctor,
 Quereris, hoc sat erit dicere, Clusius est:
 Hoc sat erit, mora nulla, manuque, oculoque, animoque,
 Lectoris, felix abripere Liber.

Petrus Plateau I. F. Tornacensis.

IN PLANTARVM HISTORIAM
CAROLI CLVSII.

TVLERVNT varios priora secula
Scriptores, neque defuere nostro,
Linguis, iudicio, eruditione
Qui clari studium omne in hoc locarunt
(Sui ut quemque animi iunpetus ferebat
Atque ardens amor ardui laboris)
Spattam quam sibi singuli colendam
Sumfissent, numeris modisque cunctis
Perfectamque darent & absolutam.
Quod cum sit propè disciplina in omni
Summa non sine laude factitatum:
Tum vel præcipuè hoc videre in illa est
Quæ vires docet & figuram, & ipsos
Natales quoque, differentialque
Herbarum (studium utile atque dulce)
Et frugum, fruticum, arborum, omniumque
Vita queis homini salusque constat,
Et sinu locuplere terra fundit
Cælo fertilibus rigata stillis.
Summa hanc barbarie obsitam ac tenebris
Plus quam Cimmeriis (pudet faceri)
Primus restituit suo nitore
Nostrum ætate patrum Leonicens:
Quem Ruellius, huncque mox sequuti
Complures alij, haud quidem labore,
Sed quos ingenio, celebritate,
Doctrinaque adeo pares fuisse
Constat, dum merito probantur omnes,
Dote quisque sua: (negata namque
Cuncta uni; sua singuli tulere)
Ut negem facile esse judicare
Cuinam laurea jure debeatur:
Nemo si tamen abnegarit vinquam
Plus illum meruisse laudis atque
Præmij, qui salebrosa & invia inter
Primus compita figere est pedem ausus,
Venturisque nepotibus prævit,
(Tua hæc docte Leonicenclaus est:)
Quis, Clusi, precor, alteri secundum
Audebit dare te, tuos labores
Qui norit, tua quique scripta vidit,
Vidit scripta, satis probanda nunquam?
Sint verò eximiam refert digni
Qui laudem fuerint (libens fatebor:)
At certe fuit ante qui præiret
Et viam daret explicatorem,
Scripto, consilio, aut opinione

Cui

Cui, quòd non minimum tulit laboris,
 Pars laudis quoque magna cedat, æquum est.
 Verùm, dux tibi quis fuit, comésve,
 Quando quas aniuosa gens Iberùm
 Terras sole terit calente tostas,
 Mensium spatio octo peruolasti
 Herbas mille manu legens avara;
 Laudis qui sibi vindicare partem
 Tuæ vel minimam queat vel ausit?
 Discendis tibi quis fuit magister
 Herbis, Pannonicos, iuga alta, montes
 Quas novas dare, te legente, scimus,
 Nostri te quoque dante habemus hortis?
 Ignoraret opes suas Iberus,
 Ignoraret opes suasque Pannon,
 Ignoraret opes & orbis ipse
 Amborum, nisi te docente nossent.
 Nostri delicias alunt quod horti
 Quæ vel visu oculos iuvant foventque,
 Pulvinos hilarantve raritate,
 Acceptum ferimus tibi illud uni,
 Et grato tua scita scripta, Clusi,
 Cum plausu modò lectitamus omnes,
 Venturique avidè legent nepotes
 Dum constabit honos decorque Phœbo
 Et Floræ suus: efferentque Clusi,
 Quaqua Sol oritur caditque, nomen,
 Æternâ super astra clara famâ.

Ioannes ab Hoghelande.



IN CAROLI CLVSII A.
EFFIGIEM.

Os Clusi frontemq; oculosq; , & cetera vultus
Pictoris expressit boni manus bene.

Ingenij haud potuit vires : at Clusius ipse
Expressit illas hoc in opere quàm optimè.

Longa dies ut opus pictoris deleat, ipsum
Et Clusium : opus hoc nulla delebit dies.

Ergo, illum in cineres ubi longa resolverit aetas,
Adhuc opere in hoc sibi supererit Clusius.

Ioannes ab Hoghelande.


CAROLI CLUSII RARIORVM PLANTARVM HISTORIÆ

LIBER PRIMVS.

PLANTARVM, quas in variis peregrinationibus meis rariore
observavi, historiam scripturus, ab arboribus eam auspicabor,
sic enim ordo postulare videtur: deinde ad frutices, suffrutices
& virgulta progrediar, quibus aliquot *ἐπευλοκαύλους* subij-
ciam. Hæc autem omnia priore libro completi animus est: reliquas
stirpes in sequentes libros distribuam.

DRACO.

CAP. I.



APAUCIS prodita est huius Arboris hi-
storia, eaque admodum mutila. Libuit
itaque eam hic subicere, & ab illa nostras
Observationes auspicari, quandoquidem
valde rara est, in nostra præsertim Europa, &
Herbariis dum hos Commentarios scribe-
bam (ni fallor) incognita.

EST verò Draco (apertus enim nunc non
inuenio) procera arbor, Pinū procul intuen-
tibus referens, adeo æquales, semperque vi-
rentes sunt rami. Huius truncus crassus, octo
aut novem cubitales ramos æqualiter na-
scentes & nudos sustinet, qui in summo fissi,
in alios ternos vel quaternos ramos cubita-
les, aut paulo ampliores, brachialiſque craſ-
si tudinis desinunt, nudos item & sine foliis,
in summo gestantes capita plena cubitalium
foliorum, unciali latitudine, sensim in mu-
cronem desinentium, media costa densiore
& eminentiore, ut in Iridis foliis, tenuium
& rubentium in lateribus: mucronem pla-
ne repræsentant ea folia, semperque virent,
& Aloës vel Iridis modo, invicem ample-
xando nascuntur. Truncus perquam scaber,
multis rimis dehiscit, humoremque fundit
per Caniculæ æstus, qui in rubrâ lacrymam
densatus, sanguis Draconis appellatur, ob
quam sanè causam, hanc arbore Draconem
nuncupavi. Materia trunci firma est, fer-

*Dracoides
arboris huius
forma.*

rumque difficulter admittit, quod veluti fibris transversim & oblique excurrentibus con-
stat: at rami cum multo succo prægnantes sint, satis facile cædi possunt.

EAM arborem Olyſipone primum vidi anno reparatæ salutis humanæ, quingentesimo
sexagesimo quarto supra millesimum, post monasterium Divæ Virginis sacrum, cui nomen
à Gratia octo palmorum crassitudine, inter aliquot Oleas in colle nascentem, monachis ig-
notam & neglectam, quam neque flossem, neque fructum ferre afferrent: rem tamen ali-
ter se habere postea prehendi, ramulo ex illa ipsa arbore anno sequente revulso quoniam donatus
ab amico. Est autem hic ramus (quem cum aliquot foliis corticisque fragmento, & lacryma
meis manibus eximita multo tempore adſervatum, à Cæsare Maximiliano evocatus, in
Belgica cum multis aliis eius generis reliquis) pedali amplioreve longitudine, cui inhzrent
alii ramuli multo fructu racematum compacto onusti. Fructus color flavescens, sapor ali-

Aquantulum

quantulum acidus, magnitudo exigui Cerasi. Eum in summis capitibus nasci verisimile est, ut in palma dactyli nascuntur: spatha tamen uti illos includi non intellexi. Huius portò arboris recentia capita renella sunt, & humilium Palmarum sive Chamæxiphs modo, cuius cerebrum in deliciis est, edi possent, nisi amaritudo prohiberet.

APUD veteres neminem libus arboris mentionem facere invenio, nisi forte ea sit, quam Serabo ex Posidonio Gadibus nasci tradidit, libro Geograph. tertio, his verbis.

Gadensis arbor Posidonij.

DE Arbore Gadibus existente scriptis prodidit Posidonius, quæ ramos lumum usque incurvatos habear, frondes ærissimè mucronis speciem gestantes, quarum longitudo cubitalis est, latitudo digitorum quatuor. Huic & illud innarum esse creditur, ut uno fracto ramulo lac effluat, radice abscessa minij humor exfudet.

VERVM neque nostra hæc arbor ramos incurvatos, sed erectos, neque folia tam lata habet, nec illius ramis effractis lac exfudat, at humor aqueus duntaxat. De radice quod adscribit, nostræ faris quadrare videtur, è qua secundum radices terebrata, lacrymam statim anni temporibus effluere aiunt rubram, ut postea dicemus.

CETERVM illud hic etiam obiter indicatum volo, quia in Gadium mentionem incidimus, me, tamen si diligenter totam insulam perlustrarim, nullam arborem cunxepisse qualem Posidonius scribit: sed neque ullam aliam, præter aliquot salices, & unam aut alteram siliquam, licet (vt ab ioculis viris fide dignis accepi) circa urbem Gades, recenti adhuc memoria, lætissima viridaria fuerint, omni fructiferarum arborum genere excultissima, quorum ne vestigia quidem nunc apparent, sicut arenaea, quam naves eò appellenres exonerant, omnia complectere & exurente. Ex recentioribus binos duntaxat hæc arborem describere memini, sed succinctè admodum.

Idguis Draconis.

ALOISIVS Cada mustus libro Navigationum cap. 4. eius in hæc verba memini. IN insula Porrus sancti (è Canariis una) est Sanguis Draconis, lacryma arboris ferro faciatæ: nam statò anni tempore arbores incise, emittunt anno sequente gummi, quod athenis decoctum & defecatum, sanguis efficitur quem Draconis appellant. Eius arbor fructum producit Cerasi instar mensè Martio, gustu eximium, coloris veneti.

POST hunc Thevetus Singularium Franciæ antarcticæ cap. vttt. describit his verbis è Gallico redditus.

Cinnabari Dracoidis.

EST in Canariis insulis arboris genus, certo anni tempore gummi fundens, quod Sanguinem Draconis vocant, perforata arbore prope radicem sans lato & profundo hiaru. Eius fructus luteus est, magnitudine Cerasi nostris, refrigerando corpori, & levandæ sitis in febre aut ardoribus valde utilis. Non est dissimile hoc gummi Cinnabari Dioscoridis. Hæc Thevetus.

ET sanè id gummi quod apud diligentiores quosdam pharmacopolas invenitur, Sanguinis draconis in lacrymis nomine insignitum, magna ex parte ex Madera & Canariis insulis in Europam invehitur: & forsitan etiam ex Aphrica, quæ Dioscoridis tempore Cinnabarum subministrabat.

AN hæc portò arbor alius cuius momèti sit in medico usu, neminem scribere memini: fructus tamen aciditas argumento est, utiliter in febribus (vt censet Thevetus) præberi posse.

Eius lacryma adstringendi vi poller, illiusque usus non infelix ad mulieres & dysentericas fluxiones, cruentas excreationes, firmandos commotos dentes, & roborandas gingivas. Quæ facultates eia admodum sunt similes, quas Dioscorides Cinnabari tribuit, quamque Hæmante lapillo efficaciorē facit. Hanc ob causam, non abs re existimant celeberrimi Medici, exquirsum illum sanguinem Draconis, legitimum Dioscoridis Cinnabarum esse, præsertim cum eius tempore à nonnullis etiam sanguis Draconis appellata sit.

PERSEA.

CAP. II.

Persea hispanica.

VALDE rara etiam est hæc arbor, cuius ramum expressum damus: nam solo Valentino regno unicum arborem vidi, monasterio D. Virginis cui cognomen de Iesu, primo ab urbe Valentia lapide, ex America, ut ferebatur, è delatam.

HÆC portò arbor Pyro similis est, in larum diffusa perpetuoque virente coma, ramulis ex viridi pallescentibus. Folia illi lauri latifolia, superna parte vitentia, inferna cinerea coloris, firma, nervis aliquot per obliquum discurrentibus, odore & sapore quidem comendanda, cum adstrictione tamen linguam mordicantia. Flos Lauri ferè, copiosus, racematim compactus, pallidus, sex foliolis confusus. Fructus pet initia pruno similis, deinde successu temporis, pyri in modum oblongus, nigro colore, ucuendoque sapore: nucleum cordis effigie continet, gustu castaneæ aut dulci amygdalæ haud abissimili. Vere florentem conspexi, Autumno maturum fructum fete intellexi à CL. V. D. Ioanne Plaça Medico & Professore Valentino, qui mihi illam quo nunc dixi loco monstrabat, incolisquæ Mamay dici asserabat: tamen qui nobis Americam descriperunt Hispani, aliam ab hac diversam arborem hoc nomine insigniant. Sed multis post annis, ab eruditissimo viro Simone de To Medico Hispanensi, qui similem arborem in cultissimo suo horto, cum aliis exoticis stirpibus alit, non Mamay, sed Agnate vocari edoctus sum. An verò hæc arbor Veterum Persea sit, nec ne, discipendum est.



THEOPHRASTVS libro IIII. Historie Plantarum cap. II. Perseam in hunc modum describit. Est etiam in Ægypto alia arbor Persea dicta, aspectu magna & pulchra, sed maxime similis pyro & foliis, & floribus, & ramis, & tota figura, præterquam quod hæc perpetuo est folio, illa deciduo. Fructum autem fert multum, eumque omni tempore maturum edit, novo semper veterem occupante. Maturat autem sub Æstiarum flatum: reliquum cruditiorem auferunt & recondunt. Est magnitudine pyri, figura oblongus, amygdalæ modo, colore herbideus, intus nucem continens quemadmodum prunum, sed multo minorem & molliorem: carnem verò valde dulcem, suauem, concoctæque facilem: nihil enim eos qui multum ederint tentat. Excellit hæc arbor radicum tum longitudine, tum crassitudine, tum etiam multitudine: materiem etiam habet robustam, aspectu pulchram, atram vt lotus, ex qua simulacra, lectulos, mēfulas, atque alia huiusmodi conficiunt.

SIMILITUDINE modo, iisdemque ferè verbis ipsam Plinius describit lib. XII. cap. IX. sub Perseæ arboris nomine, voces ipsas cōmīscens, quas tamē lib. XV. c. XII. apertissime seiungit, & distinguit.

Perseæ, inquit, arbores sero & cum difficultate transiēte, ut quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Ægypto eatum fuerat hospitium. Falsum est venenata cum cruciari in Persis gigni, & pœnarum causâ à Regibus translata in Ægyptum, & terra mitigata. Id enim de Perseâ diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, myxis rubescenibus similis, nec extra Orientem nasci voluit. Eam quoque cruditiore negauerunt ex Perside propter supplicia translata, sed à Perseo Memphi satam, & ob id Alexandrum illa coronari vidētes ibi instituisse, in honorem atavi sui. Semper autem folia habet & poma, subnascentibus aliis. Qui sanè locus, eorum sententiam apertissime refellit, qui Perseam arborem cum Persica malo eandem esse, cetebrosius asserere volunt: ut taceam utriusque arboris historiam esse diuersissimam.

PERSEÆ item meminit Strabo Geograph. ultimo, perpetuam illi comam tribuens, & fructum pyri magnitudine, figura oblonga, amygdalæ modo putamine inclusum, & corio. SED & Galen. lib. II. de Alimēt. se Perseâ Alexandriæ vidisse: asserit: meminit & aliis locis.

IN eo omnes conveniunt, ut Perseæ perpetuam comam tribuant, oblongum fructum, inclusum amygdalæ putamine & corio. Hæc quam exhibeo arbor perpetua quidem est coma, folio autem & flore laurum magis refert quàm pyrum: fructu etiam oblongo est, sed qui myxis (qualem illi Plinius loco iam adducto tribuit) aut oblongus prunis similior sit, quàm amygdalis, & colore (ut Placæ referebat) nigro non herbido.

ITAQVE, vt verum fatear, tametsi nonnullis cum Perseâ Theophrasto descripta notis, hæc nostra conveniat: mihi tamen aptius quadrare videtur ei, quam Plinius libro iam memorato describit: aut quam Plutarchus in Ægypto nasci testatur lûdi grandissimam, quod fructum ferat figura cordis æmulum, folium verò linguæ. Sed aliorum id relinquo iudicio: nobis sententiam nostram in medium protulisse satis est. Non possum tamen non mirari, quosdam Perseæ historiam negligentius perpendentes, non esse veritos ad hanc nostram fructus CUCI suo pulvino nudati iconem in suis Commentariis pro Perseæ fructu adiciere, fructus certè planè offe qui nobis aliquando pro Bdellij fructu obtutus fuit: nisi fortè pyri vel cordis forma quam utrumque exprimit, eos ut id faceret impulerit. Verum Cuci integer fructus, etiam per multos annos adseruatus, & planè resiccatus, pugno maior est, magnitudinem persicum malum potius æmulatur, quàm prunum aut pyrum. Eius historiam Theophr. lib. IIII. Hist. cap. II. Plinius lib. XII. cap. IX. tradunt paulo post Perseæ descriptionem. Neuter tamen Perseæ fructum pyro similem facit, sed magnitudine illi æqualem.

HVIS quam exhibeo arboris neminem hæcenus experimentum fecisse, quod sciam, puto.

AT Perseæ fructum cibo idoneum, & stomacho utilem Dioscorides facit: arida verò folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistere tradit.

CETERVM NEMAY ab Hispanis Historicis descriptum, arbor est formosa, simili modo virens, vt iuglans, lata coma, sed celsa, & quæ in pyramidem aliquantulum desinat in fastigium: foliis longitudo maior quàm latitudo, materies ligni fungosa, fructus rotundus & magnus, carne malum cotoneum referens, sed sapore persici mali duracini: cui insunt terna vel quaterna ossa, intetdum plura, valde amara.

Persea Theophrasti.

Persea Plinij.


Persea Strabonis.

Persea peronis virens.

Plutarchi Persea.

Cuci.

Mamay. Gomara Hispania geographica India, cap. 123. 124.



Nec huius arboris histociam ab ullo proditam, imò ne herbariis quidem nostræ ætatis cognitam arbitror. Cùm autem ex earum sit genere, quæ perpetuâ comâ virent, elegantissimaque sit aspectu, locum inter primas, in nostris hinc Commentariis, meriti sibi vendicare videtur.

Laurocerasus
diffusa.

Est verò Laurocerasus (sic enim appellare libet, & nominis causam postea explicabo) iuxta magnitudinis arbor, caudice recto, multis tamis donato, qui cortice atrovirente obduti sunt, novellis tamen omnino virentibus. Folia alternatim ramos ambiunt, non decidua, Lauri latifolia, sive potius Citriæ mali foliorum æmula, per ambitum nonnihil dērata, nervis aliquot ex media costa in latera excurrentibus, superne splendētia, inferne nequaquam: color in vetustis ex atro virefcens, in novellis ex viridi pallēscens: sapor amarus, nucleorum mali pericæ, aut amygdalarum amararum æmulus. Flos initio mihi non conspectus, nam quam aiebam arbuscula, sine flore, sine fructu perit: quam verò D. Aicholtzio dederam, anno octogesimo tertio supra millesimum & quingentesimum, mense Maio egregie floruit. Paucis post annis floruit etiam D. Ioachimo Camerario V. C. quam ipsi donarum, ut ille Noriberga Viennam ad me scripsit. Oblongas porro in summis vetustis ramis inter superiores anni folia fert hastulas, digitalis longitudinis, crassiusculas, in quibus brevis pediculus numerosus, & racemi in modum conferti, nascuntur flores, candidi, quinque foliolis constantes, multis in umbilici ambitu staminibus præditi, Cerasi avium vulgò nuncupati floribus non admodum dissimiles, odoris tamen expertes, qui nullum fructus rudimentum præbuerunt, sed caduci admodum fuerunt. Supra hos deinde rami germinant & novella folia protrudunt. Fructus, quem in arbore nascentem non vidi, sed qui Constantinopoli missus fuit anno septuagesimo quarto & octogesimo sexto supra millesimum & quingentesimum, ovali forma fuit, exigui pruni magnitudine, Sehesten fructui proximus, foris niger, rugosus, pulpa præditi dulci & eduli, cerasiorum vel Brunnenium in Moravia prunorum pulpæ modo, ossiculum continens scissili parte orbicularem, deinde lentum in oblongam tenuemq; cuspidem desinentē, ut testes esse possunt amici Belgæ, quibus cum fructum tunc cōmunicavi cum Galatensisibus sive Peranis pruneolis, albis, oblongiusculis, acidis. Vtrumque fructum licet diligenter terræ commiscerim, etiam in scissilibus, ut commodius curarem, neuter tamen germinavit. At qui eodem nomine acceptus est Byzantio, anno M. D. LXXXI. hęc similitudine forma, colore & sapore præditus, bina aut terna habuit sub pulpa nullo putamine inclusa semina plana, spadicei coloris, plurimum accedētia ad Loti africanae, vulgò Guaiacanae nuncupatae, semina.

Brunnenia
pruna.

Galatensis
pruna.

CETERVM sub initium anni M. D. LXXVI. ab Illustri Domino Davide Vngnad, Cæsareo apud Turcarum Imperatorem tunc Legato, nunc verò Bellici cõsilij Viennæ Præside, mihi missa fuit eius arbuscula, brachialis crassitudinis, humanâ altitudinem excedens, cum aliquot aliis tarioribus fruticibus. Sed cum asperima esset hiems, & negligenter ab eo qui eos adiecit, curati fuissent: omnes in itinere radicibus perierunt, præter hanc & Castaneam equinam, de qua postea: imò parum absuit quin & hæc periret. In fornice autem cum eodem dololo, in quo aduecta fuerat, eademq; terrâ illata, & sequente Aprili educla ramos omnino secos cum deprehendissem, ad vivum releui, & vasculum loco umbroso reposui, ne à solis radiis exsiccata difficilius repullularet. Cœpit tandem Autumno secundum radicem aliquot germina proferre, quæ cum ea trunci parte cui inhærebant (resecto inuultu & sicco) in aliud vas translata, magna cura deinde alui, vt elegantè arbusculam postea habuerim: reliqua etiam germina, ubi paulo altius excrevisissent, in terram inflexa radices egerunt, aliasq; arbusculas dederunt, quas & Principibus viris, & amicis communicavi.

Longior paulò in his referendis, & Lectoti molestus fortasse fuit: non potui tamen ea silentio præterire, ut intelligant studiosi quibus difficultatibus ad huius rarissimæ stirpis possessionem peruenierim.

Messa porro fuit hæc arbuscula *Trabifem curmassi* nomine, quod Trapezuntinam dædylum interpretati sunt. Sed cum nihil cum palma commune habeat, fasus impropiè hoc nomen illi inditum arbitror.

BELLONIVS lib. I. Obelationum cap. XLIIII. inter arbores perpetuò virentes recenset Trapezuntinam quandam ferentem cerasa: meminit & eo libello, cui De ratione circurandi filvestres arborestitulum fecit, cap. XX. (utrumque librum Latio donauit, ut rei herbariæ studiosi illius viri lucubrationibus quæ Gallico sermone scriptæ sunt, frui possint) & Laurocerasum appellat: eius tamen historiam non describit, nisi quod eodem capite illius ramum mali Citrix ramo æqualem facit, & eius prægrandem arborem Genux in horto Principis d'Orta postea vidisse asserit. Cum verò huius nostræ folia maximam similitudinem cum mali Citrix foliis habeant, nec desint, & Trapezunte Constantinopolim, ut nomè indicat, primum allatam fuisse verisimile sit, eam esse omnino existimo, quam Bellonius observavit.

Laurocerasi autem nomen, quantum coniectura adest qui possum, illi impositum à foliorum cum laurinis similitudine, & fructu cerasis æquali: tamen si postremo loco ex Pliniana historia id inuenisse asserimet. Verum nusquam apud Plinium Laurocerasi vocem legere memini: is quidem lib. XV. cap. XXV. ubi Cerasi genera enumerat, de cerasis lauro infusus agit. Minus quinquennium est, inquit, quod prodire que vocant lanrea, non ingræz amaritudinis, infusa in Lauro. Hanc autem quam proponimus arborem, ipsum intelligere, vix mihi persuadere queo.

Sed cum aptiore appellatione careamus: neque sine iudicio Bellonius ea usus esse videatur, Laurocerasum cum ipso nuncupabimus, donec ex veterum monumentis commodum aliqua sese offerat. Si cui tamen Palmæ Trapezuntinæ vocabulum, quod Constantinopoli adepta est, aut Cerasi Trapezuntinæ, ut Bellonius etiam Gallico sermone usurpat, magis arideret, eo utatur, per me licet.

Dalechampij porro opinio mihi non satisfacit, qui hanc stirpem Theoph. Hist. lib. II. cap. II. Locum secundam esse censet: nam huius fructus non nascitur tæyiti modo æternis, siue ut Græcus Theoph. codex habet καὶ αἰώνια τὰ μέρη παρὰλληλα, sed racematim vix modicis ipsius certè flores, uti dixi, in hastula confertim plurimi nascuntur. Neque quoddam Dædylum Trapezuntinam esse statuit Lotum aphyricanam Matthioli, cui durum nucleum tribuit, quæ de causa d'Isoporus Theoph. Hist. lib. III. cap. XII. esse vult, cuius nucleus durus est, in qua opinione etiam est, marginalibus in Arhenzum ab ipso Latio donatum scholiis. At Locum Aphyricana non nucleum, sed semina duntaxat habet. Imò quoque Viennæ Austriæ & apud Pannonem cultas observavi, fructum quidem ferebant, sed seminis expertem, & sola dulci pulpa constantem, licet semine ex Italia misso natæ essent. Perinde Faba Græca Plin. lib. XVI. cap. XXX. esse potest.

MALVS MEDICA.

CAP. III.

FOLIORVM similitudo facit, ut pauca quædam de Mali medicæ generibus quæ in Hispanica mea peregrinatione observavi, superiori arbori subiungeream.

MEDICORVM malorum varia sunt genera. Alia enim Hispanis *Cidras* dicuntur, alia *Limonæ*, alia *Limas*, alia *Naranjas*, alia *Tarungas*.

QVÆ Citria siue Cidras fert *Cidreira* dicta, brevi trunco est, longis ramis firmis, crassis & acenis spinis, foliis magnis, latis, & per ambitum serratis aliquantulum. Fructum fert magnum & oblongum, Meloæponis amplitudinem intermedium æquantem, cortice per maturitatem flavescente, densa carne, candida, firma & eduli, nullo ferè interiore succo, odor mali fragrantissimus: flores sunt candidi, sæpiusculè forinsecus purpurascètes, odorati. Semper hæc aut floret, vel fructu onusta est. Sunt qui fructum nascentem figulinis formis varias figuras experimentibus includunt, atq; ita relinquunt donec fructus maturitatem consequatur, tum demum formas auferunt, vt malum nativum colorem adfiscat, iucundo sanè spectaculo.

Citria malus.

Limonex.

Limonex 4.
generat.

CITRIA fere similis est, quam ipsi Limoneram appellant, cuius fructus minoribus Citris pares, oblongi, satis densa carne, & multo succo acido præditi, nullis aut perpaucis intus acinis: folia Citris breviora, flos purpurascens foris, spinæ minores & breviores quam in Limera: huius generis reperiuntur etiam dulces, minores tamen & oblongi Limis similes. Audio & eius genus prægnans reperi, alium fructum minorem in se continens, incolæ sua lingua *Limonex priados* vocant: verum id genus non est mihi conspectum. Doctiss. vir S. de Tovar ex Fortunatis Insulis delatum scribebat in Indice sui horti quem ad me mittebat anno M. D. XCV. & aliud genus se alere totum fere carneum quod varias figuras representat, eam ob causam ab Hispanis *Limonex de figuras* appellari. Quartum autem genus omnium maximum conspiciebam Hagæ Comitum apud Batavos anno M. D. XLIII. Illud Heroïnæ Principi de Chimay, à Doctissimo viro Bernardo Paludano Medico missum: id enim Citrij mali grandioris magnitudinem æquabat, corticem verò minus densum, & aurum instar fulgentem habebat, grumos etiam interiores minus acidus, quam reliqua genera.

Limon 3.
generat.

QUAM ipsi Limetam nuncupant, magno caudice assurgit, ramosque habet tenuiores, longos, firmis, longis, virentibus spinis armatos, folia per ambitum nonnihil serrata, florem candidum, fructum paulo minorem Limonera, oblongiusculum, ubi maturuit flavescens, cortice renui, ut nil nisi succum fere contineat, cumque acidissimum. Semper flore & fructu onusta conspiciuntur. Aliud porro eius est genus per omnia fere simile, nisi spinis caret, vel eas perquam exiguas haberet, & illius fructus rotundus esset, summa parte quasi corona aut umbilico insignitus. Vtriusque acini seu grana oblonga sunt.

Aurea malus
varij generis.

AUREA malus reliquas huius generis magnitudine superat, Malo vulgari non inferior fertili solo, tamen humilis interdum repenatur: firmos habet ramos, spinas paucas & breves, folia viridia, minime per ambitum serrata, flores candidos odoratissimos, fructum, *Naranja* à Hispani vocant, maturitate aurei coloris, succo præditum aut dulci, aut vinofo, aut acido, in quo grana frequentia, rotundiora quam in Limonibus. Habet etiam hæc arbor sui generis puilionem, qui insitione vel inoculatione propagatur: liberalior est hæc ferendus floribus & malis etiam in frigidis regionibus, modo rite curetur.

Aur. mal.
pusillo.Aur. malus
etuli cortice.Aur. mal.
pusillioris
figura.

Ex eo genere quod dulci est succo, Hispani apud Chartusianos (Hispani *las Cuenas* nominant) trans Bætiam flumen, binas arbores conspexi quæ fructum ferebant carne multo firmiore præditum Armeniacorum fere modo, licet similiter eamerulis distinctum & succulentum ut reliquorum, cuius cortex unâ cum carne & succosa substantia mandebatur, corticis color insigniter aureus est. Hispani *Naranja caxel* vocant. Aliud insuper genus cuius succus acidus unicum granum continebat.

QYAR

Malum aureum.

Poma Adami.



QVAE vulgò Poma Adami dicuntur, ea Galli *Pomiers* Batavi, *Terenjas*, Lusitani *Zambouas* ^{Terenjas} ^{Zambouas} appellant. Arbor ipsa interdum humilior est, Citrix perquam similis, magna tamen ex parte celliorem *Malum aurea* aequat: breves habet spinas, folia *Limonez*, florem candidum, odoratum, fructum rotundum, triplo maiorem aurea malo, maturitate hauescentem, cortice inaequali, denso, crassa & fungosa carne, quæ à nonnullis cum cortice simul editur, fucobrevibus folliculis ut & mali aureæ comprehenso (in reliquis enim generibus folliculi sive vesiculæ succum continentes oblongiusculæ sunt) granis subrotundis. Nonnulli *Afsyrium* malum vocant.

CETERVM, præter Aurantium malum eduli cortice, decem mali Medici genera apud Hispanenses inueniri, ex altero Indice, quem anno M. D. xcvi. eruditissimus vir D. Simon de Tovar mittebat, intelligebam: accipiebam enim ab illo femina illius quod Hispani *Zambouas* appellat, deinde *Limones de carne*, *Limones de figuras*, *Limones preñados*, *Limones pomiers*, *Limones centies*, *Limones dulces*, *Limones dulces limas agrias*, *Limones de Tulse*, vel *Limones del Emperador*, quoniam, inquit, ab Imperatore Carolo V. ex Vngaria in Hispaniam primò delata hæc plâta fertur, cuius quidem opinionis fidem augere videtur, quòd ultra cetera mali Medici genera, hæc frigoris patientissima existat. Est autem eius fructus edulis multo suaviore gustu præditus quàm Auratiz castel, succus verò eius maxime ad acidum dulcem accedens, ideoque omnium mali Medici generum acidiorum suauissimum.

Omnium porò folia perpetuò viridia sunt, multisque veluti foraminibus, si soli obiciantur, pertusa, instar foliorum Hyperici, iuncturâ quadam pediculo inhaerentia: folia mali aureæ folia secundùm iuncturam tamquam appendices habent.


CASTANEA EQVINA.

CAP. V.

EQVINAM Castaneam CL. V. Matthiolus commentariis in t. lib. Dioscoridis descripsit: quoniam tamen nondum apud nostros, aut certe rarissime conspecta est, & mihi ^{Castanea} ^{equina hi-} ^{storia.} egregiè adolevit, illius historiam aducere libuit.

VASTAM esse hanc arborē intelligo, quam sanè Vienna discens anno M. D. LXXXVIII. istic reliqui, intra duodecimum annum, in humanæ coxæ crassitudinem, duarumq; orgyiarum aut amplius altitudinem adoleverat, latamque comam sparserat. Frigoris patientissimam esse, umbræque & aqua ut Platanum delectari deprehendi. Autumno autem, cum folia abiicit, protinus gerit amentaceum quiddam extremis ramulis, & turgidum, quasi parturit, pinguique & lento humore conspersum, in quo culices & huiusmodi insecta hærent, totaque huic ita perdurat, donec incunte vete, & præmaturè ad modum, gemmæ in folia

Castanea equina.

Castaneæ equinæ fructus echinato
suo calice tectus.

Castaneæ Peruinæ fructus.

fese explicant, quæ palmata sunt, & plerumque septena numero uni eisdemque pediculo inhaerentia, tenella initio & dilutiorē viriditate prædita, deinde venosa, rugola, longa, ab infima parte sensim in latum excreſcentia, & per oras crenata, mucronata culpidē, ſuperne virentia, inferne candicantia, amariuſculo ſapore: pediculi quibus inhaerent oblongi, bini ſemper æquali ſitu, oppoſito tamen, alternatim ramos amplectuntur: novelli rami virent, adulti cinereo cortice obdukti ſunt, ſub quo latet alius ſucculentus, viridis, lignum ambiens, ut in Sambuco, vel Acere latifolio, cui huius arboris (quantum quidem ex ea quam unicam alui deprehendere licuit) marenis perſimilis eſt. Eius ſlos & recens fructus nondum mihi conſpecti, tametiſi in eam amplitudinem, ut dixi, mea excreverit, ut ſperare flores daturam: ſed neque ſæpius peritos ab amicis qui Conſtantinopoli cum Cæſareis Legatis fuerunt, impetrare potui. Succus vero fructus inde aliquoties allatus, nudus omnino, & ſine calice exemptus: tandem cum ſuo echino communicatus, à doctiſſimo viro Chriſtophoro Wexio ex ſua peregrinatione Ægyptiaca, Syriaca, Aſiatica, & Byzantina reduce anno M. D. LXXXVII. Eſt verò vulgari caſtaneæ æqualis, interdum etiam maior, non in mucronem deſinens ut illa, ſed planior, & orbiculari quodammodo forma, tuberculo quodam ſuperiore parte eminente, quod ſenſim gracileſcens, ad pronam uſque partem extenditur, germen (quod iſtic ortum habet) amplectens: coriaceo cortice integitur ut vulgaris, qui ſuperne ſpadicis coloris eſt, ſed infima, qua ſuo echinato calyci adheret, exalbidus, ſimilem propodemum notam impreſſam habet, qualis in vellicariæ repentis ſeu peregrinæ ſemine conſpicitur, ſed longè maiorem, nec ita candidam: ſingularis eſt hic cortex, nec aliam tunicam aut lanuginem intra ſe occultit, quemadmodum noſtrates caſtaneæ: ſtima & ſolida conſtat carne, candida ut vulgares, non aded grati ſaporis tamen, ſed amancantius potius, præſertim vetuſtor & ſicca, qualem deguſtavi: ſingulæ magna ex parte, nonnumquam binæ, eodem calyce multis brevibus firmiſq; ſpinis horrido includuntur, qui per maruſcitatem in tres partes dehiſcens, nucem oſtendit ipſius lateri infima parte inhaerentem, non à pediculo, ut reliquæ nuceſ.

As. creſcentia.
Ad caſtaneæ.
Cæſtægne de
echino.
Cæſtægne de
echino.
Cæſtægne de
echino.
Cæſtægne de
echino.

VATEKIVS ignotam fuiſſe hanc arborem cenſeo, quandoquidem nullius hiſtoriam, quæ ab illis deſcripta ſit, legere memini, quæ huic arbori convenire deprehendatur.

Turcæ at cæſtaneæ, vel ad caſtaneæ, id eſt, equinæ caſtaneæ nomine inſignunt, quia eius fructum devoratum, anhelis & ruſſienſibus equis plurimum auxilij adferre comperiunt. Gallis dici poteſt *Chæſtægne de cheval*, Germanis *Reiſe Reſen*, Italis *Caſtagna di cavallo*, Hiſpanis *Caſtaña de cavallo*.

Hic nō poſſum nō adiciere elegās Caſtaneæ genus mihi à doctiſſimo viro, eodēq; Coſmograp

grapho clarissimo Abrahamo Ortelio, veteri amico donatum anno M. D. XCI. quod ille ex Peruzina provincia delatus, à celeberrimo V. Benedicto Aria Mótano paulo antè accepterat.

Sphærica portò pæne figuræ est hæc Castanea, nisi latera haberet paulo depressiora, præsertim ubi pediculo inhaeret, cortice satis crasso, fragili tamen, & veluti fungoso obducta, coloris ex fulco aliquantulum flavescentis: huic subsunt innumerae tenues quidem sed firmæ spinæ, putamini, quod nucleum includit, tenaciter inhaerentes: ipsum putamen fuscum est, non densum, sed lentum & fractu contumax, interiore parte læve & splendens, quo continetur nucleus amygdalæ (putamine suo liberæ) magnitudine & colore, forma autem leporino reni similis, intrus albus, sapore dulcis ferè ut amygdala aut castanea vulgaris.

Eius iconem, in studioforum gratiam, sub Castaneæ equinæ fructu, suo echinato calice prædito, eadem tabellâ exprimi curavimus à perito & diligente artifice.

Castanea Putamen.

PLATANVS, ACER, SORBUS, &c.

CAP. VI.

Platanus.



TAMETS I Platanus in iis regionibus quas adj. pte non nascatur, quia tamen cum Castanea equina Constantinopoli allata, ad aliquot orgyas mihi Viennæ Aultruz adolevit, illius mentionem hic obiter facere volui. Historiâ apud alios videre licet.

ACERIS etiam, quod foliorum similitudine proximè ad Platanum accedit. Eius in Viennensi saltu, & aliis vicinis sylvis observantur duo illa genera, à plerisque iâ descripta.

Latifolium oblongiore florum uva, candidiore & laxiore materie, quod ab imperitis Platanî nomine donatû est: Galli *Plane* vocant, Vngari *laner sa*.

Alterû minore folio, firmiore materia, crassiore cortice, ab imperitis in Gallia Sycomorus nûcupatum, id Galli *Erable*, Vngari *thar sa* dicitur. Vtrumq; genus Germani *Bohnend. Bohnenbaum* Itali *acere*, Hispani *el acere* appellât.

SORBUS item terminalis Plinio dicta & Herbariorum lib. III. Hist. plant. cap. XV. descripium esse censent, Viennensi saltui, & plerisque aliis Aultruz & Pannoniæ sylvis familiaris est. Eius fructus Octobri Viennam in forum venalis addfert, à tenuioris fortune hominibus & pueris admodum expetitus: Galli *Aucier*, Germani *Böhlbe* Vngari *Barkacz* vocant.

FREQVENS est & iisdem locis, præsertim verò inter saxa & rupes, id Sorbi genus, quod nonnulli Ariam Theoph. esse censent, folio coryli aut alni ferè, sed prona parte omnino incano, fructum ferens superiori proximum sed colore differentem, qui ruber est, minimè edulè, & à nullo animantium, præterquam ab avibus expetitur. Eius nullum vulgare nomen novi præter Aultriacum, quod *Melpersaum* est.

AVCYPARIA etiam cognominata Sorbus à baccharum usu, quod iis hieme aucupes turdis & metulis insidiari soleant, foliis legitime Sorbi, vel Fraxini. Eam Dalechampius cur torminale censcat, nullam eausam video, cum eius rubris bacis nemo vescatur, sed à folis turdis alisque sylvicolis avibus, gallinagine præsertim expetatur: deinde ubi Platanî folia, quæ Plinius Sorbo torminali tribuit: Germanis *Dogelbe*, *Wasser vob* *Maderpsaum*: Vngari *Börbe* *herkinye* dicitur.

AT legitima Sorbus plerisque regionibus quas adj. satis vulgaris est, foliis superiori proxima, mollioribus tamen, & nonnihil pubescentibus, fructum fert plerisque expetitur, præsertim mulierculis & pueris, & interdum secundis mensis maturus additur. Vngari *Berkinye*, Aultriaci

Platanus.

Acer.

latifolium.

minore.

Sorbus terminalis Crap. Theophrasti.

Aria Theophrasti.

Aucuparia Sorb.

Sorbus legitima.

Acer latifol.



Sorbus torminalis Plinij.



Sorbus legitima.

Juglans ge-
nui aliorum.Corylus va-
ri generis.

Austriaci *Acheritz* vocant: reliqui Germani ar-
borē *Eperbaum* & *Eperwebaum*: fructū *Eperlings*.
Galli arb. *Cormier*, fruct. *Corme*: Itali arb. *Sorbole-
ro*, fruct. *Sorbo*: Hispani arb. *Sersul*, fruct. *Sersul*.

Hic autem non possum non meminisse, ge-
neris illius Juglandis haud vulgaris, mihi certē
proximis annis demum observati, & nati nuce
quæ cum aliis vulgaribus secundis mensis adpo-
sita in convivio quodam ad quod eram evoca-
tus: ipsius porro nucis teneritudo, & longior quā
vulgaris forma, me invitabat, ut binas seponere,
rarus diversam à vulgari eam esse arborem, quæ
cujusmodi nuces ferret. Hogelando amico nuces
mittebam, quæ ipsi non modò germinarunt, sed
folia etiam protulerūt, vulgaris quidē Juglandis
foliis formā similia, hoc est alata, instar foliorum
Fraxini, sed lōgè magis tencilla, atque in ambitu
ferrata: quorum odor etiam gravis ut in vulgari.

AVELLANA BIZANTINA.

CAP. VII.

CORYLVS duorum vulgo est generum, syl-
vestris sponte nascens passim obvia, & do-
mestica, quæ in hortis colitur. Ea etiam duorum
est generum: nam vel oblongiusculum fructum
fert, eumque duplicem, unius enim nucleus ru-
bra (qui præstantior iudicatur) alterius alba pel-
licula integitur: vel breviorē & crassiusculum,

qualis in Italia, Hispania reperitur, & Londini mihi conspectus est, & Francofurti ad
Mœnum satis frequens.

VERVM aliud genus peregrinū & rarum admodū hic propono, quod anno M. D. LXXXI.
primum

Corylus.

Auellana pumila Byzantina.



Auellanae Byzantinae ramus cum fructu minore.



primū, deinde quadriennio pōst iterum alatum est Constantinopoli cū varij generis bulbaceis stirpibus curante Mag^{ro} ac Generoso D. Dauide Vignad Barone in Zonneck, Consilij bellici in Austria Praesidi, qui & Turcarum Imperatori, cuiusque Proceribus in deliciis esse mihi affirmabat.

Eius potior frutex, eo asserente, supra cubitalem altitudinem raro excrescit, sed pumilus semper permanet: crassos admodum magnosque ferens in tenuibus pediculis calyces callosos durosque, modò singulares, modò plures simul in eodem pediculo cohaerentes, ut vulgaris, extrema parte in multas crassas longasque lacinias divisos, sede etiam multis fimbriatis appendicibus obsita: sunt verò ij calyces foris valde dura asperaque lanugine hirsuti, interiore parte laeves, continentes fructum Auellanae sylvestris & sponte nascenti ferè similem, vel aliquantulum breviorē, duroque putamine, ut illa constantem, qui nucleum similem continet, quem initio observare non potui, quòd unicum dumtaxat fructum, qualem tum in Pannonicis stirpium historia expressi, impetrare potuerim: postea tamen cum plures nactus esset, & aliquot ab ipso accepissem suis calycibus inclusos & exemptos, non modò degustare volui, sed etiam telluri comisi in fide libus, non cum suo calyce, ut antè mihi fuerat significatū, sed nudos: atque illi quidem altero dumtaxat à facione anno nati sunt, & in singularem virgulā excreverunt pedalem, quam sine ordine

*Auellana
Byzantina
historia.*

ordine oblongiora paulo quàm in vulgari ambicant folia, perinde tamen rugosa: Eius unicum fruticem humanà altitudinem superantem, adhuc alebam, cùm Francofurtò discessi M. D. XCIII. sed qui ullius fructus specimen nondū dedecet: imò neq, etiam anno M. D. XCV. licet in magnam altitudinē excrevisset, ut ad me scriberet, cui arbore discedens reliqueram.

ALNVS,

Alnus vulgaris.



Cornus.

CAP. VIII.

Alnus altera.



AD E ò vulgaris est notitiæ Alnus, ut cùm ab omnibus rei herbariæ scriptoribus eius historia sit prodita, supervacaneum esse videatur eius hęc meminisse. Quia tamen quotquot illius historiam dederunt, unicum eius genus agnovisse animadverto, operæpretium me facturum existimavi, si quæ circa hanc stirpem observabam, hic proponerem.

VULGARIS illa, omnibus provinciis (quas quidem adij) admodum familiaris est, & Gallis *Aulne*, Germanis *Erlenbaum*, Italis *Alno*, Hispanis *Aliso*, Ungaris *Eger* sa dicitur, Græcis *ελαιόρ*.

At aliud genus alunt Austriæ & Scythiæ montana, circa flumina & rudis locis, etià in Danubij insulis circa Viennâ frequens est alteri cōmixtum: quod perinde affurgit ut primum: huius cortex candidior est, folia quidem alteri similia & perinde rugosa, minora tamen aliquantum, superne non splendens ut in primo genere, sed inferne candicantia: iuli etiam & strobili minores quàm in vulgari, tenellique rami & novella folia nullo lento humore aspersa ut in priore. Vtriusq, differentia rusticis illarum provinciarum etiam bene nota: nam primum genus *Schwarz aln*, hoc est Alnum nigrum: hoc *Weiss aln*, id est, albam Alnum appellant. Huius cortex magis refrigerantem & adstringentem cum siccitate facilitatem obtinere videtur quàm vulgaris.

FOLIO

FOLIORVM quædam affinitas facit ut de Corno aliquid subijciam. Nam præter vulgaram, quæ à ceteris qui Plantarum Historiam descripserunt, est proposita, aliud genus observabam Orobanchis initio M. D. XCIII. cum Francofurto Coloniam descenderem, Andernaci ad Rheum, in litto ejus diversorij cui symbolum S. Spiritus, moente honesto viro Hieronymo Scholier.

Non minore porrò altitudine assurgebat illa arbor, quàm vulgaris mas, ejusque caudex simili cortice erat obductus: verùm ramuli, illius ramulis longè fragiliores, folia ex adverso eos amplectentia, brevi pediculo, instar foliorum vulgaris, nitentia, nec illis minùs nervosa, in ambitu non serrata, sed vulgaris folijs lariores, ex quorum alis cutaceæ thecæ emergebant etiam ante brumam, in quibus florum subsequente novo vere explicandorum gemmæ: floret enim cum vulgari, ejusque fructus cum illo maturefcit, satutiùs tamen (ut intelligebam) rubens: craffiora etiam, brevioraque officula habet.

VULGARIS aurem Cornus, sed sylvestrior & magis pumila, frequens nascitur multis arboribus sylvis.

EADEM foliorum affinitas facit, ut quæ circa Vlmum etiam observabam, dum Salmaritice in Hispania agebam, hic adjiciam: nempe Vlmorum, juxta Thormum amnem nascentium quædam radices in frequentia tenuissimaque stamina desinere, atque cum præterlabentibus aquis perliantur, rubescerent colore contrahere. In his nascuntur & lateri exigua quædam animalcula locustulis sive exiguis squillulis perquam similia, quæ Salmaritices picatores diligenter colligunt in escam capiendis piscibus idoneam. Quæ verò piscatorum oculos effugiant, si diutius illis radiculis implicata persistant, adolefcunt, & ex radiculis emergentia avolant instar terrestrium locustarum: postea certo tẽpore in aquas temeant, ad conservandum suum genus.

SILIQVA SILVESTRIS.

CAP. IX.

Arbor Iudz.



HVC arbori Siliquæ sylvestris nomen indidi, non quòd Siliquæ veteribus descripæ similes sit, sed quia nonnullis Hispaniæ locis vulgari nomine sic appelletur.

1. CRESCIT interdum in arborem juxta magnitudinis, locis cultis sed neglecta & sponte nascentis, plerumque inter frutices potius, quàm arbores censenda est. Rariores fert ramos alternatim ex lateribus nascentes, cortice ex purpura nigricante tactos, qui primo Vere ante folia, aut ijs primùm germinare incipientibus, inferiore parte ternos aut quaternos flores simul junctos ferunt, genistæ aut pisorum forma, colore purpureo elegantis: folia deinde ex intervallis prodeunt Asari ferè, minùs tamen carnosa, circinaræ propemodum rotunditatis, nervosa admodum uti Aristolochiarum, & dura, superiore parte viridia, inferiore verò nonnihil candicantia: floribus succedunt membranaceæ purpurascences siliquæ, & quodam modo transparentes, compressæ, digitalis longitudinis & latitudinis, in quibus semen lentis planum, dutum.

2. Aliud genus invenitur per omnia ferè simile, præter florem, qui in hoc candicat, cum in superiore purpureus sit, & corticem virgultorum qui candicat potius quàm purpurascit.

Sponte nascitur primùm genus Granatensis regionis, & quibusdam aliis Hispaniæ atque Narbonensis Galliæ locis inter tepes. Abitur etiam in hortis non modo in Germania & Belpica, sed etiam in veteri Hispaniæ Castella ob venustatem. Secundum genus flore candido sponte nascentis non vidi, sed semine dumtaxat natum quibusdam Belgicijs hortis.

VULGVS Herbariorum Arborem Iudz appellat: quidam à siliquarum sive lorum generatione Fabaginæ: Granatenses vulgari sermone *Algaronelos*, hoc est Siliquam faruam sive sylvestrem: Mauritanii illius regionis incolæ *Dit*: Castellani propter elegantiam & venustatem *Arbol d' amor*, Galli *Guanier*, quasi vaginalem, quia, ut opinor, ejus siliquæ cultorum vaginæ æmulantur.

QVO nomine hæc arbor veteribus sit dicta, non facile dixerim. Nonnulli ad Cercin Theophr. referunt. Sed ea nihil aliud est quàm populi tertium genus eleganter descriptum, quod

Siliqua sylvestris.

Arbor Iudz alba flora.

Natalis.

Hominis.

Cercin Theophr.

quod Plinius Lybicam appellat, Gaza verò pro Cerci Alpnam posuit: & Cerci *aspak*, vocabulum usurpavit lib. 1. Theoph. de plant. Hist. cap. xviii. inter arbores siliquis præditas post *xaparias*, ubi quædam Græca exempla non *aspak*, sed *xxxk* legunt. Plinius lib. xxxi. cap. 11. meminit Siliquæ silvestris, quam purpurcum florem ferre ait: an verò hæc nostra sit, difficile est ex unica illa nota iudicare.

*Calyrea
Theophr.*

DVM Mompelij degebam, peritiores rei herbariæ studiosi Arborem Iudæ referrebat ad Colyteam Theoph. descriptam lib. Hist. plant. 111. cap. xvi. quæ sic habet:

Quæ verò circa Idam provenit Colytea appellata, alterius generis est, fruticosa, nodosa, multis alis concava, non admodum rara, folio laurino latifolia Lauri, sed rotundiore amplioreque, ut vel ulmeo simile appareat, oblongius tamen, colore parte altera herbido, tergo autem subalbido nervosoque, nervulis præternubus fibrisque inter eas propagines quæ è medio callo collarum in modum excurrunt: &c. Et cap. xiiii. eiusdem libri, siliquas illi tribuit leguminum modo. Quæ sanè notæ, præsertim si utriusque Colyteæ descriptio in unam contrahatur, Arbori Iudæ plurimum conveniunt.

*Calyrea
Theophr.*

Porro Colutea quam sponte nascentem in quibusdam Austriæ montanis inveni, egrègiè à Theoph. lib. Hist. 111. cap. xvii. describitur ante Colyteam, & est satis vulgaris ubique notitiæ. Eam Galli *Beguenandier* appellant.

Kegvin.

CRITERVM Siliqua Græcis *Kapania* dicta, Valentino regno frequentissima est, ubi eius fructus in iumentorum pabulum cedit. Confpicitur & alius Hispaniæ locis magnæ altitudinis, lateque ramos spargens: caudex illius crassus, longi firmique rami, folia alata ut Terebinthi aut Pistaciz, majora, Novembri & Decembri rulum instar luglandis ferè, in flores ex rubro purpurascens: se se aperientem: siliquas de inde digitali longitudine, erassas, edules, quæ grana continent Cassiæ siliquotæ quam solutivam cognominant, grana non dissimilia, Galli arborem *Cereger*, fructum *Cereger*: Germani fructum (nam arbor illis incognita) *Bos Johans* vocat: Itali *Carobe* & *Carobole*: Hispani arb. *Algarvus* & *Garrus*, fruct. *Garrus*: Vngari, Germanos imitati, fructum *Scentiansi kengere*, id est. D. Ioannis panem appellant.

LENTISCVS.

CAP. X.

*Lentiscus in
Asia.*



Nabab.

*Maffich in
sola Chio.*

Nimbia.

MAGNA solum ex parte fruticat Lentiscus, multis ab una radice folionibus & virgultis assurgens, lentis, & viminis instar obsequosis, cinereo cortice obductis: interdum verò quando non cæditur, sed negligitur (ut plerique locis ad Anam flumen, quod Hispani *Guadiana* appellant, observavi) in arbore iussu magnitudinis excrevit: folia Glycyrrhizæ, firmiora & duriora, atra viriditate splendens, alata, hoc est in longo pediculo utrinque sita, foliorum inter se semper contrariis pediculis, ut in Terebintho, Iuglande, Fraxino, Sorbo, & plerisque aliis, nullo tamen extremo imparem numerum (ut in illis) faciente, iucundi cum quadam gravitate odoris, sapore acidiusculo, & adstringente: his interdum adnascuntur vesiculæ aut folliculi, culicibus exiguis pleni ut in Terebinthinis: Bos in alarum cavis circa oblongum pediculum racematim cohzrens, muscosus, colore ex herbido pallefcente, nonnihil purpurascens: fructus deinde initio viridis, mox ex purpureo rubes, per maturitatem niger & oleaginosus, erui magnitudine, nucleo duro, nigro, candidam medullam continente.

PROVENIT copiosè per Lusitaniam, Bæticam, regnum Valentinum, & toto illo tractu ad mare mediterraneum obverso, atque in Gallia Narbonensibus: floret Aprilis, fructus Octobri & Novembri primùm maturefcit.

Belonius lib. 11. Observat. cap. viii. refert in insula Chio copiosissimum esse Lentisci proventum, & primarias Insularium opes & fortunas consistere in Maffichis (quam sola hæc insula subministrat) collectione, nec minore impèsa & diligètia Lentiscos isth excoli, quàm in Gallia vites, non differre tamen arborem ab ea, quæ in Narbonensibus Gallia & Italia provenit: Idem mihi retulerunt qui Constantinopoli redeuntes, in Chio aliquamdiu hæserunt, nonnihil tamen differre arbutulas ab ijs quæ in Italia nascuntur.

DICTA Græcis *ῥίζον*, Latinis *Léntiscus*, Gallis *Lentisque*, Italis *Lentisco*, Hispanis *Mate*, nonnulli.

nonnullis *aranea*, Lusitanis *arveira*. Ejus resina Græcis *resin*, *gōira*, *gōira*, *gōira*, Latinis Resina Lentiscina, & Mafliche, Officinis *Mastix*, Gallis *Mastic*, Germanis *Mischli*, Hispanis *Almofaga*, Italis *Mastice*: oleum ex lentisci baccis expressum Gallis *huile de mastic*, Hispanis *aceite de mala*.

TRIBUIT Dioscorides Lentisco, Acaciz & Hypocistidis vires: Maflichen sanguinis *Tarlatan*. rejectionibus, & veteri tussi utilem esse dicit: oleum quod ē semine fit, cūm quid adstringendum est.

Cūm in Narbonensi Gallia degerem, oleum ex Lentisci baccis exprimebatur magni ad varia usus, quod in peregrinas regiones asportabatur. Et denticulata expurgandis dentibus idonea, non minū quam olim, ex Lentisci ligno conficiebantur: ut etiam in plerisque alijs regionibus, quæ Lentiscum alunt. Hispani tamen majore ex parte festucus ē Gimgadij sive Bisnagæ umbella detrahis, dentes à cibo purgare solent, tamen si apud eos copiose nascatur Lentiscus: sed unica Bisnagæ umbella plurima denticulata ex tempore subministrat.

Bisnaga.

TEREBINTHVS

CAP. XI.



TEREBINTHVM in duo genera, hoc est *Terebinthus* marem & feminam distinguit Theophrast. lib. Hist. Plant. III. cap. xv: Marem sterilem faciens, feminam fructiferam, quæ duplex sit, una fructum protinus rufum promens lentis magnitudine, qui concoqui nequit: alia, viridem editum, postmodum rufum tingens, postremo nigram faciens magnitudine fabæ, &c.

Ego illas differentias non observavi, tamen si diligenter inquisiverim: nisi differentia sit appellanda, cūm frutices inter se omnino similes fructum ferunt, alter inanem & rufum, aliter interdum ad maturitatem perductum; nonnumquam etiam frutex non adultus, aut nimis umbroso & iniquo loco proveniens, nullum fert.

MAXIMA porro ex parte Terebinthus fruticet, ramis longis, raris, cuius cortice testis: folia illi Lauri, aut Pistaciz potius (quæ plurimum consensu Terebinthus indica est, cujus Theophrast. lib. III. cap. v. meminit) ejusdem cum illa odoris, circa unum pediculum conjugatim ut in Sorbo nascentia, uno, quod extremo pediculo inheret, impare, & hieme, quantum videlicet mihi observari licuit, decidua. Verè, cūm novella folia, prorsus ferè rubentia extremis ramis germinare incipiunt, nascitur ē ramorum tuberculus, copiosus & mucosus, ut olez, flos, purpurascens, vel phœniceus, racematim cohzrens, qui temporis successu in fructum transit Lentiscino ferè similem, paulò majorem & longiorem, initio viridem, circa vindemias, dum maturuit ex cæruleo virefcentem, tactu pinguem & resinofum, manusq; dum colligitur inficientem, medullam in se continentem. Plerisque frutices eum rubescere incipientem, ante maturitatem, inanem abijciunt, Carpopalsamo quod in officinis venale proponitur, planè similem. Fert etiam vindemiarum tempore concavos quosdam folliculos ten vesiculas folijs & ramulis inhzentes, quales ferè in Vimi folijs nascuntur, sed pallido aut purpurascens colore: interdum etiam extremis ramis oblonga & cartilaginea cornicula, varia forma excrefcentia, concava, quæ (uti etiam folliculi) aperta, lentorem quandam continere deprehenduntur cui permixta cinerea & fuliginosa excrementa, atque exigua animalcula alata.

Terebinthus indica.

Sponitè provenit plurimis Lusitaniz, Hispaniz, & Galliz Narbonensis locis, ubi interdum in arboris formam assurgit: sed maxima ex parte solummodo fruticet. Nusquam, quod sciam, commemoratis locis resina ex Terebintho elicitor: Bellonius in Syria & Cilicia copiosam inveniri, quæ venalis Damascum inferatur, & in Mesopotamia, & Tutcis Asamia vocata, quæ in Cairo venditur, refert.

GRÆCI *τρίψανθον*, Latini Terebinthum, Galli *Terebinthe*, Hispani nonnulli, à corniculis, ut arboris, *Cornu abra*. Fructum ejus Avicenna Granum viride vocat. Resina Græcis *resin*, *gōira*, Latinis Terebinthina resina, Avicennæ gluten Albotin, Officinis ignota nam quam Terebinthinæ nomine donant, Abiigna est.

HVIS cortici & folijs eisdem vires tribuit Dioscorides quas Lentisco, similemque esse illorum & parandi & sumendi rationem. Præterea fructum ejus aptum esse, sed stomacho adversari,

Natalis.

Tarlatan.

adversari, excalcificare, utinam movere, venereum excitare, cœtra phalangiorum morfus conuenienter in vino bibi. Ejus resina reliquas anrecellit, teste Dioscoride: Galenus tamen, nonnullarum facultatum ratione, Masticen præferendam censet.

BELLONIVS lib. II. Observationum cap. xcvi. refert, cum in Cilicia esset, in Arabem quendam rusticum incidisse, qui Camelum Terebinthi fructu onustum ageret Damascum, ut illic venderet, vulgò enim illic in cibum recipi. Quod verò ab alio nemine obseruatum puto, scribit idem lib. I. cap. LXV. & lib. III. cap. 49. Thraciæ & Macedoniæ rusticos mense Iunio diligentissimos esse in colligendis nucibus illis aut vesiculis Terebinthi ramulis adnascantibus, cum primum efformatæ gallarum magnitudine sunt, ante quam in ampliorem formam aut cornicula excrecant, & istas magno vendere in Prusæ Bithyniæ urbe, magnus enim earum usus ad sericea stamina varijs coloribus imbuenda; cumque duntaxat in ulum plus quàm sex millia pondo singulis annis infumi.

C. V. LEONARDUS Rauwolfius Hodepencilib. II. cap. VIII. ait Terebinthi, quod Arabes *Bent*, Persiæ *Terbaick* vocant, præter vulgarem duo genera obseruasse, unum majus, alterum minus. Majoris fructum quem Arabes *Bent quibir* appellant pistacijs forma valde similem, breviorum tamen & rotundiorum: minoris, qui illis *Bent finger* dicitur, cum suo cortice magnitudinem, piso majori æqualem esse, in rotundum nonnihil concavam, veluti milium ejus Indicum sive *Dara*: utriusque fructum non minus jucundi saporis esse pistacijs, eamque ob causam inquilinos abundè ijs vesci, perinde ut nos pincis nucleis & avellanis. Nasci magna copia in Persiâ, Mesopotamiâ, Armeniâ, racematim coherente fructu ut pistaciæ, vel potius ut Terebinthi vulgaris, cujus etiam genus æstimatur, cum arbores illum fructum ferentes oblongiusculis folijs Terebinthum satis æmulentur, qua nota à Pistaciâ, quæ rotundiora & magis conspicua habet folia, differunt. Possent, præsertim majus genus, ad Theophrasti lib. III. cap. V. Indicam Terebinthum referri, & ad *Fait Serapiosis*, Avicennæ, & Rhafis, quemadmodum minus ad eorundem *Bet*, quandoquidem illi ipsi Auctores similes facultates his nucibus tribuunt.

Terebinthi
fructus stili-
lus.

Vesiculæ
Terebinthi
stylus.

Bent quibir
Bent finger.

Terebinthi
Indici Theophrasti.
Yell.
Bet.

COGGYGRIA.

CAP. XII.

Coggryria
hystris.



Natalis.

Nemus.

Cotinus Plin.

Vulgus Herbariorum mappellat hunc fruticem Cotinum, & à Plinio ita vocari existimat. Cotini certè breuiter meminit Plinius lib. XVI. cap. XVII. his verbis: Est & in Apennino frutex qui vocatur Cotinus, ad lineamenta, conchylij colore insignis. Ex quibus sanè nemo facile colligat, an ei stirpi quæ apud Herbarios tale nomen obtinuit, Cotini appellatio rectè tributa sit: sed ab illis hoc nomen potius inditum suspicor, à soliorum tabescentium rubro colore, quo Cotinum inficere scribit Plinius.

Idem

Idem Plinius lib. xiii. cap. xxiii. Coggygriam describit in hunc modum: Similis & Coggygia folio (uncdoni videlicet) magnitudine minor. Proprietatem habet fructum amittendi l'anugine (pappum vocant) quod nulli alij arborum generi evenit. Ea sane plurimas notas habet nostræ huic stirpi convenientes.

Coggygia.
Plex.

Plinius autem eo loco ad verbum ferè exprimit Theophrasti *κακκωμελιάς* lib. iii. Histor. plant. cap. xvi. descriptam post *ἀνδράγην* *δυσανδρὸν* τὸ φύλλον δὲ τῆς κακκωμελιάς τὸ δὲ *ἀνδρῶν* μικρόν. *Ἰσως δὲ ἔχει καὶ τὴν ὑπερπαραπλήθειαν τὸν καρπὸν. τὰ τοιαῦτα δὲ ἐν ἰσθμῷ παραρρέει ἄλλῃ δὲ ἰσθμῷ*, ut vulgata habent exemplaria: at *κακκωμελιάς* legisse videtur, non *κακκωμελιάς*, quam Gaza prunum interpretatus est, cum tamen animadvertere potuisset eundem Theophrastum aliam *κακκωμελιάς*, hoc est, prunum ab hac planè diversam libro iii. Histor. plant. cap. iiii. describere.

κακκωμελιάς
Theoph.

Itaque libenter assentior doctissimo Ruellio, qui *κακκωμελιάς* vocem priore loco corruptam esse censet, & *κακκωνλιάς* legendum esse suspicatur: *κακκων* enim apud Theophrastum etiam Vnedonem significat, cuius folijs, fruticis quem describit, folia comparat. Aprius iudicatur meo iudicio hanc stirpem Coccoconeian cum Ruellio, aut Coggygriam (si quis sciret Theophrastum sic scripsisse cum Plinio censet) appellabimus, quam Cotinum: cum *κότνος* & Theophrasto & Dioscoridi oleaster sit.

κακκωνλιάς

Hoc frutice ad paranda coria utuntur Coriarij, non minùs quàm rhoë, cum alibi, rura circa Viennam Aultrix, ubi etiam rhois vulgare nomen *Sumach* indiderunt.

Rhus obfionorum & Corianorum.



CETERVM quia in Rhois, quo coria perficiuntur, infectionem incidimus, ab instituto non erit alienum de eo hic nonnihil agere, prætermittà ejus historiam, quæ luculenter admodum à Theophrasto primùm, lib. iii. cap. xviii. Historiæ plantarum, deinde à Plinio lib. xiii. cap. vi. & lib. xxiii. cap. xi. postremò à neotericis plenius descripta est, ne actum agere videamur.

Rhus Coria.
Rivum.

In Hispanica verò mea peregrinatione, magnum ejus proventum Salmanticensi agro esse, isticque quæstus gratia diligenter eoli, observabam. Multi enim agri eo conferuntur, nec minore cura coluntur quàm vineta, alioqui nec tam lætè allurgit, aut si cultura absit, degenerat & sylvestrit: imò non desunt qui vitibus interferant, culturæ compendium quaerentes, ut eadem operà cum vitibus fodiantur. Cæduntur singulis annis enati furculi cubitales ad radicem usque aut summam tellurem, deinde desiccantur, in pollinem rediguntur, & in usum convertuntur, ad paranda coria.

Officinæ hunc fruticem *Sumach* nominant Arabica appellatione, Hispani *sumague*, Galli nonnulli *Rhon*.

Plinius eodem libro xxiii. cap. xi. meminit alterius Rhus, diversi à superiore. Nec Rhus, inquit, Latinum nomen habet, cum in usum pluribus modis veniat. Nam & herba est silvestris, folijs myrti, cauliculis brevibus, quæ venena & tinea pellit: & frutex coriarius appellatur, sub-

Rhus herba
Plinij.

rutilus, &c. Hæc herba Rhus quantum conjicere licet, ea esse videtur quam Brabant & Batavi *Gagel* appellant, nonnulli Galli *Piment*, magni inter eos usus ad conservandas à tinea vestes, & Belgis etiam ad robur fuz cerevisiæ addendum: illi enim incoquere solent, ut magis caput tentet, & temulentos potiores efficiat.

Gagel.
Piment.

Est & alius frutex folijs *Oxymyrines*, flore albò in Hispania & Gallia Narbonensi frequens, quod à nonnullis Rhus Plinij nuncupatur. Verùm cum is nullius alterius Rhus meminerit præterquam illius quam herbam cognominat, & Coriatij fruticis, cuius se medicamentis & culinæ necessarium: arbitrantur peniores potius ad Dryophoni Plinij historiam accedere: talis enim est lib. xxvi. cap. ix. ejus descriptio. Dryophonon similis herba est, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdati vrimque folijs, pollicari amplitudine, qualia oxymyrines, sed candidioribus mollioribusque, flore candido sambuci, &c.

Dryophonon
Plinij.

ROBUR, QUERCUS. CERRUS.

Robur III.

CAP. XIII.

Robur IIII.



Robur va-
ria genera
Theophrasti.

ROBORI quina genera à nonnullis assignari, ab alijs solum quaterina, Theophrastus lib. III. Hist. plant. cap. ix. & x. scribit: nonnulla tamen nomine discipare. Vt verò Idem videre consueverunt, hæc genera sunt, *ιμρις*, quam nonnulli Robur, Gaze nunc placidam, nunc quercum vertit, *αἰθιας*, quæ Cerrus: *πλατύφυλλος*, quæ Gaze Latifolia, alijs Quercus: *φρυγέ*, quæ Esculus: *ἀλφειοῦ κλυφλοῦ*, Gaze Salicortex, alijs Cerrus semina: omnia fructifera: dulcissimam autem glandem esse *φρυγέ*, sive Esculo, deinde *ιμρις*, tertiam *πλατύφυλλος*, quartam *ἀλφειοῦ*, postremam & amarissimam *αἰθιας*, sive Cetto. Macedones autem quatuor genera faciunt, *τρομόδον*, quæ Gaze Veriquercus, *πλατύφυλλος* quæ dulcem, *αἰθιας* quæ amarā, *ἑσπερίαν*, sive Gaze Cerrum, quæ rotundam glandem ferit: hanc nonnulli sterilem omnino, alijs vitiosum fructum ferre aiunt, quem nullum animalium gustet præter suum.

Qui plura de his volet, consulat Theophrastum quo diximus libro, & Plinij Naturalis Historiæ lib. xvi. cap. v. & vi. Nos verò eas arbores hic describemus quæ per Hispanias, & in Aquitania Cantabris finitima vulgò *Roble*, deducto à Robore nomine nuncupantur, quasque illis similes in Austria & Pannonia observavimus: insuper Cerrum, & nonnulla de Quercu non vulgaria.

Robur I.

PRIOR igitur, Quercui vulgari admodum similis est, sed humilior, robusta materie, caudice magis contorto, frequentioribusque ramorum alis cavo: folia magis sinuosa & incisa quam quercui, nec ita viridia, sed averſa parte molli canaque lanugine pubescentia.

Quercus
semper vi-
rens.

Robur II.

Frequens est in celsis Castellæ veteris montibus, acque in Aquitania supra Burdegalam, ubi *Roble* dicitur: tamen si idem nomen Hispani etiam tribuant vulgari Quercui, quæ in Hispanijs frequens est, & montibus Calpi fretosq; Herculeo vicinis semper vires. Quercum etiam propriè *Quexigo* Hispanis dici, & *Encina de bellota gruesa* à quibusdam vocari, mihi relatum est.

Robur III.

ALTERA, Quercus ferè magnitudine in Austria, Styria, & Pannonia crescens, strigosior est Quercu, ligno duriore, folio minus amplo, altera parte nonnihil incano, exigua glandem fert: incolæ à duritie *Stalnastet* appellant, Vngari *Keméncherfa*, nonnulli *Musfal*.

TERTIA, humilior est, & interdum humanam altitudinem non excedens, alioqui priori facie, foliorum forma, caniceque omnino similis, ut illius pumilum genus esse videatur: fert hæc prægrandem gallam, exigui mali magnitudine, adeò copiosam, ut aliquando ramulum, vix palmum superaret, novem aut pluribus gallis onustum colligere meminerim: in-

hærebant ex gallæ ipsi ramo contiguae ferè, sed sine ullo ordine, totunda quidem & veluti

sphærica figura conspicua, sed aliquot tuberculis reperfæ: rubentæz dum recentes, præfertim ea parte qua solem spectant. Inveniuntur & in hujus folijs interdum pilulæ ijs similes quæ Quercus nostratis folijs innascuntur.

Multis Castellæ veteris montibus frequens est, & plerumque numerosis ab eadem radice stolonibus fructuat. Omnes etiam montes Viennæ Austriæ vicini hoc roboris genere abundant, quod similem fert gallam: sed non adeo copiosam.


Hujus ramis contortis, deinde filis & exsiccatis, Thedæ loco rustici utuntur aliquot Castellæ veteris locis, præsertim circa S. Martinum *Del Cassaial*.

QUARTA, in arborem excrefcit pusillam: ejus item folia minora sunt, duriora, angustiora, non adeo profundè incisa & sinuata, sed veluti aculeatis denticulis tantum serrata, infernè quidem candicantia, sed nulla molli lanugine aspersa. Frequentem etiam ista alit gallam superiori similem, & acutis tuberculis ornatam, pallidiore tamen colore.

Robur 1111.

Robur v.

Robur VII.



QUINTA, huic ferè similis est: sed stolonibus brevioribus & magis contortis, rugosioræ cortice. gallæ item extremis ramulis nascuntur, alijs minores, læves & sine tuberculis, colore ex rufso nigricante, ijs quæ in officinis venales reperiuntur, perquam similes.

Robur v.

Nascitur utrumque hoc genus in Lusitaniz solitudinibus itinere Vlyssiponenis non procul Eboræ, & ab incolis *Cervasa* nuncupatur.

SEXTA humilis est, nec humanam altitudinem excedit, fructicis potius, quàm arboris nomine donanda: tenuibus & lentis ramis, folijs secundæ ferè similibus, sed minoribus, nec adeo sinuosis, minorum gallarum, quæ plerumque binæ, ternæ, aut plures simul nascuntur, admodum ferax.

Robur vi.

Nascitur in Austria & Pannonia: nullum tamen ejus nomen vulgare intellexi, sed rustici cum secunda confundunt.

INVENTUM & sepius quoddam Roboris genus (nisi quis ad Quercum referre malit) inter Rio frio, & Aldea Galega non procul Vlyssipone, arenoso solo frequentissimum, adeo humile, ut rarè pedem altitudine superet, nusquam alibi mihi observatum. Ejus ramuli tenues & flexibiles, vulgaris Quercus ramulis simillimi: folia ad quintum genus accedunt, aliquantulum tamen majora & molliora. Hoc fert glandem quæz vulgari haud minorem, interdum etiam crassiorè, calice planiore, admodum amaram. In reliquis generibus, præterquam in secundo, nullam glandem observavi.

Robur VII.
Sive Quercus
pennia.

OMNES porro adstringendi vim habent, teste Dioscoride, præsertim interior & subiectus cortici liber, qui ligno membranaceus coheret: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, cæliaci, sanguinem excreantibus. Tita in pesto, seminis fluxione vulvæ laborantibus, tub datur.

Tamulæ

CETERVM

Cerrifolia-
ria.

Cerrifolia.

Litharia.

Cerrifolia-
ria.Cerrifolia-
ria.Cerrifolia-
ria.Cerrifolia-
ria.Cerrifolia-
ria.

CETERVM Quercus genus non modò in Viennensi saltu, sed plerique etiam Pannoniæ sylvis frequens est, eadem altitudine qua vulgaris Quercus, atque etiam celsiore assurgens, caudice erectiore, cortice crassior, & magis scabro: folia frequentioribus lacis furis, sed minus altis divisa habet, quam Quercus, & longioribus tenuioribusque pediculis inhzrentia: ramulos breviores, frequentioribus nodis obfitos, gemmas minores, & aliquot gracilibus foliis ceu staminibus aut villis sepias: flores racematim compactos ut Quercus, è quibus, nri nec in quercu nascuntur caliculi, sed ij brevi crassoque pediculo annotinis ramulis adhzrent, non in foliorum alis, omnino hispidi, & molliter echinati, in quibus glans est quærna paulò brevior, & obtusior mucrone prædita, quæ Autumnò maturitatè adipiscitur: adhzrent interdum inter folia, multis veluti squamis constantia capita.

Rustici & materię cafores optimè eam à Quercu vulgari distinguere norunt, illius materiem candidiorem, laxioremque, & ad operamini aptam censentes.

THEOPHRASTO Hist. plantarum libro III. cap. IX. *αὐθαῖα*; Plinio Natural. Historiæ libro XVI. cap. V. Cerrus dicitur: Germanus *Cerrus*; Vngaris *Cerrus*.

HIVVS Cerrifoliorum atque etiam tenuiorum ramorum libralia interdum aut majora fragmenta in lapides commutata, ipsaque adeò matrice in nigrum silicem conversa (superficie tamen candida & friabili remanente) atque naturales ipsius ligni venas, orbes, reliquiasque formam etiamnum retinentia, non modò eruta conspexi, & Ill. Herois D. Bathariæ de Bathyan (cujus in hac Historia mentio sæpe fit) munere habui: sed ipse etiam legi anno M. D. LXXX. in montis Eysenberg vulgò nuncupati, & Pinkæ fluvio Pannoniæ imminetis aequali, qua ad valem *Pinkthal* ab ejusdem fluvij eam perfluens nomine nuncupatam, descensum est, atque ad Austrum & *Λυγαριον* spectat.

Obfusus is mons olim fuit (quemadmodum adhuc vicini) Quercus & Cerrifoliarum sylvis: nunc verò vinetis generosissimi vini feracibus, quibus varijs locis insperæ sunt diversi generis præstantissimi atque maximorumque pecticorum malorum arbores. Est autem hic mons cum vicinis aliquot pagis jam memorati Ill. Dn. de Bathyan. p. m.

AT in eodem Viennensi saltu, Latifolia amplissimas arbores inveni anno M. D. LXXXVIII, cujus omnes glandes è longis pediculis dependentes, maxima ex parte non modò obfusa, sed quasi incluse erant viridi quadam excresecencia multis inæqualibus angulis prædita & scabra, quæ resiccata, gallarum modò dura & firma erat, quarum etiam vicem explere potuisset. An id vitium illi peculiare fuerit, & singulis annis arborem in infestet, me latet, ut qui semel dumtaxat per eam saltus partem iter fecerim.


CETERVM latifolia Quercus per multas Pannoniæ sylvas visci feracissima est: id Vngari *Fay gyöngy*, id est arborem unionem vocant: ipsam verò arborem *Tisy* silicem esse existimantes.

BATY porro genus plerisque Oceani littoribus observabam, quod, an ad Quercus mariniæ historiam referri possit, facile judicare non possum: licet cum ea quæ Theophrasto lib. Historiæ Plantarum III. cap. VII. describitur, nullam affinitatem habeat.

Nascitur autem hæc planta in scopulis qui mari alluuntur, aut marina aqua operiuntur, sine ramis, sed oblongis lais que folijs, adeò mollibus, ut cum æstus recessit, nullo modo sustinere se queant, sed in saxis strata atque diffusa conspiciantur: multifida verò sunt hæc folia, & secundum alarum exortus atque cavitates, bullas quasdam aqua plenas eminentes habent, eorum verò extrema in quoddam veluti rudimentum exigui cucumeris desinunt, subflavescentes, aqua plenum: atra viriditate prædita sunt quamdiu sub aqua latent, aut ceterum à marinis undis ejecta: siccata autem nigrescunt, & glutinis instar splendent. Nullis radicibus firmantur: sed lepadum modò saxi, aut Ostreorum testis inhzrent.

MEMI

Quercus marina.



MEMINI & aliud genus in Flandria & Zelandia maritimus colligere, folijs latioribus, tenerioribus, sinuosis, confertim nascentibus, pedalis interdum longitudine, & alia folia ex media costa proferentibus, ut in Chamagenista, ea dum aqua operata sunt virefcunt, & ecia verò & reficcata, candicant fragiliaque sunt: in hoc genere nullas vesiculas observavi, sed extrema foliorum plerumque in larum expansa: faxis inhærent, aut trabibus in aquam inimicis ad infringendum ætus maris vehementiam.

QUERCUS verò marina Theophrasti loco jam memorato descripta, folium habet carnosum, tenue, & Myricæ simile, colore ad purpuream accedens: forma flexuosa, atque in latitudinem diffusa, ramos breves, contortos, spinosos: magnitudo arboris tota, cubitalis, aut paulo altior. Vitis mulieribus ad lanas inficiendis.

Istam aliquando colligere memini ad mare mediterraneum, tempestatibus in lirtus ejectam cum Alga, & alijs maris purgamentis, dum Mompelij agerem: postea etiam circa Calpen & Valentiam, dum Hispaniam peragrerem, verum cubito minorem, durissimo ligno. Ejus rami alba falgugine adco conspersi erant, ut faccharo testis viderentur, in modum foliorum Tamaricis aut Ericæ vulgaris formati, sed crassiores: interdum etiam omnino purpureascentes fuerunt, nonnunquam partim albus partim purpureascentibus ramulis constantes. Nullas radices habebant arbutulez, sed infima parte

planæ erant, & plerumque aut lapidibus aut ostreorum testis adhærebant.

Multas etiam hujusmodi arbutulas cubitales & amphores, numerosis tamulis præditas, cum omnino albas, rum prorsus rubefcentes, cum plurimis alijs Naturæ miraculis magnâ diligentia conquisitis adservabat Imp. Maximilianus 11. felicis. memoriz, in sua arce Ambrosii secundo ab urbe Vienna miliari.

SYBER.

CAP. XIII.

SYBERIS duo genera Claris. Matthiolus observavit: ego unicum tantum, nisi forte quod in extrema Aquitania Pyrenæis proxima nascitur, ab eo quoddam per Hispanias frequens est, diversum sit. Nam Aquitanicum (quod quidem conspexi) folia non retinet, sed hieme abijcit: ut, cum mense Aprili in Hispanias proficiscerer observavi, folijs enim prorsus viduæ erant quotquot Syberis arbores circa Bayonam conspexi. Quare Theophrastus lib. 111. cap. xvi. Plantarum hist. non immerito tribuit Syberi deciduum folium, cum dicat arborem esse Pyrrheinz familiarem.

Quo vero in Hispanijs nascitur, perpetuo vitet ut Ilex, cui adeo simile est, ut primo aspectu plerumque fallat, nisi cortex crassius, & dissumpti folitui errorem detegeret. Majus est Ilce plerumque, & caudice (ubi adolevit) longè crassiore, cortice item denso, carnoso, scabro, & rimoso, qui nisi suo tempore detraharut, dehiscit, alioque subnascente expellitur: eo detracto, qui subest novellus ita rubet, ut procul aspicientibus arbores rubrica aut minio pictæ videantur. Syberis rami lignis firmiores sunt, folia majora, longiora, molliora, & superne magis virentia, interdum nonnihil dentata, aliquando minime, ut in Ilce. Glans magna, ubi maturuit nigricans, ligna longior & obtusiore cuspidè, calice etiam majore, magis hispido, & per oras molliter echinato: glans admodum adstringens & exsiccatilis gustus, ligna multo ingravior: magna ex parte conjunctim nascitur, ut pontica nux, sed crasso brevique petiolo, & firmiore quàm ligna. Ramulis nonnunquam adnascuntur dura & lignosa quædam cinerei coloris tubercula, adeo firmiter inherencia, ut nisi fracto ramo eximi non possint.

Nascitur plerisque Castellæ novæ, Bæticæq; locis, præsertim circa el Puerto de Mirabel, ubi ingentes ejus sunt sylvæ, & tota adeo Lusitania.

Sed Matthioli Syber alterum oblongis angustisque folijs quod Pisano agro nasci tradit, mihi nunquam conspectum, quemadmodum nec illius Cerro Jugo Senenli agro frequens, quod

Syberis A.
quitania f.
lla decidua.

Syber Hispaniæ
latissimam
virentem.

Suber latifolium.

Quercus

Quercus

Ligea Belli-
naSuber Qui-
queranus

quod Theophrasti Arcadum *φιλάνθος* esse censet: Italiam enim nunquam vidi, licet ter professionem tenebam, semel concessa Massilia navibus, bis ad alpes usque progressus: sed negotia perpetuo me revocarunt. Ideoque in posterum omnem adeundi Italiam cogitationem deposui.

Hæc porro arbor Græcis *φύλη*, Latinis Suber dicitur. Hispani arborem *alcornoque*, ipsum corticem *corcha de alcornoque* vocant, glandem communi cum iligna nomine *bellota*, Italici arbor *sugaro*, Germanis *Pannoffstetly* dicitur. Galli arborem & corticem (qui illis potissimum cognitus est) *Lige*. Miror autem plurimum, Bellonium lib. 11. Observationum suo *Lige* fructum edulem Memæcylo similem tribuere: nisi forte *Lige* vocabulo diversam à Subere arborem intelligat, præter omnium Gallorum receptum morem. Mihi certe nullum alium fructum in Subere videre contigit, præter glandem modò descriptam.

QUIQUERANVS libello quem de Laudibus Provincie inscripsit, triplicem Suberi corticem tribuit, sed præstat ipsum audire: nam quædam in ejus historia tradit, ab alijs minimè observata.

Suberis, inquit, arbor uberrime in Olbiensi ora provenit, licet specie, glande majore & detiore, trunco ingenti. Hunc vestiunt cortices terni: primus præcrassus, qui in cadorum & omnium penè vasorum obturamenta adfiscitur, piscatorumque retia, contra premente plumbo, elevat, ex eo sunt etiam alvearia: secundus crepidas munit & hibernum calceatum. Ex tertio subtili atque admodum delicato, sunt patere, è quibus quiddam hestitis propinatur, magna utilitate hauritur. Eò melior hæc arbor quò vetustior. Detrahendus corticibus hæc est ratio. Qua stipes tellus committitur, circumfiscinditur ad lignosam usque materiem, parietique in summis humeris, antequam in brachia dividat sese: mox à summo ad imum finditur, detrahiturque triplex cortex. Non explanantur aqua, sed igni, nec demuntur nisi tertio mox anno. Quod si paucis diebus à rorsura largi imbres intervenerint, arbor interit, quod raro accidit, nimirum regione calida & sicca, & temporum observatione raro fallente. Hactenus Quiqueranus.

VERVM in Hispanijs primum illum præcrassum corticem dumtaxat detrahere solent: quo non modo ad cadorum obturamenta, alvearia, & nonnulla etiam vasa rustici utuntur, sed etiam ad ruguriorum, parietum, & murorum prætexta, præsertim in ea Bæticæ parte, quam Estremaduram vocant, ubi interdum totis pagis ædes magnis suberis fragmentis imbricum loco tectas conspiciere licet. Idem cortex exterior illa scabritie darsa muniendis crepidis & hiberno calceatui idoneus: itaque videtur Quiqueranus præter veterum Auditorum sententiam ex præcrasso illo externoque cortice binos fecisse: nam scabritia illa exterior ad nullam rem utilis.

ILEX MAJOR.

CAP. XV.

Ilex a. gener-
na.Ilex major
hystoria.

ILEX duo genera recenset Plinius Hist. naturalis lib. xvi. cap. vi. Vnum folio non multrum ab oleis distante, quod *σύνδαγ* Arcadum esse videtur, Theophrasto descripta lib. 11. cap. xvi. Hist. plantarum, quam Ilici similem facit, folio non aculeato, sed molliore profundiorisque.

QVÆ autem mihi cognita, arbor est Mali aut Pyri magnitudine, multo frequentioribus brevioribusque ramis prædita quàm Suber, quos larè spargit: folia perpetua, supernè viridia, infernè candicantia, gustu adstringente, folijs Suberis minora, & magis orbiculata, im adultis arboribus plerumque sine aculeis, præter novella, & nunc primum enata, quæ aliquantulum incisa, aculeata sunt: certè in tenellis arboribus ante quam glandem ferre incipiant omnia folia aculeata observabam. Multos in extremis ramulis fert oblongos vilulos, qui in flavos & muscosos flosculos polline & tenui pulvere perfusos explicantur. Glandes è floribus non oriuntur (nam sunt inutiles) verùm ex alijs quibudam separatis pediculis: ex autem quædam glandibus sunt similes, nunc majores longiorisque, modò minores & breviores, quæ nonnunquam ante maturitatem nigrescunt, & gummi quoddam reddunt gustu caldum,

Ilex major.

Ilicis majoris ramus floridus.



calidum, saporis tamen non ingrati. Maturarum cortex sive putamen nigricat, nucleus candidus, firmus & dulcis est, præsertim majorum: utæque tamen à nonnullis maximè expectantur, illisque non minus avidè vescuntur ac nos castaneis aut avellanis: hanc ob causam in foro Salmanticensi, alijsque Hispaniæ locis, venales mensibus Octobri & Novembri proponuntur: ut non immeritò dixerit Plinius, per Hispanias glandem secundis mensis inferi.

Hæc vix minorem Londini anno M. D. LXXXI. in suburbano quodam horto ad dextram Tamesis ripam, supra pontem qui utramque urbem conjungit, multis & frequentibus tamis præditam admodum fragilibus, in quibus confuso ordine & sparsum nascuntur folia Hispaniæ folijs similia. Florebat sub finem Maij paulò seriùs quàm in Hispanijs, & glandes primùm emergentes habebat, quæ an maturitatem consequantur, me fugit: nam sequente Julio Britannia excessi.

Altera porro etiam vastæ magnitudinis in arcis regiz ad Westmonasterium horto alebatur, sed magnitudine cum superiore non conferenda, licet adeò crasso esset caudice, ut nemo amplecti posset. Hæc à superiore nonnihil differre mihi visa est: nam minora & magis orbiculata habebat folia, buxeis interdum non ampliora, nullis aculeis horentia, aliqui subtus incana & supernè virentia, ut prioris folia: nullos in ista flores observavi, & an glandem ferret nemo indicare potuit. An verò Ilex mas sit, quam, Plinio teste, glandem ferre negant, nihil statuire possum.

Quam doctissimus Matthiolum exhibet, mihi videre non conigit, ad id fortè genus referenda est quod Plinius in Italia nasci tradit folio non multum Oleæ dissimili, nam oblongum & angustum est: & Matthiolum Hetruriam ea scaterere asserit.

VISCUM aut hypbear in nulla Ilice observare memini, sed aliquando granum ex puniceo nigricans in ijs arboribus quæ frequentes nascebantur silva illa ponè cœnobium *Esanum* vulgò dictum, Mompeliano agro, & interdum, in Bærica præsertim, tenuem & capillaceum muscum cinerei coloris è ramis dependentem, qualem in Ilicis ramo sua glande opusculo adpingere curavi: qui verò florem habet, ex pteiore Londinensi expressus est, nam quos ex Hispania attuleram ramos, florem omnino corruptum & attritum habebant.

Copiosè nascitur per universam Hispaniam locis præsertim campestribus & collibus, rarò in montibus, Lusitaniz non admodum familiaris, ubi Suber frequentissimum. Narbonensis Gallia & Provincia Ilicis etiam abundans, sed minore glande quàm Hispanica.

Nomen Græcum est *ἰλίς*, Latinum Ilex, Hispanicum *Eneiza*, Italicum *Elex*, Gallicum *Eaule*, & *Chefne* verd. Germanis & Vngaris ignota est. Fructum Theophrastus ex Homero *ἰλίκον* vocat. Hispani *Beldra*, aut *Abileira*.

QVIDVS.

QUIRVS DAM Casti llex veteris locis llex isrami ceduntur cubitali longitudine, in frutes & arcevos congeruntur, & luto operiuntur, deinde sub celo igne in carbonibus assulantur qui Saimanticam & alia loca deportantur. Arborum trunci, ad molarum fabricas & alia opera servantur: est enim materia firma & durabilis.

ILEX COCCIGERA.

CAP. XVI.

*Wincigera
ra coccigera.*

Natalis.

Nomina.



NON QUAM altè affurgit hæc llex, sed multis ab eadem radice prodeuntibus ramis fruticæ, duorum aut trium (quando plurimum) digitorum crassitudinis, sepe numero unius tantum, aut etiam virgule tenuioribus, ramosis: folia illi superiore llex minora, aliquantulum sinuosa, magis virentia, nec averfa parte adeò incana, rigentibus aculeis armata, quæ vetustate interdum rubescunt: pusillam & valde amaram fert glandem, calice spinoso & echinato.

CRASSIT multas Hispaniæ locis, in Narbonensi etiam Gallia & Provincia. nõ dubium, quin & plurimis alijs, sed non ubique coccum gignit. Nam ipsi solum regionibus quæ Mediteraneo mari vicinæ sunt, & magno Solis ardore torrentur, nasci animadvertēbam. Sed neque istuc perpetuò fert: cum enim frutex adeò adolevit, ut glandem alere incipiat, coccum non gignit: ideoque solent incolæ quadriennes aut adultiores frutices urere, ut proximo anno novelli refurgant, qui deinde singulis annis aliquor subsequenribus coccum ramulis in herentem instar exiguorum pisorum coloris cinerei gignunt. Hunc pueri & mulierculæ colligere solent & mercatoribus vendunt, qui magna ejus copia coacta, deinde preparata, in Emporia postea mittunt.

IPSE frutex Dioscoridi *κόκκος βαρβάς*, Latinis Coccus insectoria, Plinio aquifolia ilex. Hispanis major frutex qui glandem fert, *carafa* dicitur, qui verò coccum gignit, *tesfesa*. Granum

ipsum Dioscoridi etiam *κόκκος βαρβάς*, Plinio coccum & cusculium, unde Hispani sum *cafoja* depravata voce sumptisse videntur: air enim lib. ix. cap. xli. Hist. natur. Coccum Galatæ rubes granum, aut circa Emeritam Lusitanix in maxima laude est: & lib. xvi. cap. viii. Omnes tamen has ejus dotes llex solo provocat cocco. Granum hoc, primoque ceu leapus fruticis parvæ aquifoliz ilicis, cusculium vocant. pensionem alteram tributi pauperibus Hispanix donat. Arabibus *chermes*, Hispanis *grana de tintoreros*, Gallis *vermillon* & *graine*, vel *graine d'escalette*, dicitur.

Familiæ.

PORRO coccum vim adstringendi habere, vulneribusque & præcis nervis convenienter ex aceto illui, restis est Dioscorides. Meo tempore in Mompelio mulieribus in difficili partu, & collapsis viribus, scobem ejus ex vino, aut confectioem alchermes præberi folitam memini.

*Coccus Pan-
jania.*

CETERVM Cocci etiam meminit Pausanias in Phocaicis. Perpetui inter vites ejus fruticis ordines, quem Iones & reliqui Græci coccum, Galatæ qui super Phrygiam sunt, patria voce *Hyss* nominant. Crescit eadem magnitudine qua Rhamnus, folio nigriore & molliora quàm Lentisco, in reliquis Lentisco similis: ejus fructus Solani fructui similis, erui magnitudine: gignitur in cocci fructu pusillum animal: id si maturo fructu in ætrem exilietur, statim volucres fit, culicis similitum. Verum priusquàm concipiatur animalculum, cocci fructum legunt: est etiam animalculi sanguis ringendis lanis utilis. Hæc Pausanias. Veteres autem codices, ut à nobilibus viro Iacobo Sufio, græcè & latine linguæ peritissimo admonitus sum, non habet *gñōs* nec *gñōs*, sed *πρὸς* & *πρὸς*, hoc est llex & ilici pro lentisco & lentisco: quæ sanctio legitima est: nam quæ similitudo cocci insectoriz cum Lentisco? facilis autem est lapsus à *πρὸς* in *gñōs*.

*Pausanias
emaculatus.*

Hyss.

Hyssinum.

Ab *Hyss* autem Galatæum deducta videtur *Hyssini* vox apud Plinium lib. ix. cap. xli. Quin & terrena miscere, coccoque tindum, tyrio ringere, ut fieret *Hyssinum* &c. Et lib. xxxv. cap. vi. ubi de purpuris agit. Quæ puteolanum potius laudatur quàm tyrium, aut getulicum, vel laconicum, unde preciosissime purpure. Causa est, quod hyssino maxime inhiærit, Virruvius etiam lib. vii. cap. xliii. hyssini meminit.

COCCEVM quo modo gignatur, & ejus colligendi rationem Quiquertanus libro
suprà

suprà memorato multis verbis declarat, quæ hic subiunximus.

Licis duo genera: alterum arborescent, alterum frutex exiguis sesquipedali proceritate lætissimè viret, folijs leuore præfulgidis, spinarum vallo ambitis numerofo, stolonè affurgit in modum Rosarj: à nostris Fagi appellacionem fortitur, quamvis nullam fagi imaginem repræsentet. Provenit locis planis quidem, sed in altitudinem euectis, exilibus & sitientibus collibus, sed infœcundis. Vere medio roati imbribus frutices, coccum hoc modo ordiuntur. Vbi unus scirpus se in duo brachia partitur, in hotum medio primum omnium increfciſciturundum quiddam, magnitudine & colore Pisi, hoc Matrem vocant, quod ex eo cetera grana producantur. Matres porò habet ut plunimùm quinque quilibet cespitum familia, quæ incuante æstate, æstusque, minutissimotum verniculorum catervam profundunt, fanſcenneque in summitate. In animalia proreptit nova soboles colore candida, pro se quisque in sublimè. At ubicunque vermiculi vel geminantis furculi axellis occurrerint, desident, & incrementis aucti, milij magnitudine sunt. Inde liberius adoleſcentibus, albus color in cineracium tranſit, jamque non animal, sed Pisum rursus apparent. Tuncque ea grana maturitatem adeptæ colliguor, jam coloratis vermiculis forta: dùmque asportantur mercatoribus, ambiens pellicula præ tueritate tumpitur. Vermiculorum quidem qui citra vaginulam habent pretium in libram quamlibet, aureus solatus, in granorum verò quæ adhuc eorum partem retinent, hujus quadrans. Torpent interim vermiculi, ac immobiles jacent: cerecium, cum primum tempeſticitas adest, in liarea præcipitari, soli exponuntur. Tum libato calore statim prorepunt, atque effugere nituntur: sed à custode, qui continus assidet, conuulsu lintei in medium eò vsque reijciuntur, donec emoriantur. Tanta quidem dum hæc sunt, tororque mox triduo, odoris suauitate, atque gratia, ut non Cibetæ, non Moscho, non Ambæ, sed ne Citriorum quidem floribus facillè concesserit. Si quæ verò grana legentis effugerint sedulitatem, ea mox alarorum animalium numerosum exercitum in auras effundunt. Obſervare est uno anno ex campo lapideo, Arelatensi agro, hunc proventum undecim aureorum milibus æſtimarum. Hæcenus Quiqueranus.

SIMILEM Cocci parandi rationem in Gallia Narbonensi, atque in Hispania, dum istic degerem, obſervare memini. Arcas enim sub dio habebant ad eam rem destinatas, emittente aliquantulum margine, quibus lineo panno instratis coccum effundebant, custodibus summo seruetu Solis perpetuo assidentibus. & extrema lintei bacillo concutietotibus, vt vermiculos effigere properantes, in interiorem lintei partem repellerent: istam tamen summam odoris suauitatem non sensi, licet faris acres & lagaces habeam nates.

VERVM Petrus Bellonius Obſervatorium, quas nuper admodum latius donavi, lib. 1. cap. xvii. aliam præparandi cocci rationem tradit: ejus verba referam.

Cocci baphicæ census ingens est in Creta: sed ejus collectioni cum potentiores operam impendere nolint, pastoribus & pueris istam provinciam relinquunt. Invenitur mense Iunio in exiguo quodam frutice, ex licis genere glandem ferentis, sine pediculo inhzrentis, ilius fruncis stipiti, colore ex cinereo albicante. Sed quia istius fruticis folia spinis horrent, uti Aquifolij, pastores furculam sinistra gestant, qua ramulos deprimunt & inclinant, dextra autem putatoriam falcem, qua illos demerunt, & rotundas vesiculas exigui pisi magnitudine auferunt, qua parte ligno adhæſetur apertas & hiantes, pusillis tubris animalculis lende minoribus plenas, qui per hiarum illum effugiunt, & inanem vesiculam relinquunt. Pueri jam collectam coccum ad Quæstorem deferunt, qui ex dimenso ab illis rodimit. Is animalcula à vesiculis eribro segregat, deinde summis digitis leniter ea prehendendo, in pilas efformat gallinacci ovi magnitudine: nam si nimium comprimeret, rota in succum dissolverentur, & color periret. Itaque duo infectionis genera: unum pulpe, alterum vesicularum: quoniam autem pulpa ad inficiendum commodior est, ejus precium quadruplo majus, quam vesicularum.

OLEA SATIVA.

CAP. XVII.

OLEA per Hispanias varia sunt genera. Nam nunc magnam & carnosam fert olivam, modò exiguam & gracilem, interdum etiam albam.

HABET verò Olea solum Saligneo ferè simile, densius, firmitus, brevi pediculo ramulis exadverso ut plurimum inhzrens, superne magis incanum quàm inferne, amari gustus, flore copiosum, in ramulis racematim compactum, ex herbido candicantem, quaternis foliis constantem, & fructus rudimentum amplectentem: fructus ejus ovali est figura, ossico inus nucleo per maturitatem nigrescens, præter olivam quam albam vocant.

Existantæ Oleæ, minores olivas producant, sed multum olei ejusque præstantissimi præbentes: sic etiam nonnullæ quæ in Narbonensi Gallia & Bætica nascuntur oleæ minorem fructum ferunt ex quo plus olei exprimitur, alteri, quod è majoribus olivis elicatur, longè præferendum.

Circa Hispalim, & cassior oliva nascitur, atque etiam minor, nonnumquam & alba: quam & circa Vlyſſipone nasci, clarissimus eques Damianus de Goës, idemque vit doctissimus piz memoriz, in quodam suo prædio, mihi asserbat.

C

Immaturas

Cocci baphicæ collectionis ratio.

Cocci parandi ratio.

Cocci collectionis ratio.

Olea baphicæ.

Olea præstantissima.

Olea Sativa.

Oleæ legu-
da tempus.Viscum he-
cu purpureu.

Nemini.

Silvestris Olea.

Zucuratus.

Oleæ fructi-
feria.

Natalis.

Immaturas plerumque condiunt per Hispanias & Galliam Narbonensem: interdum etiam maturas & nigras, præsertim in Lusitania.

Granatoli regno primum Februario colligitur oliva, plerumque verò Hispaniæ locis, Decembri, ut & in Gallia Narbonensi: hi quidem peritici decutunt, illi autem rarissime, sed potius ad motus scalis manulegunt, ne sequentis anni spem decussis germinibus præcipiant: vehementer enim laborant oleæ percussæ, & detrimentum capiunt.

Non procul Hispani, viscum in oleis copiosè nascens observabam mense Januario, oliveto- rum dominos magno damno afficiens: integros enim olearum ramos, crebro etiam maximam earum partem cædere coguntur, ne latius virum ferpat, alioqui rotas arbores occupaturum, & steriles redditurum. Habet verò id viscum baccas non albas, quales in alijs arboribus narum, sed ex rubro purpurascens, eujusmodi nusquam alibi videre me mini. Hascum in Belgium rediit, & columbis, & alijs avibus devorandas dabam, ut experirent an nasei vellent arboribus imposito avidi illarum fimis: verum operâ lusi.

Beillonius lib. 11. Observarionum cap. 1222112. simile viscum in oleis Hierosolymitano agro crescere scribit. Oleæ, inquit, illic peculiari nota à reliquis discernuntur: nam viscum quod eis innascitur, rubris baccis est præditum.

Ἐλαιὸν ἑσποτὸς Græcis, Olea Sativa Latinis, *Oleis* Italis & Hispanis, *Olivier* Gallis, *Olbaum* Germanis, *Oley sa Vngaris*, dicitur: fructus etiam *hale* Græcis, *oliva* Latinis & Italis, *aceryna* Hispanis (oleum enim olivarum *acerye* vocant) Gallis Latinos sequitur *olive*, Germanis *oliven*, Vngaris *olay magh*.

SATIVA oleæ foliorum vis eadem est quæ sylvestris, inquit Dioscorides, sed aliquanto inferior: uode ocularibus medicamentis, ob miriorem vim convenientior est. Sudor ligoo virrente accenso manans, illitu sanat hichenes, furfures, & scabiem, &c.

SILVESTRIS OLEA.

CAP. XVIII.

OLEASTER instar Oleæ adolefcit, illique per omnia ferè similis est, cortice tamen leviori, rarioribus ramis, minis frequentibus & brevioribus angustioribusque folijs, licet eodem modo circa ramos dispositis: hos ut in olea sativa racematim coherens, fructus exiguis olivis similis, pauca tamen carne præditus, mucrone recurvo, è longis petiolis racematim dependens, primum viridis, deinde purpureus, postremò ubi maturuit niger, succo prægnans purpureo, qui gustatus noonihil linguam vellicat. Tota arbor insigniter amara est.

Nascitur quibusdam collibus juxta Tagum, & multis Lusitanæ desertis contrafractisque locis, inter ingeotia saxa, præsertim non procul à cerba, postrema Lusitanæ (ut nunc circumscripta est) urbe, duobus supra Anam flumen miliaribus, ad radices ferè Castellonenfis saltus, quem nunc *Sierra morena*, hoc est Montem nigrum vocant, cujus pars superanda est ijs qui Vlyssipone Hispaniam proficiscuntur, ubi magnæ ejus

ejus sunt silvæ, in quibus Ianuario mense fructum colligebam anno MDLXV. Maturus fit ejus fructus cum in Olea: sed magna ex parte incolis negligitur, & in lturnorum aliarumq; avium escam tantum cedit.

ΓΡΑΜΙΝΙ *αγροδολος* καὶ *αὐρνός*, Latini Oleastrum & Oleam silvestrem, Hispani *azebuch*, *Nolina*. sed frequentius *exuche*: Galli *Olivier sauvage* appellant.

EADDEM cum Olea vires obinet, sed vehementiores & plures. Quas verò Dioscorides *Taxinaria*. Oleastro tribuit, eisdem Plinius Oleæ adscribit.

Plura verò de Olearū genibus, cultu, & alijs eò pertinentibus videre licet apud M. Catonem, M. Varroem, Columellam, Plinium, Palladium, qui exactè omnia ista descripserūt.

OENOPHIA seu NAPECA Bellonij, CONNARVS Alexandrinorum
fortè, apud Athenæum. CAP. XIX.



NON incommode forsitan silvestri Oleæ (subijciam Oenophilæ, sive Napece, cujus Bellonius meminit, historiam: quam Venetij ad me anno M.D. XCIII. mittebat C.V. Honorius Bellus Vicentinus, Cydoniæ Cretæ Medicinam faciens, unâ cum rami suis floribus onustis iconè, ipsius manu delineata.

ANNO autem est, ipso referente, Piri mediocris altitudine, cujus caudicem & ramostegit cortex exalbidus, ad cineraceum tendens: ejus folia Paliuri Theophrasti, sive Ziziphurizæ foliorum sunt æmula, binas uncias longa, unam lata, tribus nervis à petiolo secundum longitudinem excurrentibus prædita, supernâ parte saturâ viriditate nitentia, infernâ ad cineraceum aliquantulum tendentia, quæ ramos æternis inordinata ambiunt: ad quorum exortum multi nascuntur flosculi albi, flosculorum Oleæ instar peculiaribus longis petiolis singulis nitentes: fructus succedit parvo malo valde similis, magnitudine, ut plurimum, cerasi, interdum tamen, nucem juglandem etiam æquante, suavis gustus, ossiculum in se continens olivæ instat. Bifera autem est: nam & novo Vere & Autumno singulis annis fructum profert: vernalis tamen plerumque ad frugem non pervenit, ob imbrium copiam, sed à vernalibus corrumpitur.

DVO ejus genera: spinosum unum, alterum spinis carens. Spinosum, ab Alpino describitur, qui Connarum Athenæi (& rectè) esse censet, licet icon ipsius, arborem non rectè exprimat.

Spinis carens, in Ægypto Syriaque provenit: nascitur & in Creta, in urbe Rhetimo, è Syria allatum, quod non noverat Alpinus, quemadmodum neque ego spinosum: quare diu fui in eâ sententiâ, ut non Connarus Athenæi esset hæc arbor, sed potius Polybij Locis Lybica, ab ipso Athenæo eodem libro paulò post descripta: præsertim cum viderem arborem spinis carere, hancque eam sententiam Alpino significavi, à quo Oenophilæ ramum spinosum accepi, qui de spinis spinis, idem erat cum Napecâ à me descripta.

VIRIUSQUE arboris historia apud Serapionem sub nomine *Sadar* est: sed more suo cū Loto Diofco. (à qua valde differt) confundit. Bellonius lib. Observationum II. cap. LXXIX. Nape-pium. cam inter arbores perpetua fronde virentes enumerat, quod in Ægypto & Syria nascente, verum esse, at in Cretam translatâ, omnino falsum docet experientia.

HÆC arbor in Ægypto & Syria, *Nep*, seu *Nap*, vocatur: at in Creta, proprio nomine caret. *Nolina*. Hætenus Honorius Bellus.

QUAM potè Democritus apud Athenæum lib. XIII. Deipnosoph: ab Alexandrinis Connarum appellari tradit: magnitudine parva est, Pino, aut Vimo, ut ait, similis, utraq; non humilior, crebris ramis, nonnullis spinosis, prælongis pallido folio, tenero, natura rotundo. Fructum bis quotannis parit Vere & Autumno, apprimè dulcem, magnitudine oleæ phauliæ, carne & ossiculo, ei, quam diximus oleæ similibus, eximii saporis jucunditate. Rêcens estur: ac cum exsiccat fuerit, mobilit in farinam, quam pedibus calcant, non manibus pin-sunt, aut aqua rigant, quoniam respuit ejus natura, sed cogunt in ossas negligentiis, &c. Sed ego non satis affequebar Democriti mentem, qui Connarum parvam quam faciat, Pino tamen, aut Vimo (quæ magnæ arbores) non humiliorum esse ferbat.

PROSPER autem Alpinus lib. de Plantis Ægypti cap. VI. Arbor, inquit, in Ægypto, quam

Oenophia sive Napeca h. flora.

Ejus genera.

Natales.

Sadar Sadu.

Connarus Alexandrinorum.

*Nabea Alpi-
ni.*

illi *Nabea* dicunt, Locis magnitudine spectatur, instar *Acaciae* spinosa, folia ferens subuix proxima, verumtamen latiora: flores subuix floribus quoque planè similes, albos ac paruos, à quibus exeunt pomula rotunda, odorata, dulcia, gustuique valde suavia, cerasorum maiorum *Maroschensium* appellatorum æmula, quæ apud primates *Ægyptios*, ac *Turcas* sunt in magno pretio. Arbor bis in anno floret, Vere scilicet & Autumno, secundissimaque est, sed verni fructus non perfectè maturantur, plerique enim ipsorum prius putrescunt, quam maturef: aut Autumno perfectissimi ac optimi evadunt, eluigine summè jucundi: parum tamen nutriunt, facileque, ut cerasa, in stomacho corrumpuntur, eumque offendunt, si immoderate ipsorum esui indulgeatur. Eam sine dubio esse puto quam *Connarum* sive *Palurum* olim ab *Alexandrinis* appellatum, *Athenæi* scriptis constat: et si fructus & ossa non videantur *Nabea* fructui & ossi omnino respondere, quia hic pomo similis est, & os rotundum habet, non oblongum instar *olivæ*. Nusquam tamen in *Ægypto* exsiccatat illis fructibus farinam fieri apud eos animadverti. Sed præcipuus usus ipsorum est recensitum, ac vinidum pro ciboribus enim velci, perinde atque nostris cerasa mandere, consuetudo est.

*Emus far-
tatu.*

Sed & in medicum usum cedunt: nam cum eorum facultas frigida sit & sicca, immaturorum frequens est usus ad stomachi alviq; relaxationem firmandam, succo ex ipsis expresso per os sumpto, aut clysteribus injecto: ex iisdem fructibus sicis in aqua maceratis fit insusio utilis ad intestinorum relaxationem & ulcera. Sed maturorum siccatorum decoctum aut infusio, familiarissima est ad omnes pestiferas febres: aiunt enim hos fructus miram adversus venenosas qualitates & putredinem efficaciam habere, corque si tenuerit roborare. Succus item perfectè maturorum, optimus est ad purgandam bilem è ventriculo, & primis venarum ductibus. In omnibus etiam putridis febribus, infusione ex ipsis parata libenter ad sedandum calorem utuntur, &c.

Ceterum *Oenophilæ* iconem spinis carentem, qualem ipse *Honorius* ad me mittebat, ex primi curavi, ut huic capiti adderetur. Ipsius quidem ramos, *Cydonia* reversus, in fasciculum compererat cum aliquot stirpibus sicis, & seminibus ut ad me, illustri viri *Ioan. Vincentij Pinelli* operâ, curarentur: verum navis, quæ ista ferebat, sævis tempestatibus acta, in *Siciliam* ejecta est, & corrupta, ut fasciculus ille cum magno meo dolore perierit. Exemplum tamen *Epistolæ* quam fasciculo addiderat, Ianuario mense insequentis anni M. D. XCIII. accipiebam Maij sub exitum, *Lugduni* apud *Batavos*: quæ quoniam earum stirpium quas mittebat, amplam mentionem facit, existimavi me operæ pretium facturum, si illam ad calcem mearum Observationum adderem: præsertim cum plerasque contineat, de quibus in meis Observationibus ago. Eam ob causam *Lectorem* rogarum velim, illam epistolam, & reliquas quas postea ad me misit, legere ne pigeat: nam & eruditæ sunt, & de multis stirpibus agunt, quæ à Veteribus quidem scriptæ sunt, sed pleræque vulgo Herbariorum nondum satis cognitæ.

ZIZIPHVS RUTILA.

CAP. XX.

*Ziziphi ru-
tila sylvestris.*



Natalis.

Tuberos.

PYRI magnitudine interdum affurgit *Ziziphus rutila*, plerumque minor, contorto caudice scabro cortice: ævæ sunt rami ex nigro rufescentes, ad singula internodia binis spinis firmis ejusdem coloris armati, alterâ rectâ, alterâ hamis modo incurvâ, ut in *Rhamno* tertio. Ab istis ramorum internodijs bini, terni, pluresve tenuis ramuli exeunt lenti & flexibiles, coloris pallescentis, spirameæ longitudinis, in quibus alternatim & impari ordine folia nascuntur *Rhamni* tertij, sive *Paluri Therophrasti* folijs similia, tribus nervis distincta, per ambitum crenata, dilutior tamen viriditate prædita, & majora quàm in *Rhamno*, ad quorum ætorem aliquot flores exigui pallidi, quinq; foliolis constantes, quales in *Rhamno* tertio nascuntur, deinde fructus ovali figura, olivæ magnitudine, primum viridis, ubi maturuit, rutilus, dulcis saporis.

Alitur in plerisque *Hispaniæ* & *Galliæ Narbonensis* hortis: spontè nascuntur nunquâ vidi.

MEMINIT *Ziziphi* *Plinius* lib. xv. cap. xliiii. Hist. Naturalis in hæc verba. Equè peregrina sunt *Zizipha* & *Tuberos*, quæ & ipsa nō pridem venèrè in *Italiam*: hæc ex *Africa*, illa è *Syria*. *Sextus Papinius*, quem *Cōsulem* vidimus, primus utraq; attulit, *Divi Augusti* novissimis temporibus, in castrorum aggeribus facta, bacis similiora quàm malis, sed aggeribus præcipue decorata, quoniam & in tecta jam silvæ scandunt. *Tuberos*

berum duo genera, candidum, & à calore sericum dictum. Et lib. xvii. cap. x. Et Zizipha, inquit, grano seruntur mense Aprilis. Tuberes melius inferuntur in pruno sylvestri, & malo cotoneo, & in Calabrice: ea est spina sylvestris.

COLYMELLA lib. ix. cap. iiii. ubi de Apum passione agit, Ziziphum duorum generum facit. Arbores, ait, probatissimæ, rutila atque alba Ziziphus. Tubermum etiam meminit lib. xi. cap. ii. & inter arbores, quæ primæ florent, recenset. Possunt, scribit, his diebus [prædilectæ] licet x. i. Ianuarias] Cerasi, Tuberes, & Armeniacæ, atque Amygdalæ, ceteræque arbores quæ primæ florent, inferri commodè.

Plinius ex eo sumptuosè videtur quæ lib. xvi. cap. xxv. scribit: Floret prima omnium Amygdala, mense Ianuario: ab ea proximè florent Armeniacæ, dein Tuberes & Præcoces, illæ peregrinæ, hæc coactæ.

Poëti non desunt qui veteribus etiam Græcis hanc arborem cognitam esse putent, & ad Lorum quam Theophrastus lib. iiii. cap. iv. Hist. Plantarum in Pharide insula Lotophagorum nasci tradit, referendam. Optimè sanè convenire videtur arbori quam Arhenzus libro xiiii. Deipnosoph. sub finem, Loti nomine describit ex Polybij Megalopolitani libro duodecimo historiarum, his verbis:

Est autem Lotus; arbor minimè procera, aspera, non tamen aculeata [alii spinosa legunt] folio Rhamni, paulò latiore, & crassiore: fructu per initia colore & magnitudine simili perfectis baccis Myri, dum augetur, coloris phoeniceo, oleæ magnitudine, totundum, nucleo admodum pusillo. Maturus is colligitur & cum alica tulus, ad servorum famulorumque cibum in vasa concaleatur, ac stipatur: ingenuorum autem edulsi, detracto nucleo, eodem modo reponitur, ac pro cibo est, gustu caricis & palmulis non dissimili, odore tamen suaviori. Fit & ex eo vinum, in aqua macerato, & triro, sapotis grati, & jucundi, qualis est optimi mulli: merum id & sine aqua bibunt, sed ultra decimum diem non perdurat: quàm obrem ad usum tam brevis temporis conficiunt. Fit etiam acetum ex eo.

Eundem etiam usum Loto tribuit Plinius ex Cornelio Nepote lib. xiii. cap. xvii. & eo passus exercitus ultro citroque commeantes per Africam scribit.

GALENO *σπινά* dici plerisque placet. Verùm recentioribus Græcis *Ζίζυφα* & *Ζιζύφα* esse, Officinis *Isajuba*, certum est. Arbor Hispanis *aceseiso*, Gallis *Isajuber*, Narbonensibus *Guindubler*: fructus iisdem *aceseisai*, & *aceseisai*, *Isajuber* *Guindubler*: Italici *gingiale*, Germanis autem *Isajuba* *Isajuber*.

SANGVINIS acrimoniam edomare creduntur ejus bacce, & tussim spirandi que difficultatem lenire illatum decoctum: pecton, renibus, vesicæ prodesse. Galenus Serica parvi succi esse ait, nec concoctioni nec stomacho facilis, insolentibus & effrenatis pueris & mulieribus cibi gratia tantum expeti, exiguumque præbere alimentum.

ZIZIPHUS ALBA.

CAP. XXI.



AD superioris altitudinem interdum assurgit hæc arbor, sed plerique in latitudinem fæte pandit: caudice est satis crasso, cortice levi & canicante: rami qui interdum spinosi sunt, pleraque virgulas habent tenues spinas carentes, ut superior, folijs alternatim & sine ordine etiam nascentibus, salignis similibus, mollibus, omnino incanis exornatas, ad quorum exortum oblongi nascuntur flosculi, coloris ex argenteo pallescentis, gravem, non tamen injucundum odorem late spargentes & caput feriètes, quibus succedunt oblongusculæ bacce, exiguis olivis aut ziziphus similes, albæ, fungosæ sed dulci carne sive pulpa præditæ, osseo intus nucleo canicularo.

Crescit spontè in sepibus cum Rhamno & Vitice juxta urbem Guadix regno Granatensi. & in omnibus serè viridariis alitur non modò per Hispanias, sed etiam per Galliam & Germaniam.

Floret æstatis initio, fructus Aurumio maturarescit: sed rarè admodum frigidis regionibus fructifera est.

BELTONIUS libro Observat. ii. cap. cxi. existimare esse Ziziphum albam Columellæ, & scribit apud Heracleam agrorum fæpes ex hujusmodi fruticebus constare, earumque fructum in uribus venalem proponi, & à Græcis vernaculo sermone Ziziphia vocari.

Item alio libello quem de Ratione cicurandis sylvestres arbores edidit, quemque etiam nuper

Lotus Pharide insula Theophr.

Lotus Achaia.

Nemina.

Faculent.

Ziziphum alba.

Natalis.

Tempus.

Ziziphum alba Columella.

C 3 admo-

Ziziphus
Cappadocia
Plus.

admodum latio donabam, à Plinio Ziziphum Cappadociam appellari putat, cujus in hæc verba meminit, de coronis agens lib. xxi. cap. ix. Natur. Historiz. Duo earum genera, quando aliz flore constant, aliz folio. Florem dixerim esse genistas, namque & ijs decerpitur luteus, item rhododendron, item zizipha quæ & Cappadocia vocantur. his odoratus, similis quæ olearum floribus.

Iovis barba
Pisij.

Non desunt qui Jovis barbam arborem, opere copiariorum cõsilem, & in rotunditate spissam, folio argenteo, cujus Plinius lib. xvi. cap. xviii. Natural. Hist. meminit, esse existant. Anguillara tamen libello de stirpibus, quarta opinione, binas alias proponit argenteis omnino folijs, magis ut videtur ad descriptionem accedentes.

Elæagnus
Theophr.

ETIAM Elæagnum nuncuparunt nonnulli. *Elæagnus*, tamen Theophrasti, quæ lib. iiii. cap. xi. Hist. Plantarum descripta est, videtur Salicis genus esse: & aliquando illud esse existimavi quod secundum aquas nascens, ampliora, candidioraq; habet folia quàm ceteræ salices, ad mali folium nonnihil accedentia, sed longiora: florem seu iulum mollem, villosum, candidantem ante quàm sese expandat, populi albz iulo similem, lignum reliquis salicibus lentius, & ad multos usus utile. Sed petfecto postea Doctissimi Rauwolfij Hædæporico germanico idiomate cõscripto, animadverti ipsum aliam arborem observasse apud Halepũ, *Saffas* ab incolis appellatam, quæ ad *Elæagnum* historiam magis accedere videtur, odorato flore præditam, ex quo organis elicatur liquor ad roborandum corporutis. Eam verò esse censet quæ Arabibus *zarnab* & *zarnabum*, Serapioni *zarnabith* appellatur.

Nomina.

HANC autem ziziphum scribit idem Rauwolfius circa Halepũ & in Libano monte spontè crescere, & ab incolis *Sesifan* vocari. Vulgus autem plenitque locis Oleastrum appellat, & legitimum esse purat: Castellani & Granatenfes *Arbol parayso*, hoc est, Arborem paradisi: Galli, teste Bellsonio, *Injuher blanc* & *Olivastre*. Matthiolus commentarijs in Dioscoridum Oleam Bohemicam appellat & *Elæagnus* Theophrasti esse censet.

AZADARAC Herbariorum.

CAP. XXII.

Azadara
hirsuta.



Nomina.

Arbor sancta.
Lena: alba.
Ziziphus
alba.

Nomina.

Doctissimo & celeberrimo viro Gulielmo Pellicerio Momphesi Episcopo Lotus alba existimabatur, alijs verò Ziziphus alba, quam opinionem adhuc retinere magni nominis viros miror, cum nullas notas habeat quæ albz zizipho conveniant: nam ubi oleæ flos & ceteræ notæ quas Auctores Zizipho albz sive Cappadociz tribuunt? Italis Herbarijs Sycomorum vocari audio, non minus inepte & impetè quàm Herbarij Galli secundum Aceris speciem eo nomine donarunt.

Beticis vulgari sermone *Arbol parayso*, quem admodum Castellani Ziziphus alba dicitur: Italis *Pelrare*: Tripolitanis *Zenselachi*, teste Rauwolfio, qui eam ibidem nascentem multis Tripolitanz urbis plateis, ad umbram præbendam, atque alijs locis in sua peregrinatione

natione observavit, fructum retinentem, donec sequente anno nova germina præbeat.

Plerique eam esse putant, quam Avicenna lib. 11. cap. xvii. Azedaracth appellat. Arbor inquit, nota habens fructum similem Nabach (id est loto) & nominant eam in Rechi arborum Myrobalanorum, & est ex magnis arboribus.

Azedaracth

Florem Azedaracth calidum in tertio, siccum in fine primi, Avicenna loco memorato scribit, & cerebri obstructions aperire asserit: stillaticium verò ejus liquorem pediculos interficere, & comam alere, si eo vino permisto caput abluatur. Fructum autem pectori noxium, & valde perniciosum esse. Rauwolfius addit canes interimere, si cum cibo obijciatur: ex quibus quidem facultatibus, Ziziphum esse non posse, conjicere licet.

Facultates.

PINASTER ET ALIÆ RESINIFERÆ.

CAP. XXII.

Pinaſter II. Auſtriacus.

Pinaſter III. Auſtriacus.



PINASTRUM appello Pinum silvestrem, sequutus Plinsum, qui Natur. Histor. lib. xvi. cap. x. Pinastrum nihil aliud esse quàm Pinum silvestrem scribit, & quæ Theophrastus Histor. Plant. lib. 111. cap. x. de *αἰνία ἀγρία* tradit, ad Pinum silvestrem tranſtulit. Ejus in meis peregrinationibus varia observavi genera: terna in Hispanijs, quaterna in Auſtriacis Pannonicisque montibus & silvis.

MAJOR Hispanicus, in Pini alnitudinem excreſcit, interdum etiam ſuperat, à medio ramofus: folia habet Pini, oblonga, bina ſemper ſimul juncta, in viriditate nigricantia, acuminata & pungentia: ſtrobilo paulò minore quàm Pini, alato inter ſquamæ, quibus compactus eſt, nucleo, molli & nullo putamine incluſo, ſed tenui cortice duntaxat teſto. Caudex reſtus, cortex levior & minus ſcaber quàm Pini. Plurimam Reſinam fundit.

Pinaſter I. Auſtriacus.

Creſcit id genus in Aquitania, in Pyrenæis frequentiſſimè, & plerique alijs Hispaniæ locis.

AVSTRIACVS major, duorum eſt generum, adeò inter ſe ſimiſum, ut pauci, niſi maturæ cæſores, diſcernere queant: alterum tamen genus latiore & creſcitore eſt caudice, levior cortice, majore cono, Auſtriacis *Wäſſe* ſæpi diſtinctum: alterum craſſiore plerumque eſt caudice, ſcabriore cortice, ſolijs paulò craſſioribus, minore cono *Schwarze* ſæpi appellatur.

Pinaſter II. Auſtriacus.

Tenuia porò & oblonga habet utrumque genus folia, pungentia, bina ſemper conjunctim ex eodem rubulo prodeuntia, & circa ramos in orbem quaſi naſcentia. Maio menſe in extremis ramis quaſi borros ſive uvas quaſdam fert tenuibus ſquamis obſitas, qui ſpontè apertis ſe ſquamis tulos oſtendunt viſcetes aut pallescentes, plenos tenui polline luteo, ſive farina, quæ levis auræ aſſatu diſpergitur. Ex medijs deinde botris nova germina eodem menſe prodeunt ſuis novellis ſolijs tenui quadam veluri membrana incluſis onuſta, quæ extrema

Pinaſter III. Auſtriacus.

terma parte, ante quam folia succrescant & explicentur, fructus rudimentum dant, grandiore jam firmiterq; ad germinum basim inhzente superioris Aurūni immaturo fructu, viridi, ramorum alas speculante & reflexo. Vtrumque hoc genus Vngari *vad fenjö*, & *köz fenjö* nominant, & ex eo passim in montanis Austriacis & Pannonicis conficiuntur asseres, rotæ ab aqua versatæ opera secti: ex albo etiam, quod parum ab Hispanico maiore, & solis fortè natalibus differe videtur, scandulæ, & vinearum pali.

*Pinaſter 112.
Austriacus
albus.
Pinaſter 113.
Austriacus.*

Nigri verò genus interdum invenitur tristiore arbore, contorto caudice, & in latum sparsis ramis, minore adhuc quàm præcedens cono.

C R E S C I T & ad nonnullorum Austriæ montium radices in scopulis, & supra Badenses thetmas quatuor supra Viennam miliaribus, in montium crepidine tenui gramine obſita, aliud quoddam genus contorto admodum caudice, divaricatis ramis, quorum furculi multò graciliores lentioresq; sunt quàm in superioribus duobus generibus: folia item habet illis longè tenuiora & breviora, tametsi bina semper coniunctum ex eodem tubulo in virgarum ambitu nascētia: extremis virgis botrys sive uva exigua totum sulorum veluti nucamentum tenuiorum squamarum inclusa adnascitur, qui non vireſcunt aut flavent ut in ante dictis, sed purpuraſcunt, deinde in tenuissimum pulverem abeunt, succrescente ex eorum medio novo germine suis novellis folijs membrana vel vesicula inclusis onusto: hujus conus etiam minor est, & obtuso plerumque mucrone.

Pinaſter 11. Hispanicus.

Pinaſter 1111. Austriacus.



*Pinaſter 11.
Hispanicus.*

MINOR Hispanicus duorum hominum altitudinem rarò superat, inflexo & contorto caudice, ut plurimum ab imo ramoso: folia illi majori similia, sed breviora, & diutius virentia: conici etiam minores, oblongi tamen, turbinati, & candicantes, multa plerumque resina infecti, non admodum ijs dissimiles qui Austriaco, albo cognominato, innascentur: nuclei quales in maiore, nigra membrana conteſti. Murciano & Valentino regno frequens.

*Pinaſter 1111.
Austriacus.*

P I N A S T E R pumilio Austriacus humanam non superat altitudinem: sed statim à radice in lentos & obliqueſcentes, tametsi crassos, rugosoſq; & denſo cortice teſtos, ramos dividitur, atque in latitudinem diffunditur: hos per singulas squamas bina semper ex eodem tubulo simul prodeuntia & juncta folia ambiunt, que madmodum in Pinu & vulgari Pinaſtro, magis tamen carnoſa ſunt, crassiora, breviora, & obtuſiore mucrone prædita, coloreq; saturatiùs virente: strobili unciales squamarum compacti laniceis conis haud majores, sed magis turbinati, rectiq; & pediculo retroſum non inflexo ut in prædictis generibus, nucleus alatus ut reliquorum, & inter compactiles squamas latens: radix crassa, lignoſa, in diversa tendens.

Nascitur

Nascitur in fummis Austriae & Styriae alpium supercilijs, inter faxa & scopulos ut plurimum, ubi nulla aliarum arborum proveniunt.

Pinastrum III. Hispanicum.

Picea Pumila.



ALTER pumilio ejusdem ferè cum superiore altitudinis, licet in lentos & obsequentes ramos divisus sit, non sunt tamen adeò crasso rugosoque cortice tecti, neque ita in latitudinem diffusi: virgæ etiam graciliores, folia exilia, Laricis folijs non dissimilia, non adeò tamen mollia, neque ut illa decidua, sed in immortalis viriditate prædita, ut superiorum folia: strobili exigui & graciles, nucleis etiam pusillis & nigris, alatus ut reliquorum. Solo Murciano regno genus hoc, idque rarissimè conspexi.

Pinastrum III. Hispanicum.

PIOR, Pinus silvestris montana Theophrasti nonnullis esse putatur, quemadmodum minor Hispanicis, marina. Pumilio Hispanicus, alterum fortè Piceæ genus descriptum Belonio lib. III. Observat. cap. XI. Pinum silvestrem Hispani vocant *Pino tarax*. Nucum Pinastrum fructus Plinius Pitydas appellat. Dioscorides tamen *pervidan* vocabulum Piceæ Pinusque fructui indifferenter tribuit: quem vim adstrictoriam habere, & aliquantum exaltescens, tussis pectorisque vitij auxiliari, per se, aut ex melle sumptum, scribit.

Nemina.

E Pinastrum majoris Austriaci inferiore parte, radicibus vicinior, sunt assulae illæ pingues ad ignem accendendum, & lumen præbendum idoneæ, magni per multas Germaniæ provincias usus: strangulat enim humor ad radices descendens ipsas arbores, sic ut in Teda vertantur, ex qua assula. Est verò Teda vocabulum *Quercus*, & interdum arborem significat quam Plinius lib. XVI. cap. X. Natur. Hist. sextum resinitarum genus facit. Resinam autem ex Pinastrum indigenas colligere non observavi, quemadmodum in Aquirania, apud Cantabros, & alijs Hispaniæ locis, ubi arbores vulnerantur, ejus rei causa, singulis annis novum vulnus supra notatum insigentes, donec ad decimi aut duodecimi pedis altitudinem pervenerint, & humor ab ea parte manare desierit, tum demum simili modo ex alia parte, ac deinde alia aperitur.

Quæ verò Theophr. lib. III. cap. X. Plantarum Histor. *arizis* sit, ex Gaze versione & vulgatis græcis codicibus, difficulter admodum judicari posse existimo, quandoquidem ejus materiam operibus ineptam esse, & magnitudine pino minorem, minusq. erectam assurgere scribit. At ut ex melioris notæ codice colligere licet, omnium doctiorum judicio ea est arbor quam Plinius appellat Piceam, & apud recentiores rei herbariæ Scriptores eodem nomine donatur: arbor procera, & in modum cretæ, folijs brevibus, rigidis, & pungentibus, unde quæque ramos singulatim cingentibus, qui cruciformiter, & decussatim in arbore nascuntur, quam ob causam Vngari *keruzsi fenyő*, hoc est cruciatam abietem nuncupant. Fert verò ea Maio mense in extremis tamis singulares stulos pallefcēte farina plenos, deinde strobilos

arbor Theophr.

Picea.

strobilos five conos mollibus squamis imbricatis compositis constantes, purpurascetes dum novelli sunt & primum nari, deinde paulatim in longitudinem excrecentes, quæ in maturis septem aut octo interdum unciarum est, sub quibus exiguum alarum semen, Pinarostro simile fovetur.

Abies picea

Picea sibirica

Picea pumila

la.

Picea sibirica

la.

Abies

Abies picea

Sic o & multas habet notas, ex quibus conijcere liceat, Theophrasti loco jam memorato *ἀβύς ἡ πίττα* esse, hoc est, abierem masculam. Eam autem appellant Hispani *Pino albar*, Germani *Kiechen* aliqui *ros thannen*. Meminit etiam Plinius lib. xv. cap. x. *Picea* sive quæ sapiniam nucem ferat.

Illius autem genus reperitur, quod numquam valde affurgit, sed pumilum manet, fertque quædam nucamenta nucis ponticæ magnitudine, e squamulis imbricatis compositis, sed in pungens foliolum desinentibus compacta, quæ maturitate desiccantur, concavas in anitates & veluti cellulas ostendunt, à summis & extremis nucamentis ramuli nonnumquam enascuntur, frequentibus, brevibus, & pungentibus foliolis obsiti: sed & tota arbuscula brevioribus & pallidioribus folijs quàm superior prædita est. In hac neque florem, neque fructum observavi: & haud scio an ferat. Videtur eam C. V. Dalechampius non ignorasse, sed Pinum Tubulum, five Tubulum vocare. Plinio tamen Tubulus Pinafter est gracilis, succinctior, enodis, liburnicarum ad usus, pæne sine resina.

ABIES CVM SVIS IVLIS.



Stell.

Nomina.

Larix.

Pliny Larix est Theophr.

Abies autem Plinij, *ἀβύς ἡ πίττα*, abies femina Theophr. lib. iii. cap. x. est, arbor celsissima & formosissima, cortice laxi, & candidiore quàm in Picea, ramis etià decussatis cretcentibus, & in latera, velut alæ, expansis, quos ambiunt folia plana in junioribus & bifido mucrone conspicua, superne viridia, averfa parte cineracea, & utrinque in ramulis veluti pedinarum disposita, ita ut torus ramus complanatus, & compressus videatur: in vetullis autem arboribus folia istum ordinem (nisi in tenellis ramis) non servant, nam rigidiora magisque obtuso mucrone, licet pungenti, redduntur. Adultæ arbores circa majorum ramorum extremos quasi furculos, in singulorum foliorum alis prona parte exigua quædam nucamenta interdum ferunt, e quibus singulares brevessq; uli emergunt, qui deinde in Bosculos explicantur: perdurant ea nucamenta in alterum nonnumquam annum. Crassiores habet quàm Picea conos, obrufa culpe, latioribusq; squamis præditos, Cedrinorum ferè modo, inter quas prominent veluti membranacea foliola: non propendent ut Picearum coni, sed firmi & quodammodo cælum spectantes, extremis ramis circa arboris cacumen solùmmodo nascuntur. Tam verò hujus quàm Piceæ coni virent Autumni initio, & multam resinam fundunt. Sub Autumni finem & hiemis initium maturitatem consequi feruntur.

In hac porro arbore viscû, quod Steelin Plinius ex Theophrasto appellat, observavi anno redemptionis humanæ M. D. LXXXIII. sed longè majore deinde copia anno M. D. LXXXV. in vivario Illustri Dn. Hyneck à Waldstain Promarchionis Moravia non procul à Piernitz ipsius urbe (eius areem incolebat) albis, perinde atque vulgare viscum, baccis præditum.

Tenuiores hujus arboris ramos solent Viennenses, venali vino ante suas ades suspensos proponere, ut aliarum regionum incolæ hederam. Itali *Abete*, Hispani *Abete*, Galli *Sap de Sapin*, Germani *Weyss Thannenbaum*, Austriaci simpliciter *Thannen* nominant, Ungari *senyő fa buk alentele egy felöl ad*.

Sic o celsissima etiam est Larix, à Theophrasto minimè descripta ut arbitror: nam Gazæ Larix nihil aliud quàm *πίττα* est, quam prioribus libris perperam Piceam interpretatus est, interdum autem eodem *πίττα* vocabulo & piceam & laricem simul expressit.

CETERVM Plinius de Larice agens, omnia illi adscribit quæ Theophrastus *πίττα* tribuit, ut ex multis locis inrer se collatis videre licet, quorum aliquor in medium profereamus.

Theophrastus Plantarum Histor. lib. iii. cap. iii. *ἡ δὲ δὲ τῶν δένδρων ἡ ἀβύς ἡ πίττα ἡ ἐν τῷ πύλῳ αὐτῆς ἡ πίττα: περί τῆς μασίδος, ἡ δὲ πίττα, πύλῳ, πίττα, ἀβύς, ἐλῦρα, &c.* Plinius Histor. Natural. libro

Laricia foetida
bark & leaves
resin.

Stemina

Abies marina Belgica.

Canalis 2
Lacrimosa
longitudinalis

At the same time, the company is also looking for a new supply.

Memini autem post meum ex Hispanijs reditum observare annis sexagesimo sexto, & sexagesimo septimo supra miliesimum & quingentesimum in Flandriæ ora maritimâ varias articularum formas Osteorum testis & Myrurum



Abies mar-
ina Belgica.

tulorum conchylis adnatas, quarum Aliquæ Abietis figuram ita referebant, ut pumilæ Abietes viderentur, ramulis ordine utrinque dispositis, sed fragiles admodum, & pusillæ, rarò palmi altitudinem excedentes, ex tenuibus veluri squamis contextæ, nonnullæ omnino planæ, in orbem prominentibus ramulis aliz.

Cupressus
marina Bel-
gica.

Aliz Cupressos ita æmulabantur, ut facis mirari nequirem Providentiæ divinæ opus & artificium, ramulis frequentibus in orbem, sed nullo ordine nascentibus, & sursum spectantibus cupressinorum foliorum modo efformatis. Harum tamen aliquot annis inter chartas adservatarum & compressarum rami, si in vitrum aut aliud vas aqua plenum irijiciantur, statim sese explicare & in orbem diffundi, seque furrigere incipiunt: eaq; ad eodè de causa piscatorum vulgus fanis obsecrum illis nomen indidit.

Plures adhuc collegimus, sed cum plerisque alijs Naturæ miraculis in eistâ repositis à Divo Maximiliano II. Viennam evocatus, in Belgica reliqui, nec ad manum habui cum hæc describerem, nec etiam ab eo tempore conspexi, ideoque earum historiam dare nequeo.

HARVM autem marinarum plantarum, uti & reliquarum stirpium, atque omnium Naturæ miraculorum diligentissimus observator erat Illustris vir Carolus à S. Audomaro p. m. Dn. de Dranoutre, Moerkercke, &c. Dynasta.

Myricama-
rina Batavi-
ca.

Sed & anno M. D. XCV. inter rejectamenta reperris, maris litore arenosos aggeres non procul Lugduno Batavorum alluentis, quatuor aut quinque plantulas conspiciebam conchis Tollinarum adnatas, graciles valde, spiralis aut majoris longitudo, in breves & salugine obductos ramulos divisas, quæ Myricæ vel Ericæ ramulos mitum in modò referrent.

ARBOR VITÆ.

CAP. XXXIII.

Arboris vitæ
hæstia.



Natalis.

AMODVM elegans est ea arbor, cæjus ramum hic exprellum damus, perpetuò viret, caudice est recto, aliquot orgyias alto, nodoso, paulatim succrescente, cortice ex rubro nigricante, ligno duro; frequentes habet ramos in alatum formam expansos, qui in alios ramulos planos alternarim elatere succrescentes divisi, denno in multa oblonga folia è numerosis foliolis, quaternis simul semper compositis constanter expanduntur: flores Vere extremis folijs prodeunt, quemadmodum in Cupresso, pusilli, flavescetes, quorum nonnulli deinde in exiguum fructum pincinulei magnitudine efformantur, conimodo è sex squamulis tenuellis compacti, initio vindem, deinde pallefcenrem, postremò ubi planè maturuit, nigricanrem, quaterna plerumque semina paleacea, medio (in quo medulla acris & amarifculi saporis) paululum extuberante continenem. Tota arbor graviter odorata est, reliquas congeneres longè superans odore, quem, si quis folium nonnihil duntaxat digitis conficaverit, facile elucere non possit. Hunc autem non modò viridis ex se exhalat, sed etiam multis jam annis excisa & resiccata retinet.

Primum mihi conspecta est hæc arbor in horto Regio Fontaine bellean, non procul Aurelia Gallorum, eò ex Americæ Septentrionali ora, *Canadas* dicta, delata, Gallorum Imperium obtinente Francisco hujus nominis primo, litteratorum omnium summo Mæcenare, nec antè, ut existimo, Europæ cognita. Deinde apud doctissimum virum Nicolaum Rassium Regis cheirurgum celeberrimum, eundemque omnium Naturæ miraculorum studiosissimum & petitisimum, qui primus mea opeta cum Belgio communicavit, ubi nunc ad eodè frequens est, ut nullus sit rei herbariæ studiosus, qui eam in suo horto non alat: inde porò in plerosque Germaniæ hortos transiit: facili enim rami depacti radices agunt, quemadmodum sæpe sum expertus, præsertim loco umbroso & fertilè pinguiq; solo. Nasctur etiam femine: sed tenellæ plantæ ante quàm in ramos dividantur & expleantur, Oxycædruum, Juniperumq; majorem primum enatas admodum æmulantur. Fngoris patientissima est: hieme ramem fuscum & fuliginosum colorem contrahentibus folijs, quæ novo Vere pristinam nitorem & viriditatem recipiunt.

A. D. quam arborem veteribus descriptam referenda sit, non facile quis conijciat. Plutimi *Symon* quam Theophrastus lib. III. Plant. Historiæ cap. I. montanum cacuminibus, locisq; argenteis proceram nasci tradit, esse existimant, & cujus lib. V. cap. V. meminit in hæc verba: Thymum ab alijs Thya appellatum, nascitur apud Ammonis fanum, & Cyrenensis agro, forma Cupressi similis, ramis, folijs, caudice, & fructu: vel potius cetero Cupressus silvestris. Multa etiam ubi nunc urbs est: & tradunt contignationes basilicarum adhuc existere, nulli

Syn. Thuyæ.

nulli enim putredini obnoxium esse hoc lignum. Cispissima verò ejus radix, ex qua præcipua opera hunt.

Anguillata porro Theophrasti Thyam nihil aliud esse censet, quam Sabinam primam, sive vulgarem. Sed licet Sabinæ genus inveniatur bacciferum: ejus tamen fructus, juniperi vulgans fructu non major, valde ab similis est cupressino, cui Thyæ fructum Theophrastus similem facit, quem admodum & totam Thyæ plantam cupressu. Et facile in doctissimis Guilandini sententiam problematis ix. & x. defensione concesserim, plurimum ad Thyæ historiam a Theophrasto proditam accedere arborem sui generis Cupressu simillimam in Syria,

Habbel fructus.



Ægypto, & Arabia nascentem, cujus fructus Abbel toto Oriente notissimus, pilularum Cupressi magnitudine, colore rufus in nigrum declivi. Talem verò Habbel nomine insignitum, sub anni m. d. lxxxix. initium eum alijs pletisque exoticis mihi dabat doctissimus vir Bernardus Paludanus Frius, nuoc Eochusianus poliatros, & omnium rerum naturalium (quibus amplissimum mutuum refectum habet) peritissimus, & peregrinatione sua Syriacâ & Ægyptiacâ redux: quâ de causâ illius nomen lecloris oculis hic subijciendum duxi.

Sabinæ baccifera.

Abbel.

Habbel.

Plinius etiam Naturalis Historiæ lib. xiii. cap. xvi. Thyæ meminit, & pleraque ex Theophrasti loco jam dicto desumptit.

Non desunt qui ad arborem Brutam (de qua idem Plinius lib. xii. cap. xvii.) referant. Petunt, inquit, in Halimæos arborem Brutam Cupressu fusa similem, exalbidis samis, jucundis odoris accensam, & cum miraculo historis Claudij Cæsaris prædicatam. Folia inspergere potionibus Parthos tradit, odorem esse proximum Cedro, fumumque ejus contra alia ligna remedio. Nascitur ultra Passigrin in finibus oppidi Sitacæ, monte Zagro.

Bruta P. H. H.

Hæc quidem arbor ad Cupressum nonnulli accedit: verum ramos sursum non attollit quemadmodum illa, sed in planas veluti alas expansos, ut dixi, in latitudine diffundit. Hujus item folia tametsi ex foliolis squamatis compacta, omnino plana sunt, non rotunda uti Cupressu, Junipero maiori, Sabinæ: nec totitudine ante contrahunt, quàm in ramos excrefant.

Galli arbor de vitæ, hoc est, arborem vitæ nuncupant, nescio qua ratione ducti: nisi forte ob immortalem ejus comam, quam tamen cum multis alij communem habet, aut odoris ejus vehementiam quam salubrem esse existiment, hoc nomen indiderint. Vulgus Herbariorum & Thuiam & Arborem vitæ appellat. Nonnulli plura Thuiz genera constitunt, & hanc arborem tertium genus esse volunt.

Nemina.

Non vobis dubium est, quin ad pleraque sit utilis: nemo verò illi us faculatem nostro ævo prodidit, quod sciam. Cum tamen magnam habeat partium tenuitatem, & amantissima sit, venisimile est digerendi & abstergendi facultate præditam.

Hæc porro descendere videtur Ovicedus lib. ix. cap. xiii. his verbis. Sunt præterea nonnullæ aliz, quas inter arbores recensco, et assitudine & longitudine prælatæ Pini, cujus folia Hispaniam silecem planè referunt, tametsi longè majora: ejusdem tamen formæ, ut videlicet singula folia multis folijs simul connexis consistunt. Habent igitur istæ arbores folia verè Filicis omnino similia, satis viridia: & magna ex parte in torrentium ripis & convallibus humidis sponte nascuntur.

Arbor Filicis similis.

IVNIPEAUS.

CAP. XXV.

IVNIPEA duo genera veteres constituunt, majus & minus. Dioscorides unius fructum nuncjuglandis magnitudine interdum augeri, alterius nucem ponticam æquare ait: cum tamen reliqui Juniperi fructum non majorem quam myrto tribuant: sed nec ipse cap. de Cedro:

VERVM de Junipero cujus descriptio à Dioscoridis interprete tanquam notha rejecta est, primum agemus, deinde de altera cui spina pto folio est.

Juniperi, quam majorem appello, frutex est humanam altitudinem raro superans, caudice contorto, non recto, multis ramis prædido, scabro corrice: folia habet carnosa, & ex continua quaternorum foliorum mutuo connexorum serie composita, quemadmodum Cupressus: flores Junipero vulgari & Oxycedro similes, flavos, sed extremis folijs insidentes ut in Cupressu & Thuia: quibus succedit fructus baccarum myrti magnitudine, rotundus, primum viridis, deinde ad phœniceum colorem tendens, qui maturitate nonnulli mollescit, sapore & odore Juniperi baccis simili, qui tria aut quaterna, vel etiam plura grana oblonga & striata habet, medullam albam & resinam olentem continentia. Vere flores, fructumque diu retinet ante quàm maturescar, uti Juniperus. Primum semine hucus hie frutex, & adhuc tener, folia habet omnino dissimilia, utpote quæ alterius Juniperi folia æmulentur, nisi breviora & paulò molliora essent: cum verò jam tertium aut quartum annum attingit, rotunda & cupressæ folia efformare incipit: ut inferioribus tami pungentibus & acutis folijs, summi verò obtusis & rotundis onusti interdum conspiciantur. Quam metamorphosin nisi quis diligenter observaverit, facile innotem innoteri possit, ut credat adolescentem à jam adultâ diversâ fâto plantam esse.

Juniperi majoris testis.

D

NASCI

Juniperus major Diofci.

Juniperus Alpina.



Males.

NASCITUR ad Thyrrhenum mare: nam inter Calpea & Malacam, Bæticæ item & Galliz Narbonensis ora mæritima observabam.

OPTIME convenit hic frutex cum Junipero majore, quæ tamquam spuria è Diofcoridis codice ab interprete rejecta est, ut dixi. Ejus vero hæc est descriptio.

Juniperus
major Diofci

JUNIPERUS major, quam aliqui silvestrem Cupressum appellant, alij Mæstisæum, alij Acateram, Romani Juniperum, vulgò cognita est, Cupressi similis: asperis maritimisq; locis plerumque nascitur, easdem quas supradicta [videlicet juniperus vulgaris] vires habens.

Cedrus Thu-
æa minor.

NISI fortè ad Cedrum minorem alteram, quam Theophrastus & Plinius phœniciam vocari, folio ab oxycedro differre, odoratioremq; esse scribunt, ut certè hæc est, referre maluit.

Juniperi ma-
joris & Saba-
inæ hæc dif-
ferentia.

Ex Necoreicis nonnulli Sabinæ bacciferæ nomine appellatæ, cum tamen à Sabina, etiam baccifera, plurimum differat odore & forma: nam Sabinæ gravis odor, hæc Junipero vulgari etiam odoratio: Sabinæ extremi rami in acuta folia plerumque desinunt, contra verò hujus obtusa sunt, Sabinæ item bæccæ maturitate nigrescunt, minoresq; sunt quàm hujus, quæ, ut suprà dixi, phœnicæ sunt coloris. Sunt etiam qui Oxycedrum folio Sabinæ appellant, Galli, Bellonio teste, *serbin*, quæ nonnulli magno, inquit, eiore pro Sabina utuntur. Nec desunt qui Thuiz primum genus faciant. Ex ejus sanè odore & sapore colligere licet similibus virtutibus præditam esse cum vulgari Junipero.

Juniperi
vulg. æstiv.
& ætherei.

Ea porro Juniperus cui spina pro folio est, vix totà Lusitaniâ reperitur, Castellâ verò novâ admodum frequens est: sed ea præsertim quæ celsior & arborelescens supra Segoviam, quæ inde Madritium itur, ut ibi trabes & ædium contignationes incolæ sibi fabricent: nec immerito Plinius lib. Natur. histor. cap. xvi. cap. xxxix. dixerit hanc in Hispaniâ vastam nasci. Sed & in Belgio & plerisque Germaniæ locis vulgatem Juniperum in justam fœtæ arboris magnitudinem excrefcere observabam, præsertim in hortis & cultioribus locis natam.

ALIAM autem elegantem Juniperum pungentibus folijs, in Austriacarum Alpium quibudam jugis mihi primùm observatam hic adjungam.

Juniperi
alpina.

Cubitaliæ altitudinem ea non excedit, sed depressa est, & quasi humi spargitur, multoq; crassioribus & brevioribus constat ramis quàm vulgaris, lentis etiam, fractu contumacibus, & contortis: tenebrosos ramos ambiunt terna folia, æqualiter semper nascentia, ut in vulgari, verum laciore, breviora, crassiora, nec minùs quàm illa pungentia, colore interius ex cæruleo candicante, exterius viridi: florem non conspexi: fructum autem in ramulis gestat vulgari similem, paulò tamen (ut mihi quidem videbatur) longiorem, antè quàm plenam maturitatem consequatur: deinde, ubi maturuit, nigrum, ejusdemque cum illo farinæ.

Males.

Cæteris in scopulis Durenstein & Eschleri, quibus duntaxat locis inveniebam Augusto mense

mensis pauculas stirpes fructu maturo & immaturo onustas. Gustus autem indicabat, facultates à vulgari non abimiles possidere.

VULGARIS porro Iuniperus Græcis *Ἰπυωδός*, Germanis *Krautbaum* oder *Wacholderbaum* Nomina. Gallis *Gineure*, Italis *Ginepro*, Hispanis *Enebro*, Vngaris *Tevistes fenyj*. Ejus bacca græcis *ἰπυωδίδες*, gallis *grain de Genevre*, ital. *Granella di Ginepro*, hispanis *Nenema*, germanis *Krautbeere*.

OXYCEDRVS.

CAP. XXVI.



IUNIPERO ferè similis est Oxycedrus, magna ex parte contorto ut illa caudice, interdum etiam in arbuticulam excresecens, tenui & rufescente cortice: folia habet Iuniperi vulgaris modo pungentia, aliquantulum tamè longiora & rariora, terna semper circa ramulos simul nascentia ut in Iunipero: fructum initidè viridem, deinde flavescentem, postremò, cum maturat, puniceo coloris, Iuniperi fructu multò majorem, ut interdum avellanam magnitudine æquet, & tuberculis quibusdam, veluti squamarum rudimentis oblitum, nucleos tres aut quatuor inæquales continentem, majores quàm in superiore, medulla intus alba. Floret Iuniperi modo, & eodem tempore utriusque fructus maturitatem adipiscitur.

PROVENIT plerisque Hispaniæ & Narbonensis Galliæ asperis locis: nusquam autem majorem videre memini, quàm supra Segobiam & Guadarrama, itinere Madritano, ubi arborum magnitudinem & altitudinem interdum æquat, truncò humani corporis crassitudinem æquante, ex quo, veluti ex truncò Iuniperi, quæ simul cum isto eadem aliudine crevit, ædium trabes & conignationes incolæ faciunt.

Hisce porro in ejus ramis mense Octobri enatam plantulam observabam, digiti longitudinem, instar visci ramosam, geniculatam, viridem, interdum flavescentem, ramulis micigerecens natis, sive ejus plantæ quam nonnulli Salicorniam, Mompelliani matinum Sempervivum vocant, sed paulò minoribus constitentem, quorum extremis aliquando inhaeret veluti fructus Musci, qui in arboribus aut saxis nascitur, fructui persimilis Acido & valde adstringente gustu est tota hæc plantula, Oxycedro, veluti viscum in alijs arboribus, innascens.


THEOPHRASTVS hunc fruticem *Ἰξωδρον καὶ Ἰξωδρον Ἀνδίας* appellat Hist. Plant. lib. III. cap. XII. Plinius, cum sequutus, Natural. Hist. lib. XIII. cap. V. Cedrum minorem Lyciam & Oxycedrum. Nam quam alij pro Lycia exhibent, nihil aliud est meo judicio, quam novella majoris Iuniperi, sive Cedri minoris Phœnicis plantæ, quæ baccas proferre non solet, donec Tamancis sive Capressi folia contraxerit, licet non desint, qui quartum Thuxæ genus ex ea facere non vereantur. Minorem autem Phœniciam voco, ad majoris Coniferæ quæ & Cedrelate Plinio est, in Syria Phœnicia & alijs locis crescentis, differentiam. Hispani autem Oxycedrum à Iunipero non discernunt, sed eodem nomine *Enebro* utramque vocant. Narbonenses Galli *Cedr* appellant, & oleum ex eo confectum, *huile de cedr*, capitis male scabiei, quæ illis *Rasile* dicitur, pecorum quæ scabiei & ulceribus, quibus à tonsurâ nonnumquam infestantur, adprimè utile. Idem oleum, quod cedræ simile est, Hispani *Altera* appellant.

MYRICA.

CAP. XXVII.

DVO Myricæ genera Veteres nobis prodiderunt, silvestre unum, aliud sativum sive domesticum.

MYRICA silvestris magna ex parte tantummodo fruticat, interdum in vastam arborem adolefcit: scabro cau licis cortice, ramorum verò punicante: folia habet Cupressi, aut Ericæ humilis vulgaris, coloris ex viridi ad cinereum tendentis: flores extremis ramis in oblongis pediculis confertos & racemarum compactos, exiguos, foris purpurascences, cum expansi sunt, candidos, quinque foliolis constantes: qui deinde in exiguum semen tomento involutum



lutum efformantur, exiguis veluti valvulis inclusum, quibus maturitate dehiscuntibus effluit ut in Salice, Populo & similibus. Ter plerumque in anno fleret, vere, æstate, autumnos recentibus floribus semen jam evanescentis semper subsequentiis. Hanc Plinius inter eas recenset quæ nullum fructum, imò ne semen quidem proferunt cum tamen Dioscorides illi fructum tribuat compage muscosum.

Natalis. Nascitur plerumque juxta flumina, aliquando satis etiam procul ab illis. Observabam & in Narbonensi Gallia (tagno Volcarum vicinam: nusquam tamen ampliorem videre memini, quàm supra Madritum Regum Hispaniæ Regiam, planicie multis hujusmodi arboribus confita, non procul ab amnium Xarama & Henares confluentibus, sub Compluto, Hispaniæ *Alcala de Henares* nuncupato, quod fluvius Henares eam urbem alluat: magnæ tamen istæ arbores, quas hominis ulna amplecti vix potuisset, diversum florem non ferunt ab eo qui in fruticantibus dumtaxat tamaricibus provenit. Frequentis etiam hæc est Belgicis hortis.

Nusquam eam neque in Hispania, neque in Gallia, perpetua coma virentem vidi: sed novo vete singulis annis nova foliorum germina proferentem.

Myrica silvestris. A L I V D hujus silvestris genus in Pannonia nascitur solummodo fruticans, nec unquam, veluti superius arborecens: brumam etiam fert, & riguis ut gallicum & hispanicum gaudet: crassiores huic sunt virgæ, folia crassiora & latiora: singulis annis novos furculos producit cubitales, virides, ut plurimum desinentes in quandam spicam palmaris aut semipedalis longitudinis, è floribus ex albo purpurascens, majoribus quàm in superiore, quinque etiam foliis constantibus confertam: ijs succedunt oblongi & mucronati caliculi, qui dehiscunt, semen pappi salicis modo involutum ostendunt: ex majusculorum foliorum, furculos ambientium, alijs, nascuntur alij ramuli exiguis foliolis onusti.

Natalis. Copiosè ad flumen Drafen, ante D. Hippolyti urbem, vulgò *Eam Priem* nuncupatum, octo à Vienna Austriæ inferioris urbe miliaribus distantem, crescit: ad amnè etiam *Echmorte* oppidum *Murtre* alluens, binis supra Neapolim Austriæ miliaribus, præsertim arenosis illis locis quæ hieme ab ijs amnibus inundantur.

Tempus. Floret Maio & Junio, ac deinceps tota ferè æstate flores & semen proferre non desinit.

Huic similem, quibuldam Germaniæ locis ad Rhenum fluvium, & in Tyrolensî comitatu nasci intelligo: frequentem etiam vidi ante paucos annos Londini Trenobantum in aliquot hortis.

Myrica silvestris nova. SATIVAM, quam Dioscorides mitiorem vocat, & in Ægypto Syriæque nasci scribit, fructu Galilæ proximo, gustu adstringente, cujus etiam Plinius meminit, numquam conspexi.

Beillonius observationum lib. II. cap. XXV. & XCVI. in Ægypto se vidisse ait magnas arbores My-

res Myricæ gallam ferentes, ab Arabibus hujus tēporis *chermafel* appellatam, magni olim in medicina usus: fructum verò arboris esse negat, sed excrementum potius arbitratum his verbis. Tamarices in Ægypto locis humidis & arenosis sicciſque indifferentes nascuntur, illarum enim silvulæ perinde in aridioribus locis reperiuntur, atque in humidis litoribus. Ex autem excreſcentiâ, quam gallam nominavimus, adeo onustæ sunt, ut parum abſit quin rami nimio pondere rumpantur.

Vocatvr autem à Græcis *μυrica*, Plinio Myrice, Tamarix & brya silvestris, officinis Tamariscus, Hispanis *Taray*, Gallis *Tamarisque*, Italīs *Tamarice*, Germanis *Tamarisken* tum odor *holz*.

FOLIORVM Tamaricis decoctum ex vico & aceto, lieni indurato prodesse, testes sunt veteres medici, & ipsa etiam experientia: atque in eundem usum potioris calices ex ejus ligno tornari, quibus bibant lienosi: multis alijs insuper morbis utilem esse Tamaricem: majoris gallam cruentis exſecrationibus, & cœliaci in potu dari, & contra profluvia feminarum, regium morbum, & phalangiorum morſus: illius tumores inhibet: cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum lienem abſumit, multas præterea alias facultates huic frutici tribuit Dioſcorides, & Plinius.

Memini etiam Francoforum ad Mœnum adſerti ſolita doliola è Tamaricis ad Rhenum nascentis ligno concinnata, ad sextarium dimidium fortè capacia, nonnulla etiam paulò majora, quibus contentus liquor lienosis proſit.

ERICA Coris folio.

CAP. XXVIII.



ERICAM Dioſcorides lib. I. Myricæ ſimilem facit, loogè tamen minorem: libro verò III. Corin folio Ericæ pinguiore ac minore. Plinius Narur Hiſtor. lib. XXI. cap. IX. fructicem eſſe ſcribit non multum à Myricæ differentem, colore Rorifmarini & penè folio. Ex quorum ſententijs colligi poſſe videtur, plura eſſe Ericæ genera, ut certe ſunt: quemadmodum ex iconibus & earum deſcriptionibus ſubjctis videre licet.

PRIMUM itaque genus Ericæ, ſimile eſt Myricæ, & ſeprenſionalibus regionibus maxime familiare, locis incultis, raro ſupra cubiti altitudinem aſſurgens, plerumque minus, tenuibus ramis, duris, lignoſis, fruticoſum, colore ex nigro ruſcente: frequentia habet folia, è foliis quaterno ordine diſpoſitis conſtantia, uti Cupreſſus, ramarix, & ſimiles, vitidia admodum, quæ temporis ſuccellu in ramulos efformantur: flores ſecundum ramulos à medio ad ſummum uſque propendent bullari quodammodo; quaternis foliis conſtantes, elegantiffimo purpure dilutioris colore, interdum etiam, ſed raro, albo. Bis quidem floret: ſed majore ex parte Autumno tantum, licet nonnuquam etiam vere. Rarius provenit in calidioribus regionibus.

Iſti per omnia ſimilem plantam, ſed paulò elariorum, folijs tomeoroſis & incanis, paulò etiam dilutioris flore in venetiam inculris, ſupra Windſotam Regum Angliæ Regiam, locis.

Altervm Erica genus diverſo à ſuperiore eſt folio: etenim Myricæ folio non reſpondet, ſed Corin, foliorum forma & ſitu admodum æmulatur. Iſtius autem generis multæ ſunt ſpecies, magnitudine, foliorum & florum forma, coloreque, inter ſe differentes.

PRIMA, omnium quas unquam conſpexi maxima, humanam altitudinem interdum ſuperat, fruticoſa admodum, ligno duro, ex rubro nigricare: folijs exilibus & brevibus, quaterno ordine ramos obſidentibus, guſtu admodum adſtringente, flore copioſo, racematim penè totos ramulos occupante, ut interdum majores rami pedali longitudine onſti conſpiciantur: eſt autem iſtos concavus, veluti exiguum cymbalum, oblongus, odoratus, pulcher, albus.

Nascitur in Luſitaniz ſolitudinibus inter Vlyſſipontem & Conimbricam celebrem ejus Regni Academiâ: inveniebam etiam citra Tagum decimo ab Vlyſſipone miliari, inde Hiſpalim proſecturus. Floret Novembri, Decembri, & Januario, his enim menſibus & obſervavi & legi.

Erica Coris folio 11.

Erica Coris folio 111.



Erica Coris folio 1111.

11.



111.

1111.

ALTERA, ejusdem ferè altitudinis cum prima, etiam fruticosa, tenuioribus ramis tamen, ejusdem cum superiore colens, exilibus similiter folijs quaternis ramulos simul amplectentibus, quorum extremis oblongiusculi flores insident superioribus similes, colore purpurascens. Tota etiam adstrichonis particeps.

Provenit iisdem quibus prima locis, illa etiam frequentior, & eodem tempore florens.

2. Non multum illi dissimilis, quæ Narbone nsi agro frequens, longiore paulò & copiosiore est folio, flore purpureo, minore, & extremis ramulis confertim stipato, cujus iconem exhibere videretur Claris. Matthioli.

TERTIA illis persimilis, paulò tamen humilior, aliquantulum majora & laruscula, nigriora quoque, quaternis ordinibus circum ramulos nascentia: plurimos flores per intervalia secundum ramulorum longitudinem nascentes, superioribus forma similes, herbacei primùm coloris, deinde ex albo purpurascens. Tota etiam adstrichoria facultate prædita.

Supra Vlyssiponem frequens inter superiores, pluribus tamen locis occurrit, ut etiam citra Tagum. Floret Decembri & Januario.

QUARTA etiam fruticosa est, duorum cubitorum altitudine, nonnunquam amplior, fragili ligno, tenuibus & minus folijs, ut in Corrua prima ferè viridibus, quæ in desiccatis nonnihil ramis facile defluunt: istius flos reliquis minor est, cavus etiam & herbacei coloris. Extremis ramulis capitula è multis folijs compacta nonnunquam gignit, his nõ multum absimilia, quæ in vulgari & duriorè Thymo aliquando cõspiciuntur.

Vulgaris

Erica Coris folio v.

Erica Coris folio vi.



Erica Coris folio vii.



Vulgaris admodum hæc est toti Hispaniæ, Lusitanæ & Aquitanæ: nam spariosis illis solitudinibus, & in culis inter Butdigalam & Bayonam locis, quæ vulgo *Landes de Bordeaux* nuncupantur, nullum ferè aliud virgultū conspicitur. Nota est etiam Narbonensi Gallix, consociendis scopis maximè idonea. Verno tempore & sub hiemem floret.

QVINTA minor est superioribus, cubitalis v. videlicet ut plurimum altitudinis, ramis gracilibus fruticosa, quos terni per intervalla tamuli ambiunt, ternis folijs admodum exilibus circa illos disposito quodam ordine & ferie nascentibus: flores plurimos habet superioribus paulo majores coloris purpurei obsoleterioris, confertim circa ramulos longis pediculis inherentes.

Incultis Lusitanæ locis supra Vlyssiponem frequens. Florebat istic Decembri.

Sexta admodum similis est quintæ, paulò tamè humilior, neque fruticosa, sed omnes ferè virgas seu tenues ramos à radice proferens singulares, cinereo cortice obductos, quos ferie quadam ambiunt ramulorum rudimenta, seu germina à multis folijs confertim nascentibus constantia, nigrioris quàm alterius coloris: flores concavi, quintæ floribus forma similes, elegantiissimi saturatioris purpurei coloris, è longiusculis pedicellis verticillato ambitu, per intervalla, & è summis ramis depèdunt.

Nascentem hanc vidi in Castella veteri Hispaniæ, supra Lutetiam Gallix, & in Anglia supra Windeforam mense Septembei florentem.

SEPTIMA

VII. **SEPTIMA** multos teretes humiq; procumbentes ramos habet, pedales, interdum etiam cubitales, ex atro purpureascentes. Hos plurima gracilia ambiunt foliola, Tertix folijs penè similia, paulò tamen longiora, quaternis plerumque, interdum quinis veribus ordine disposita, adstringente gustu: flosculi in summis ramulis oblongi, concavi, purpurei dilutioris coloris, ex quatuor foliis ejusdem ferè coloris prodeuntes, qui maruri & tescicati, nigricans & minutum semen continent: radix dura, lignosa, in diversa tendens: ipsi tamen procumbentes rami, humiq; diffusi, tenues capillaresq; fibras nonnumquam agunt.

Copiosè admodum crescit supra *Orthes* in ascensu *hermæsten* magno militari germanico supra *Gamingam*: inveniebam etiam inter saxa & scopulos in ipsis *Emassten* *Eneasten* atque aliarum *Syniacarum* & *Austriacarum* alpium præaltis jugis, ubi Junio & etiam serius floret. Inter *Pragæ* & *Notibergam* etiam Junio florentem colligebam anno M. D. LXXIX.

Erica Coris folio VIII.

Erica Coris folio IX.



VIII. **MINOR** est octava, & pedalem altitudinem rard superat, magna ex parte humi procumbens, quaternis folijs, ramulos, contrario exortu, semper ambiens: bus flores secundum ramulorum summam longitudinem inter folia dependens. cavi, pusilli, in quatuor angulos desinentes, herbaceo colore præditi, in quibus deinde semen: radix dura & lignosa.

Maximè copiâ nascitur in ascensu montis illius qui superandus est ijs qui *Gaminga* ad *Orthes* vicinaque loca proficisci cupiunt, quo loco & florentem & foliaceâ capitula profertentem Augusto mense colligi, nusquam alibi mihi conspectam. Quartæ genus esse videtur pusillum.

IX. **NONA**, æquali cum illa excrescit altitudine, tenuibusq; virgulis prædita est humi diffusis, ex purpura nigricantibus, quæ summa parte in multos plerumque ramulos dividit: folia in ordines & vertus digesta, ut in reliquis, tenuia admodum, *Ericæ* sextæ in Hispania & Gallia nascentis folijs similia, terna semper, quem admodum in illa, æquali inter se sita, virgulas ambiunt: summi ramuli onusti sunt concavis & oblongis flosculis, extrema parte in quatuor angulos sectis, coloris cum quatuor illis foliis, unde enascuntur, carnei, octonis staminulis nigricantibus, stiloque purpureascente e medio flosculo emergentibus: semen maturitate nigricans, ex quo habet radicem alijs similem lignosam. Adnascuntur interdum hujus etiam ramulis vitidia capitula, & latioribus foliis compacta, capitulorum *Thymi* modo.

Invenitur hæc apud artem *Orthes* in silva illi imminenti qua ad *Emberg* ex arce iter est, alia item ad sinistram oppidi *Therich* silva, & nonnullis montanis *Pannoniæ* silvis. Floret ut plurimum Aprilis & Maio, quo tempore aspectu venustissima est.

Erica Coris folio x.

Erica Coris folio xi.



DECIMA fruticosa est, cubitalibus assurgens ramulis, fragilibus, nigriore quàm reli-
quæ cortice: folia superioribus similia habet, sed nigriora & crassiora, trino ordine circum
ramulos disposita, calidiusculi cum quadam adfrictione gustus. Septembri & Octobri fru-
ctum à reliquis differentem summis ramulis inhaerentem gerit, pulcherrimum, candidum,
transparentem, obscuriores & inæquales niones formâ & colore referentem, succulètum,
acidi saporis, tria granula dura plerumque continentem, qui Novembri exsiccatur, & spon-
te decidit. An floreat ignoro, incolæ negabant, & fructum paulatim intrumescere grandius-
culumque fieri donec maturescat affirmabant.

In unâ Lusitanâ hoc genus observabam non procul Vlyssipone inter Riofrio & Aldea
galega, ubi qui Tagum transire volunt, naves conscendunt, & etiam supra Vlyssiponem so-
lo admodum arenoso, copioso suo fructu albo onnsum: ut initio mânz grana isti fructici in-
haerentia existimarem, ad eò procul aspicienti imposuerunt: jam enim primum exoriebatur
Sol, & frigidiuscula erat aura, utpote Novembris initio.

HYMI diffusa est Vndecima, & latas occupat areas, multis ramis lignosis, flexilibus ta-
men constans, ex atro rufescente cortice tectis, qui interdum fibras agunt, ut latius serpere,
& sufficiens alimentum melius attrahere queant: assurgentes ramulos numerosa ambiunt
foliola, ternis, interdum quaternis versibus disposita, crassa & carnosa, superiori ferè similia,
sapore primum linguam exsiccante, deindi acti & linguam vellicante: pusilli ad foliorum
exortus flosculi, tribus foliolis constantes, coloris ex herbaceo subalbicantis, purpureiscenti-
bus staminulis internè præditi: his succedunt rotundæ bacce, junipetinis haud minores, ini-
tio virides, maturitate nigre, & purpureo succo, uti mora, plenz, in quibus multa inæqualia
& veluti triangu la grana: radix lignosa & dura est.

Hanc florentem, & viridibus baccis onustam, multasque adhuc superioris anni maturas
retinentem, inveniebam in præclisi montis, vulgò *Monte* appellati, scopulis, quinto supra
Neapolim Austriæ urbem milliari, meosè Junio. postea etiam Augusto, immaturo & ma-
turo fructu plenam in Enserg & Smalbes celissimarum Austriæ & Styriæ alpium jugis. Il-
lius etiam arenosis Hollandiæ tumulis etræ: ramum suis baccis maturis & immaturis
onustum ad me misit N. V. Ioannes ab Hoghelande anno M. D. XC.

Certum est eam ipsam esse, quam Matthioli in montibus qui Boëniam à Silesia dis-
jungunt inventam, bacciferam cognominat, ac describit, tamedî subvirescentem pulpam
suz fructui tribuat, quæ io mea nigricat, & purpureo succo manus inficit: sed immaturis for-
te baccis prædictam observavit. Multum autem differt ab *Oxyocco* Cordi, sive *Vaccinijs*
palustribus

palustris Dodonzi. Hujus enim folia crassa, carnosa, & acriscula sunt, illius autem latiuscula pro parte cana, refringentisque & adstrictis facilius.

Erica XII.

XII.



XIII.

DVODECIMA cubitali pæne est altitudine, fruticosa, tenuibus virgulis prædita, quæ ternæ semper circum majores ex intervalis nascuntur: folia similiter terna ramulis innascentur, exigua quidem, sed latiora quàm in suppetiobus, inferiore & terram spectante parte nonnihil cædantia, hirsuta, gustus adstringentis: summi ramuli ad foliorum exortus verticillatim exornantur per intervalla ternis perpetuò floribus æquali inter se spatio nascentibus, & in unam partem converfis, majoribus quàm in reliquis generibus, concavis, & entre nâgis turgido, coloris ex rubro purpurascētis, numero sex, novem, duodecim, quindecim, aut pluribus.

Idem cum Decima, & alijs Lusitanæ arenosis locis crescit ut plurimum. Floret Octobri mense, & subinde semen exiguum, nigricans, quale reliquæ (præter bacciferas) præfert.

DECIMATE TERTIA, foliorum forma non multum ab hac differens, plerique Brabantæ & Geldræ locis crescit: nonnullis item Castellæ veteris, præsertim circa collem *la Peña de Francia* vulgè appellatum, in quo monasteriū D. Virgini factum, pedibus solummodo fruticans virgis, tenuibus, ex rubro nigricantibus, frequentibus eas cingentibus folijs, quaternis ordine dispositis, superiore ordine angustioribus, & Thymi vulgaris minoribus, hirsutis tamen & pilosis: summi ramuli plerumque dependent quæsi aut seni flores simul juncti, Lilij convallium floribus similes, paulo tamen oblongiores

neque adeò vetriciosi sicut prioris flores, coloris ut plurimum ex rubro diluvis purpurascētis: interdum etiam albi. Floret Vere & Autumnū.

Epilæ.
Terralis.

Epilæ Græcis, Erica & Ericæ Latinis, Atheniensibus *Tetralix* teste Plinio (Theophrastus quidem Tetralicem nominat inter plantas quæ ætare germinant, sed qualis sit non describit) Galli *Bruyère*, Itali *Erica*.

Primum verò genus, quod folio Tamaricis est, Hispani *Quiribœla*, Lusitani *Quirra* appellant, Germani *Seyden* Virgati apud quos non minus abundè nascitur quàm in ædularum aliarum Provinciarum solitudinibus, *id est* id est hiemale vicide.

Acacalis.

Altecus generis primam Lusitani *aterra* vocant: quartam *urs* & *urgueira*, Hispani *breçes* septimam monachi pastores aliqui *gmaet*: decimam Lusitani *camarinhera*, fructum verò *camarinhera*, eam Amatus Lusitanus suis in Dioscoridem commentarijs *Acacalis* esse existimat, cujus Dioscorides statim post Ericam meminir: duodecima Lusitanis *temerihæ*.

Erica fructu.
lata.

FOLIORVM Ericæ succus oculorum imbecillitatem sanat, si oculis inhihletur: flos & coma serpenticum moribus illi medetur. Memini, dum Mompelij agerem, Claris, virum D. Gulielmum Rondeletium, Regium tum Professore, felici successu usum esse oleo ex Ericæ floribus confecto, ad tollendos herpes fœdos & jam inveteratos totam faciem occupantes.

Lusitani decimæ fructum, qui Septembri & Octobri venalis Vlyssipone invenitur, febricitantibus exhibent, ad sitim qua premuntur restinguendam: avidè etiam idem fructus à puernis & mulierculis expetitur. Si Acacalis est, aquam in qua maduerit Ericæ fructus, ad collyria quæ ad excitandam oculorum aciem conveniunt, addi, telus est Dioscorides.

PRVNVS MYROBALANVS.

CAP. XXIX.

Prunus rep.
nominata
Myrobalan.
um.

FACILE adolescit hæc arbor, & in vastam excrescit amplitudinem, majore scque ejus rami subinde in alios divisi, opacam admodum præbent umbram: caudex multo levior graviorque oculis corrice præditus est, quàm reliqua prunorum genera: tenuiores rami graciles admodum, tenerimo cortice vestiuntur: folia quodammodo media inter Prunum & Cerasum, tenella, pet ambitum serrata sunt: flos candidus, tenuior quàm in vulgaris fructus,

Prunus Myrobalanus.



Arbutus.



fructus, cujus alternis annis feracissimus est, rotundus, oblongo tenuique petiolo inter folia pendens, aspectu jucundus, per initia vi-
ret, cum maturiscere incipit rubet, matu-
ritatem adeptus purpura nigro commixta nitet,
carnem succulenram & palato gratam, nu-
cleum non admodum magnum habet.

Floret cum alijs ejus generis novo Vere
sub Julij finem & Augusto fructus maturita-
tem adipiscitur.

Nondum vulgaris erat, cum eam descri-
berem: sed qui habebant, ex Cæsarei Palatii
horto nacti erant, ubi omnium primas con-
spexi ejus arbores tres ingentes, unde primum
eò delatas, incertum: nonnulli è Constanti-
nopoli, alijs è Gallia genus duxisse arbitran-
tur. Certè ea arbor quæ Biturigibus Gallo-
rum Myrobalanorum Chepulorum nomine
ostenditur, huic per similes esse videtur, ut ex
ejus folio inde delato mihi quæ donato à Cl.
V.D. Joanne Pothio, nunc Palatinæ Elect.
Archiatro, æstimare licet.

2. Nunc in eodem Cæsarei horto illius ge-
nus alitur ex superioris nucleum natum, quod
minore fructu & dulciore pulpa est: in ceteris
nihil à superiore differt.

Cum huic generi Pruni, Myrobalani sit
appellatio data, me latet: nam nec fructus si-
milis est, neque officula, quæ reliquis Pruni
generibus similia habet. licet parva, cum legiti-
morum Myrobalanorum officulis five nu-
cleis quæ canaliculæ sunt & striata, quidquam
commune habent.

ARBUTVS.

CAP. XXX.

ARBUTVM Theophrasti à Dioscoride
differtè peritissimus rei herbariæ Anguil-
lara censet. Cujus sanè sententiæ non possum
non subscribere: cum Arbutus mihi hæcenus
observata, cum Cotonea malo nihil similitu-
dinis habeat.

Est verò pumila arbor, aut potius frutex, *Arbuti li-
fera.*
frequentibus ramis, quorum summitates ru-
bescunt: alioqui trunco & majoribus ramis
satis scabro cortice testis: folia nullo ordine &
temerè nascentia ramulos ambiunt, Laurinis
similia, ejusdem interdum amplitudinis, per
ambitum serrata, semper virentia, lævia &
splendentia: flores extremis ramis singulari
appendice racematim coherent, albi, quæ par-
te Soli obversæ sunt, nonnihil purpurascen-
tes, concavi, Lilijs convallium floribus per si-
miles: fructus frago similis, orbiculatus, mul-
tò major, & rotundus prunis interdum magni-
tudine par, initio viridis, deinde flavescens,
postremò, cum plenè maturus, rubro colore
elegantissimo conspicuus, interiore tamen
carne pallescens, edulis, & à tenuis fortune
hominibus valde expectatus, ideoque Vlyssi-
pone, & alijs quibusdam locis venalis à rusti-
canis mulierculis in foro propanitur: semen
nilio non majus, tenui membrana obdu-
ctum in medullis continet.

Buxæ

Baticæ & Lusitanicæ incultis, inter Myrtum, Cistum, & alios frutices provenit, semperque ferè aut florens, aut fructu oouula conspicitur, interdum utroque abundans: foliis enim de cædo flore, novum germen extremis ramis proferre, in sponsonem alterius floris. In Narbonensi Gallia nascentem etiam observabam. Crevit etiam apud meos Belgas semine, & à nonnullis fide libus exceptus, cum alijs perpetua fronde viticulis diligentissimè ad servari solebat.

.. Bellonius lib. 1. Observationum cap. XLIII. refert in vallibus monti Artho (veteribus ad eò celebrato) vicinis, Arbutos nasci vastæ magnitudinis, cum alibi duntaxat fruticent: ut minus mirum videri debeat, si luba (referente Plinio Natur. Histor. lib. XV. cap. XXIII.) quinquagènum cubitorum in Arabia eas esse auctor est.

King Dr. Minusian. DICTYVA porro Græcis ἀμυρτος, Latius Arbutus, Gallis *Arbustier*, Hispanis *madroño*, Lusitanis, addita aspiratione *madrenbo*: fructus Græcis μαμακιάδες, Latinis Vnedo, Hispanis *madroños*, Gallis *arbustes*.

PLINIVS Nat. Hist. lib. XXII. cap. VIII. ait unedonis fructum esse difficilem concoctioni & stomacho inutilem: lib. verò XV. cap. XXIII. pomum ejus inhonorum, ut cui nomen ex argumento sit, unum tantum edendi. Athenæus lib. 11. Deipnosophistarum scribit, ei qui plures septem Arbuti fructus ederit, caput dolore vexari. Longè tamen plures ab alijs devorati observabam, cum per Baticam & Lusitaniam, Vlyssiponem profecturus, iter facerem, & ipse multo sedi sine vili noxâ: verum quidem est non ad eò grati saporis esse ut fraga. *Fanliato.* Amatus Lusitanus ex Arbuti folijs & floribus aquam vitreis organjs elici scribit, eamque servari tamquam sacratissimam ad vetus pestem & venena antidotum.

ADRACHNE THEOPHRASTI.

CAP. XXXI.

ISTIVS etiam iconem brevemque historiam, cum Oenophia supra descripta, mittēbar idem Honorius Bellus.

POTVLACA, inquit, seu ἀδραχνη Theophrasti, frequens provenit in Creta, montibus Leucis, & alibi inter saxa, frutices potius, quam arboris modo: perpetua fronde vires, foliaque habet laurinis adeò similia: ut solo odore dignoscantur: nam Adrachnes folium odore causet caudicis & ramorum omnium cortex adeò lavis, rubens & splendens est, ut corallij rami esse videantur: æstate rumpitur cortex, & in tenuissimas brachæa decidit, quo tempore neque rubens, neque splendens cernitur, sed medium quandam inter pallidum & cineraceum colorem adquiret: florem & fructum bis, ut Arbutus, profert, & hunc quidem adeò similem, ut alteri ab altero nullo modo dignoscere queas. Differt tamen arbor hæc ab Arbuto: quoniam tantum provenit in montibus, neque folium ferratum habet, neque corticem caudicis scalarum: ligni materies durissima est, fragilis tamen, quia siect non potest: rusticis igni struendo servat, & ad verticilla conficienda mulierum fusis appendenda. Theophrastus recenset hanc arborem inter eas, quæ detractis cortice non intescunt, & perpetua fronde vires, hiemeque in cacumine folia retinent: quod ita se habere, à me observatum est: ideo iconem duplicem ad te mitto.

Vocatur hæc arbor in Creta, & tota ferè Græcia, ἀδραχνη. Hæc Bellus.

Nos autem ex Theophrasti de Historia Plantarum libris I. III. IIII. V. ἀδραχνης (sic enim habent exemplaria græca, tamen si potius ἀδραχνης legendum videatur, quia vulgaris notitiae herba est ἀδραχνη) historiam quàm paucissimis verbis concinnabimus.

Vitens, inquit, perpetuò ex silvestribus [præter alias plerasque] ἀδραχνης, Arbutus &c. Adrachne quidem arce unedo, inferiora folia, ut apparet, abijciunt, summi autem rami assidue enim ramos gignunt semper vires. Arbuto etiam similia folia habet Adrachne, magnitudine non valde præstant, cortice albo & circumrumpi solito prædita, rumpi fructu Arbuti simili. Adrachne & Aphaca primum fructum maturant, cum uva dulcescit: postiorum, cum in flores: bis enim istæ fructiferae hieme incunte videntur. Cortice autem in orbem detractis, omnes arbores ferè, necari videntur, excepta Adrachne & ipse tamen & ipsa, si quis catenam vehementer prefferit, germenque futurum luxaverit, morientur: itaque vetus, forte, excepto

*Trilactia frons
ad præterea
flos.*



*Plumet val
gata.*

*Adrachne
historia ex
Theophr.*

excepto subere dixerim: hoc enim & iuvari potius cortice detracto. affirmant, videlicet tam exterio, quàm carni proximo, sicut etiam Andrachna. Andrachnes verò lignum mulien- bus ad telas, sive opus textorium experitur.

Plinius autem cap. xxxi. lib. xi. Naturalis Hist. Adrachnen appellat. Adrachnen, inquit, omnes ferè Græci portulacæ nomine interpretantur, cum illa sit herba, & andrachne vocetur, *Andrachne* *hirsuta* *et* *glabra*. unius litteræ diversitate. Ceterum andrachne est silvestris arbor, neque in planis nascens, si- milis unedoni, folio tantum minore & nunquam decedente: cortice non scabro quidem, sed qui circumgelarus videri possit: tam tñstis aspectu est.

Hanc arborem multis enim locis, in sua peregrinatione observavit Petrus Bellonius, atque lib. ii. Observationum cap. c. l. i. i. scribit, iter facienti Halepo Antiochiam, in tumulis nascentem sibi conspectam, cujus ramos suo fructu onustos, quilibet eorum qui comita- bantur, abstulerit, ut in itinere ederet: marutus enim erat, elegantique suo colore, singulos ad edendum in vitabat. Racemarum autem cohebebat, magnitudine & colore fructus Rubus idzi, quem Galli *Framboise* appellant, mollisque erat ut Arbuti fructus.

Nos ejus iconem, qualem ab ipso Honorio Bello accepimus, Lectoris oculis subjicere vo- luimus, tum qualis est suo fructu onusta, tum hieme suo fructu privata, utramque eadem tabellâ expressam.

TINUS, seu Laurus silvestris.

CAP. XXXII.

INTRA Lauri genera Plinius Nat. Hist. lib. xv. cap. xxx. Tini meminit, nulli fortè veterum Latinorum præterea cognitz, nisi M. Caro lib. de re Rustica cap. vii. eam Lauri silvaticæ nomine intelligat. Ejus tria genera nonnihil inter se differentia observabam.

Laurus sil- vatica.

PROR. frutex magnitudine Cornum feminam æquat, virga, q̃ habet oblongas, quadrangulas, ramosas, folia ordine distincta, perpetuo gemina simul inter se adversa, magna, lata, Cornus feminæ folijs penè similia, ad laurina tamen accedentia, perpetua, hoc est immorta- lis viriditatis, nigricantia & splendentia, nullo odore, & amaro sapore prædita cum non nulla adstrictione: fummis ramis florum quinis folijs constantium um bellas profert candidorum & odoratorum: deinde fructus succedit Myrti baccis paulò longior, planior, angulosus, cæ- rulei coloris elegantissimi.

Tinus I.

Nascitur prærupis & lapidosis locis inter alios frutices, & in sepibus circa oppida Lusita- niz *Montem de novo*, & *Tomar*, ubi cum suo flore & fructu colligebam mense Novembri, tamet si aliàs Julio & Augusto floreat, fructus Octobri maturus sit.

TINUS II.

TINUS III.



ALTER, eadem qua superior altitudine affurgit, frequentioribus & firmioribus ramis, *Tinus II.* cortice ex rubro vitescente tectis: circa quos folia superioris, aliquantulum angustiora & ob-

E longiora,

longiora, pluribus venulis distincta, sibi invicem opposita, ut in priore: flores extremis ramis umbellatim etiam nascuntur, colore nonnihil foris purpurascente, minus odorati quàm superioris: fructus etiam minor est plenior, nignior.

Vno dumtaxat loco in Lusitania quodam monasterio *Petra Longa* dicto, locis incultis supra Vlyssiponem recens extructo, observavi secundum piscinas, & deinde Bæticæ maritimis.

Tinus 111.

TERTIVS in Belgicis hortis mihi primum conspectus, semine ex Italia delato natus apud nobilem & clariss. virum Ioannem à Boissæ, penitissimum & diligentissimum rei herbariæ cultorem, arbutulæ magnitudine, quæ singulis annis florem & fructum ferebat. Alunt nunc & plerique alij rei herbariæ studiosi, nobilissq; viri & matronæ, ramis ex ea quam dixi arbutulæ detractis & terræ commixtis enatos fructices. Minore verò est folio quàm superiores, Laurino tamen latiore, lævi, nigricante, perpetuo, ramo sordine quodam per intervalla ambiente, ut in superioribus generibus: umbellæ florum nonnihil foris purpurascentium summorum ramos coronant, deinde fructus ex cæruleo nigricans, lævis, minor quàm in alijs. Bis plerumque floret Vere & sub hiemem.

*Diagramma
silvestris
laurus.*

THEOPHRASTO lib. 1. cap. xv. inter perpetuo virentes è silvestribus, dicitur *δ' αὐτῆς ἀγρία*, à Plinio Tinus & silvestris Laurus. Lusitani priorem *Fua de perro* (est tamen & alia planta dissimilis hoc nomine donata) Alterum *foliudo* à foliorum ut arbitror frequentia, Bæticis *durillo*. Italici Anguillara *laurus salvatica* vulgari nomine dici scribit, & à Brutijs *Molesto*: Bellonius *lentagine* nuncupat.

ALATEANVS.

CAP. XXXIII.

HVIVS fruticis perpetuo virentis duo genera, in mea peregrinatione Hispanica observare memini.

Alateinus 1.

Alaternus 11.



Alaternus 11.

VIVVM arborefcens interdum, longis ramis, non admodum crassis, neque in multas alas diuisis, flexilibus deinde virgultis, quæ externo cortice è candido virefcente integuntur, latente sub eo membrana quadam flavescente quæ lignum ambit: ramos vestiunt incondito ordine disposita folia, media inter Oleæ atque Illicis folia magnitudine, crassiuscula, leviter per ambitum serrata, ex viridi nigricantia, gustu ingrata, & cum amaritudine paululum mordicantia: ad singulorum foliorum qui in ramulis nascuntur, exortus, flores oleæ similes, coloris ex herbido pallascentis, racematim ex oblongis pedicellis dependent vere, interdum etiam media hieme. Nullum in hoc fructum vidi.

Alaternus 11.

ALTERVM multò humilius est, ramis brevioribus, cortice qui eos ambit, ex albo, viridi, & purpurascente coloribus simul permixtis infecto: folia illi superiore minora, magis circinate rotundata.

rotunditatis, in ambitu etiam serrata: ex foliorum alis flores è longiusculis pediculis dependent ut in superiore, illis ramen majores, & coloris magis herbacei: quibus succedit fructus racematis coherens, Lenticis in magnitudine, initio viridis deinde nonnihil rubescens, qui tribus nucleis constare videtur plenior, & nigri coloris, maturitate fieri arbitror, nam immaturo fructu colligebam Aprili. & floribus onustum Februano & Martij initio.

Primum genus Vlyssiponensi agro, locisque vicinis in Lusitania observabam. Alterum etiam ipsam locis, præterea multis Bæticæ, tum Granatensis regno & Valentino.

PLINIVS lib. xvi. cap. xxvi. Alaterni meminit, cui folia inter Ilcem & Oleam tribuit. Hæc aded causa fuit cur huic frutici Alaterni nomen dederim, non Celsatn quem Theoph. etiam inter perpetuo virentes recenset, & tarde fructum maturare ait. Nec refert quod Plinius Alaternum neget fructum ferre, etenim in arbore non valde sibi nota hallucinati potuit, quemadmodum in ceteris quas eodem loco commemorat. Fructum, inquit, arborum folz nullum ferunt, hoc est, ne semen quidem, tamarix scopis tantum nascens, populus, alnus, ulmus attinia, alaternus, cui folia inter Ilcem & Oleam. Nemo enim rei herbarie ad ignarus est, qui alnos ex semine, quod in globulis adulescentes ferunt, nasci non sciat, cum & ipsi rusticis id sit notum: tamarix tanè ex semine non semel mihi nata est: populus, salicis seminibus papposa lanugine involutis provenire, ulmos item atrnias ex famaris (sericem enim semen sed minus quàm latifolia) plerumque vidi.

CETERVM Alaternum eandem cum Theophrasti Philycæ esse, Bellonio lib. i. Observat. cap. xlii censet. Nemo est in monte Artho, inquit, cui arbor Phinio Alaternus dicta, veteri legitimo nomine, quo ipse Theophrastus illam donavit, Philycæ, ignota sit: Corcyrenses vero & Cretenses *ilay-aynos* appellant, quia ejus solum inter Ilcem & Oleam medium est, teste Plinio. Theophrastus quidem varijs locis in sua Plantarum Historia τῆς φιλύκας, & τῆς καλίσσου meminit, sed formam non describit: utramque tantum maturè germinare, & serò fructum reddere, Philycæ honorem in alendo pecore, semper enim fronde abundare, maximè flexibile esse, candore quæ Celsatni.

Lusitanis prior *calca* appellatur, quibusdam *silicæna* & *saquentia*: Gallis, Bellonio teste, *Dalader*, & *sanguin-blanc*: Lucensibus *lietra*. Anguillara Alaternum vocari tradit vulgari appellatione *Alaterna* & *Linterna*.

Nullum illius usum medicum novi. Sed Lusitani assererebant ejus cortice in aqua decocto piscatores sua retia subrutilo colore inficere: & tinctores et fragmentorum ligari, quod paller, decoctione, nigrescentem è cæruleo colorem conciliare.

PHILLYREA.

CAP. XXXIIE.



PHILLYRAM, de qua Theophrastus, à Phillyrea Dioscoridi descripta diversam esse, nemo, ut opinor, jam ignorat. Nos de Phillyrea hic agemus, cujus aliquot genera in Hispanijs & Narbonensi Gallia observabam, omnia folijs concinno ordine dispositis, & contrario inter se petiolorum exortu nascentibus, ut in Olea, Myrto, & plerisque alijs.

PRIOR alius assurgit quàm Ilex coccigera, tamosque habet pollicaris vel etiam amplioris crassitudinis, cortice viridi, sed candicantibus maculis asperso, testos: folia Illicis coccigera, majora, viridiora, crassiora, in ambitu nonnihil spinosa, adstringentis quidem gustus, sed non ingrati. Hujus flos non est mihi conspectus, sed fructus Lenticis æqualis, è foliorum alis dependens, maturitate niger, ossiculum continens.

ALTERA priorem magnitudine superat, multis ramis candicante cortice obiectis prædita: folijs Alaterni prioris præne similibus, firmioribus tamen, & minus nigricantibus, saporis quidem aliquantulum acris, sed in quo amaritudo sentitur. Neque istius florem conspexi, ipsum autem fructum racematim inter folia propendentem, magnitudine granorum pipetis, aut fructus Myrti, rotundum, nigrum, calidi gustus, osseum & durum nucleum candido & fragili cortice obdutum continentem, Decembris initio colligebam.

TERTIA superioribus minor est ut plurimum: illius tamen arbuticulam videre memini

duorum hominum altitudinem æquantem, & ab illa ramulorum suis floribus onustum avel-

E 2 lebam,

Celsatn
Theophr.

Pinus Alaterni
frutic.

Philycæ
Theophr.
Quercus

Phillyrea.

Phillyrea.

Phillyrea.

Phillyrea 111.

Phillyrea 111.



Phillyrea 1111.



Phillyrea 111.

Phillyrea 111.

Karst.



lebam, & quo subiecta icon delineata est, & cum
plenisque alijs stirpibus in mea peregrinatione
collectis adseruatur. Ejus autem rami exalbido
cortice teguntur, ut in altera, aliquantulum ru-
goso: folia habet superioribus angustiora, nullis
crenis serrata, ejusdem ut in praecedente colo-
ris, adstringentis gustus: flores oleæ similes pu-
sillos, ex herbaceo candicantes, confertim inter
foliorum exortus nascentes: fructum deinde
rotundum, superiori similem.

QUARTA humanam altitudinem æquat,
ramos tamen minores & frequentiores habet
quàm superiores, nigriore cortice tectos: folia
Oleastræ, angustiora, viridiora, amaritudinis
non expertia: flores etiam exiguos, albicantes,
oleæ similes, simul congestos, & inter foliorum
alas circa ramulos nascentes: quibus succedit
fructus, maturitate niger, baccarum Myrti ma-
gnitudine, officulo duro præditus.

QUINTA, jam descriptæ forma, magnitu-
dine similis, in hoc differens quòd ejus rami te-
nuiore, rariore minisque conferti: frequen-
tiores etiam habet virgas à radice germinantes,
fractu satis contumaces: folia etiam ex aduerso
disposita, paulò longiora & angustiora quàm
Quarta, oleastrinorum modo firma, saturatiùs
virescentia, subacris laporis. Hanc & flore &
fructu carere incolæ mihi affirmabant: sed
utrumque superiori simile proferre non dubito.

Prior frequens est in Lusitaniz incultis circa
Eboram. Altera varijs Lusitaniz locis, in sepi-
bus, sed nusquam copiosior quàm circa Tomar insignem pagum, unde plurimum fructum
in Belgium detuli. Tertia desertis Bæticæ locis: ejus etiam unicam abulsculam in Narbe-
nensi

n-nsi Gallia conspiciebam ad ingressum pagi *Peraul*, vicini Volcarum stagno, secundo à Mompelio mihari. Quarta abundè in Castellà nova Hispaniæ, locis inculcis non procul à Tagostomine distans invenitur, & frequenter Mompeliano agro in sepibus. Quinam nupquam alibi vidi quàm in inculcis Castellæ veteris & Bæticæ.

Omnes autem, præter secundam, cujus fructus amicis à meo reditu communicatus, & à plerisque terræ creditus non est natus, non modò in cultissimis hortis illustrium virorum Dn Caroli à Divo Audomaro, Domini in Dranoutre, Moerkkerke, &c. Dn. Ioannis de Biancion, sed etiam in elegantissimis Nobilium virorum Dn. Ioannis Dils, Ioannis Boifot, Generosæ Dn. Mariz de Brimeut Magnifici viri Contadi Scheti uxoris, Raphaëlis de Coxia pictoris Regij, Georgij van Rye mercatoris Machinienfis, & aliorum quorundam rei herbariæ studio se oblectantium, conspexit aliquando fuerunt. Et posteriora quidem tria genera alias species peperisse videntur: nam quædam breviorè & latiorè folio, alix longiorè & angustiorè, quædà etiam ferratè aliquantulum folio natæ sunt, à matre nonnihil degenerantes.

Phyllyrea Græcis dicta, Latinum nomen non habet: sed græca voce *Phillyrea* dicenda. Prior à quibuldam vernaculo Hispanorum sermone *acecho* dicitur, illius semen *Oxyacanthæ* nomine ad Belgas missum. Altera Lusitanis *adorna*. Tertia, quarta, & quinta indifferenter nomina dabant incolæ, modò *piadera*, modò *ladierna*, nunc *lentiño*, nonnulli etiam *ter-misè* (quod Thymelææ proprium & peculiare est) nuncupantes. Tertium genus *Peraulianis* stagni Volcarum accolis, si bene memini, *alader* dicebatur. Quartum verò meo tempore Mompelianæ academix studiosi, nunc *Oleastrum*, interdum etiam *Halimum* appellabant.

Dioscorides *Phillyrææ* folia commenducata, ad oris ulcera commendat, vel eorum decocto collui oportet: pota verò urinam ac menses ciere dicit.

HALIMVS.

CAP. XXXV.



VNVM Halimi genus Dioscorides tradit. Plinius Naturalis Historiæ lib. xxii. cap. xxii. duo genera recenset, & tertium ex Cræteva addit.

Halimolysium ergo Dioscoridis, quem & maiorem & latifolium appellare licet, frutex est omnino candidus, Rhamno similis, ipso etiam candidior, eademq; altitudine assurgens, multis ramis ex una radice proceduntibus, crassissimis, & fragilibus, nullis rigens spinis: folia oleæ, seu potius Rhamni, breviora tamen & latiora, interdum rhomboide figura, alba, carnosa, quodammodò splendentia, sapotis acidici, circa ramos, nullo servato ordine temerè nascuntur: flos oleæ parè, muscosus, purpurascens, tace matum in summis ramis coheret: deinde semen latum Atropiciis, aut portulacæ quam marinam vulgò appellant, copiosum: radix dura est, lignosa, & in multos ramos sparsa. Floret æstate, semen Autumno maturefcit: invenieram Decembri florentem & maturo semine onustum.

Plurimum spontè provenit Vlyssipone vicinisque locis ad Tagum, aut ejus ostia, & æstuarii mari proxima in sepibus mixtum cum Rhamno, aut solus: Hispani item in sepibus. Natus etiam nobis semine quod Vlyssipone attuleram, quem etiamnum apud quosdam rei herbariæ studiosos ali existimo: verum minus albus erat quàm natali loco, & ampliora nactus folia, Atropiciis silvestribus fere magnitudine &

forma, carnosa tamen, & falsæ dinis nonnihil retinentia.

Frustra hunc, verbis Amari Lusitani inductus, Salmanticæ ad eadem D. Virginis, cui cognomen de la *Pera*, fluvio Thormi vicinam, sepe requisivi: sed Rhamnum istuc frequentem, quemadmodum tota illa suburbiorum parte inveni: nisi Atropicem silvestrem, illic ut plerisque alijs locis satis abundè nascentem, pro Halimi frutice fortassis sumpsit.

Halimolysium genus aliud, supra cubitale, aut sesquicubitale non assurgit altitudinem, flagellis potius, quàm ramis, adè infirmis, ut plerumque procumbant & humi fundantur, candidis quidem illis, sed minus superioris ramis: hujus folia oblonga, angusta, pinguia & carnosa, cinerei & albicantis coloris: flos summis flagellis tace matum coherens innascitur,

E 3 herbacei

Halimus II.



Halimus. III.

Halimus.

Halimus
salinis.

herbacei potius quàm purpurascens coloris, deinde semen superiori pene simile, paulò tamen minus. Floret quo superior tempore.

In maritimis regni Valentini nascitur: videre & legere etiam memini in aggeribus illius Insule, quam duo Rhodani cornua faciunt, inter Fanum D. Egidij & Arclaren, cum Mompellio Arclaren & inde Massiliam proficisceret. Altius etiam à nostrantibus in hortis. Alebat etiam Viennæ in suo horro cultissimo Cl. Vir Doctior Ioannes Alcholtzius insignis Medicus, & dum vixit amicus carissimus, ad eò prolifico semine, ut plurimæ illi plantulæ singulis annis sponte nascerentur.

A d. Halimi etiam genera referti potest alia planta non modò in maritimis Mediterraneis maris, sed etiam ad Oceanum sitis, ut in aggeribus Flandriæ, Zelandæ, & Hollandiæ nascens, pedibus ramis, humi procumbentibus, ex cinereo colore purpurascens, folijs priori similibus, punguoribus & magis carnosiss, minus tamen incanis, & ex viridi potius canescentibus: flos etiam extremos ramulos ambit racematus, ex herbaeo purpurascens, deinde semen secundo simile.

Ct. Vir Iacobus Dalechampius (iptum enim magnæ illius Plantarum Historiæ, quæ proximis his annis Lugduni apud Rovilum expressa est auctorem esse iudico) verùm Dioscoridis Halimum Tholose in hortis coluit: sed cum fructum Rubes vulgari similem ei adpingat, dubia mihi est ejus fides. Dioscorides enim nullius fructus in

ejus Historia meminit: nec ipse etiam Plinius. Ego verò primum quem descripsi, legitimum Dioscoridis *ἀλμυρον* esse censeo, & mitius genus Plinii: Lusitani *Salsedera* à salifugine, Hispanenses *marisma*, quòd maritimis celsar, appellant. Alter silvestre genus Plinii videtur, cui tenuiora folia tribuit: illius vulgare nomen mihi ignotum. Tertius vulgò Portulaca marina dicitur.

Omnes autem perpetua sunt fionde, & aliquid adfne cum Attriplice silvestri (cujus varia inveniuntur genera foliorum amplitudine & exilitate inter se differentia) habere videntur, & forè etiam faculrtes non dissimiles.

HALIMI folia Dioscoridi & Plinio, cibi gratia deconquuntur: radix drachmæ pondere in aqua mulsa pota, tormina discunt, ruptaque & convulsa mitigat. Plinius deinde utrumque genus prodesse dynteritis etiam exulceratis cum pane, stomacho veidè ex aceto. Viceribus verulstis illini crudum, & recentium vulnerum imperus lenne, & luxatorum pedum ac vesicæ dolores: sed in eisdem remedijs, effectus majores silvestris effc, & in sananda hominum ac pecorum scabie: semine linguæ subdito firim non sentiti. &c.

Lusitani cetè renellas prioris, arque etiam Rhamni cimas in cibos recipiunt Clariss. ejus Damianus de Goës, idè miqve vir doctissimus Halimi majoris folia cum fursuris decocta, & podagris quæ à calida causa proveniunt, malagmaris modò calida imposta, dolores lenire mihi affirmabat, cum Vlyssipone effem.

Tertij generis ranones & folia Flandriæ, Oceani accolæ, sale condire solent, & in vsum servare, non secus ac Tyrrheni maris maritimis vicini, semiculum marinum.

FRUTEX CORONARIUS.

CAP. XXXV.

Syringa vul.
gana.

VALDE elegans est hic frutex, multis ab radice longis virgis præditus, rectis, cinereo cortice tectis, digitalis aut majoris crassitudinis (quæ tandem brachialis interdum evadit) nodosis & quodammodo genicularis, multam medullam in se continentibus: hæc demum in multos renellos virides ramos spargunt, quos ex intervallis bina semper folia contrario pediculorum exortu nascensia exornant, laurinis majora, oblonga, per extreum mucronata, rugosa, viridia, in ambitu crenata, amari osculi, primum degollantibus, saporis, deinde acris: fiores extre mis ramulis insident, terni, quini, septeni, nonnumquam plures, bini semper inter se oppositi, extremo impare: constant ij quatuor folijs mucionariis, albis, numerosis sibiis pallidis mediam floris cavitatem & umbilicum occupantibus, odor jucundè gravis, qualis in aureorum malorum & citriorum floribus: his succedunt capitula è multis quâ valvulis compacta, superne obtusa, primum viridia, deinde maturitate nigrescens, quibus

quibus dehiscuntibus, oblongiusculum & tenue semen excidit, quod plerumque novellas plantas sequente anno procreat: nascitur etiam avulsione, & stolonibus radices spargentibus mirè se propagat. Floret Iunio, semen Augusto maturum est.

Nusquam sponte nascentem hunc fruticem vidi, sed in Belgicis hortis mihi primum conspectus, nescio unde delatus: postea in Hispanijs unus aut alter, è Belgio haud dubiè missus. Nunc pauci sunt, in Germania, alijsque vicinis regionibus horti, in quibus ob odoris suavitatem & elegantiam non alatur.

Frutex cotonarius.



ῥερος Theophrasti.



A veteribus fuerit cognitus hic frutex, nondum statuere possum: passim verò ab Herbarijs Frutex coronarius, quòd ejus flos odoratus in coronas interdum addatur, & Syringa à virgarum rectarum longitudine & fungosæ interioris medullæ copia, appellatur: Austriacæ matronæ, *Welsche halden* id est. italicæ live peregrinæ sambucum à florum odore vocant.

Sunt qui ῥερος Theophrasti esse censeant. Sed cùm illius ῥερος, quam à nonnullis ῥερος appellari dicit, adò luculenter sit ab ipso descripta Hist. Plant. lib. iii. cap. x. non video quibus rationibus suam opinionem stabilire possint. Nemo enim in te herbaria vel mediocriter versatus est, qui non agnoscat Ostrya live Ostryam, illam esse arborem quæ in omnibus penè Germaniæ, Galliz, Pannoniæ, & multarum aliarum Europæ Provinciarum silvis obvia est, ῥερος live fago, non fraxino, ut vult Plinius, qui lib. xiii. cap. xxi. Natur. Hist. eam describit, corpore & corice similis, folijs sagi sed minoribus, durius, per ambirum ferratis, non splendidibus supernè ut illa, ante hiemem tamen, priusquam defluant, similiter flavescuntibus, extremis ramulis spicam alatarum ligularum, in quibus semen hordeo simile latet, propendentem ferens. Herbarijs quibusdam *Fagulus* dicitur, nescio quo auctore, nisi fortè à sagi similitudine nominis occasione sumperint. Germani *hammels* appellant, Galli *Cherne*, Atrebares mei populares ad græcæ vocem alludentes *Hestre*, è cuius crassioribus virgis crates rexuntur.

Coronarius porò frutex an vllum in medicina usum obineat, nondum intellexi: sed nobiles apud nos matronæ, floribus syndone munda exceptis, & in conclavi ab aère perflato supra mensam stratis, singulisque diebus marcidorum & pridianorum loco recentibus suppositis, chirothecas suavi odore imbueri solebant.

E s t alius quidam frutex à nostris etià Syringa vocatus, superiori dissimilis. Nam quamvis ab eadem radice multas proferat virgas rectas & nodosas, magis tamen fraxini, quàm Syringæ superioris, renellas virgas referre videntur: multis etiam fruticat ramis, circa quos ad singulos nodos bina folia contrario situ nascuntur, latiora quàm in præcedente, & longiore

Frutex coronarius.
Syringa.

ῥερος ῥερος
Theophr.

Plinius compendit.

Syringa coronaria.

Syringa cæruleo flore.

Lilac Mar-
shali.Cauda vul-
pinæ.

Evonymus l. sive latifol.

Evonymus l.
latifolus.

neum quodammodo colorem accedentibus præditi, forma per similes Evonymi vulgaris

floribus:

nixa petiolo, crassiuscula, dura, nigricantia, & ad populi nigre sive hederæ foliotum formam accedentia: summis ramis oblongos veluti racemos fert, æquibus multi flores superiore minores, obsolescentis cærulei coloris dependent, odorati quidem, minus tamen quàm prioris Syringæ: ijs succedit longiusculus fructus, duabus veluti membranaceis valvulis conflans, quo bina oblonga & compressa femina continentur, coloris ex atro rufescentis. Facile pangitur.

Hunc etiam alunt noster hortus, atque plerique Germaniæ, & aliarum Prouinciæ arborum cum superiore, interdum maturius.

LILAC hunc vocat Doctus. Matthiolus, & ex pictura quæ Constantinopoli fuit illi allata, tum ramulis flore & fructu referitis ab Antonio Cortuso sibi missis, qui ex Aphricâ acceperat, sed in eo fallitur quod fructum pilicis similem illi tribuat, nucleo intus conferto & admodum pingui, ex quo oleum exprimitur, quod de Ben appellant: nam hujus fructus multum à Pistacijs differt, ut ex ejus historia liquet.

Bellonius hujus meminisse videtur Observationum lib. III. cap. I. Nam postquam dixit Turcos nullis parcere sumptibus, & summam adhibere diligentiam, in conquirendis exoticis arboribus, quæ elegantibus floribus sint præditæ, addit: Alunt fruticem hederæ folijs perpetuò virentem, violaceis floribus, oblongum pediculum ambientibus, & vulpinæ caudæ crassitudinem æquantibus. quæ de cauda ipsi sua lingua vulpinam caudam appellant.

Verùm nostra Syringa cærulea perpetuam non habet comam, ut ille Caudam vulpinam habere asserit: sed deciduo est folio, ut superior.

EVONYMVS. CAP. XXXVII.

NON minus familiaris est uniuersæ Pannoniæ Evonymus vulgo dictus, quàm reliquis provincijs quas quidem adi: alit tamen etiam quædam alia ejus genera nusquam alibi mihi observata.

VIRGAS habuit primum genus, cum id reperi, cubitales duntaxat, lætas & fractu contumaces, quas ambiebant bina folia ex aduerso semper nascentia, leviter in ambitu serrata, Evonymi vulgaris folijs non ab similia, quod ad formam attinet, sed longè majora, Citræ mah folijs amplitudine non cedentia, viridia, gustus ingrati & amari: radicem digitalis crassitudinem summa tellure in cubitalem longitudinem excurrentem, multisq; flavescens fibris donatam. Nullos tum flores observabam: sed posteaquam in cultissimo horto C. V. Doctoris Ioannis Aicholtzj, Viennensis Medici, vetere amicitia mihi cõjuncti, cui binas stirpes quas erueram, adoleverunt; ad humanâ vel ampliore altitudine post paucos annos excreverunt, ampliora folia nactæ sunt, flores & semen tulērunt. Maio enim mense oblongi tenuesq; inter infima folia pediculi nati sunt, æ quibus aliquot dependebat flosculi, quatuor albicantibus foliis & ad car-

floribus quibus succedit fructus, ut in vulgari quadrangulus, interdum etiam quinque angulis constans, major tamen, & quasi alatus, maturitate dehiscens, & alba grana aurea pulpa inclusa nonnumquam Augusto, sed potissimum in Septembri mense continens. Sub Autumno finem, folia abijcit cum reliquis arboribus quibus perpetua non est coma, & extrema ramulorum cuspidem oblongam gemmam, speciem proximam novo vere germinationis, producit.

Vno dumtaxat loco hunc fruticem observabam anno reparatae salutis humanæ m. d. LXXI. Maio mense in silva illa quæ ex Greben Ill^{re} Dn. Baltharis de Bathyan arce descendens est versus Waraschnum, ea Pannoniæ parte, quæ olim Interamnis appellabatur, nunc autem Slavoniæ nomen obtinet, Germani *Wundschland* vocant, ultra Dravum flumen: & inde bucos illos fructus Viennam adferebam.

Evonymus ir.



BICCVITALIBVS ramis assurgit alterum, aut etiam majoribus, digitali, interdum pollicari crassitudine, lentis & obsequiosis, deo cortice obductis, vindi primum, deinde multis nigricantibus maculis aspero, qui in fummo dividuntur in plures ramulos, ordine & serie quadam inter se oppositos, quos exornant folia similiter ex adverso sita, latifolia Myrti folijs paria, teneriora, leviterque in ambitu crenata, gustu primum exsiccante, deinde amarulculo & calido: è quorum sinu, in oblongis gracilibusque pedunculis, unus, bini, aut ad summum terni flosculi splendentes & purpurascentes dependent, quatuor foliolis constantes, umbilico quadrato, & lucis staminibus quatuor angulos occupantibus, Cogygiaz flori non multum absimiles, majores tamen: fructus succedit in quadrangulis filiquis vulgaris Evonymi similibus, spongiosus, aurei coloris, ijs dehiscenibus tenui filo propendens, in quo grana extrema parte nigra & splendens, Fraxine lxx granorum instar, bina interdum & terna eodem loculo & pulpa comprehensa.

Copiosè nascitur in silvis utriusque Pannoniæ montibus: sed qui Alpes attingunt, id alere desinunt. Invenitur & in Moravia: nusquam verò abundantius, quam in silva arcis Greytzenstein Ill. Comitibus Nicolai de Salmis vicinia, secundum Viennam Austriæ miliari, ad legem Danubij ripam. Floret Maio: fructus Augusto plerumque maturefcit, maturius quàm vulgaris, & primum genus hic descriptum.

Evonymus Græcorum, Evonymus Latinorum censetur potiori doctorum virorum parti is frutex qui apud Herbariorum vulgus tale nomen obtinuit, tamen si quidam aliter sentiant, & *terrapinon* (Gaza quadratoriam vertit) cujus solum nomen apud Theophrastum lib. 11. Hist. Plant. cap. vi. inter fero germinantes invenitur, esse voluit: ejus autem *terrapinon*, aliam quandam stirpem quam infra suo loco describam.

PORRO vulgarem Evonymum à capris maximè appeti, & ejus folijs avidè sine noxa vesci, dum in Pannonia esset didici, eamque ob causam, ab Ungaris *kecherego fa*, id est, à capris rosa arbor dicitur: licet id Theophrasti opinioni repugnet, qui Evonymi folia, capris præcipuè mortifera esse scribit. Germanis autem *Spyndelbaum* dicitur, Gallis *Fusain*, & *beau à faire larderes*.

PERICLYMENVM.

CAP. XXXVIII.

VULGARIS Periclymeni, duo genera sunt cognita, utrumque vicinis fruticibus plerumque se circumvolvitur: sed illud quod in Septentrionalibus Regionibus nascitur, extremis tantum multis flores odoratos admodum, & rubrum fructu in unum caput coactum profert, alterum in calidioribus regionibus veluti Italia, Hispania, Narbonensi Galia crescit, latioribus folijs & binis aut ternis acetabulis extremos ramulos ambiens, in quorum singulis feni plerumque flores exoritur præciores & minus odorati quàm in priore, quibus succedunt bacce ferè puniceæ. Vtrumque genus Belgicis & Germanicis hortis valde familiare, pergulas interdum vestit. Neutrum spontè nascitur, quod sciam (certè non observavi) in Ungaria, Austria, Bohemia: Matronæ Austriacæ Rosin vos Jenseo appellant.

At IVDO porro genus est, quod nullo adminiculo egens, per se consistit. Istius plura genera observabam. Nam præter primum, cujus cum luculenta descriptio extet Petraprad. 111. lib. 111.

Evonymus

Natalis

Evonymus

Terapinon

Evonymus

vulgaris.

Periclymen

das genus.

Strandi ge

u. n.

Periclymen, et

lib. 111. cap. xx. 1111. Historiz stirpium Clariss. Viti Remberti Dodonzi Cæsarei Medici, hic repetendum esse non duxi: Leclorem tamen admonitum volui, inæquales baccas non ferre, quemadmodum nonnulli existimant, sed geminas semper, easque perpetuò fetè æqualis magnitudinis, cum in Pannonia, Austria, Moravia, Bohemia, ubi plurimum, tum in Allobrogum, Helvetiorumque alpebus, & alijs locis in quibus spontè crescit. In Belgicis autem hortis cultum, vix unquam æquales ad maturitatem perducere deprehensum est, at cum altera excresecat & turgida fiat, una semper exilis, plena tamen remanet, lagenulamque gestatoriam, aut cucurbitulam refertè quodammodo videtur.

Periclymenum rectum 11.

Periclymenum rectum 111.



ALTERNVM humilius est, humanamque altitudinem rarissimè attingit: multò graciliores & rariiores habet ramos albicante cortice rectos: folia priore tenetiora, longiora, in ambitu nonnihil serrata, superne virentia, inferne minus incana quam primi: tenellis germinibus nascuntur inter folia graciles pediculi, unum interdum, sed binos ut plurimum flores sustinentes, superiore minores & teneriores, non pallescentes ut illi, sed purpurascens, quibus succedunt gemelli fructus æquè magni ac in priore, etiam æquales, nigri tamen, non rubri, succulenti, gustu ingrato. Radix dura est & lignosa.

Hujus unum fruticem in Pyrenæis montibus, binos aut ternos apud Allobroges, deinde frequentiores varijs montibus Austriæ & Scitiz, inveniebam.

TERTIUM ejusdem cum secundo altitudinis, crassiusculo est stipite, multos in ramos diviso, nigricante cortice obductos, qui scaber est, & plerumque multis locis hiat: interdum statim à radice in multos ramos sese dividit: tenelli ramuli purpurascunt, & incana lanugine pubescunt: folia contrario situ inter se disposita, ut in reliquis Periclymeni generibus, illi quod rubras baccas fert non dissimilia, exsiccant & amariusculi gustus: flos non fuerat mihi conspectus cum hujus historiam primùm evulgarem, quandoquidem sub finem Julij solummodo observatus frutex suo maturo fructu onustus: at aliquot deinde annis elapsis, se mine naræ stirpes, tertio à fato anno, flores è tenellorum ramotum alis pediculis inhaerentes, protulerunt geminos, rudimento fructus, ut ceterorum, innixos, pusillos, pallescentes, cavos & in quinque lacinias divisos, ut reliquorum Periclymeni surrecti generum flores, è quorum umbilico prodeunt quinque staminula flava appendice insignita, fructus singularibus baccais, utrimque inter folia brevi pediculo dependentibus, consistit, Chamæpysilo Gesneri magnitudine æqualibus, sed longioribus paulò, coloris cærulei, quæ vinofo & acidiusculo succo plenz, manus rubro colore inficiunt, & multa plana grana continent. Radix lignosa latè diffunditur, & multis fibris prædita est.

Crescit spontè ad radices ejusdem montis pægo Malitz vocato contigui, ad sinistram, via quæ

quæ ad Taurum, superioris Scitizæ Saltzpurgensæ Ditionem pettingensæ præcellum montem, ducit. nunc autem semine natum in quibusdam hortis alitur. Incolæ fructum diligenter colligunt, & in tinctorium usum reponunt.

Periclymeni 1111. & 1112. flores.

Periclymen. rectum 1111. cum fructu.



QUARTVM genus humilius est, rard cubitalem superans amplitudinem, tamis secundo crassioribus, candidioribus, lentis & fractu contumacibus: folia illi omnino maxima, Laut. *Periclymen. rectum. 1111.* rinis non minora, pet extremum mucronata, superne virentia, inferne candidiora, nulla tamen lanugine pubescentia, neque in ambitu serrata, duriora etiam quam superiorum: flores in longo crassiusculoq; petiolo gemelli, secundo forma similes, nunc ex purpura candicantes, modo purpurei: fructus plerumque unicus, rard geminus, tamen si gemino flori succedat, omnium crassissimus, exigui cerasi magnitudine, rubet, succulentus, transparent, duplici in summo, ubi flores inhaerunt, stigmate notatus, sed unicum granum continens.

Frequens est in montibus Pyrenæis & Allobrogicis, sed omnium abundantissimum in Pannonicis, Austriacis, & Stiriacis, præsertim supra monasterium Neuberg, vbi, & in reliquis vicinis Alpibus plurimæ stirpes elegantissimæ proveniunt.

Florent omnia surrecti Periclymeni genera Aprilis & Maio, fructus Iulio & Augusto plerumque perficiunt.

Primum genus *hundo* *Hirsch* & *Benholz* à quibusdam appellatur vulgo, quidam Xylostei nomine, postremam Germanicam vocem exprimentes donarunt. Austriacarum & Stiriacarum Alpium incolæ tria priora genera *hundo* *her* vocant. Quarti nullum vulgare nomen didici. Verum mihi non probatur eorum sententia, qui hoc genus Plinianam Chamæcerasum esse existimant cum ejus fructus nulla saporis gratia commendetur, nullamque habeat tota stirps cum Ceraso affinitatem. Sed magis verisimile judico, ipsius Chamæcerasum non esse diversam ab ea quæ plurimis Pannoniæ, & vicinatum quarundam Provinciarum locis sponte provenit, cujus historia paulo post sequetur. nec mihi satisfaciant qui Ficum Idæam, cujus Theophr. lib. 111. Plant. Hist. cap. xvii. meminit, esse volunt: nam hæc planta nullam, mea opinione, notam habet cum ipsius, nec cum Pliniana sicu Idæa convenientem.

Ad Periclymeni etiã genera proculdubio referenda est hæc elegans planta, cujus iconẽ cum descriptione liberaliter pro mutua quæ inrer nos erat amicitia comunicabat C. V. Thomas Pennæus Londinensis medicus, cum alijs aliquot elegantissimis stirpibus, de quibus suo loco.

CAVITVLIS verò dodrantalibus est, quibus quatuor, sex, rarius octo adherent folia ex adverso per intervalla sita, Phillyrææ Narbonensæ, sive medizæ, folijs similia, sed paulo majora, magisque nervosa, in mucronem desinentia, quinque costis ab ipso pediculo ad mucronem excurrentibus. E supremorum foliorum cavis duo veluti ramuli exeunt binis folijs co-

dem

Chamæpericlymenum.

Chamaepiclymenum.

*Aliud Cha-
maepicly-
menum com-
mune.*

Nomen.



Chamaepiclymenum Gesneri.

*Chamae-
pili hylaria.*



dem modo quo in caule dispositis praediti, qui cacumine quaterna alia folia gestant. Ex istorum ramulorum medio, pediculus nudus & sine folijs exit, in cuius summo tubae bacce (flores non fuere observati) racematim cohaerentes nascuntur, Prutenis rusticis circa Gedanum vulgò Danticum appellatum expetite atque etiam in Norwegia & Suecia, ubi in maritimis copiose nascitur, tenui radice se propagans, & vicina loca occupans, hinc inde fibras spargit.

Qui ad me mittebat, Chamaepiclymeni nomen, nec immeritò indidit.

CONSIDERANDVM porro an eadem non sit (certè persimilis) cuius brevem histociam mihi communicabat, & plantulas aliquot siccas relinquerebar doctissimus vir D. Henricus Hoierus Medicus Anno M. D. xcvi.

TERTIVM, inquit, locum assignamus herbulae [inter bacciferas videlicet stirpes ab ipso in Norwegia observatas] quae folijs Hypericon humile mentitur: florem unicum profert, nigellae flori quodammodo similem, ex quo baccae per maturitatem rubentes, non secus ac vaccinia rubra, ejusdem quoque magnitudinis protendent, intus albæ, succulentæ, sapore admodum dulci: quæ manducatae, scabiem pruritumque generare vulgò creduntur, atque hinc illi nomen inditum *Chamaepiclymenum*.

Plantulae autè quas mihi siccas relinquerebat valdè tenellae erant, ex quibus observabam (quod Hoierus breviter studens praetermiserat) singulis furculis sive cauliculis fena plerumque, interdum octona inhaerere folia, ex adverso, sive contrario situ semper nascentia, in imis cauliculis minora, in extimis ampliora, Ascyri folijs valdè similia, è quorum limbo ad latus pediculi florem sustententis, aliquando unicus, ut plurimum bini, utrinque scilicet unus, exsurgunt ramuli binis aut quaternis folijs simili serie dispositis praediti: florem porro summis cauliculis nitentem, quatuor folijs candicantibus constantem, in cuius medio multarum baccularum suis petiolis inhaerentium rudimenta nigricantia, quæ magnam gratiam flori addere debent.

CHAMÆMESPILOS GESNERI.

CAP. XXXII.

FREQUENS est hic frutex in omnibus non modo Alpibus, sed montibus etiam quibusdam Viennæ Austriæ vicinis, bicubitalibus, vel cubitalibus, interdum etiam longè brevioribus virgultis, pro locorum, in quibus crescit, natura, lentis, nigro cortice tectis, sic tamen ut tenelli rami canescant: folia alterius generis Idæae viris folijs haud multum dissimilia sunt, magis tamen ad cotoneæ mali foliorum similitudinem accedunt, minora tamen, crassiora, superne virentia, inferne cana lanugine pubescentia, alternatim in virgultis nascentia. Ineunte Vere è singulorum foliorum alis flosculos profert herbacei coloris, concavos, ternos aut quaternos, in uvam quasi congestos, qui deinde in fructum exruberant rotundum, magnitudine baccarum myrti,

myrti, aut potius Spinæ appendicis, five vulgaræ oxyacanthæ, colore foris initio subflavescente, deinde rubro, carne intus pallida, fungosa, oxyacanthæ iam dictæ ferè sapore, quina officula five semina continente. Augusto maturus est.

GESNERO Chamæmepilum appellare placuit: quem alij recentiores sequuti sunt. In Epistolis satis apertè docet à Coronastro ipsius (ne quis eandem stirpem existimet) differre, cuius maiora folia, baccas non adeò rubras, nec adeò rotundas tribuit. Sunt qui Dioscoridis ἐπιμυλῖδα, & Theophrasti mēpilum ἀνδροειδὲς esse censent. Epimelis sanè Dioscoridis, quam & σταῖνος appellari ait, vulgaris nostra mēpilus est. Anthenoides verò Theophrasti (quam Gaza Gallicè appellatione expressit) qualis sit, non facile iudicari posse arbitror. Mihi porro videtur hic frutex plurimas notas habere communes cum *κασσιόφυ* live arbuto Dioscoridis, quæ à Theophrasti Arbuto differt, ut cap. de Arbuto adnotavi. Anguillæræ autem videtur Dioscoridis κάμαρος esse Andrachne, quam Theophrastus Plant. Hist. lib. 111. cap. XVI. Arbuto subjungit, illi quæ similem facit folio & fructu.

Epimelis.
Antheoides.

Kassio-
phy.
Diosc.
Andrachne
Theophr.

VITIS IDÆA.

CAP. XL.



IDÆA Vitis nomen diversis stirpibus tribui video à Rei Herbariæ petitis: sed maxima pars Myrtillum germanicorū officinarum, hæc appellatione Theophrastum intelligere, vult. Sunt qui alium fruticem ab eo describi arbitrantur. Nos utriusque generis stirpes hoc capitè describemus, à priore initium faciētes, quod plurimum opinione id nomen sibi vindicare debet: cuiusque species (præter vulgarem nigris baccis, aliam buxæis nec deciduis folijs, baccis quæ rubris, & terram palustribus nascentem) duas ab alijs minimè descriptas observasse puto.

Vitis Idæa.
myrtillum.

PRIOR flexibilis est ramis & humi diffusis, gracilibusque, multis gemminibus vix è musco (quorami occultantur) prominentibus, in quibus nullo ordine digesta sunt folia, prioris Ledi alpini folijs penè similia, paulò tamen longiora, angustiora, teneriora, minutè quæ crassa, admodum venosa, superne virentia, inferne dilutiora, leviter per oras crenata, & mollibus quibusdam vilis hirsuta, longo pediculo inhærentia, gustus valde adstringētis: in fummis gemminibus præcedentis anni, baccas fert (florem non observavi) rotundas, ceterasij nonnumquam magnitudine, oblongas & tenuibus pediculis dependentes, coloris initio viridis, deinde rubri, postremò nigri, succulætas, non ingrati saporis, nulla officula continentes, sed plana dumtaxat semina, alba, numero ut plurimum quinque: radix lignosa quibusdam fibris donata est, & rami per terram sparsi similes fibras nonnumquā agunt.

Vitis Idæa 1.

Maturis & immaturis baccis onustum hunc fruticem, juxta Ericam bacciferam alteram nascentem, in unius *Enicæ* jugi supra *Neuberg* scopulis mense Augusto etuebam.

VITIS IDÆA est vulgari Altrera, quæ ramos etiam habet humi interdum diffusos, teretes, lentos, nonnumquam verò firmos & erectos, cortice modò cinereo, modò rubescente tectos, in multas alas divisos, & in his folia, illi quæ rubro est fructu forma similia, sed teneriora, venosa, subtus exalbida, gustus adstringētis & nonnihil acidus: flos vulgari similis, ex eandem purpurascens, concavus. Labris in quinque crenas divisis, & exteriori reflexis, suis intus flammulis: fructus vulgari similis, maturitate niger, saporis quæ gratia non minus quam vulgaris officinarum myrtillus commendabilis. plurima granula in se continens: radix est dura, lignosa, multis fibris capillata: sarmenta, five tami procumbentes, subinde radices agunt.


Vitis Idæa 2.

Invenitur in *Weyssbach* jugo duobus supra *Neuberg* germanicus miliaribus: postea etiam observabam in descensu *Stem* albi supra *Weyssbach* multo fructu onustam, atque in *Etz* herio Aultrix monte supra *Gamingam*. Anno deinde M. D. LXXIX. reperi in silva Noribergensi urbi proxima, ad *Latomias*, ubi & vulgares nigris & rubris baccis maxima copia nascuntur sub *Pinalis*, *Piceis* & *Abietibus*, duce & comite C. V. Ioachimo I. F. Camerario. In *Silesiæ* verò montibus etiam provenire audio.

FORMA & amplitudine hæc à superioribus differt: etenim multis stolonibus statim à radice fructicat, ternos, quaternos, & quinos interdum cubitos alris, crassis, valde ramosis, nigricante cortice obductis magna ex parte: primo vere folia ex gemmis in ramulorum lateribus nascentibus

Vitis Idæa.
111.

F nascentibus



nascensibus promit subtrus omnino incana, & multo tomento obfita, superne autem viridia, è quorum medio veluti corymbacea florum quinis foliis candidis constantium coma emergit, sine odore: folia deinde paulatim sese explicant, tomentofamque illam lanuginem abijciunt, & in ambitu serrata conspiciuntur: fructus floribus succedit, rotundus, niger, umbilico quinque alis aut lacinijis septo, spinæ appendicis fructu major, succulentus, subdulci melleoque sapore, quali ferè Ceratia seu Silique, continens dena aut plura grana oblongiuscula, plana, subnigra.

Abundantissime nascitur montibus Viennæ Austriæ vicinis, veluti ad Brunnam, Medeling, Cumpoltkirche, Baden, Fische, atque etiam ad radices Styriacarum alpium. Floret, ut dixi, incuntes Vere, fructus Augusto maturus est.

Nomen.

A n priorem rectè in hanc classem retulerim, alijs judicandum relinquo: nec enim mihi ipsi in illius nomenclaturâ satisfacio. Ledi alpini generibus adscribi posset, nisi bacce quibus prædita est, & aliz quædam notæ refragarentur. Vulgare nomen non intellexi. Simlerus verò ad Commentarij de Alpibus caldem ejus meminisse videtur, & *Cerato-stuben* appellare: nam parum à Rosæ montanæ frutice differre asserit. Hujus sanè folia satis ad illam accedunt.

Altera ab Austriacarum & Styriacarum alpium Venatoribus *Jegenber* nuncupatur, libenter enim ejus baccis victitant, ut ipsi mihi retulerunt: unde nomen inditum. In Silesia vocatur *Kauffel* quemadmodum & ea quæ tubo fructu prædita est, & palustris: similem etiam apud illos usum obtinent, qualem Ledon alpinum Infestioribus alpinis præstat.

Tertiam Itali Vitem Idzæam Theophrasti, ejus meminit lib. iii. cap. xvii. Hist. Plantar. esse censent. Austriaci rustici montani *Silzgenber* vocant, vel quod muscæ ejus fructum ob dulcedinem appetant, aut quia neglecta ab avibus, muscisque in pabulum cedunt. Pena & Lobelius *Amelanchier* nomine describere videntur in doctissimis Adversarijs. Iosias verò Simlerus *Sisibidus* hoc est, pyrum petræam, loco supra memorato (ni fallor) appellat. Gesnerus in Epistolis vacia (si modo hanc intelligit) tribuit nomina, Myrtomalidis, Petromelidis, Pyri cervinæ, Pyrastri idzæ. Dalechampius Epimechdem alteram vocat, & rubrum fructum tribuit, Cotonastrum Gesneri esse censens: deinde alio loco Amelanchiet illi *αμαλνχιδ* seu *αμαλνχιδ* Athenæi lib. xiiii. est.

Pyrum petræam.
Myrtomalidis.
Petromelidis.
Pyri cervinæ.
Pyrastri idzæ.
Cotonastrum.
Amelanchier.
αμαλνχιδ.
αμαλνχιδ.
Cerato-stuben.
Cydonagium.
Diospyros.

COTONASTRUM portò, quem Gesnerus Cydonaginem, Dyospiron & *Wibbatten* in Epistolis appellat à superiore omnino distinguere videntur, cum illius baccas tutilas esse ait, siccas, carne & succo nullas, seminibus intus quaternis triangulis.

Eum

Coronaflet fortè Gefneri.



*Agriomela
spania
dion.*

VVA VRSL. CAP. XL.

FRUTICAT pedalis ferè ramulis, flexi-
bilibus & lentis, humi diffusis, rubescen-
te cortice testis, ut teneriores Arbuti ramuli: fo-
lia illi frequentia, nullo ordine ramis adhe-
rentia, Arbuti folijs minora, carnosa, Chamæ-
lex Italice foliorum planè amula, minimè ta-
men hirsuta, cum adstrictione amaricàtia: ex-
tremis ramulis flores proferit ex candido pur-
purascens, sive candidos, quibus leuiter pur-
purascens color admixtus sit, cava, Arbuti flo-
ribus similes, & uvæ modo simul congestos:
fructum (quem non vidi) incolæ rubentem,
rotundum, exigui cerasi instar, acidum refere-
bant: radix parva sed lignosa. Perpetua fronde
viret.

*Vva Vrb
Galen.*

Vva VRSL.



Vnico loco nascentem conspexi arido solo
& aprico, via regia, in colle imminet cuidam
viculo *Ventatibabul* vocato, inter Guadix &
Baza, regno Granatensi, iam florentem Mar-
tio anni M. D. LXXV. senis tamen plerumque
florere, fructum æstate maturescere, & in
planta ad hiemem usque perdurare ipsi inco-
læ affirmabant.

PERITIORES quidam Hispani quibus eam
ostendebam, Chamædaphnen esse existona-
bant, crassitudine foliorum pmeul dubio de-
cepti. Mihi verò ad amussim quadrare vide-
tur *apocynum* quam Galenus lib. VII. cap.
VIII. De Compos. Medic. *κατὰ τὸν οὐχὶς*
verbis describit.

*apocynum
Lam.*

Vva VRSL in Ponto nascitur, planta humilis
& fruticosa, folio Memæcyli, fructum ferens
rubrum, rotundum, gustu austerrum.

Nam quod nonnulli Vvam utri Galeni à
Theophrasti Vite idæa differre nō putant, fal-
luntur illi meo iudicio: quandoquidem Vitis
idæa nihil aliud esse videatur quàm ea planta
cujus superiore capite aliquot genera descri-
psi. Et hæc à Vitis idæa illo genere pumilo
quod buxeis folijs semper viret & rubris bac-
cis prædicum est, multis notis differt, hæc non-

*Vva vrb diff
ferit à Vite
idæa.*

F 2 nulli

nulli qui buius iconem à me in Hispanicis observationibus ante exhibitam ab illius icone discernere non noverunt, ita sensisse videantur. Magis adhuc falluntur qui hanc meam cum Alpigena & Chamærhododendro Lobelij confundunt: nam si vtriusque historiam & iconem diligenter contulissent, plurimum inter se discrepare animadvertissent.

Alpigena.

Pyracantha.

Oxyacantha.

Non defunt qui Vvam urfi faciant spinam illam perpetuò virentem Oxyacanthæ vulgaris floribus & fructu persimilem, quæ in Belgicis hortis Pyracanthæ nomine ali folèbat. Eam Aogulara, & re è quidem meo iudicio, Oxyacantham legitimam esse censet: nam Theophrastus lib. i. Hist. Plant. cap. xv. & lib. iii. cap. iiii. perpetuam comam Oxyacanthæ tribuit. Dioscorides Pyrastrî folio esse ait. cumque in super baccas habeat myrti, plenas, rubras, fragiles, &c. aptissimè Oxyacantham referre mihi videtur.

CHAMÆCERASVS.

CAP. XLII.

Periclymenium
rubell. Lili.
non est Chamæ-
cerasus.

Chamæcerasus
indica.



Supra dixi, eorum sententiam mihi non sprobari, qui quantum Periclymeni surrecti genus Plinianæ Chamæcerasum esse existimant, & meas rationes sic attuli. Plinius quidem Nat. Hist. lib. xv. cap. xxv. enumeratis aliquot Cerasi generibus, addit: Sunt & Macedonica parvæ arboris, raroque tria cubita excedentis: & minore etiamnum frutice Chamæcerasi. Neutram autem harum, fruticem illum qui inter Periclymeni genera descriptus est, dici posse censeo: sed eos quos nunc describam.

Variae altitudinis invenitur Chamæcerasi frutex: nam interdum in cubitalem, bicubitalem, aut ampliorem magnitudinem atrolitur, umbrosis videlicet locis & tenui solo: siccioribus autem locis, & juxta semitas plerumque supra pedalem altitudinem non assurgit. Tenuis autem & lentos habet ramulos seu virgas nigricante ex cinereo cortice obductas, quæ ex intervallis quædam tubercula, & velut gemmas proferunt, unde quoque ex cachrye, aliquot exigua foliola, Myrti Tareninæ folijs æqualia prodeunt, simulque flores bini, terni, quaterni aut plures sese explicant, candidi, quinque foliolis constantes, multis in medio staminibus præditi, Cerasi vulgaris floribus persimiles, minores tamen: infra hos flores, atque etiam in extremis virgis, ex alijs tuberculis exeunt sine floribus folia superioribus majora, Cerasi vulgaris acerbo fructu foliorum formam imitantia, & in ambitu similiter ctenata, longè tamen minora, & atra viriditate splendètia, subamari gustus: floribus succedit exiguus fructus, rotundus, carnosus, maturitate ruber, exsiccantis minuscule grati saporis, quàm sint acida cerasa, osseo intus nucleo: radix crassa, longa, dura, paucis fibris prædita, profundum petens, & quæ difficulter erui possit.

Natalis.

Crescit passim in Pannonia, Austria inferiore & Moravia, editoribus siccisque locis, ad vinetorum etiam in collibus sitorum margines, & juxta publicas vias. In Bohemia videre non memini. Floret Aprili cum primùm folia germinare incipiunt: fructu Junio, interdum etiam Julio duntaxat maturus est.

Nomen.

Græcis *χαμαίκερας* dicitur, Latinis Chamæcerasus, Germanis *Austriaci Erbt weind* Vngaris *Pád-meg*, id est, silvestris merasus (merasum enim vocant illam seriis maturefcentem Cerasum austero fructu nigro) Gallis, apud quos sponte non nascitur, *Cerisier nain* nuncupari potest.

Cerasus Ma-
cedonica.

Ceterum Macedonica Cerasus per Pannonias & Austriam in agrorum & vinearum marginibus frequentissima est, raro ad trium cubitorum altitudinem accedens, nihil in reliquis à vulgari, quæ acerbum & rubrum fert fructum differens: nam flores, fructum, folia similia habet.

Mahaleb.

Invenitur porro in Austria & Pannonia alij frutices qui cum Ceraso aliquam affinitatem habent, & à nonnullis inter ejus genera referuntur: quemadmodum qui à plebique Mahaleb vocatur, odorato flore, in scopulis & saxosis Pannoniæ locis nascens, & collum urbi Viennensi vicinorum radicibus, à rusticis Austriacis eam ob causam & *Mahaleb* hoc

hoc est petrosa Cerasus appellatur. Hunc etiam plerique Narbonensis Provincie & Allobrogum locis non procul à Rhodano sinis observare memini. Sunt qui Vaccinium Plinij, & Lacatha, cuius nudum nomen apud Theophrastum Plant. Hist. lib. III. cap. XIII. & VII. ex-
tar, esse censent. Plinius tamen Nat. Hist. lib. XVI. cap. XXVIII. Vaccinia aëquos solummodo nasci tradit; tingendi causa ad servitiorum vestes: in quem fanè usum neminem hunc fruticem aut ejus baccas usurpare intellexi; at palustris illa Vitis idæa, cum ea quæ nigris & rubris baccis, est rinditur apta, quemadmodum paulò antè annotabam.

Cerasus item avium, aut Cerasus racemosa vulgò herbariorum nuncupata, in silvis frequens, Germani *Elmen* & *Elmen* dicunt, Ungari *Zelnic* sa. Belgicæ officinæ, antè quàm res herbaria adeò excolta esset, pro Vitice habuerunt. Sunt qui Padum Theophrasto lib. Hist. Plant. III. cap. I. esse censent. Sed cùm Theophrastus eo loco Padum duntaxat reulerit inret arbores um brosis gaudentes, nulla addita descriptione: quâ ratione suam opinionem stabiliant, non video.

MYRTVS.

CAP. XLIII.

C A T O tria Myrti genera tradit, nigram, albam, & conjugulam. Plinius lib. XV. cap. XXIX. Naturalis Hist. suo tempore aliter distincta fuisse Myrti genera refert, videlicet in sativam atque silvestrem, & in utroque genere lanifoliam inveniri. Sativarum genera topiaros deinde facere, Tarentinam folio minuto, Romanam parulo, Exoticam densissimo, feniliorum versibus: eam verò non esse in usu: ramofam utramque aliam, Conjugulam se existimare, quæ suo tempore Romana nuncuparetur.

Ego verò in Hispanica mea peregrinatione, & alijs quæ adjacis locis, multo plura genera observare memini: nec dubito quin ex sanione major adhuc varietas oriri possit.

Myrtus Bætica latifolia, domestica.



V N U M, satis crassis ramis, folijs duplici serie rariùs dispositis, magnis, ut interdum ad Lauri tenuifoliz aut Arbuti foliorum amplitudinem ferè accedant, dilutius paulò virentis coloris, odoratis: rariùs hoc floret aut fructum fert, quia tendens sepius, quas còdere solent, eo pleròque utantur.

Nusquam id genus vidi, nisi in monasterio quodam Hispali, & in latissimis Mauritiorum Granatæ viridarijs, in quibus, picinis & lacus claudabant sepes illo Myrti genere confantes, & ex alio quodam non multum huic dissimili, minoribus tamen, & paulò densioribus folijs, cujus nos hic picturam damus.

S E C U N D U M genus altius fruticat, & à radice plurimos densos, crassos, firmosque ramos promittit: folia superioris secundæ speciei similia habet, sed ad eò confertim nascentia, uspenè muruo sese contingant petioli, duplici interdum serie, sæpiùs triplici, valde odorata: flos ejus candidus quinquè folijs constat, cerasiorum floribus ferè similis, albis villis plenus, odoratus: cui succedit paulò oblongior fructus quàm in Tarentina, initio viridis, deinde cùm maturare incipit, purpurascens, tandem plenam maturitatem adeptus, niger, vinosus, grati saporis, candida incurvaque grana in se continens.

Hoc genus in Complutensis arcis horto primum mihi conspectum, multis ejus fruticibus serie quadam & ordine dispositis, elegantissimo spectaculo, cùm semper vireat: deinde Cordubæ in quibusdam hortis.

T E R T I I generis unicam arborem vidisse memini in Hieronymitarum monasterio, primo ab vrbe Cordubæ militari, eadem foliorum densitate & serie quâ secundum genus, verum minore folio & saturatius virente: fructu etiam majore & magis orbiculari, qui reliquorum Myrti generum fructus instar, alba & inflexa grana habet, minora tamen quàm superiora.

Q U A R T U M genus non adeò densè fruticat, neque multum affurgit, tenuibus & fragilibus ramis, folijs ejusdem cum tertio magnitudinis, similiter mucronatis, duplici serie rariùs

*Myrtus Bætica angustifolia.**Myrtus Bætica filvestris.*

circa ramos nascentibus, nigricantibus, odoratis: flos alijis similis est: fructus rotundus, oblongo-pediculis ex foliorum alis prodeuntibus inhaerens, copiosus, ininiò viridis, deinde candicans, maturitate niger, vinosus, graui admodum cum quadam adstrictione saporis.

Natalis.

Sponte provenit plenique agris & collibus Extremaduræ (quæ Bæticæ pars est ad Anam flumen sita) & Lusitaniz illi contemina, adeo copiosè, ut per aliquot miliaria, nulli ferè alij fructibus conspiciantur. Octobri interdum florentem, sed maxima ex parte fructu onustam hanc Myrtum colligebam, cum Madritio Vlyssipponem proficiscerer, locis incultis & procul à mari, procul à humilibus distitis, nunc lætioribus, viridioribusq; & amplioribus folijs, nunc planè exsuccis, & ferè rigentibus palléscentibusq; pro locorum natura & situ: nam in convallibus nata, multò lætior & viridior semper erat.

*Myrtus de-
mestica fru-
ditu alba.*

1. **QVINTVM** genus satis altè fruticas tenellorum & rubentium ramorum frequentia densum, folijs omnium minimis, angustioribus, & magis mucronatis quàm in ulla Myrto, saturarius virentibus, fragrantis odoris: flos par reliquis, tum etiam fructus, qui initio quidem viret, maturitate aurem non nigrescit ut reliquorum, sed exalbidus manet.

2. Hujus generis invenitur alia species ejusdem cum superiore formæ, sed pet omniatèrior, exiliore & angustiore folio.

Primum mihi utraq; hæc Myrtus conspecta est in hortulo illustris viri Dn. Ferdinandi Cortinho Lusitani, peregrinarum & exoricarum rerum studiosissimi, & multis longinquis peregrinationibus elari: ejus hortuli sepes ex hoc Myrti genere constabant. Istæ Musam nascentem, & aliquot alias peregrinas stirpes vidi. Est verdè hortus in editiore urbis parte extra mœnia, apud quem veteres aliquot inscriptiones marmoribus insculptas videre licet.

Conspiciuntur omnia ista Myrti genera (præter primæ speciem priorem) apud C.V. Dn. Joannem Boisor doctissimum & rei herbariæ studiosissimum, qui omnium primus ex seminibus à me communicatis aluit: deinde apud plerosque alios quibus communicavi: rami enim in terram pacti radices agunt, sed quinquum genus omnium facillimè comprehendit.

*Myrti clas-
sificata.*

Nunc verdè apud eundem, & apud illustres viros Joannem de Brancion, & Joannem Dilsom ipsius agnatum, nobilesq; Marronas, Mariam de Brimeur Contadi Schetti, Margaretan de Clermes Præditi Namurcensis, uxores, aliotsq; quamplurimos in Belgio rei herbariæ studio sese oblectantes, alcantur & alia Myrti genera ab his quæ descripti diversæ: quorum nonnulla latiore erant folio, quædam mediocri, alia minore.

1. LATIFO-

Myrtus domestica fructu albo.



1. LATIFOLIAE quædam amplo est folio, *Myrtus latifolia*, quod tamen primæ classis Latifolæ primæ magnitudinem non æquat, viridi, rariore ordine, & eo duplici circa ramos disposito.

2. Alia paulò minor est, interdum vegetiore viridioræque folio, quandoque pallidiore, & tristiore.

3. Tertia denfior est folio, & magis mucronata, eodemque nunc vegetiore & latiore, nunc etiam pallidiore.

Quæ medio est folio, non mulrum abfimilis est quarto generi à me in superiore classe descripto, sed minùs nigricantibus & quodammodo pallescentibus virgultis, longiore etiam fructu.

Minore quæ est folio, omnium frequentissima in Septentrionalium regionum hortis fuit, ante quàm minor illa prioris Classis nota esset. Ejus cùm ramuli facilius radices agant, si pingui solo pangantur, quàm hujus, etiam satis vulgaris facta est multis Germaniæ hortis. Habet verò minor hæc conferta admodum folia, duobus ut plurimum versibus in ramulis disposita, nonnumquam ternis: quemadmodum in alijs generibus aliquando etiam accidit.

Florent plerumque istic Autumno, fructus rarissimè ad maturitatè pervenit, sed in ipsa planta tota hieme hærens, cùm rursus sub Veris finem aëri exponitur, inanis & immaturus decedit.

Dicitur autem Græcis hic frutex *μύρτη*, *Myrtus*. Latine *Myrtus*, Gallis *Myrte* & *Myrte*, Hispanis *Arayhan*, Italis *Myrto* & *Mortella*, Germanis *Myrtenbaum*.

Primum, secundum, & tertium genus in prima classe descriptum Hispani *Arayhan maurice*, hoc est Myrtum Mauritanicam vocant. Latinis poterit esse Exotica, licet ternis, ad summum, foliorum versibus distinctam viderim, cùm Plinius senos versus suæ exoticæ tribuar. verùm quidem est adeo densè stipata interdum nasci in secundo & tertio genere folia, ut pluribus versibus constare videantur.

Quartum genus Hispani simpliciter *arayhan* & *myrta* vocant: eam silvestrem judico, quoniam spontè locis incultis provenit. Sed *Myrtus* ab hac planè segreganda est, sui generis inter silvestres propria. Plinius tamen lib. xv. cap. vii. in quo de facturi solcis agit, silvestrem myrtum minore semine à quibusdam oxymyrfinem vocari scribit, ab alijs chamæmyrsinem, ab alijs acaron à similitudine.

Quinque genus Candida myrtus appellari poterit à baccharum exalbidatum colore. Et omnes istæ myrti (præter quartam) hortenses & domesticæ.

Latifolia quæ in Belgicis hortis alitur, Romanam dici posse existimo, quam Plinius eandem cum Conjugula Cætonis esse purat: eam ex Italia & Roma in Belgicam illatam certum est, nam in Hispania videre non memini. Hortensis Belgica minuiore & densiore folio, ad Tarentinam meo judicio referenda est. Nisi quis potius ita censeat, candidam minucissimè omnium folio in prima classe repositam, Tarentinam esse vocandam. Nam cum Cato rancum nigræ, albæ & conjugulæ meminerit: jam verò conjugula Plinio sit Romana, nigra ex fructu satis nora: restat candida, quæ ad nullum Plinio descriptum genus referri possit, quàm Tarentinam. Sic Hortensis illa in Belgicis hortis ab initio culta, minuiore folio, non incommodè *Ægyptium* Theophrasto de Causis Plantar. lib. vi. cap. xxvii. descriptam referet, quàm & angusta fronde, nigroque fructu esse, & alias odore præcellere asserit.

Porro Myrto folia viridia & sicca, ipsæque bæccæ, cùm foris impolita, tum intra corpus sumpra, restringendi vim habent. Multæ præterea Myrti facultates apud Dioscor. lib. i. repetiuntur.

Bellonius lib. i. Observationum cap. lxi. refert Illyricos myrti folijs coria perficere, quemadmodum Macedones Rhoe, *Ægyptios* Acaciæ filiquis, Aliz minoris incolas glandium Efculi calicibus, Gallos Quercus libro, Phryges silvestris Pini corticibus.

MYRTO.

Myrto cist.
balsamataCisti fusca
genera.

in eas species quas observavi, dividam, initium à Mase facturus.

Cistus mas i. cum Hypocistide.

Cistis maris
genera.

Cistis maris.

Hypocistis
rura.

ELEGANS est hæc planta, cuius iconem E.C.V. Thomas Pennæus Londinensis Medicus anno M. D. LXXX ad me mittebat, & subsequente anno Londini in Anglia siccam ostendebat, quam ille ex Balearium insularum maiore, vulgò Majorica nuncupata erutam *mauro-rigos* appellavit: cuius rei causa illius historiam inter Myrtum & Cistum reponere libuit.

FAVTEX est interdum tricubitalis, scabro admodum cortice, & veluti quibusdam tuberculis obfito, qui in vetustis ramulis facile abscedit & sponte decedit: folia sunt pendè Myrti (quorum dorsum non minus scabrum est quàm ipsi ramuli) superne lævia, conjugata ut in Cisti & Myrti generibus circa ramulos nascentia: flores summis virgibus insident lutei, quinque oblongis folijs còstantes, & multis in medurullis longiusculis staminibus præditi: his succedit oblongum & pentagonum capitulum semine plenum.

Tota stirps odorata est, & lentorem, sive pinguem quandam succum, quali Cisti Ledi genera madent, effundere videntur.

CISTVS MAS. CAP. XLV.

CISTI duo prima (ut Plinianis utar verbis) genera Dioscorides facit, marem & feminam: deinde tertium addit Ledon dictum.

Ego, illius vestigijs insistent, tria etiam summa genera constituiam: deinde singula

MARAM porrò Cistum appello, qui flore quidem, ut reliqua Cisti genera silvestrem rosam æmulatur, sed colorem rubrum nunc saturiorem modò dilutiorem habet: cuius quinque species foliorum forma aut colore inter se differentes observabam.

PRIIMVS Cistus mas, cuius hic iconem cum sua hypocistide exhibeo, humanà altitudine plerumque fructat, ligno latiss fragili, & candicante cortice recto: frequentibus ramis alternatim semper ex adverso respondentibus: eandem etiam seriem servantibus folijs, quæ omnino sunt incana, molliora & longiora in novellis plantis, in adultis verdò, contrahiora, duriora, & aspera, foliorum salvis modo, mucronata, adstringentis gustus: flos ejus Cynorhodi aut silvestris rosæ magnitudine, quinque folijs constans, dilutionis rubri coloris seu, ut vocant, incarnari, multis staminibus croceis medium florem, ut in Rosa simplici, occupantibus: flori succedunt capitula quædam pentagona, dura, hirsuta, incana, mucronata, in quibus exiguum est semen ex rufo nigricans, seminis Hyoscyami aut Papaveris magnitudine.

Ad hujus radices, quæ summis celsitibus diffunduntur & coherant, copiosè nascitur elegantissima omnium quas umquam viderim, Hypocistis, nouo Vere, cum Cistus jam ad explicandos flores se parat: nam quando primum e terra emergit, purpureum sive kermesinum laticum

sericum esse dicere: deinde paulatim assurgens, & sese explicans, multum de pristini coloris elegantia remittit, & cythos suos profert candicantes, turgidos & lento succo plenos: qui à peritis pharmacopœis den satur & in usum adseruatur.

Frequens est hic Cistus, cum in Hispania, præsertim ea parte quæ Bætica appellatur, tum in Lusitania & Gallia Narbonensi, maxime Sertio monte.

Cistus mas II.

Cistus mas V.



SECVNDVS eadem altitudine qua superior assurgit, interdum etiam majore, non minus fruticoso stipite, neque minore ramorum frequentia: minus tamen candicat: folia habet eodem ordine disposita, molliora tamen, longiora, angustiora, & magis mucronata: flos ejus superiori similis, carnei coloris: capitulus etiam & semine parum differt.

Nascitur & in Hispania, & diutius reliquis maris generibus floret: illius item ramuli teneriores, rorulentum quidpiam pingue & odorum sub Autumnum contrahunt.

Dubium non est, quin Hypocistis sub hoc genere etiam crescat: nullam tamen, quemadmodum nec sub tribus sublequentibus, observavi.

TERTIUS superioribus brevior est, non minus tamen fruticosus: tenuiores habet ramos, folia superiore breviora, dilutius viriditate prædita, magis rugosa, pingua & odorata, florem alijis similem, dilutius rubentem, & aliquantulum odoratum, quam notam in reliquis Cisti Maris generibus non deprehendi: hujus capitula superioribus paulò minora sunt, & suis involucriis (quæ florum calices sunt) diutius occultantur, semen in capitulis æquale.

Hunc duntaxat in Lusitania spontè nascentem, supra Olyssipponem itinere Conimbriensi, atque etiam in mantimis observabam.

QUARTVS humana altitudine plerumque attollitur, ut reliqui fruticosus, & ramulis aliquantulum incanis: ejus folia reliquis majora & quasi orbiculata, nonnihil hirsuta & rugosa: flos superioribus forma similis, paulò major, & colore saturatius rubente: hirsuta, dura, pentagona capitula, superiortibus majora, in quibus semen rufum, majus quàm aliorum continetur.

Invenitur Regno Valentino & Aragonum, audio etiam in Italia frequentem esse: natus in Belgicis postea hortis, semine ex illa provincijs missio.

QUINTVS humilis est, & supinus ut plurimum, multis pedibus aut paulò amplioribus ramis ex eadem radice prodeuntibus: folia crispata sunt & quodammodo sinuosa, candicantia & hirsuta, gustus acerbi & adstringentis: flores ramulorum summitatibus æquali altitudine & quasi umbellatim nascuntur, superioribus paulò minores, sed elegantius ex rubro purpurascens coloris & intensioris quàm in quarto: capitula reliquis minor, suis involucribus plerumque contexta, semen continent reliquis simile sed magis atrum.

Hunc in sola Lusitania nascentem videbam solo admodum arenoso: nec usquam frequentiore

quenriorem quam apud monasterium *Peralonga* dictum, quinto supra Vlyssipponem miliaria, semine maru onulium, flore in nonnullis planis etiam Novembri mihi conspecto. Semen in Belgium reuersus, ut ceterorum Cisti generum aliquot amicis communicabam: sed nemini natus est hic frutex, præterquam uni Petro Coudebergo Pharmacopæo doctissimo & rei herbariæ studiosissimo, quem tamen diu conservare non potuit, nam subleuens linens latis rigida abstulit.

Reliqua genera quæ hiemem superarunt, omnibus rei herbariæ studiosis qui in Belgio vivunt, satis nota, cum ea aut in suis hortis alant, aut aliquando aluerint.

Florent verò omnes isti Cisti Aprilis, aliquando etiam maturus, nonnumquam seriis, pro regionum & locorum natura & temperamento: semen Augusto, Septembri & Octobri maturefert.

Quatuor priora Maris genera communi vocabulo dicuntur Hispanis *espea*: quintum genus peculiariter Lusitanis *rojella* vocatur.

CISTVS FEMINA.

CAP. XLVI.

Cisti femina
varietas.Cisti femina
herbaria.

CISTVM feminam etiam in suas species distribuam. Nam aut elatior est, & cædis virgis fruticans, sicut Mas: aut supinus & humi sparsus, ut Erica vulgaris Myrica folio. Deinde utrumque genus colorem in flore variat, qui maxima ex parte candidus est, quandoque luteus, seu Ochra colore.

Est igitur Cistus femina frutex ramulosus, cubitum interdum altus, nonnumquam humi stratus, gracilibus, nigricantibusque ramis, folio non minore quam in maris quarto genere, circinnæ ferè rotunditatis, rudi & aspero, viridi tamen, saporis adstringentis & acerbis: florem habet paulò minorem quam mas, quod et generis flori peco similem, album, nonnumquam etiam flavum, luteis fibris, ut in rola silvestri, medium florem occupantibus: capitula minora sunt maris capitulis, uigiora, non mucronata, sed nonnihil compressa superiore parte, semen paulò nigrius & laris magnum continet.

Recti & supini qui album florem gerit magna est in Hispania, Lusitania, Gallia Narbonensi & Aquitania abundantia. Qui verò luteum profert, nonnullis duntaxat Hispaniæ locis, & extrema Aquitania Cantabris finitima, circa Bayonam vidisse memini.

Hispani Cistum feminam vulgò *xara-espea* vocant, nomine ex Maris & Ledi appellatione composito. Narbonensis Galliæ incolæ, qui circa Mompelium vicinisque locis habitant, meo tempore *meages* vernacula lingua dicebant.

CISTVS autem uterque, mas & femina, Græcè dicitur *κίσκος* Dioscoridi, quem & *κίσκος* & *κίσκος* ad quibusdam vocari scribit.

Porro ò, quam multis annis habui opinionem, hic dissimulare nō possum. Ea est, Theophrasti græcum exemplar multis jam sæculis mendosum fuisse, & Historiæ Plant. lib. vi. cap. 11. initio, *κίσκου* pro *κισσού* legendum esse, errore à librariis faciliè admissio, ob vocum afinitatem.

Nam cum Theophrastus de arboribus agens lib. 111. Hist. Plant. cap. ultimo, aded diligenter Hederam in summa genera, humi repentem & in alrum se attollentem; hanc denudò in tria genera, candidam, nigram, & quæ Fictix appellatur: tertio, singula genera in multas species distribuierit. Cur lib. vi. ejusdem Hist. cap. 11. quasi sui oblitus, inter suffrutices Hederæ denudò meminit, ejusque duo duntaxat genera facit, utrique florem rose silvestris tribuenerit: cuius obsecro quænam est similitudo cum Hederæ flore omnibus notissimo?

Cerrè sic ego existimo, mendosum Theophrasti exemplar in ea usâ fuisse, cur Plinius qui plerumque ex Theophrasto sua deprimat de Hederæ acturus lib. xvi. cap. xxxiii. Nat. Hist. ex Theophr. lib. vi. capitis secundi initium ad verbum mutauit, reliquum deinde Hederæ historiam ex ejusdem lib. 111. persequutus sit.

Sic enim habet Theophrastus, *καὶ γὰρ κισσὸς δύο γένεσιν διαίρεται. τὸ μὲν ἄρρεν, τὸ δὲ θῆλυ τῆς τοῦ μὲν μαιζῶν καὶ σκληρότερον, καὶ λιπαρότερον ἔχει καὶ τὸ ἀνδρὸς ἐπιπροσφύλλει. αὐτῶν δὲ ὁμοίαν τοῦ ἀγρίου. πλὴν ἴστανται καὶ ἀόσμη.*

Plinius autem, Hederæ duo genera prima, mas & femina, major traditur mas corpore, & folio

Erica.
Kissage.
Kissage.Theophrast.
κισσού.Plinius Theophr.
masculum
feminarum
sequens.

folio duriore etiam ac pinguiore, & flore ad purputam accedente. Vtriusque autem flos similis est rosæ silvestri, nisi quod careat odore.

Item lib. xxi cap. ix. de coronis agens. Vtuntur è ferulis, & corymbis, & hederæ flore purpureo. Est & in alio genere earum silvestribus rosis similis. Et in ijs quoque color tantum delectat, odor autem abest.

Similiter val de Ladano agit lib. xii. cap. xvii. Hederam pro Cisto ponit. Verum autem Ladaneum (inquirit) Cyprî insulæ, & esse cespitem hircorum barbis genibusque villosis inhaerens, sed hederæ flore derofo passibus maruinis, cum est torulenta Cypros, &c. Quod satis indicant subsequenda verba. Sunt qui herbam in Cypro, ex qua id fiat, Ledam appellât, &c. Nam Ledon Cisti genus esse, neminem ignorare arbitror, & paulò post demonstrabimus.

Sed lib. xxiii. cap. x. *αυστηρ* à Cisto distinguit. Nam postea quàm de Hederæ facultatibus agit, (subjungit, Græci vicino vocabulo ciston appellant fruticem majorem Thymo, folijs ocymi. Duo ejus genera. Flos masculo rosaceus, femine albus. - Ambo profunt dysentericis, &c. Et paulò post, Sub his maxime nascitur Hypocistis, quam inter Hedetas diximus.

CETERVM Cisti folia, & parva germina trita, adedè desiccant & adstringunt, ut ulcera glutinare valeant: Flores autem efficaciores sunt, sic ut cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque & humiditates persanent: nomas per se illi cohibent, vetustis ulceribus, & igni ambulis cum cetato medentur.

HYPOCISTIS verò, quæ Græcis *ὑποκίστις* dicitur, à nonnullis *πόα* *σπορ*, ἢ *αὐτῆρος* cognominatur teste Dioscoride. Plinius scribit orobathion à quibusdam dici, arefactam in umbra sistere alvum ex vino austro nigroque, siccare & spissare, & rufam stomachi rheumatismos emendare: potam tribus obolis, languinis excretaiones, cum amylo dysenterias potam & infusam, vetera quoque ulcera purgare.

Cisti fam. luteæ.

in uerbis. ἡ ὑποκίστις, ἡ αὐτῆρος. Orobathion.

CISTI FEMINAE CLASSIS ALTERA.

CAP. XLVII.

ALIQUOT præterea Cisti genera in Hispania & Lusitania observabam, quæ ad Feminam veluti ad primarium genus, meo iudicio, potius referenda, quàm ad Marem, aut Ledon: quandoquidem nullo pingui lentoque liquore sunt obrita, nec rosam sive purpureum florem habent.

Cisti femina. Classis II.

Cistus folio Halimi I.

Cistus folio Halimi II.



PRIOR cubitales aut ampliores proferunt ramos, graciles, satis fruticosos, in quibus folia Portulacæ marinæ similia, sed omnino incana ut Halimi (à quo cognomen indidi) obtusius mucrone, subacidi & adstringentis gustus: summis ramis multi inhaerent flores, quinque folijs constantes, flavi coloris, minores quàm in superioribus, illi Cisti generi quod oconulli Helianthe-

Cistus folio Halimi I.

Cistus folio Lavendulae.

Cistus folio Sampsuci.



Cistus folio Thymi.

Hypocistis
parva.Cistus folio
Halimifolius.Cistus folio
Lavendulae.Cistus folio
Sampsuci.

Helianthemum vocant, similes, suas fibras in medio emittentes: his succedunt longiuscula & triangula capitula, exiguum subrotundum semen continentia.

Ad hujus radices Hypocistin nascentem omnino luteam, sive ochracea colore, ipsius plantae florem colore referentem, lanuano mense anno M. D. LV. reperiebam. Hanc pueros & pastores manducare intellexi.

ALTER princeps est prior, firmioribus ramis & incanis ut prior: folia etiam habet Halimi, paulo tamen longiora, angustiora, magis mucronata, & dorso elatiore, incana tamen tota & sicca, suba ridi etiam & adstringentis saporis. Illius neque florem, neque semen vidi.

Uterque frequens est in Lusitania arenoso solo & aura marina afflato, inter Ericas, non procul Olyssipone nusquam abibi mihi conpectus.

TERTIUS plerumque cubitali assurgit altitudine, plurimis ramis, ipsique brevibus praeditus, circa quos confertim nascuntur folia angusta, incana, Lavendulae folijs proxima, adstringentis gustus flores superius flonibus non multum ab-similes parvis,andidis: semen non observavi.

Hic frutex aed Lavendulae similis est, ut excepto odore & sapore, pro ea sumi possit & certe quas plantas in hoc conspexi negligebam, Lavendulam esse existmans, sed floribus deinde conspectis in aliquot alijs plantis, diligentiùs observatas, Cisti genus esse deprehendi.

Solo Valentino regno hoc Cisti genus inven-

niebam aridis & petrosis locis quarto à Valentia militari, Aprilis initio.

QUARTUS frutex est multos graciles ramulos proferens, in quibus folia parva, quasi circi-

nata,

nata, incana, Sampluco similia, paulò minora, & dorso eminente, contratijs inter se pediculis, ut in ceteris Cisti generibus, nascuntur, & adstrictionem habent cum quadam aciditate & salitudine conjunctam: flos in summis ramis copiosus quinis albis folijs constat, quorum medicullum macula ex purpura nigricans inficit, villis & staminibus flavis medium florem occupantibus: capitula deinde lani ferè exigua, trigona, in quibus semen minutum Hyoscyami, ex nigro candicans sive cinereum continetur: totus verò oblongus ille ramulus qui florem & capitula sustinuit, semine maturo arefcit, ut in singulis Cisti generibus.

Primum hunc inveni in Hispaniâ Castella veteri, supra oppidum cui nomen D. Martini del Castañal: deinde copiosum circa Carafça, & toto Bætico agro inter Tagum & Anam flumina.

Hispani *Quirilla* aut *quirilla* appellant, communi fermè cum Ericæ minoris vulgationis vocabulo, quia fortassis inter Ericas numerant.

Qy. ntvS pedali fruticat altitudine, ramulus ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, qui magna ex parte sine folijs conspicuntur, præterquam circa eorum summities, in quibus confertim nascuntur exilia admodum, viridia, Thymi foliorum æmula, adstringentis gustus: florem summi ramis fort. superiori similem, minorem, & nullis maculis infectum: semen non observavi.

Hic mihi solum conspectus est extrema Bæticæ parte, qua Castellam & Lusitaniam spectat: fieri tamen potest ut etiam alijs locis nascatur.

CISTI FEMINÆ TERTIA CLASSIS.

CAP. XLVIII.

Superioribus proculdubio conjungendæ sunt plantæ, hoc capite subijciendæ, cum & forma respondeat, nec dissimile sit temperamentum.

Chamæcistus 1.

Chamæcistus 11.



Ourivus nota est planta pluribus regionibus vulgaris, quam Germani, quòd locis incultis inter Ericas nascatur, & folijs Hyssopum vulgarem æmuletur, *Dryden pffoy* appellant, floribus vel albis, aut pallidis, sed maxima ex parte aureis, qua de causa Herbariorum in Germania vulgus *Consolidam auream* nuncupat. Sunt qui Plinij *Helianthen* esse volunt, alij *Panacem Cheiræncium* Diosc. cui folium amaranco simile, florem aureum, radicem parvam nec altè demissam tribuit. Ego ad Cisti feminæ tertiam classem reducendam censeo: quemadmodum & alia genera subsequencia in meis peregrinationibus observata.

M v l z o s promitt Chamæcistus alter ex eadem radice ramulos, tenues, oblongos, summa tellure sparsos, subrubentes, in quibus exigua folia, ordine quodā & duplici serie, quem-

G

admodum

Cisti femina
Classis III.Chamæcistus
1.
Consolida
aurea.
Heliantha.
Panac. Cheir.
11.Chamæcistus
11.

admodum in reliquis Cisti generibus, disposita, Serpillo ferè similia, nigricantia & hirsuta, crassaque: sub florum autem partum, in novellis ramis longiora & candidiora: flores in extremis ydem novellis ramulis terni aut quaterni, oblongis & hirsutis pedicellis inhaerentes, quinis folijs, ut superioris flores, constantes, illisque magnitudine pares, sed aurei planè coloris & odorati: semen observare non licuit: radix multifida, aliquot fibris laevè sparsis capillata.

Nusquam nisi in summis Austræ & Syriæ Alpibus inveniebam, idque semel, mense Augusto florentem: in hortum verò translata, ubi illam aliquot annis alui, Maio mihi floruit: sed flores cum suis pedicellis nimium caduci, omnem observandi feminis occasionem planè ademerunt.

Chamaecistus III.



Chamaecistus II.



Chamaecistus
III.

DODRANTALIBVS est Tertius ramulis, humi similiter diffusis, quos bina semper contrario inter se situ sepiunt folia, Myrti tarentinæ folijs æqualia aut a ngustiora, superè cinerea quadam lanugine obducta, inferè verò omnino incana, gustu adstringente & nonnihil acrio prædita: pedicellos postea exerit duas aut tres uncias longos, quibus insident quini aut seni flores superiori ferè forma similes, quos pictor malè expressit, & sculptor corrupti, lutei coloris: his succedunt trigona parva capitula, semine inæquali, minuto, rufu plena: radix lignosa, dura, vivax: in hoc etiam ramuli flores sustinentes, maturo & deciduo semine, exsiccati & confringi plerumque solent.

Maxima abundantia nascitur in omnibus illis montibus qui à *Calenberg* Danubio imminenti, ad Alpes Austriacas continua quadam serie procurunt, tum etiam in *Hamburgensi* Pannoniæ monte, alijsque ejusdem Provinciæ locis sublimioribus præsertim, sicilique, gramine tamen tectis agris. Floret Maio, semen maturum est lunio.

Chamaecistus
IIII.

QVARTVS exigua est planta, tenuibus, lignosis, humique sparsis virgulis prædita: folijs primo generi, quod *Helianthen* putant, similibus, minoribus tamen, omnino caducantibus, gustu adstringentibus: flores extremis tamis insident, quinque folijs constantes coloris interdum albi, ut plurimum pallidi, staminibus medium florem occupantibus: semen triangulis capitulis Lino paribus inest exiguum, rufum. Radix lignosa & fibrosa.

Chamaecistus
V.

QVINTVS ab hoc non differt magnitudine & ramulorum tenuitate: flores item similes, semina similia: sed folia angusta omnino & tenuia, Cisto folijs *Thymi* (qui quintus est id secundæ Cisti semine classe) respondentia, incana etiam & ejusdem temperamenti. Radix perinde dura & fibrosa atque superioris. Flores aperit uterque Maio.

Frequens est utraque plantula *Salmanticensi* agro, ubi *perdigera* ab incolis appellatur, quia pedices circa eam frequenter se volutant, & pulverant.



Chamaecistus vii.



admodum ostendunt: radix dura, lignosa, aliquot fibris donata est: quin etiam rami subinde tenues fibras agunt. Exsiccata planta non in iucundo spirat odore.

G 2

Nascitur

Sextus dodrantales aut maiores humi-
fusus ramulos habet, multis oblongis angustis-
que folijs, nullo certo, sed cōfuso ut plurimum
ordine dispositis, septos, præter vulgare in om-
nibus Cisti generibus foliorum situm, saporis
initio velut gummosi, deinde amaricantis: ex-
tremos ramulos bini aut terni occupant flores
quinque foliolis constantes, lutei, cum suis in
medio staminulis, coloris: quibus succedunt
triangula capitula satis magna, majusculum &
inæquale semen continentia: radix lignosa, du-
ra, vivax, foris nigro cortice obducta, & in ali-
quot ramos sparsa.

Rarior est, nusquam enim nisi in monte Ba-
densibus thermis imminente, quarto à Vienna
Austriæ miliari, atque in Hamburgensi duobus
à Posonio Vngariæ urbe miliatibus: pauculas
plantas inveniebam florentes mense Junio, quo
tempore, aut paulò post, semen etiam perficit.

OBlongis, quandoque dodrantalibus
tantum serpit Septimus ramis, humi diffusis,
nigricantibus, in multos alios breves ramulos
divisis: folia frequentia & conferta sunt, bina
semper inter se opposita, exigua, Serpillo mi-
nora, Thymi durioris folijs haud majora, cras-
sa, superiore parte viridia, infernè candicantia,
amaricantis saporis: extremis ramulis innascan-
tur bini aut quaterni flosculi simul juncti, per-
pusilli, è quinque foliolis cōpositi, carnei quasi
coloris: his succedunt capitula, maturitate ut
quinque crenas sese aperientia, & semen exile

Chamaecistus
vii.

Chamaecistus VIII.

Chamaecistus
VIII.

Cistus annuus.

Cistus an-
nuus.

Nascitur tenui solo inter saxa, in summis *Encetis* & alijs Austriacarum Styriacarumque Alpium supercilijs. Floret Iunio, interdum etiam paulò maturius, pro temporis quo nix, quæ iuga illa tegit, maturè aut serò solvitur, ratione.

Cum Pannonicarum stirpium historiam primum evulgavi, nondum mihi constabat quò istam plantulam referre deberem, quòd mediam quandam naturam inter *Chamaecistum* & *Cneorum* Matthioli obtinere videretur: eam ob causam inter utriusque capita locaveram, & *divisum* reliqueram, liberum cuique faciens quo potissimum nomine appellare liberet. Sed diligentius postea observatam, inter *Chamaecisti* genera reponere placuit, impellentibus me, ut ita faciem aliquot causis.

OCTAVVS palmaris est aut paulò amplior, superioribusq; firmior, multis lignosis, rectis & nigricantibus ramulis præditus, quos numerosa & adeò conferta ambiunt folia, ut quaternis versibus digesta videatur, Myrti minoris folijs non dissimilia, minora tamen & hirsuta, licet atra viriditate supernè splendeant, quorù gustus adstrictionis particeps est: flos unicus interdum & alit extremis ramulis exit, satis crasso pediculo subnixus, unico quidem constans lolio, sed quinque profundis erenis, illi demq; velut circinaris diviso, ut quiaque folia habere videatur, ejusdem cum primo genere penè magnitudinis, coloris ex albo purpurascens, & quasi carneidulioris, decem staminibus extrema parte nigris, & stylo oblongo purpureo cincto medium florem occupantibus: floribus excelsis apparent pentagona capitula obtusè mucronata, quæ maturitate aperta, semen continere deprehenduntur exile admodum, flavi coloris.

Rarissimum hunc fruticem duntaxat in *Emathibus* jugi scopulis nascentem observabam, unde florentem sub mēsis Iunii finem erui; semine verò prægnante in *Thymale* summo supercilio, duobus supra *Thymis* miliariibus. Semel atque iterum ex ijs jugis cum suo cespite desumptum in meò hortulum trāsuli cū alijs elegantibus alpinis stirpibus: sed miscere noluerit.

NVLVM nomen vulgare has plantas obtinere intellexi præter Primam, quæ, ut dixi, *hyssopiflorà* Germanis dicitur: Tertiã quæ ab Austriacis *heptaster* Westham vocatur, à præstanti videlicet curandorum vulnerù facultate (quo etiam nomine ipsos donare audio Priorem) & Quartam atque quintã ab Hispanis *perdegnera* appellatas. Sunt autem omnes perpetuò virentes & sua folia per hiemè retinentes: sed eorum flores admodum caduci, & statim senescentes.

CISTVS ANNUVS. CAP. XLIX.

VT Superiores plantæ multos durat annos, sic quas hoc capite describam, *Chamaecisto*, mea opinione, cōgeneres, annuæ sunt duntaxat, & primo à saro anno perire solent.

T. PRIMA in vinetorum apud Salmanticenses marginibus, & Granatensium Regno mihi observata, longiusculis hirsutis, rectis, & raris est virgulis, folijs autem amplioribus quàm in *Chamaecisto* primo, magisque viridibus, adtrin-

gens

genis gustus: flos Chamæcisti primi flori similis, pallidus aut albicans est, semen minutum rubescens in trigonis capitulis, duplo quàm Chamæcisti primi maioribus continetur.

Castellani *surmeta* vocant, quia forsitàn, ubi hæc nascitur, tubera, quæ illis *surmeta* dicuntur, crescant, Granatenfes *yerva del quadrile*. An Hydnohyllon herba, quam Pamphilus in *Hydnohyllon* gloffis, teste Athenæo lib. 11. Deipnosoph. tradit supernascentem tuberibus, cujus indicio subesse tubera cognoscunt?

2. Ejus alia species inuenitur longioribus aliquantulum virgis, non tamen minus hirsutis, angustioribus etiam folijs, cujus flos minor, pallidus, valdè caducus, capirula & semè similia.

ALTERAM, Madritiana silva inueniebam, secundo ab urbe Lutena militari, pedali altitudine assurgentem, exiguis, tenellis, rectis, nec admodum ramosis cauliculis: oblongis folijs, angustis, hirsutis, diluta viriditate præditis, quæ cum ramulis per Caniculæ æstus pingui quodam & lento humore sunt obsita: flos pusillus est, quinque folijs constans, punicanæ macula insignitis, pallidi alioqui coloris ut superior: tenella admodum & triquetra capirula pusillum & cinereum semen continent.

Hujus nullum vulgare nomen intellexi. Sed utraq; Maio mense floret.

Prioris semen, maximè commendari ad nephriticos dolores, arque ad alios usus utile esse, me monebat Doctiss. vir Simon de Tovar Hispanensis Medicus.

CISTVS LEDON.

CAP. I.

SYPEREST ut tertium Cisti genus in suas species etiam distribuamus, quæ non minus varietate suæ in Cisto semina. Initium autem ab omnium vulgatissimo, & pinguis-
per Hispanias nascente faciemus.

Cistus Ledon 1. angustifolium.



1. PRIMUM igitur Ledon fruticax ad hominis altitudinem, quam etiam interdum superat, ramis frequentibus, lignosis, duris, nigris: folia, quemadmodum & rami, ex aduerso lora sunt, oblonga, transversum digitem quandoque lata, nonnumquam etiam latiora, supernè ex viridi nigricantia, infernè candicantia, quæ cum tenellis ramulis pingui quodam odorato, calido, & transparente liquore adèd copioso aspersa sunt, ut procul etiam ex splendore conspici & agnosci possit, odor autem octava miliaris germanici parte naribus percipi: flote est inter reliqua Cisti genera & pulcherrimo & amplissimo, magnæ Rosæ instar, simplici quinque foliorum textura, omnino interdum albo, sed cujus singula folia circa unguem ex purpura nigricante macula rhomboide nunc majore, modò minore & angustiore, ut plurimum infecta sunt, floris umbilico multis croceis fibris pleno, ut in alijs Cisti generibus: capitula in longis pediculis, folijsque suis denudatis, omnium maxima, rotunda ferè & plana, non mucronata, & sæpenumero decagona, dura, interius flavescentia, quibus dehiscenribus, semen decedit copiosum, subrotundum, omnium minutissimum.

Tota planta, dum rescicata est, quandam candorem contrahit, pinguem tamen illum suum lentorem & suavem odorem non amittit, sed eum retinet ad multos etiam annos.

Crescit hoc genus multis Hispaniæ & Lusitaniz locis frequentissimè, pistoribus ad cal-

ciendas fornaces, & tenuioris fortunæ hominibus struendo igni seruiens. Nulquam tamen abundantiùs quàm in collibus eorumque declivibus inter Tagum & Anam flumina, & toto ferè monte *Sierra morena* nuncupato, ut mihi aliquando contigerit ad viginri ferè miliaria per hujusmodi frutices iter facere.

2. Separata Calpe, littore marino, quâ Malacam iter est, latiore nascitur folio, quasi ad Lauri angustifolij foliorum formam & amplitudinem accedente: non minus tamen pingui lentoque illo humore abundat, quàm jam descriptum.

Hispani utrumque *xara*, Lusitani priorem speciem *eslepa* appellant.

ALTERVM genus, ubi sponte nascitur, brevius est, & bicubitalibus dunraxat assurgit stolonibus, ramolatis: rami sunt fragiles, folia omnium, inter Cisti genera quæ observabam, maxi-

Ledon latifolium II. majus.

Ledon II. latifolium minus.



Ledon III.



Ledon II. latifolium minus.

Ledon III. Cyprium.

ma, superne viridia, inferne nonnihil candicans, Hederæ foliorum formam interdum, & Populi nigre plerumque æmulantia, satis rudia & carnea, hieme rubedinem nonnullam contrahentia, subacidi & adstringentis saporis flos candidus, Cisti semine flori par: capitula pentagona, mucronata, exili & nigricante semine repleta sunt.

Tenellæ plantæ neque pingues, neque odoratæ sunt, sed annotinæ dumtaxat, & verustiores, Autumnæ præfertim, quo tempore omnes Cisti species quæ pingues sunt, abundantiore succo, crassiore saltem & magis tenaci prægnantes esse mihi visæ sunt.

2. Hujus generis alia species etiam invenitur, per omnia ferè similis, sed humilior, neque cubitum excedens folia etiam minora. flore, semine, gustu conveniunt.

Utrumque genus nascitur in ea montis Mariani (vulgò Sierra morena dicti) parte, quæ superanda est ijs qui Vlyssipone Hispalim iter faciunt. Invenitur etiam quibusdam collibus Granatæ vicinis.

Præmā speciem incolæ *xara-xargana*, & *xara-xan* vocabant: Granatenses *xara-eslepe*, eodem quo Castellani Cistum feminam nomine. Altera species incolis *xara-xarga* dicitur.

TERTIUM in Hispanijs non observavi, sed semine ex Italia misso Cyprij Ledi nomine, nobis & plerisque alijs Belgis rei Herbariæ studio sese oblectantibus natum est, cubitali, interdum majore altitudine, fruticolum, nigricantibus ramis, carnosius folijs, & præ saturata viriditate nigricantibus, mediæ inter primi & secundi generis

generis folia magirudinis, brevioribus tamen, & rhomboidis quodammodo figuræ, quæ cum novellis ramis lento & rescido humore obsita sunt, non adeo tamen abundanti & denso, si- que etiã adeo odorato, ut in primo genere: flos albus est, secundo generi similis, semen etiam exale nigricans in torundis capitis.

QUARTVM genus multis ramis fruticat, cubito longioribus, lentis & flexibilibus, hirsutis, albicantibus: folia reliquis Ledi generibus molliora, ad Cisti femina folia accedunt, verum paulò longiora, angustiora, hirsuta, nigriora, & lenta pinguedine conspersa, non modò verno tempore, sed etiam per totam æstivam conspiciuntur: flos albus est Cisti femina flore non minor, nec ei ab illis capitula exigua membranaceis quibusdam & laxis involu- cristecta, semen continent omnia inter Cisti genera maximum, nigrum.

In sola Castellâ veteri hoc genus observabam, vicinis pagis S. Martini del Castellâ locis, ubi ab ineolis Ardivieja nuncupatur, adeo frequens, ut vulgare sit istud proverbium, *Quien al monte va, y mas no puede, Alomenos ardivieja coge*, hoc est,

Quicumque montem accedit, potius quàm inaniter redeat, vel Ardivieja (plantam vilissi- mam) colligat. Apud nostros Belgas satum feliciter provenit.

Ledon v.

Ledon vi.



QVINTVM eadem qua proximè descripsum assurgit altitudine, verum ramis duris, li- gnosis, nigricantibus: oblongis oleæ folijs, angustioribus, fuscis, pinguis, & lento humore conspersis, quemadmodum & novelli ramuli: flos albus omnino roscæ minimus: longa & angulosa capitula, in quibus semen rufum nigricans, exiguum.

Ad hujus radices geos illud *ajoud cé pou*, sive Cynomorij, Hypocistis nuncuparum, adna- tum inveniebam, multus veluti squamis, ut quod in aliorum Cisti generum radicibus cre- scit, compactum, pallidæ coloris, quibusdam tamen lineis purpurascens, & nonni- hil virescentibus distincti, cytinos suos summa parte proferens, lenis quoque & glutinoso suc- co totum prægnans.

Nihil isto Ledi genere vulgatius toto Valentio regno, & Narbonensî Gallia, ubi aliud Ledum non observabam: sed in plerisque alijs Hispaniæ & Lusitanæ locis etiam invenitur.

SEXTVM penè Quinto simile est, brevius paulò, minoribus angustioribusque folijs, lento humore aspersis, quemadmodum illius folia: flos major est, albus item, & quinque folijs constans, semen etiam responderet.

SEPTIMVM cubitale est, multis & frequentibus ramis fruticans, cineraceo colore præ- ditis, quos sepiunt frequentissima folia Rosmarini coronariæ foliorum æmula, omnino crassiora.

Ledon VII.

Ledon VIII.



Ledon IX.



Ledon VII.

Ledon IX.

Ledon X.

senescencia & hispida, nec minùs pinguis, & lento succo perfusa cum suis tenellis ramulis, quàm quintum genus: flos summis ramis copiosus, candidus, superiori similis, nec semen dissimile.

Valentino etiam Regno hæc duo postrema mihi duntaxat observata sunt, circa Xativa, & ab incolis *Xaguarço* dicuntur.

OCTAVVM eadem qua superius magnitudine crescit, rami tamen magis expansi sunt, folia tenuiora, superna parte ex fusco viridia, inferna verò candicanria, ut *Rorismarini* coronariæ folia videntur, gustu tamen adstringentia, licet lento quodam & pingui humore sint cum tenellis ramis obfita: numerosi flores secundum ramorum longitudinem nascuntur quinque folijs constantes, exigui, postremò tamen descriptis pares, lutei coloris: semen in pusillis capitellis ex cinereo nigricans.

Invenitur hoc frequens incultis illis locis citra Tagum, supra Olyssipponem, cum Cisto folijs Halimi, & nonnullis Bæticæ, ubi ab incolis *Romero*, id est, *Rosmarinus* appellatur.

NONVM minus est superiore, folia paulò majora, neque subtus incana ut in præcedente, sed rariora & magis glutinosa sunt: ramulos, quibus flos inhæsit, tenues, exsuccos, planeque retortidos, aliquot inania capitula & omnino hiantia jam excusso semine, sustinere deprehendebam.

DECIMUM pedali duntaxat est altitudine, ramulis exilibus, lignosis, satis tamen fragilibus, nigricantibus, pinguibus, & quodam lento humore madentibus: folijs longè minoribus quàm in Nono, non multum à Thymi folijs dissidenti.

Ledon x.



diffidentibus: flores non observavi, quemadmodum nec in superiore: sed in oblongis ramulis quasi umbellatim prodeuntia capitula exigua & superiore parte aperta, in aëia jam & cum lustramulis arida.

Nascuntur verò hæc duo postrema, in extrema Bætica parte, qua Castellam novā spectat, ab incolis *xaguerge* nuncupata: tamen posteriùs nonnulli etiam *tumercela* appellant, quòd sub ea forè tubera, vel potiùs, ut existimo, Hypocistis, quæ illis tuberis fortasse loco observata est, nascantur: tubera enim Hispani *turma*, ut antè dixi, vocant.

Non minus perpetuò virente nec decidente sunt folio ista Cisti genera, quàm Mas & Femina.

Græci s porro hic frutex *λιδων*, Latini Ledon dicitur: Plinius etiam Ladan appellat. Pingue verò illud quod ex eo colligitur *λιδωνος*, Latini Ladanum, officinis Laudanum.

Eius colligendi rationem Dioscorides lib. i. Plinius Naturalis Historiæ lib. xii. cap. xvii. describere. Quam verò inter recetiores Bellonius lib. i. cap. vii. Observationum in Creta observasse ait, adscribere hic libet, cum ab alio nemine sit adhuc prodita.

Græci colligendo Ladano peculiare instrumentum parant, vernaculo sermone illis Ergastri dictum. Est verò id instrumentum talstro dentium experti simile: huic affixæ sunt multæ ligulæ sive zonæ è corio rudè nec præparato confectæ.

Ladani colligendi ratio.

Eas leniter adfricant ladaniferis fruticibus, ut in hæreat liquidus ille humor circa folia concretus, qui deinde à ligulis per summos Solis ardores cultris est abradendus. Itaque Ladanum colligendi summus, imò intolerabilis est labor, cum totos dies ardentissimo canicula æstu in montibus hætere necesse sit: neque faciliè quisquam aliud ad colligendum operam sumit præter Calobieros, hoc est, monachos Græcos. Nusquam autem majore copia per totam insulam cogitur, quàm ad montis Idæ radices, pago Cigalinus nuncupato, & apud Milopotamo. Hactenus Bellonius.

Si quis ramentum in Hispanijs huic colligendo operam navare vellet, multò minnre, ut mihi videtur, negotio magnam ejus longè purissimi, resinosi, & odorati copiam colligere posset, cum integræ aliquando, ut dixi, silvæ inveniantur omnium pinguissimæ illius Ledi quod primo loco descripsi: neque illo ex Africa invecdo, magna ex parte impuro, opus esset.

Ceterum Ladanum primo excessu calidum est, adhuc substantia tenui, proinde emolliens, & moderatè digerens, atque etiam coneoquens: itaque mirandum non est, si peculiariter ad uteri vitæ conveniat: similiter adstrictionis paululum habet, quocirca etiam defluentes capillos retinet: nam quicquid pravi humoris ad radices eorum resedit, id omne absorbit, tum meatus quibus infuxi sunt, contrahit.

LEDVM ALPINVM

CAP. LI.

LEDON non ineptè subjungetur odoratus hic atque elegans frutex, multis cubitalibus, L. d. alpini quorum extremi ramuli confusè nascentibus folijs sunt obliti, Chamælex Italica foliorum æmulis, duris, supernè viridibus & splendentibus, infernè dilutiorè colore conspicuis, mucrone interdum rotundiorè & obtusiorè, in ambitu villosis hirsutisque ut sunt & oova germina, adstringentis saporis: germinum extremis insidet coma florum deorsum inflexorum & propendentium, campanulæ modo concavorum, qui summa labra quinque divisuris secta habentes, foris intensius rubent, & argenteis veluti guttis (cum ipsis unde dependent petiolis) confpersi sunt, interiore verò parte dilutius rubri, aliquot staminibus intra latentibus, suavisculi odoris: ijs succedunt exigua capitula quinque cellulis constantia, in quibus semina fulvum, minutissimum scobis mita: vindia capitula tria, suo odore capitis gravedinem quodammodo inducunt: radix dura, lignosa, oblonga: sed & rami per terram sparsi interdum fibras agunt.

Invenitur in summis Cadberg/Emathum/Wechelo/Durzenstein aliarumque vicinarum Alpium jugis inter Saxa, ad dexera pleiumque latera. Observavi etiam supra Garmingum, Chariunorum

L. d. alpini
cisterna.

Ledum Alpinum.

Ledum alpinum
genus alter.

Nerion alpinum
nomen.

Chamaerodendron alpinum
nomen.

Chamaerodendron alpinum
folia
Balsamum
alpinum.

Evonymum
quoddam.



norum cœnobium, in montis ascensu lapidibus strato, qui subeundus est ijs, qui ad Etios & vicinas Alpes proficiuntur.

2. Aliud ejus genus invenitur in *Encens* supra *Tuberg* rarioribus folijs, nec ita confertis, majoribus, durioribus, admodum venosis, longiore mucrone præditis, minime in ambitu hirsutis, & prona plerumque parte flavescens, aut ferrea rubigine nigricantibus: flores habet superiori similes, sed paulò dilutiores, capitula & semen similia. Hujus folijs & ramis adnata aliquando reperiuntur tubercula nunc nucis ponticæ, modò pisi magnitudine, inæqualia, foris ruticante aut pallidente nonnumquam colore, intus fungosa, & alba pulpa plena, adfrictonis partecipe, quæ gallarum vicem præstare possint.

Floret utrumque genus Junio & Julio: semen sub Augusti finem, aut paulò secius maturefcit.

NERION alpinum nobilis idemque doctissimus *Vlysses* Aldrovandus hunc fruticem appellat, teste C. V. Conrado Gesnero in descriptione Montis fracti. Alpini pastores *Alpreß* & *Berges* nominant, ut ipse eodem loco & in Epistolis, & *Stenlerus* ad calcem Commentarij de Alpibus referunt, quidam *Zienblust* nonnulli *Bumtlaub* vocant. Primum genus omnino intelligi existimare & Clariss. Viris Pena & Lobelio in Adversarijs, sub Alpina *Chamaerodendri* odoræ nomine, nisi bacculas asparagi vel taxi pares illi rinbuerent, quas in nostro non

reperias, sed pentagona tantùm capitula, ut ex ejus descriptione satis liquet. Alterum plurimum convenit cum eorum montana *Chamaerodendron*, sive *Lenticifolia* *Chamaerodendron* minus odora. In Observationibus prioris iconem exhibet Lobelius *Balsami alpini* nomine: pictor tamen flores fideliter non expressit, quos in quinque crenas non in quatuor, divisos esse comperisset, si ramos suis floribus onustos, à me anno M. D. LXXIII. amicis Machliniam missus (è quibus illam iconem expressit) diligenter confiderasset: licet non negem interdum fieri posse, ut quatuor tantùm crenis dividantur, sic nonnumquam ludente in floribus natura: at omnes in eodem ramo tales habere, credibile non est.

Hic est frutex quem à nonnullis *Evonymum* dici, ante memini, nequo quia ratione ductus. Nam in hoc ubi fructus scilicet proximus in quo acinus in quaternos versus digestus, qualem Theophrastus, sive granum quadrangula figura, quod Plinius, illi tribuunt? Ex modo descripta sanè historia satis liquet ne minimam quidem notam ad *Evonymum* referri possit. Itaque cum Gesnero loco supra memorato, & in Epistolis, *Ledum* potius esse, quàm *Nerion* aut *Evonymum* arbitror, multum me impellente, ut ita cen'eam, hujus stirpis odore & temperamento. Rustici & Pastores eorum montium in quibus observavi, utrumque genus *Kais* appellant, eo quæ Tinctores qui vicina loca inhabitant, utuntur ad lineas penulas nigro colore inficiendum. Nullum præterea usum apud eos obtinere intellexi.

LEDUM SILESTIACVM.

CAP. LII.

CISTE *Ledi* generibus adnumerandum etiam esse hunc non minùs elegantem & rarum fruticem, non est dubium: ijs enim odoris fragrantia proximus est.

Ledum silvestre
nomen.

CVBITALIBVS autem interdum est virgis, frosis, lignosis, cortice cinereo obductis, quarum extrema in plures alias tenuiores & quodammodo purpurascentes, easque etiam nudas dividuntur: illæ vicissim in alios dodrantes ramulos, virentes quidem, sed tamen quodam rubiginæ coloris obitos, quos nulla sene digesta fed confusa ambiunt folia, Libanoidis coronariæ folijs ferè similia, sed longiora, supina parte viridia, adeoque in pronam partem reflexa & convoluta, ut ejus nihil conspici possit præter nervum secundum folij longitudinem excurrentem, simili tomento, cum petiolo cui inhaeret, pubescens, grati & suavis odoris, acrisculi tamen saporis: summis istis ramis insident capita ex multis brevibus quasi squamis ferrugineis compacta, è quibus deinde se se explicat cotymbacea quædam multorum florum coma, ubi longis, tenellis, atque virentibus, nonnihil tamen lanuginosis, pedicellis

Ledum Silesiacum.



pedicellis inhaerentium, grato odore nares ferientium, quibus foliis albis constantium, non subluteorum (ut temerè quidam qui sic cum flore ramum duntaxat confpexit, afferere non est veritus) decem candidis staminibus cum stylo medium florem occupantibus: his demum succedunt oblongiuscula capitula, pentagona, officulis fructus corni, aliquando magnitudine non cedentia, quæ dum adhuc vincta sunt, argenteis punctis distincta esse videntur, sed maturitatem adepta, rubiginèi sunt coloris, semenque continent oblongum, flavescentes, adeoque exile, ut scobis, è ligno à vermicibus erosò sponte decidentis, instar sit. Verùm peculiare est in istis capitulis, ut matura deorsum inflectantur, terramque mucrone specient, magna Naturæ providentia, ne semen temere effluat: nam præter reliquorum consuetudinem, à pediculo, non ab extrema cuspidè, aperiri & dehiscere solent: maturo semine, terni aut quaterni alij ramuli rubigineo tomento obducti cum suis folijs in eorû lateribus nascuntur, spem florum in sequentem annum pollicentes: radix lignosa est, & brevibus fibris donata.

Tota planta, præsertim floribus onusta, odorata est, & aromaticum quidpiam spirat: quare mirum non est, si, teste Matthiolo, vestibus injiciatur ad eas à tineis præservandas.

Nascitur plerisque Silesiæ locis, unde non modò aliquot stirpes erutas, quæ in meum hortulum translatae per biennium duntaxat creverunt, sed etiam recentes ramos elegantissimas

Natalis

floribus & suo fructu onustos, ad nos mittebat anno M. D. LXXVIII. Cl. V. D. Achilles Crometus Nissenus, tunc R^{mo} ac Ill^{mo} Episcopo Vratislaviensi à secretis, nunc verò Brunnenfis in Moravia *πρωτεύων*: qui nos etiam pro nostra amicitia peramanter admonebat, ad montium radices aliquot se plantas invenisse, quæ flores sex folijs constantes, duodenisque staminibus præditos præferrent. Insuper addebat, qui illi dux viæ fuisset, Venatorem adfirmare, similem plantam in fumis montium jugis conspexisse, jam suis floribus ornatam, quæ digitalem longitudinem non excederet: nominatam autem ab eo *συνθετός βούταν* hoc est, peregrinam apariam, quia videlicet apes ejus floribus delectantur.

*Apiares po-
regina.*

Floret sub finem Junij & Julio, semen Augusto & Septembri maturum est: inluxeruntque interdum in sequentem usque annum capitula, sic ut recenti flore, & fructu superioris anni vacuo, nonnumquam & tertij anni fructus pedicellis, onusti rami conspici possint.

ROSMARINVM silvestre vocatur hic frutex à Matthiolo: sed, ut dixi, ad Ledum generatius referendus videtur, in qua sententia est doctissimus noster Lobelius: ideoque Ledum Silesiacum nuncupavi. Si quis Boëmicum (quod in Boëmia teste Matthiolo nascatur) aut folijs Rosmarini cognominare malit, à foliorum cum illo similitudine, per melior. Cordo haud ignotum fuisse atbitror, & Plantarum Historiæ lib. 1. Chamæpucen ab eo appellari.

*Rosmarinum
sive Maribus-
lin.*

*Chamæpucen
Corda.*

Non dubium est, quin, si quis periculum faceret, ad pleraque magni usus futurus sit hic frutex. Atque adeò Silesij, teste Cromero, adversus articulorum contractiones utilem felicissimo experimento compererunt, totius plantæ decocto in solum infuso, cui ægri insideant, eoque remedio subinde repetito. Idem me hujus oleo stillantio Fabiani Ilges Nissen cum Pharmacopœi opera & diligentia vitreis organis extracto, mense Octobri anni M. O. LXXXII. donavit. Anno autem subsequente, ipsemet Fabianus Ducis Brigenfis nunc Pharmacopœus, oleum quod è summis ejus fruticis ramis florentibus exceperat ad me misit: quod cum admodum fragrans sit, & stirpis florumque nativum odorem retineat, easdem proculdubio facultates etiam obtinebit. Nondum tamen quempiam periculum fecisse intellexi.

Idem porro locis quibus id Ledum crescit, nonnumquam invenitur frutex quidam pedalis altitudinis, raro amplior, tenuibus subrubentibus virgis præditus, quæ deinde in tenuiores candicantesque ramulos dividuntur, angustis longisque folijs temerè & confuso ordine eos vestientibus onustos, supernè virentibus, infernè verò canescentibus, & Salicis pumilæ

*Cisti: Salsæ
genus.*

Rosmarinus silvestris *ἀρσμος*.*Rosmarinus silvestris*.*Spiræa* Theophr. fortè.*Spiræa Theophr.*

δὲ καὶ τῶν *Θαμνῶν* αἱ, ἑρῖκα, καὶ *σπυραῖα*, καὶ *ἀγρος*, καὶ *ἀλλ' ἄλλα*. Et fortasse commodius quam *Visburum* Matthioli, quod nonnulli *σπυραῖα* esse voluit.

pumilæ angustifoliæ, quæ paulò post describetur, valde similibus folijs, nullius grati odoris, sed peradstringentis saporis: summus etiam ramis insident capitula ex multis brevibus squamis compacta cæbryos modo, è quibus sese explicant aliquot stiloculi tenuibus oblongisque pedicellis inhzrentes, quinque foliolis, ut superioris, præditi, sed diverſi coloris, rubri nimirum dilutionis sive quodammodo carnei, quibus excussis pentagona conspicuuntur capitula breviter, obtuso mucrone, exili, pallidissime semine plena.

Eodem quo superior tempore floret, & maturum semen profert.

Hunc sub anni M. D. LXXXII. Autumnum, è Silesia ad me mittebat Cl. V. Fridericus Sebizius Ducis Brigenſis Medicus, hac inscriptione, *Rosmarinus silvestris ἀρσμος*. Similem verò ante multos annos Machinæ aluimus in horto, & florentem, non procul Loon arce, inter Brabantinæ Campaniæ cricæ rutum, accepimus.

SPIRÆA THEOPHR. fortè.

CAP. LIII.

BRIGA Silesiæ etiam mihi Viennam miſit elegantem hunc fruticem idem Sebizius, ipſo Vere, anno M. D. LXXXVI. qui in meo hortulo repositus, egregie provenit (umbroso enim loco collocaram ut facilius comprehenderet) & sequente anno flores & semè protulit.

Dvorum autem cubitorum altitudine affurgit, tenuibus ramis seu virgis puniceo cortice obductis, per quos sine ullo ordine sparsa sunt frequentia, longiuscula & angusta folia, salignis proxima, per ambitum serrata, superne dilutiore viriditate prædita, inferne veluti ærugine aspersa, exsiccati cum quadam amaritudine conjuncti gustus. Extraxi ramuli, digitalis ferè longitudinis, satis crassam spicam ferunt exiguorum florum, vix in modum congestorum, quinis folijs còstantium, è quorum umbilico multa staminula prodeunt, coloris cum suo flore ex albo rubescentis sive carnei, nullo peculiari odore præditorum, nisi qualis ferè in florente olea est: illis evanescentibus succedunt pusilla pentagona capitula, quæ ad plenam maturitatem pervenientia, tenuissimum & pulvereum quodammodo semen flavescens effundunt. Mense Iulio floret, sub Augusti finem semen matureſcit.

Qui ad me mittebat Sebizius, percontabatur an ad Syringam referri posset, propter pentagona capitula forsitan quæ Syringæ albo flore capitulis haud absimilia, minora tamen, pollinem potius, quam semen effunderent. Sed ego ad *σπυραῖα*, cujus Theophrastus lib. I. cap. XXI. Hist. Placit. inter frutices qui spicam pariunt meminit, commodè referri posse judico: Sic enim ait, καὶ αὖ δ' ἀρσμος παρὰ τὴν ἀλλαντὴν καὶ τὴν δ' ἑρῖκα. οὗτοι τῶν τῶν σπυραῖων καὶ ἀγροῦ.

SALIX

SALIX ANGSTROFOLIA PANNONICA.

CAP. LIII.

PRÆTER vulgaria Salicis genera, quorum superior Pannonia non minus ferax est quam reliquæ quas ad Prævinciæ, peculiares quasdam salices in ea observabam, quas alibi videre non memini.

CRESCIT ergo peculiare quoddam genus juxta torrentes & udis locis, crasso caudice, & ramis in multo tenuiores frequentioresque ramulos divisus præditum, quam vulgaris ea salix quæ angustis alioqui folijs prona parte incanis est: hujus insuper folia non modo subter canescunt, sed licet superne viridia, quadam tamen alba lanugine pubescunt, angustiora sunt, in longiorem mucronem desinunt, frequentioraque in ramulis nascuntur flores alijs generibus similes, pallidi, semenque minutissimum, nigrum, candida mollique lanugine exceptum, levis auræ arbitrio huc illuc fertur. Solet etiam hæc Salix alia quadam peculiari nota à ceteris distingui: nam plerumque subrubentibus quibusdam tuberculis, baphico cocco ferè similibus, onerata habere folia conspicitur. Vienna torrentis, sub urbe Vienna in Danubium influens, ea maximè abundat.

IN insula porro Danubij quæ è regione Posenij est, altissimas & crassissimas salices conspiciam maxima prægrandium Visci fructu copiam onustas. Audio etiam circa illam ipsam urbem & in Castaneis arboribus, & Coryli, rosarumque fruticibus, viscum nasci, mihi id affirmante ornatissimo viro Andrea Heindl, ejus urbis Pharmacopæo.

Vngari salicem latifoliam aquaticam, quam ego aliquando Eleagnum Theophrasti esse suspicatus sum, Anguillara Siler Plinij esse credidit, Dalechampsius platyphylon leucophylon cognominat, appellant *Rekötze sa*, vulgarem luteam sive pallidam *Saar fe*, rubram *Kie fe sa*, amensam ex qua corbes fiunt, *Kie fe*. Germani omnes communi vocabulo, *Weidenbaum*, *Weiden* & *Selber* nominant, Galli *Saulx* & *Saul*, Itali *Salice*, Hispani *Sauze*.

SALIX PYMELA.

CAP. LV.

MONTIVM herbosa & aperta juga pumilas alunt, quæ tribus generibus (præsertim quas observare potui) discernuntur.

Salicis pumilæ latifol. genus I. & II.




PRIVM enim virgas habet minimi digni crassitudine, humi iustas, pedales, interdum etiam majores, frequentibus præditis ramulis, qui sursum atolluntur, & inter gramina emergunt uncialibus ferè folijs oblici, superne viridibus & splendentibus, infernè subcinereis & quodammodo canescentibus, non multum ab similibus Viris idæz i. i. folijs. Fert ea in tenellis ramulis flosculorum molles spicas, quibus succedunt capitula ut in majore & latifolia salice, quæ matura aperiuntur Augusto, mollemq; lanuginem fundunt, in qua pusilla nigra grana latent: radix a modum crassa est, pro plantæ renuitate, crassisque & oblique sparsis fibris firmata.

ALTERVM similes fundit virgas, humi etiam jacentes, nonnumquam paulo longiores, magis scabro cortice tectas, & in frequentiores ramulos divisas, quas similia cum superiore folia ambiunt, magis mucronata, superne viridia, infernè splendentia, licet tenui lanugine pubescant. Hujus florum spica, sive sulus crassiusculus est, illi pæne similis qui in latifolia salice nascitur: radix cum superiore convenit, imò crassior quodammodo videtur, non minus quam illa dispersa, virgis etiam secundum radices caput, interdum fibras agentibus.

TERTIO generi graciliores sunt virgæ, ut plurimum pedales, nonnumquam dodrantes duntaxat, rectæ, lentæ, subflavo cortice tectæ: uncialia folia, lativi lini foliorum modo angusta, supina parte viridia, prona verd cinerea, & cum novella adhuc sunt, omnino cana: flous ut in vulgari flavescent, exigua, brevi, molliq; spica ante folia nascitur, at in candidam do-

angusta, supina parte viridia, prona verd cinerea, & cum novella adhuc sunt, omnino cana: flous ut in vulgari flavescent, exigua, brevi, molliq; spica ante folia nascitur, at in candidam do-

H



dam deinde lanuginem resolvitur: radix digitalis crassitudinis, obliqua, nigra, & tenuis fibris donata est. Crescit etiam hoc genus in udis cædus silvis infra Francofurtum ad Mœnum.

*Salix pumila
angustifolia.*

INVENTUR porro in Pannoniæ & Austriæ quibusdam depressis cædus silvis & uliginosis pratis, Quartum quoddam genus, gracilibus & cubitalibus interdum virgis assurgens, non minus quàm in superiore lentis, quæ à medio ad summum ramulorum, multas ferunt exiguas florum spicas, molles & incanas, maturitate in pappum & lanuginem abeunt: folia superiore breviora, angustiora, supernè viridia, infernè cana lanugine pubescunt & splendent: radix superiore non minus crassa est, & tenuibus fibris prædita: sed & virgulta secundum summum radicis caput, qua telluri cohzrent, subinde tenues & capillatas fibras agunt.

Nec huic dissimilis, paulò tamen latioribus folijs prædita, quæ passim in fabulosis Hollandiæ aggeribus Oceano objectis inter gramina & sparum, belm illis nuncuparum, nascitur.

CHAMELÆA.

CAP. XVI.

*Chamelæa
hifera.*

SYRCALOSVS frutex est Chamelæa, ramis palmaribus, interdum minoribus, præsertim calidis regionibus: folijs perpetuò virentibus, Oleæ similibus, minoribus tamen nec incanis, sed viridibus, gustus initio amari, deinde linguam vellcantis: flores habet exiguos, pallidos aut flavos, tribus foliis constantes, ex foliorum alis prodeuntes, fructum trilocum rithymali modo, pelliculâ primùm viridi, deinde per maturitatem rubrâ, amari & fervidi gustus, obductum, durum, & ubi exsiccatum fuerit, fuscum. Floret Aprili, fructus Augusto maturefcit.

Maralis.

Nascitur Valentino & Aragonum regno totaque Catalonia: verùm multò brevior & candidior quàm in Gallia Narbonensi. Certè Mompeliano agro circa Miravaux, & vicinum illi collem, viâque ad Frontignanum urbem, Setio moni, quod vulgò *Cap de Sete* dicitur, proximam, frequens est, ubi multò vegetior & viridior quàm in Hispanijs. Nunc etiam à rei herbariz studiosis in Germania & Belgio alitur.

Remina.

ΧΑΜΕΛΑΝΑ Græcis, quasi humilis Olea dicitur: Dioscoridi etiam *πρὸς ἄγρον, ἢ ἀγρὸς ὅτι χῆμα* hoc *χῆμα* dicitur: apud Latinos Græcum nomen retinet Chamelææ. Quidam Hispani *Olivilla* vocant, Narbonensis Provincia *Garrupe*.

Facilem.

DIOSCORIDES auctor est pituitam & bilem detrabere, in catapotijs sumptam, ita ut

duz

Chamelæa tricoccus.



THYMELAEA.



duz Absinthij partes ad unam Chamelæz misceantur, & Hydromelre exceptæ in catapotia eogantur: in ventre tamen non liquefieri, sed quotquot assumpta sunt regeri. Hujus item folijs cum melle tritis sordida ulcera & crustosa repurgari. Easdem parè facultates tribuit illi Plinius lib. xxiii. cap. xv. Nat. Historiz: sed lib. xiii. cap. xxi. Chamelæam cum Thymelæa confundit.

ALIUD potè Chamelæz genus nobis ex Italiâ defertur ab hac planè diversum. Id tethio stolone fruticat, ramosque habet admodum flexibiles, tenaci cortice, & qui difficile dirumpi potest, obductos, folia admodum conferta, carnosa, Daphnoidis foliorum formam imitantia, multo tamen minora, & incana lanugine, infernè præsertim, pubescentia: flores simul congestos, quatuor foliolis constantes, dilutissimè purpureascentes, ex lanuginosis colorisque argentei calyculis prodeuntes: fructum non tricoccum, ut superior, sed unicum, oblongiusculum, tenui miniata membrana rectum, succulenta carne, & fervidum nucleum in se continente præditum.

Eum fruticem dumtaxat apud nos videbam in hortis cultum, hisque interdum eodem anno florentem. Viennæ Austriz aliquoties illius semen terræ credidi, & natas plantulas diligenter summaque curâ conservare volui, sed subsequens hiems semper corripuit.

CAP. LVII.

FRUTEX est Thymelæa pollicaris interdu crassitudinis, cubitalis verò altitudinis aut amphoræ, & in multas virgas divisus cubitales, pulchras, tenues, rectas: quas sepiunt perpetuò vitentia folia Lini serè, sed majora, latiora, non obtusa cuspidè ut Chamelæz, neque adeò fragilia, sed mucronata, lenta, & gummosum quiddam, si dentibus atterantur præbentia: flores sepi in extremis virgis copiosos, quatuor foliolis constantes, Oleæ serè similes, candidos, racematim semper propendentes: deinde fructum baccarum myrti interdum magnitudine, paulò longiorem, initio viridem, postea corallij modum rubrum, carne succi plena Ceraforum instar, sub qua latet unicum semen, nigra fragilisque pellicula, albam & fervidi saporis medullam obvolvens: radix lignosa est & dura, in tenellis plantis raphani modo efformata, crasso cortice testâ, sed, quemadmodum tota planta, lento & admodum tenaci.

Nascitur per totam Hispaniam locis asperis, & plerisque Narbonèsis Galliz. Floret autem Iulio, & toto nonnumquam Autumno, semenque subinde profert.

GRÆCI *Θυμеляία* vocant, nonnulli etiam *χμυμυλίας*, teste Dioscoride, *καὶ πυρρὰ χμυμυλίας*, à *χμυμυλίας* (tametsi eodem capite folia peculiariter *κνίμυρ* appellari dicat) Eubœenses *αἰθαλίον*, alij *λίθον*. Latini Thymelæa appellationem retinent: Hispani *servisac*: cuius bac-

cis mense Octobri & Novembri aviculis plerumque infidiantur. Ejus fructus Græcis *αριδ βοε*
αριδ βοε, Latinis Granum cnidium peculiari voce dicitur. Hallucinantur enim, inquit Dio-
scorides, qui cocum cnidium fructum esse Chamelæ existimant.

Facultates.

Folia per menses colligi debent, & siccata in umbra recondi, auctore Dioscoride: & si dare libebit, antea tundi & nervi eximi. Purgant aurem, & aquola ducunt, si acetabuli men-
sura vino diluto macerentur, moderatius autem, addita lente cocta, aut contritis olei bus.
Seminis medulla, bilem, pituitam, & aquas per inferna detrahut, si viginti granorum pars in-
tema bibatur: verum fauces adus irritaque cum farina aut polenta, aut in uvæ acino dari de-
bet, aut melle cocto obducta devorari. Plures ejus facultates apud Diosc. lib. 1. 11. videre licet.

SANAMUNDA HISPANICA.

CAP. LVIII.

SUPERIORIBUS merito cōjungi posse existimo duo suffruticum genera, quæ Sanamunda
Snomine donata per Hispanias observabam, quibus addi potest & tertium illis simile.

Sanamunda 1.

Sanamunda 11.



Sanamunda
1.

PRIMVS Suffrutex multis cubitalibus ramis ab eadem radice fruticat, obsequiosis flexi-
bilibus, cortice exteriori nigrescente obductis, alium interiorem lentum & in tenuia fila se
dividentem complectente: folijs Chamelæ æmulis, minoribus tamen brevioribus, carno-
sisque, ad Thymalum parvulum, aut Myrtum proxime accedentibus, sed aliquatulum hir-
sutis, circa ramulos confertim & serie quadam distributis, gummosi si mordeantur, amaris
initio, deinde acris & adurentibus: flores inter folia nascuntur Oleæ similes, oblongi, in
quatuor foliola per extremum divisi, lutei: fructus (ut ex relato accepti) penè Thymelæ est,
sed nigricantis coloris: radix crassa, & lignosa.

Frequens est regnis Granatensi & Valentino, in apricis & Sole illustratis locis: Verno
tempore floret, hoc est, Martio & Aprili.

ISTIC ab Herbarijs, hoc est, ijs qui Scirpium notitiam se habere profitentur, Sanamun-
da vocatur, a rusticis verò *mierde-craze*, ob purgandi videlicet facultatem, cujus causa rusticis
illius regionis magno in usu est.

Sanamunda
11.

ALTERA cubitalis etiam altitudinis frutex est, ramis lentis, flexibilibus, carnosus & denso
cortice interfectis, qui (sublata exeriore cute) per totam plantam, præsertim circa radicem, Li-
ni aut Cannabis modo in fila diduci potest: superiores ramusculi densorum, confertorum,
lanuginosorum, & veluti tomento quodam obditorum foliorum comam pariunt, superiores
minorum, & mucronatorum, salis nonnihil gustus, sed deinde acris & calidi: exornatur hæc
coma flavescens flosculorum Oleæ similium numerosa sobole: radix crassa & lignosa
superiori similis est.

Istius

Istius fructum observare etiam non potui, quandoquidem Februario florentem in veniebam petroso & salebroso loco, manibus Baticz, inter Calpen & Estipona, montibusque Granaræ proximis.

GRANATENSIBUS Mauritanis Sanamunda vocatur, apud quos purgandorum corporum granatæ frequenter vsutur. Drachmæ enim pondere cum decocto Cicerum sumpta, mitissime purgat per inferiora. Circa Calpen, ubi vulgò *Burhalega* appellatur, nullus illius usus, præterquam ad excalfaciendas tornaces.

Sanamunda III.



CNEORVM MATTHIOLI.

TERTIVS duos superiores magnitudine excedit, candidioribus & multò lenioribus virgis, uarum cortex supra modum lenrus est & frangi contumax: extremi ramuli frequentes & serè omnino tomentosi, procumbentem comam habent, & frequentibus foliolis obsiti sunt. carnosus, parvis, Sempervivo minori Dioscoridis, quod nonnulli, Illecebram vocant, valde similibus, urentis etiam facultatis: flores superioribus fimiles inrerdum herbaei sunt, aliquando pallentes. Sed neque istius fructum observare licuit; floret autem eum superioribus.

Invenitur hoc genus toto illo tractu maritimo Meridiei objecto, qui ab Herculo freto, ad Pyrenæos usque excurrit.

Quo porro nomine vulgari appelleretur, ignoro. Similem autem fruticem sicum ad nos aliquando miserunt C. V. Alfonso Pantius Medicus & Professor Ferrariensis piz memoriz, & amplissimus Iacobus Anronius Costutus Patavinus patricius, hic quidam Ericæ Alexandrinæ nomine, ille verò Cneuri.

Verùm Cneuri-ne, an alio nomine, Veteribus descriptæ sint hæc stirpes, alijs iudicandum relinquo. Cerrum tamen est, Thymelææ congenere esse, & isdem facultatibus pollere.

CAP. LIX.

ILLIS subiiciendum existimavi elegantem hunc suffruticem, cui multi sunt rami graciles, flexibiles, lenti, furculosi, ab ipsa protinus tellure emergentes & humi diffusi: folia nullo ordine disposita ramulos ambiunt, viridia, curanea, Thymelææ verè proxima, ingrati primum, deinde amari saporis, nulla aut perexigua (quantum quidem gustanti deprehendere licuit) acrimonia prædita: flores in summis furculis, sex, septem, aut plures, conferti, quatuor foliis constantes, ex rubro purpureascentes, Centauri minoris florum penè æmuli, ingrati etiam & amari saporis, aspectu ramen pulcherrimi, atque odorari, caput (si durius naribus admoveantur) rennantes: ijs succedit fructus exiguus, Thymelææ fructus haud dissimilis, non ruber quidem, sed candidus, oblongiusculus, semen continens cinere a membrarum teetum, rotundum, Thymelææ grano par: radix longa, minimi digiti ut plurimum crassitudine, inrerdum nigricans, majore verò ex parte flavescens, lenra, superna parte nonnumquam gracilior, unde rami flexibiles & humi dispersi emergunt, & subinde, secundum alarum cava, satis crassas fibras flavascentes agunt.

Provenit in multis montibus Viennæ vicinis tantà abundantia, ut rusticæ mulieres, dum floribus abundat, multos ejus manipulos in forum venales adferant, cum alijs varij generis floribus, extornandorum tricliniorum gratia. Nascitur etiam in Pannoniæ silvis editiore loco sitis ultra flumen Ratum sive Aradonem. Frequens etiam crevit quibuldam siccioribus pratis Francoforto ad Moenum vicinis, præsertim silva quadam quercubus confita, circiter miliare infra eam urbem ad sinistram fluminis, inter Ericas, ubi illam candidis etiam floribus variantem conspieciebam, ejus etiam manipulos rusticæ mulieres in foro venales proponunt.

Aprili plerumque florere solet, nonnumquam etiam Maio: fructus maturus est Junio. At eo autem fecundus est hic suffrutex, ut æpenumerò ter eodem anno floreat, novis floribus semen semper consequentibus, quod probè maturum, bis eodem anno de una eademque planta colligere memini Viennæ Austriæ.

Cneorum Matthioli.

Cneorum
alt. 1.50 p.Gala-
m-
d-
m-
p-
l-
s-
t-
m.

Hippoglossum Valentinum.

Echinops
lin.Hippoglo-
ssum
lin.

Natalis.

Februario mense floribus onustum hunc suffruticem inueniebam in Batice solitudini-
bus cir-

MATTHIOLVS Commentarijs in Diosc.
cap. de Cinamomo huic suffruticem pro
Cneuro albo Theophrasti proponit. Cum vo-
rò, quale sit Theophr. Cneorum, cujus lib. vi.
cap. 11. Hist. Plant. duo genera facit, album &
nigrum, difficile judicari possit, cur huic
stirpi Cneuri nomen accommodare voluerit,
multi mirantur. Postrema aurem editione
cap. de Thymelæa lib. 111. aliud nobis Theo-
phr. Cneuron adfert, nullis, ut ipsius verbis
utar, deficientibus notis. Sed cum nudam tan-
tùm imaginẽ addidit Cneuri nomine nostris
oculis subijciat, illiusque historiam planè sub-
ticeat, si parum hideri, ipsius asseritioni adhibue-
rimus, nemo, ut opinor, vitio vetter. Diosc. &
Gal. Cneuron, ad Thymelæam & Chame-
læam referendum esse censent doctissimi cui-
que. Peritissimus Anguillara opinionem lib. 1.
cap. de Cassia, Cneorum utrumque Theophr.
arbitratur esse nostrum Rorem marinum co-
tonarium & Lavendulam, & Gazam mendo-
sini exemplar secutum, ὃ δὲ μέλας ἄσπερος, pro
ἄσπερος legisse, propterea nigrum odore care-
re interpretatum esse. Cujus rei causa mirifi-
cè illum exagitat Matthiolus. Certe meus
Theophrasti Græcus codex qui Venetijs an-
no m. d. 111. Aldinis typis cufus est, discretè ha-
bet ὃ δὲ μέλας ἄσπερος.

Ceterum nisi in hac planta, acrimonia, quæ
quidem sensu percipi possit, abesset, ad Thy-
melæa genera, aut ipsi cõgeneres stirpes (qua-
les multas inveniri paulò antè monuimus)
hunc suffruticem referendum esse censerem.
Vulgarem autem appellationem cur apud ru-
sticos mulerculas nullam invenerit, satis mi-
rari nequeo, quandoquidem illius flores ipsi
admodum familiares sint, & in delicijs. Nonnulli
tamen rustici Ἐχιν ὀψιπύλον hoc est, petrazam
rosulam vocant.

Quibus verò facultatibus prædita sit hæc
planta, mihi adhuc incomperum.

HIPPOGLOSSUM VALENTINUM.

CAP. LX.

SVFFRVTX hic potius, quàm herba,
scubitali aut ampliore altitudine assurgit,
multis ramis lignosis, duris, fragilibus tamen,
& nigricantibus præditus, circa quos, ex tuber-
culis interdum multa confertim & simul jun-
cta folia nascuntur, in tenerioribus verò ra-
mulis, qui plerumq; rubescunt, rariora, Myr-
tiferè, longiuscula, ex cæruleo nigricantia,
carnosa, nigricante pediculo, acuto mucrone,
extremæ amaritudinis: summis ramulis sin-
gulares inhzrent calices squamarum compa-
cti, interioris orbis florum Scabiosæ, aut Mor-
tus Diaboli magnitudine, qui florem con-
tinent villosum & lanuginosum, ex cæruleo
candicantem in medutillio, ar in ambiru om-
nino cæruleum: semen ignoro, nam floren-
tem duntaxat conspiciebam: radix dura est
& lignosa.

bus circa Antequeram, Marrio autem inter Velez & rubio & Lorca, quæ Eliocrota veteribus dicitur, Murciani regni urbes, totoque Valentino regno.

BAETICI, *Coronilla de frailes*, hoc est, corouulam fratum sive monachorum, quasi eorum orbiculatam tonsuram florē referentem, & *siempre en flor*, quia semper in floribus, & exsucca videtur, appellant. Murciani verò & Valentini vulgari voce *segullada*.

Nonnulli Valentiniæ academix Proflores Hippoglossum esse censebant: sed nihil eum Hippoglossio Dioscoridi descripto commune habet, nisi quis fortè ob foliorum ejus cum Ruscifolij affinitatem ei hoc nomen donandum putet, quæ tamen in hoc frutice circa pediculum oblongiora & angustiora sunt: præterea dissimiles utriusque faculrates.

Alij Alypum nominare malunt: sed eum planè anda sit & fuccei expertus, non video quata tione suam sententiam stabilire possint.

CETERVM circunforanei Bæticæ medici ejus decoctum propinare dicuntur ijs qui Galliæ scabie sive Venere læ laborant, non sine magno (ut aiunt) successe.

CASIA QUORVNDAM.

CAP. LXI.



CVITALIS est hæc planta, fruticeosa, tenues virgas ferens, virelcentes, lentas, interdum etiam nigricantes, præsertim dum novellæ sunt: & in his folia Lini rarius per ramos sparsa, amari saporis: flores aliquor ex luteo virelcentes & palliduli, muscosi, corni florum æmul, adstriccionis facultatis, in eodem pediculo congesti innascuntur: fructus deinde qualis Myrti, initio viridis, ubi maturuit ruber, Corallij aut Asparagi maturo fructui similis, subdulcis, lentusque, tandem nonnihil armoniz exeres, ostens intus nucleo, qui medullam continet albam, dulcem. Radice nititur dura & lignosa. Floret æstate, fructus Octobri, vel etiam ante maturefcit.

Varijs Hispaniæ locis crelcit secundum vias: frequenissimè autem Granatensi & Valentino regno. Mompeliانو etiam agro olim observare memini, ad ingressum Peraul, pagi ad stagnum Volcarum fini, deinde silvula Egremont cæno- bio proxima, in qua multæ elegantes stirpes.

Eo quo illic vertabar tempore à studiosis pro Osiride habebatur: subsequenribus annis Casiam appellare maluerunt, quod nomen etiam nonnullis Hispaniæ locis nbtinet. Doctissimus Plaça Medicus & Professor Valentinus Plinij Polygonum esse existimabar: verum ad quod Polygoni ab ipso descripi genus referri possit, non video. Hispanorum vulgus *Badajoz* & vicina loca Bæticæ, qua Lusitaniz conjungitur, incolens, *quar dalebo* vernacula lingua appellat.

Si quis cum Osyride Plinio descripta confecer, aliquot notas communes habere deprehendet: nihil tamen statuere volo. Certè Theophrasti, quem Casiam ab Hygino vocari Plinius tradit, cujusque ipse lib. xxi. cap. ix. Nat. Hist. ex Theophrasto duo genera constituit, esse non potest. Sed neque etiam Virgilij Casia, planta odorata, cujus in Bœolicis & Georgicis meminit.

VVA MARINA VULGARIS.

CAP. LXII.

HVIS duo genera per Hispanias mihi sunt observata, sola duntaxat magnitudine inter se differentia.

PRIMUM humana interdum altitudine fruticat, Spartij, quod Hispani *retama* vocant, modo, brachialis crassitudinis aliquando stipire, oblongis ramis, nigricantibus, qui deinde multas virgulas ferunt pedales, tenues, multis internodijs distinctas, ut Equisetum ferè, pro-pendentes, sine folijs, admodum adstringentis saporis: florem secundum internodia confer-tum, minutum, & muscosum, corni florum non ab similem, pallidum: deinde fructum exi-guis moris similem (ut mihi quidem retulerunt incolæ, nam florentem duntaxat videbam) rubentem, succulentum acidum, in quo pauca grana, multo ferè similia insunt, foris nigra, in-tus alba: radix dura, lignosaque est.

ALTERVM humile est, gracilibus, fermentosis & frequentibus ramulis fruticosum, qui internodijs ut in superiore distinguuntur, humi sparsa & profusa comâ, sine folijs, ut Primum, ncc

Polygonum 1111. Plinij majus.

Polygonum 1111. Plinij minus.



nec minus adstringens: flores sunt mucofi palliduli corni floribus etiam similes: fructus exiguis moris par, per maturitatem ruber, succulentus, acidus, unum aut alterum granum mihi pæne æquale, foris nigrum, intus album continens: radix alteri similis sed minor: longè etiam lateque serpens, & subinde novas proles sub terra promeus.

Matalen.

Floret utraque planta Maio mense: fructus Augusto vel etiam ferius maturefcit. Primam tamen initio Martij floribus onustam deprehendebam circa *Pelea el rabu*, regno Mutciano, ubi plurima nascitur, nusquam alibi mihi conspectam.

Alteram frequentem inveniebam in quodam colle, secundo à Salmantica miliari, totius fere Hispaniæ mediterraneo, longissimè à mari. Quod equidem satis mirari non poteram, cum antea nusquam observassem nisi maritimis locis, & toto illo tractu inter stagnum Volearum & ipsum mare Mediterraneum, supra Petaul & Magalonam, ad montem usque Setium.

Hemina.

HISPANI primum genus *belcho* vocant. Alterum genus Narbonensis Galliz incolæ *rasina de mar*, hoc est, uvam marinam appellant. Cum istæ vivebam, peritiores pumilum genus ad Dioscor. *ῥαῖον* quod & *ῥαῖον* dici ait, lib. 1111. descripiam referebant: ejus sane aliquot notæ non ineptè huic plantæ quadrant. Postea nonnulli ad Androsace retulerunt, Bellonio sequenti, qui Observation. lib. 111. cap. x11. de Androsace agens, hanc innuere viderunt.

Trypan.

Trypan.

Androsace

Briquet.

Croton de-

guil.

Peritissimus Anguillata, Crotonis, cujus Nicandri interpretes mentionem facit, nomine, hanc, ni fallor, describit opinione duodecima. Crescit, inquit, ad flumen Sebenicum in Dalmatia humilis frutex, Pino valdè similis, frequentibus nodis, cujus folia [citri seu ramuli porius] Equifeto minor similia sunt, ejus flos rufescens, rametis pallescentem viderim, qui deinde in fructum exuberat rotundum Ceraso minorem, maturitate colorem rubrum contrahentem, qui etiam edi possit. Nascitur locis asperis, montosis & saxosis, &c.

M V L T I S verò notis, hujus primum genus præferunt, cum Polygonum quarto Plinij quadare mihi videtur, quod his verbis describit lib. xxvi. cap. x11. Quatum genus silvestre appellatur, pæne arboris modo frutex, radice lignosa, stirpe Cedri rubicundo, ramis sparti, binum palmorum, nigris gemmularum tetrinis quaternisve articulis. Huic quoque spissandi natura, sapor mali cotonei.

Deinde quas Dioscorides Polygono tribuit facultates, adhuc hodie apud ejus regionis, ubi hic frutex nascitur, incolæ, in usu sunt: illius enim decoctum. penis & vesicæ ulceribus conferre adestunt.

Ephedra.

Caneu.

Anabasis.

Posset tamen ad Ephedram forsitan etiam referri, cujus idem Plinius lib. xxvi. cap. vi11. in hæc verba meminit: Caveon, quæ & Ephedra, ab alijs Anabasis vocata, nascitur ventosa ferè tractu, scandens arborem, & ex ramis propendens, folio nullo, cirris numerosa, qui sunt junçj

junci geniculati, radice pallida. Datur ex vino nigro austero trita ad tussim, suspiria, tormina, &c.

Hanc Bellonius lib. 1 & 111. Observationum arboreas ascendere dicit, cujus & fructum Androsaces similem, rubrum edisse refert.

Ego verò hanc plantam solum ferè nascentem, & sese sustentem, nec ullo adminiculo egentem semper inveniebam.

ANAGYRIS.

CAP. LXIII.



TAMETSI nonnulli plura Anagyris genera se vidisse referant: ego unicum legitimum, quale videlicet à Veteribus descriptum est, tantum observasse ingenue profiteor.

ARBUSCULA autem est humanam altitudinem non multum superans, calidioribus præsertim regionibus (nam alibi duorum etiam hominum magnitudinem æquantem conspexi) multis ramis fruticosa, cortice ex viridi nigricante obtusis, & quibus ramuli proflunt onusti folijs trifolij ferè æxianthis, hoc est, ternis simul junctis, sed superne dilutius virescentibus, aversâ autem parte incanis, ut viticis folia, odoris, ut spatulæ foetide vulgaris, (quam nonnulli Xyrin esse volunt) adeo gravis & tetri, ut transeuntibus suo foetore caput offendar. Ex foliorum sedibus & alis, bini, terni, aut quaterni ad summum flores simul prodeunt oblongi, quinque folijs constantes, genistæ ferè aut Cytisi florum modo, sed quorum supremum, quodque reliqua integrit, brevius est, & mimimè, ut in illis, reflexum, coloris intensius aurci, reliquis pallefcentibus: siliquæ deinde succedunt digitalis longitudinis, pollicaris verò latitudinis, cartilagineæ, in quibus terna aut quaternaria semina, nonnumquam plura, satis magna exiguis phasolis æqualia, renis surma, quæ initio candicant, deinde purpurascentem colorem contrahunt, tandem, cum plenè matura, ex cartulco nigricant: ut apertissime Dioscorides *trifolius* dixerit: nam in eodem fructu non ex-

Anagyris foetida.

adè maturo tres differentes colores subinde conspiciuntur.

Primum omnium huic fruticem nascentem inveniebam primo ab Arelat lapide, fixo quodam colle, qui dicitur D. Antonij monente C. V. eodem quæ primario Mompelanzæ Academ.æ Professore D. Guiljelmo Rondeletio. Deinde frequentem circè à Hyspaliæ totius Bæticæ Emporium celeberrimum, tum etiam ad Mundam, Malacam & Valentiam.

Floret istic Januarii & Februarii, æstate semen maturalescit. Hujus porrò ligni matrix sive cor, non nigricat, sed nonnihil porius pallefcit.

Αναγρίς *αγία ανδροπος*, à nonnullis etiam *αλσος* Græcè appellatur, teste Dioscoride & Plinio, Latine Anagyris, Herbariorum vulgè Faba in versa. Vulgare nomen Hispanicum non intellexi.

TENERA folia trita Dioscorides refert illitu tumores reprimere, & si partus hæreat, & secundæ mensæque morentur, drachmæ pondere bibi in passorice & suspiriosis dari, & contra capitis dolores in vino: difficulter patientibus adalligari, ita ut à partu statim auferantur. Plinius addit, in vino veterè ad phalangiorum morsus dari. Radicis cortex, utrique, concoquendis discutiendisq; adhibetur. & semen manducatum, vomitiones vehementer ciet.

CYTISVS.

CAP. LXIIII.

IN tanta opinionum varietate de Cytiso, licet judicare difficile sit, quis legitimus Cytisus veteribus descriptus: peritiores existimant eum esse quem C. V. Bartholomæus Marantha proponit. Ceterum nemo, uti spero, inficias ibit, qui quos hoc capite enumerabo frutices, ad Cytisi genera etiam referri debeat.

PRÆIOR interdum arbusculæ magnitudinis excrefcit, duro stipite, cujus materia flavescit, sed cor sive pars interior nigricat: is autem cum majoribus ramis & virgulis candicante cortice obducitur: tenelli ramuli toti villo obfusi: folia numerosa ramos ambiunt, terna uni pediculo inhzrentia Medicæ modo, dilutioris viciiditatis, saporis viridum leguminum, amari tamen.

Cytisus

Cytisus

Cytisus 1.



Cytisus 11.



Cytisus 111.



Cytisus 12.

H. raiin.

Cytisus 111.

ri tamen: aliquot flores extremis ramulis quasi spicæ instar nascuntur, Genistæ similes, minores, lutei, nonnihil odorati: deinde lobi Genistæ pares, oblongi, asperi tamen & hirsuti, in quibus exiguum semen, humidiusculum, nigricans, Genista minus: radix lignosa, & in diuersa tendens.

ALTER duorum culirorum duntaxat altitudinis, fruticosus, virgas proferre candidas omnino, tenues, ramosas. folia superiori similia, terna semper ex uno pediculo nascenna, minora, proflus incana, numquam expansa, sed semper quasi complicata, prominente dorso, impense amara: flores, ut in altero, extremis ramis insident superioribus forma similes, sed intensior & plane aureus color: siliquæ etiam longiusculæ, asperæ, ex purpura nigrescentes, mucione deorsum inflexo: semen paulo majus est, & subnigrius altero, radix similis.

Vterque crescit Salmanticensi agro, & alijs utriusq; Castellæ locis secundum publicas vias. Florent Iunio semen proferunt Iulio & Augusto. Seminibus inde ad amicos in Belgium missis nonnulli in suis hortis aluerunt, ubi longè majores adoleverunt: sed subsequens polica Belgicis moribus, cum negligenter, & intermitteretur necessaria cura, præsertim hiemali tempore, utrumque genus periit.

TERTIUS humanam altitudinem attingit, virgasque habet longas, non admodum fruticosas, neque lentas, nigrescente cortice obductas: folia trifolij aut mediceæ, terna simul uni petiolo inhaerentia, supina parte viridia, prona verò subrufa lanugine hirsuta, leguminum amariusculi saporis. flores ex alarum sinu reliquis majores, cum Genistæ majoribus floribus comparandi,

Cytisus terna.



Cytisus v.



comparandi, aureo colore fulgentes. Hujus semen observare non licuit, cum solum modo ad montium radices circa Calpen & Baticæ maritimis Februario florentem invenerim.

Duorum superiorum nullum vulgare nomen intellexi, iste verò ab incolis *Escabon* dicebatur.

QUARTVS cubitales & majores habet virgas, lentas, vimineas, in multas alas divisas, quas *Cytisus 1114* sparsim & sine ordine ambiunt terna perpetuo folia eidem pediculo in hæretica, viridia, eminentiore dorso, amariuscule sapore prædita: summæ virgæ in oblongam spicam florum quatuor foliis constantium desinunt, qui pili florum formam æmulantur, longè tamen minores sunt, lutei coloris, suavisque odoris & melleum quiddam spirantis: siliquæ deinde succedunt longæ, planæ, exiguum flavescens semen continentes: radix dura, lignosa, longa, rarioribus fibris donata est.

Copiosè nascitur non modò in omnibus silvis Viennensis agri, & secundum vias, sed plerisque Pannoniæ locis, & in ea Austriæ inferioris parte, quæ veteri circumscriptione Pannoniæ non continetur. Crescit & in Hercyniæ silvæ parte quæ Boëmiæ undique cingit, ubi florere incipit sub finem Junij, & Augusto plerumque cessare solet: at in Austriæ & Pannoniæ maturus. *Natalis.*

CVBITALES nonnumquam sunt Quinto virgæ, rectæ, tenues, vimineæ & lentæ: quas *Cytisus v.* infimo ad summum usque exornant folia terna etiam uni pediculo in hærentia, proximè descripto ferè similia, sed angustiora, omnino incana, amari gustus, quæ trita pingua esse videntur: ex singulis interdum foliorum sinibus ramuli prodeunt, similibus folijs, sed minoribus obstiti, ferentes in summo quinos aut senos flores loti prætensis herbæ (quam à prægrandibus siliquis nonnulli siliquosam cognominant) floribus persimiles, aurei coloris, odoris non expertes: deinde ex folliculis siliquas oblongiusculas, planas, hirsutas omnino, atque in his subrotundum semen, planum, nonnumquam tumidiusculum & rotundiusculum, durum, quod maturitate delibescit: bus siliquis excidit: radix dura est & lignosa, nigricans, summa tellure sparsa.

Frequens est toto Viennensi agro, præsertim supra Phasianorum fabricam, & multis alijs *Natalis.* cum Austriæ superioris & inferioris, tum Moraviæ & Pannoniæ locis aridis, propter vias.

Floret Julio, & subinde in Autumno usque: semen sub Augusti finem, & Septembris maturæscit, sed vermiculis illud erodentibus est valde obnoxium.

Integras sæpenumero hujus fruticis stirpes vulgari cuscuta, quam plerique legitimam *Androsæ* Dioscorid. Androsæ esse existimant, obbas inventi. *Dioscor.*

Cytisi v. species altera.

Cytisus vl.



Cytisus vl.



Cytis. species altera.

Cytisus vl.



Cytisus vl.

Cytisus vl.

2. Ejus aliud genus est multò majus, crassioribus virgis, admodum hirsutis, rectis, folijs duplo amplioribus, siliquis seu lobis majoribus ipsi etiam flores colore magis aureo rutilant.

Iuxta sepes in Pannonia & Austria nascitur, sed rarius est, & minus obuium superiore. Illius etiam semen vermiculis obnoxium.

SEXVS pedalis, raro cubitalibus assurgit ramulis, tenuibus, omnino inanis: quos exornant terna semper folia, brevi pediculo inhzrentia, quorum medium duplo longius est reliquis, cinerei & canescentis coloris, adstringentis verò & linguam exsiccantis saporis: ramusculi ferè ab imo ad summum per singulorum foliorum exortus, floribus aureo colore fulgentibus, jucundi odoris, oouisti sunt, binis aut ternis simul nascentibus ex molli quadam, & candida lanugine hirsuta vaginula, similis cum superioribus formæ, sed minoribus. Semen non observavi.

Invenitur varijs Hispaniz locis, præsertim Bætica: sed nusquam abundantius videbam quàm Valentino regno, ubi plurimus ejus usus est: nam illius ramis nudis & à suis folijs liberis supra regetes, ab his qui bombyces alunt, sparsis, jam saruri moti folijs bombyces, sericea sua stamina his ramis advolvunt, que deinde à muliereulis & puens explicantur. Valentini *buga*, & *boxa blanca* appellant.

ALIQVOT habet Septimus ramos humifusos & sparsos, tenues, lenos, fractu contumaces, qui nullis aut certè rarissimis folijs sunt obiti, multos autem ex lateribus ramulos proferunt, tenellos, hirsutos, in quibus folia longis pediculis nixa, terno semper numero, breviora

viora quam in Quinto genere, elato dorso, supernè viridia, infernè cana lanugine pubescentia, amarulculi saporis, & herbacei odoris: ex alarum in extremis ramulis, & per totos interdum ramulos sparsarum sinu prodeunt terni aut quaterni simul juncti, nonnumquam singulares flores, Quinti flori forma similes lutei coloris, qui tamen dum marcescere incipiunt, aureum colorem aded sativum contrahunt, ut purpurascere videantur: folliculi, unde flores emergunt, pallent & lanugine pubescunt: siliquæ planæ & hirsutæ subfuscum & exiguum semen continent: radix dura, lignosa, juxta quam tamè per terram sparsa subinde fibras agunt.

Spontè provenit silvula quadam ad Lachn pagum primo ab urbe Vienna militari, & ple- Natalis
risque alijs locis urbi vicinis: crevit etiam in utriusque Pannoniæ silvis, & in Interamni ul-
tra Dravum flumen, Maturius floret superioribus Pannonicis, Maio videlicet, nonnum-
quam etiam April, & novos interdum ex ramulis flores per totam deinde ætatem profert.

2. SEIO & hujus generis alia species invenitur pedalis virgis, renuibus, viridibus, supinis Cytisi 112.
& humi fuis, quas ambiunt similia folia: flores etiam pares extremis virgis quini, seni, aut Sua alia.
plures simul congesti innascuntur, nulli autem per virgas sparsi ut in superiore: siliquæ & fe-
mina non differunt: virgarum, foliorumq; pars inferior & siliquæ molli hirsutia pubescunt.

Hunc in folijs Pannoniæ silvis Maio mensè florentem inveniebam.

SEIO & alios aliquor frutices Cytisi nomine proponi: quia verò diligenter ab alijs de-
scripti sunt, hic subiiciendos non æstimavi, sed eos tantum quos à nemine antè observatos,
& Cytisi nomine comprehendi posse putavi. Quartè tamen historiam noster Lobelius in
adversarijs prodidisse videtur.

PURGO Cytisi folia refrigerare, tumores inter initia discutere, sicum pane trita illinan- Cytisi facili-
tate.
tur: decoctum potu urinam ciere, Dioscorides scribit. Columella lib. v. cap. ultimo, Plinius
lib. xiii cap. xxiii. addunt ex Aristomacho Atheniensi, nutricibus in defectu lactis aridum
& in aqua decoctum, potui cum vino dari: firmiores, celsioresque infantes fieri: & alia ple-
raque ad Cytisi culturam, & pecorum ex eo pabulum, pertinentia.

COLUTEA SCORPIOIDES.

CAP. LXV.

CYTISO cognatæ sunt ex stirpes quas hoc & proxime sequente capite describam, ideo-
que ponè Cytisi genera collocandas esse exstimavi.

Colutea scorpioides. elatior

Colutea scorpioides. humilior.



MULTAS Prior ex una radice fert bicubitales, interdum & tricubitales virgas, graciles, Colutea scor-
pioides 1. elat-
ior.
satis tamen firmas, in frequenter ramos divisa: folia alata septem aut novem uni costæ in-
brextenna, bina semper ex a. verso sita, uno impare extremam alam occupante, coluteæ folijs
similia

Colutea scorpioides altera.



Colutea scorpioides altera.

Marala.

Colutea scorpioides altera.

Polygala Valentina.



Marala.

Polygala.

similia, sed minora, saturatè virentia, ingrati admodum & amari saporis: singulis ramulorum alis prodeunt tenues pediculi sustinentes plerumque binos, nonnumquam ternos flores Coluteæ similes formâ & colore, sed minores & nonnihil odoratos: filiquæ teretes, oblongæ, quibusdam veluti articulis distinctæ, oblongæ, lævia, subfusci coloris & ingrati saporis semina, singula singulis articulis inclusa habent: radix lignosa est, longe lateque dispersa.

2. Est & alia humilior, humidè diffusa, neque foliorum numero, aut situ, aut formâ, neque florum formâ & colore, à superiore differens: sed hujus virgæ palmares aut pedales duntaxat, hieme interdum marcescere solent, & novo vere denudè à radice novæ germinare: filiquæ & semina paria: radix similiter dura & lignosa late se spargit, & fibris aliquot donata est.

Sponte nascitur ad Galatæ vicinias, Viennæ montibus abundè, tum etiam in nonnullis Pannoniæ montanis locis. Priorè etiam in Belgicis horris jam diu antè conspexerat: & ejus Pena & Lobelius in Adversarijs meminerunt, in Valena Mompellani agri silvâ nasci affequentes. In hortis culta longè major evadit. Posteriorè nunquam antea observaveram. Sed & ea in hortis culta paulò major fit, & plerumque virgæ hieme retinet. Florent Maio.

ALTERA natitur radice crassâ, & lignosâ, lentâ tamen, & flavescente cortice obductâ, multisque fibris præditâ: ex qua plures singulis annis incunte vere novas producit virgæ pedales, nonnumquam etiam cubitales, lenras, vimineas, læves, virides, & in his temerè sparsa alata folia, quina, septena, aut novena uni costæ inhzrentia, exsiccantis primùm gustus, deinde nonnihil acrimonie in summis labris relinquentis: flores in foliorum oblongis virgulis inhzrent copiosi, leguminacei, in orbiculatâ coronam dispositi, flavi, nullo grato odore commendati: quibus succedunt articulata distinctè filiquæ superioribus breviores, semen in singulis articulis continentes, Polygalæ valentinæ modo.

Crescit in montium, quâ à Danubio & Galatibus illi imminenti ad Alpes extenduntur, radicibus, inter vepres & ad vinetorum margines. Floret Junio, nonnumquam etiam Maior: subsequens hiems virgæ corrumpit.

POLYGALA VALENTINA.

CAP. LXVI.

FRUTICOSA est hæc planta, binos palmos alta, multas serens virgulas lenras, sparti aut junci instar: folia singulis costis inhzrent impari plerumque numero, quina, septena, aut plura, Lenticulæ similia, magis ramentosa, & ad rutæ colorem accedentia, adstringentis & ingrati gustus: flores melliloto similes, lutei, coronæ in modum, summis virgulis (quæ magnâ ex parte nudæ sunt, & maturo semine exarescere solent) insident: incurvæ, deinde, longæ & teretes succedunt filiquæ, tribus aut quatuor internodijs distinctæ, quæ semen continent durum, oblongiusculû, nigrum, ingrati saporis: radix longa, dura, lenta, crassiuscula est.

Perpetuè

Perpetuò virens est: floretque April, Maio, & Iunio, semen verò Iulio maturum. Inveniebam etiam Septembri florentem, & calidioribus locis maturè admodù, videlicet Februario.

Salmanticensi agro frequens est secundum vias: Granatensi, Murciano, & Valentino regnis, locis arenosis & collium declivibus observabam. Apes ex ejus flore plurimum mel colligere creduntur.

Vulgo Salmanticensibus *Coronilla de Rey* dicitur, quasi fertula regia, & istic officinæ Meliloti vice utuntur. Granatenses & Murciani *Lentejañela*, id est, Lenticulam, Valentini Polygalam appellant.

In collibus silvosis Valentiz Hispaniz vicinis invenitur & alia huic admodum similis, *Polygala* 11: sed majoribus virgis, firmioribus, & utcumque rubentibus: majoribus etiam, vitidioribus, frequentioribus & catenosis folijs: majoribus & dilutioris coloris floribus: siliquis etiam paulò crassioribus: semine verò omnino simili.

Eiusdem urbis item maritimis Tertia, oblongis, lentis, fungosis seu medullosis, & omnino vitentibus virgis prædita, quas rata obsepiunt folia, superiotibus adhuc crassiora & molliora: flos Secundæ patet: semen observare non potui.

Vitet etiam perpetuò uttaque: sed in collibus nata diutissimè floret, Vere & Autumno. Prima & Secunda, ante meam ad Cæs. Maximilianum 11. profectiorem, in Belgicis hortis alebantur.

Porro Polygala Dioscoridi & Plinio gustu est adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit.

ANONIS NON SPINOSA, sive MITIOR.

CAP. LXVII.

ALYRT Silesiaca præta Anonidis quoddam genus à vulgari diversum, quod ab alijs minime observatum existimo.

Anonis mitior 1:

Fraxinella.



MULTOS annuatim ex radice durâ, lignosâ, & perenni fert cubitales, nonnumquam longiores furculos, rotundos, lentos, firmos tamen, ramulos, molli lanugine obductos: multa folia alternatim caulem latâ basi amplectentia, plerumque tetra ex eodem pediculo prodeuntia, interdum singularia, molliora & ampliora quàm vulgaris: summæ virgæ & rami desinunt in oblongam spicam florum vulgati quidem similibus, sed coloris magis languinei: fert deinde siliquas vulgari per similes, & ipsum etiam semen. Tota planta lento quodam humore graviter & hircinum virus olente obûta est, Fraxinellæ ferè odoris instar: nullo autem aculeorum vallo munita est.

EST & aliud genus huic adeò simile (præsertim si utrumque in hortis colatur) ut ante quàm flores explicentur, nisi diligenter inter se conferantur, vix discerni queant: paulò tamen pin-

Anonis mi-
tor 1. par-
vula flora.

Anonis mi-
tor 11. luteo
flora.

guis deprehenditur, nec adeò graviter odoratum: præterea ubi sponte nascitur, candidus est: ejus item flores, qui lutei sunt, brevioris spica nascuntur.

*Trifolium
suisum.*

Prioris semen è Silesia nobis missum est Trifolij majoris & fœtidi nomine, plantæ etiam ex eo natæ. Alterum frequens nascitur eum in Narbonensi Gallia, ubi primum obtinueram, tum in Hispaniâ & Lusitaniâ. Floret utrumque genus Junio & Julio.

Natrix Plinij

Cum totâ quasi facie Ananidem vulgarem, exceptis spinis referant hæ plantæ, licebit eas nominare Ananides non spinosas sive minores. Posteriorem nonnulli Hispani Ciceris silvestris genus esse autumabant: Pena & Lobelius Plinij Natricem esse censent, ejus lib. xxvii. Nat. Hist. cap. xii. meminit: sed ejus Natricis radix duntaxat hirci virus olet recens eruta, non tota planta. Cumque nullam plenioris descriptionem addat, difficile esse existimo, quænam illa Natrix sit, judicare.

Fraxinella.

OLET etiam hircum vulgò Fraxinella appellata, cujus radix Didami albi nomine in officinis nota est, & usurpatur. Illius passim in Pannonicis silvis, Viennensique saltu, duo genera inveniuntur: Vnum elatius, oblongiore florum spica, saturatioribusque floribus & nigrioribus folijs: Alterum humilius, brevioris spica, dilutioribus floribus & folijs: Vngari

Varietas.

Didamus & *æarus* sic vocant. Crescit & in Francofordiano saltu, in quo aliquot plantæ repetitæ niveo flore præditæ.

DORYCHNIUM HISPANICVM.



*Dorycnium
Hispanicum.*

FRUTICOSA & ramosa hæc est planta, pedem aut amplius alta, tenues producens virgas, incanas, flexibiles: folia oleæ albicantia, minora & breviora, terna simul, interdum etiam plura ab eodem exortu prodeuntia, in novellis ramis, qui nondum florem protulerunt admodum frequentia & confertim nascentia, adstringentis gustus: flos copiosus, parvus, trifolij pratensis æmulus, albus, veluti in capitulum congestus summus virgis insidet: quo decedente, quaternæ, quinæ, aut plures interdum succedunt simul junctæ valvulæ,ervi magnitudine, rufescentes, in quarum singulis, ut plurimum singula semina continentur verticillaria, qualia penè Trichynali parali, ejusdemque formæ, coloris & magnitudinis. radix dura & lignola nigricat. Perennis est, nec sua folia abijcit, nisi novis receptis.

Natalis.

Exit copiosè Salmanticensi agro, & alijs Hispaniæ locis, secundum vias & in culis: memini & Narbonensi agro videre: frequentissimam etiam non modò circa Viennam Austriæ, sed plerisque Pannoniæ locis, calidiore tamen regione magis incanam. Floret Maio & Junio: semen valvulis hiantibus exilit Julio.

Quotquot erant Salmantice rei herbariæ studiosi, Dorycnium vocabant, eo quo istic verisabar tempore, quo etiam nomine apud Mompelianos, ante multos annos donatū fuit.

Anguillara

CAP. LXVIII.

Dorycnio congener planta.



Anguillara etiam hanc sententiam amplecti videtur, Opiniorum libro XIIII. Ejus semen à C. V. Vlyffe Aldrovandro aliquando missum fuit Trifolij albi appellatione; & ex illo plantae natus. Salmanticense vulgus *mýedega* vocat.

Trifolium album.

Ceterum, licet cum Dorycnio Dioscoridi descripto nonnullas notas communes habeat, ejus tamen historiae per omnia respondere non videtur.

Hic ferè similis planta Valentino regno & quibusdam Bæticæ locis nascitur, cubitalibus & vixinis modo lentis virgis, superiore gracilioribus, brevioribus & latioribus folijs, brevique pediculo ternis aut quinis simul junctis, ramulos amplectentibus, falsi & nonnihil acrimoniz obtinentis gustus: oblongi ramusculi, ternos, quaternos, aut quinos flores sustinent, Medica majores, viridis coloris: alioqui tota planra candidior est superiore, imò rotincana: ejus neque semen, neque radicem observabam: sed ramulum qualem equirando abruptum potui, exprimi jussi, & hic apposui.

Dorycnis est genus plantæ.

VERUM porro Dorycnium somniferum esse scribunt, & copiosius haustum mortem adferre. An verò planta, hoc capite descripta, soporifera sit, neminem periculum fecisse arbitror.

GENISTA TINCTORIA.

CAP. LXIX.

Genista tinctoria Hispan.

Genista tinctoria vulgaris.



Genista tinctoria Hispanica.

quidamque.

AD duorum cubitorum altitudinem crescit interdum hic frutex, nudo stipite, enodi, recto, digitali crassitudine, candicante cortice testeo, qui in multiplices brevesque ramos, tenellos & fragiles summa parte dividitur: hos ornant folia Lini aut Thymelææ, frequentia, supernè virentia, infernè verò incana & argentei planè splendoris, gustus inirio exsiccantis & nonnihil adstringentis, deinde subamani: flores summis ramulis nascuntur spicati conge- sti Genistæ tinctoriæ Germanicæ similes, lutei. Tota planra elegans est aspectu.

Quo tempore floret, sub ea crescit Hæmodi quoddam genus elegans, pedalis altitudinis, brachialis inrer dum crassitudinis, multis floribus à medio scapo ad summum usque exornatum, magnis, oblongis, luteis, extrema parte hiantibus & in quinque partes divisus: totum humidum est, pingui oleagineosaque materia turget.

VISQVAM hunc fruticem conspiciebam, quàm Murciano regno secundum vias nascentem, & Martio mense florentem. Incolæ stirpem ipsam *scopa* appellabant, Hæmoderum autem sub eâ nascens, *yernatera*, quia forsitan si vaccæ eo vescantur, ad venerem exciratz taurum appetunt.

CETERVM suffruticem illum qui à tingendi usu, floris Tinctorij, vel Genistæ tinctoriæ nomen

nomen invenit, in Hispanijs videre non memini: at in Austriz & Pannoniz silvosis locis, & ad montanorum prarorum margines frequentissimum conspexi. Vngaris *Felső erceg* dicitur. Frequentissimus etiam in omnibus pratis quibus proximè silvæ, cum Francofordiano agro, cum plerisque alijs Germaniz locis.

SPARTVM GRÆCORVM.

CAP. LXX.

Genista 26.
sp.

OMNIBVS notissimum, Spartum, sive Spartium Dioscoridis, esse Plinij Genistam, sive Hispanicam & Africanam odorato flore, virgulis planè junceis & fractu contumacibus, quibus rara quædam, dum floret, inhxrent folia brevi decidua, ut tota deinde planta sine folijs conspiciatur.

Spartium Dioscoridis Genista Plin.

Spartium 11. Hispan.



Illius historiam, cum à plerisque diligenter & accuratè sit perscripta, hic proponendam non duxi: sed si alia quædam ejus genera, quæ in Hispanijs observabam, tanquam nova, & à nullo adhuc exhibita, oculis subicerem, operæ precium me facturum existimavi.

Spartium 11.
Hispan.

EST verò unum cubitali plerumque stipite, pollicem crasso, scabro & striato cortice tecto, qui in plures cubitales virecentes & striatos ramos dividitur, & hi deinde in junceas, striatas, virides virgulas, quæ novellæ adhuc & primum germinantes, aliquot folijs exornantur, statim atque planta florere incipit deciduis, ut tota deinde *ἀφυλλος* conspiciatur: è virgularum lateribus prodeunt longi pediculi, è quibus dependent aliquot exiguæ flores, glycyrrhizæ vulgaris aut trifolij prærens floribus penè similes, lutei, inodori: succedunt cartilaginei, rotundi sculi lobi, vulgari fabæ quæ in jumentorum pabulum cedit, perisimiles, ex flavo rufescentes, in quibus unicum maxima ex parte semen (raro bina) continetur, durum, nigrum, exiguo reni simile, quod in lobis agitata aut concussa crepitat, & sonitum edit: radix dura est & lignosa.

Spartium 11.
Hispan.

ALIVD longè majus, & hominis altitudinem superans invenitur virgulis priorè renerioribus, lentioribus, & magis obsequenribus, flore ejusdem cum superiore formæ, sed paulò majore, & omnino albo: lobi etiam conveniunt, minores tamen sunt & minus semen continent.

Natalis.

Primum varijs Castellæ utriusque locis crescit arenoso solo, & Maio floret, semen maturum est Julio. Alterum Gadibus duntaxat, & locis vicinis aurà marinà perfatis, mihi conspectum.

Spartium 111. Hispan.



Chamaenista 1.



specum est arenoso & sterili solo, suis floribus ooultum Februario. Lobos observare non potui in ipsa planta: sed mihi deinde ab amico missi sunt ex Hispanijs.

UTRUMQUE genus Hispani *retama* vernaculo sermone appellant: Genistam verò odoratam *hiniefla* & *yniefla*: vulgatem & Septentrionalibus regionibus peculiarem, quæ istic etiam plerisque locis nascitur, *sebas*, quod illà, quemadmodum nostrates, scoparum, quibus zdes purgant & everrunt, loco utantur.

CETERVM hanc plantam ad Spartum, quod Dioscorides *amurion* vocat, referendam omninò existimo. An verò ipsam facultatibus prædita sit, non intellexi.

De Sparco autem Hispanico junci folio, de cujus uli Plinius lib. x. x. cap. 11. Natur. Histor. prolixè agit, postea scribemus.

CHAMAENISTA.

CAP. LXXI.

GENISTAE illius, quæ per universam *Genista vulg.* Græ Germaniam, Galliam, Angliam atque Belgicam vulgatissima est, cuiusq; flores nondum expansos Belgæ murà condunt, & caparum loco edunt, spontè nascentis nulla vestigia observare potui in Pannonia & Bohemia, neque totà Austrià & Moravià. Sed duo Chamaenistæ genera plerisque locis sese obtulerunt.

PRIMUM multis palmaribus, ioterdum etiam pedalis aut majoribus virgulis humi diffunditur, teretibus, lencis, striatis, virentibus, & in aliquot ramulos divisis: per quos confuso ordine, & quasi temerè sparsa sunt foliola, bina, terna aut quaterna, ab eodem exortu & rubetulo prodeuntia, Genistæ vulgaris Germanicæ folijs similia, eminentiore dorso, & quasi complicata, superne viridia, inferne nonnihil incana, amari sculi gustus: ex illorum alis singuli aut bini flores lutei, quatuor foliolis constantes, Genistæ germanicæ florum æmuli, sed minores, nullo interdum, aut certè perexiguò odore præditi, nonnullis locis satis odorati, nascuntur: quibus deinde succedunt plantæ siliquæ, hirsutæ, exiguè flavescens semen Cyrtis generibus simile continentes: radix est dura, lignosa, aliquot fibris donata: sed & virgulæ secundum radicem, qua terrà integuntur, plerumque fibras agunt.

Nascitur multis Pannoniæ locis ad viarum & silvarum margines, editis, siccis, atque desertis nonnumquam agris. In cultis & inter vepres aliquando magis luxuriat, & in maiorem altitudinem excrefcit. Floret Maio, quandoque etiam Aprili.

ALTERIVS, quæ plantæ eoque altero ex altero nascente est folio, quod deinde in cauliculum convertitur, historiam, cum ab alijs sit prodita, hic retexendam non æstimavi.

Hanc planrulam olim apud Helvetios cum istac iter facerem, & quibusdam Germaniæ

locis colligere memini. Deinde in Pannonià sponte & copiose nascentem observabam in silva



filvâ Nemetliwywar III^{ta} Dn. Balhafaris de Batthyán urbi & arci munitissimæ proxima, atque supra Sopronium urbem vulgo *Deimbürg* dictam, Austriacus: sed omnium affluentissime inter Sakruinyá III^{ta} Comitissæ de Zrinio minutissimam arcem, & Fridaw Magnifici Dn. Michaëlis de Zek arcem in Tollibus: & nunc proximè in silva quadam militari circiter infra Francofortum, ad sinistram Mœni fluminis, ubi etiam frequens Primum genus, & pleræque aliz stirpes.

TERTIVM porro elegans quoddam genus, Secundo quodammodo affine, folijs Valentini regni locis incultis & alperis observabam, quod prætermitti non debuit.

Chamægenista peregrina.

Vix palmari magnitudine assurgebat hæc Chamægenista, admodum tamen fruticosa, folijs Chamelæz proximis, brevioribus, duris, & carnosis, aliquantulum in ambitu sinuosis & crispis, rigidiusculisque, uno ex altero è medio folij nervo prodeunte, quemadmodum in superiore, interdum etiam binis ternisve simul exorientibus: hic verò nervus paulatim intumescit, & in ramulum convertitur, sic cum tota planta foliosa sit, & non nisi folijs constare videatur, fit tandem admodum fruticosa: in extremis istis folijs quini, senive, aut plures flores simul juncti, ex villosis calyculis nascuntur, minores quàm in Genistâ, aut rei plane coloris, nisi bina inferiora folia incana lanugine pubescerent. Florent è duntaxat colligebam quod dixi loco, mense Martio. Postea tamen reliccaras plantas nactus sum pedales aut ampliores.

AVSTRIACI Vngaris vicini Priorem *Gelbe Fle* hoc est, trifolium luteum appellant: Aliteram Germani *Erbpfennig* id est terrestrem Genistam, nonnulli Genistam sagittalem. Tertiz nullum vulgare nomen intellexi.

CETERVM in Pannonia etiam vulgarissima est ea Genistæ species, spinis & aculeis horrens, quam nonnulli Genistellam spinosam nominant, Vngari *Iglacze*, hoc est, Aculeatam, Germani *Stechend pfennig*. Frequens est & circa Francofortum & multis alijs Germaniæ atque Belgicæ locis.

ANONYMOS COLVTÆÆ FLORE.

CAP. LXXII.

FLORVM similitudo & aliz quædam nocte faciunt, ut hanc *Arcturum* quidem, sed elegantem, & à nemine adhuc, ut arbitror (præterquam à me in Pannonicis) descriptam plantam superioribus subjungam.

RADICEM autem habet longè latequè summa tellure serpente, lignosam, lentam tamen, & subinde capillares fibras agentem, ex quâ prodeunt multi lentu & obsequentes ramuli,

Arcturus Coluteæ flore.

Ananymos flore coluteæ.



multi, dodrantes, & circa exortum, qua terrâ integuntur, fibras plerumque agentes: folia in his buxi æmula fere, carnola, viridia, paulo tamen magis mucronata, confuso ut plurimum ordine disposita, gustantibus ingrata primum, deinde amara & acris: in extremis ramulis prodeunt inter folia flores terni aut quaterni, oblongi, majore ex parte odoris expertes, nonnullis autem locis suavem & narcissinam quandam fragrantiam referentes, tribus folijs constantes, quorum duo alba sunt, & alarum modo sursum expansa, ex alba galeola illorum exortum ingegente, tertium in longiusculum veluti tubulum convolutum, sursum per longitudinem apertum est, extremitate concavâ & incurvâ, lutei coloris, & per vetustatem omnino interdum purpurascens aut rubescens: floribus succedunt latæ & compressæ siliquæ, Thlaspi latifolij thecis paulo minores, virides, quæ bina plerumque (nonnumquam unicum tantum) continent grana, exigui ervi magnitudine, nigricantis ex cineraceo coloris, hirsuta, & veluti quoddam animalculum ementia, Polygalæ vulgaris majoris rubræ (de qua postea) semini haud ab similia, minuta, quæ, aperientibus sese per latera loculis, sponte decidunt.

2. Interdum etiam pro loci natura floris colorem variareprehenditur: nam bisia illa folia alarum instar sursum expansa, galeolaque eorum exortum tegens, alba non sunt, sed pulcherrimè ex purpura rubent, tertium autem ve-

*Linnaeus C. f.
varietas.*

luti in tubulum convolutum flavescit, ejusque extrema pars aurea est.

Frequens est Prior non modò in montibus Calenberg, Medeling, & Badensibus thermis imminetibus, sed & in alijs ad Austriacas & Striaticas Alpes excurrentibus, qui omni Resiniferarum arborum genere integuntur, inter faxa: plurimis etiam Pannoniæ locis est obvia, veluti apud Posonium, Sopronium, & Zolonock. Altera multò rarior inventa. Floret verò utraque Aprili & Maio, semen prius (nam alterius non observavi) Junio perficitur.

NVLVM nomen huic suffrutici imposui, cum dubitem an à veteribus fuerit observatus: præterea ut studiosius ansem præbeam diligentius veteres Auctores excutiendi, & apud illos aptam aliquam appellationem inveniendi, ne perpetuò *ἀνώνυμος* maneat. A rusticis negligitur, propterea nullo illam nomine dignantur: quidam tamen, à perpetua viriditate, *ἀνώνυμος* appellari dixerunt.

SPINOSI SYFFRVTICES ET Ε'ΠΑΛΛΟΚΑΤΑΟΙ.

NUNC serè peracta Arborum, Fruticum & Suffruticum descriptio, opeteprecium me salutarum existimaui, si spinosos Frutices & Suffrutices, easque Stirpes quæ caducæ per se consistere nequeunt, sed aliarum admiculo egent (*Théophrastus ἰσχυροκαταλούς*, vel ἰπαδοκαταλούς appellat, *Gæa amplexicaules* vocat) adjungerem. Initium autem faciam ab illis Suffruticibus, qui *Gemistæ* flore sunt præditi.

ASPALATHVS ALTER.

CAP. LXXIII.

TAMETSÍ sciam hunc fruticem non esse legitimum Aspalathum alterum: quia verò tale nomen à plerisque obtinuit, immutandum non putavi, præsertim cum ad quem fruticem veteribus descriptum referri debeat, adhuc ignorem, nisi fortè Scorpij generibus adscribendum esse quis censeat.

TOTA PLANTA cubitum non excedit, fruticosa admodum & ramosa, multis horrens spinis deorsum inflexis, firmis, acutis, in quibus enascuntur pusilla folia lentis magnitudine, viridia, qualia etiam (sed teneriora) fert in novellis ramulis, quibus subfunt recens nati aculei: flores in firmioribus & rigidioribus spinis, terni, quaterni aut plures simul nascuntur, Gemistæ similes, minores, coloris nunc lutei, nunc pallidèceti: semen in parvis siliquis exiguum.

*Aspalathus
alter.*

Δ Λ Ι V

Aspalathus alter 111.

Aspalath.
alter 111.Aspalath.
alter 111.

Scorpius.

Scorpius.

Scorpius.

Scorpius 1.

Scorpius.

Scorpius 1.

Scorpius 111.



ALIVD ejus generis robustius, & aliquantum firmius, nonnumquam aliis excrefcens, cujus flos perpetuò pallidior est, alioqui non multum priori dissimile.

TERTIUM genus ad cubiti nonnumquam magnitudinem accedit: plerumque tamen minus est, & pedalis tantum altitudinis, totum etiam tenerius: ramuli in multo plures spinas divisi, istæ denuò in alias, sic ut singulæ spinæ totidem Abrotoni multida folia videantur, nisi aculei obfisterent, qui, à negligentius considerantibus, vix animadvertuntur: Vere ex ramulorum lateribus exigui alij prodeunt ramusculi cani & hirsuti, quibus adnata sunt mollia & incana lentis folia, majora quàm in primo genere: in summis illis ramusculis flores prioris similes, paulò majores, lutei nascuntur.

Crescit Primum, cum in Cantabris superato Pyrenæo saltu, tum varijs alijs Hispaniæ locis, & Narbonensi Gallia. Secundum in Castella videri tantummodo observabam. Tertium in Cantabris duntaxat tertio à Viçtoria urbe milizari, ad radices Pyrenæorum, quæ Hispaniam spectant.

PRIMUM genus ab Herbariæ rei studiosis Salmanticiæ & Mompelij Aspalathus alter vocabatur, vulgo Salmanticensium, & aliorum, apud quos nascitur, Hispanorum *palacio*: secundum Castellanis *aulaga*: tertium Cantabris *ballada*.

FLORIBUS prioris cum saccharo fermentatis, Salmanticensis ad firmandas & restaurandas collapsas vires utuntur.

SCORPIUS. CAP. LXXIII.

DVO plantarum genera, quæ plurimum ad Scorpij, quem Gaza Nepam interpretatus est, historiam accedere videntur, in meis peregrinationibus observabam.

PRIMUM cubitali aut ampliore altitudine assurgit, multis virgis ex atro virgibus, striatis, densissimo spinarum vallo obstitis fruticosum, quæ deinde spinæ alijs minoribus sunt circumscriptæ: folia nulla, nisi primo vere, apparer, brevi decidua. Flores Genistæ minores pallidi, interdum verò adeò rufescentes, ut rubere videantur, præsertim sub Autumno: siliquæ deinde succedunt breves, cylindraceæ, magna ex parte inanes, aliquando tamen ferentes exiguum semen pallidum aut subfuscum, ut Genista vulgaris Septentrionalium: radix singularis in alias tenues se spargens, & interdum latè se propagans.

Floret Maio & Junio, & quandoque totâ æstate: circa Autumnum verò, denuò floribus onusta conspicitur, eo quæ tempore saturationes & magis rutili sunt, ut plurimum, flores.

ALTERUM pedis altitudinem raro superat, totum densissimis spinis horrens, quæ non confuso ordine ut in superiore nascuntur, sed seriem quandam servant, & semper contrario inter se exortu binæ nascuntur, virentes quidem, sed languidius quàm superiotis, neque aliæ ex alijs summis ramulis in hærent bini aut terni

Scorpius 11.



terni flores superiori similes, lutei coloris, mens Martio quo tempore exiguas brevesque filiquas, vel potius semina erui magnitudine, inclusa membranâ quadam multa incanaque lanugine hirsuta, deprehendebam densissimis ipsius plâte spinis occultata, ut ex superiore ætate deciderant: adeo verò canescebant, ut initio araneorum telas esse exultarem: radix singularis, sed in plures deinde propagines sparsa, dura, & lignosa est.


Primum variis Belgicæ, Germaniæ, Galliæ, Hispaniæ, Angliæ locis conspexi, nusquam tamen frequentius, quàm in cultis illis locis supra Burdegalam, Bayonensi itinere, & apud Cantabros Pyrenæorum jugorum accolas, ubi tantâ magnitudine assurgit, ut duorum hominum altitudinem æquare nonnumquam viderim, crassitudine verò brachium humanum. Alterum collibus Granatæ vicinis itinere Condubentis duntaxat, nec usquam alibi mihi conspectum. An porro Echinopoda, cujus doctissimus vir Honorius Bellus in alterâ ad me epistolâ meminit? plurimum certè ad illam mihi accedere videtur.

GALLI primum genus *lanc morin*, Aquitani *jeuge*, Belgæ *Cospeidens* appellant: nullum vulgare nomen Hispanici intellexi. Alterum genus Granatenses *Molino* vocant.

Quas facultates Scorpius planta habeat, nemo tradit. Solus Plinius aduersus sui nominis animal valere auctor est.

ERINACEA.

CAP. LXXV.



PLANE nova, & tota elegans est hæc planta, dodrantalis, in orbem per solum diffusa, multis spinis virentibus, sive aculeis horrida: flores Genistæ, ex cæruleo purpurascentes, minores, calyculis inclusi hispidis, villosis, omnino ferè incanis, bini aut terni simul semper conjuncti: foliola interdum, dum floret, producit, sed rarò, eaque perpauca, Lenticulæ similis, quæ cum brevi marcescant & decidunt, tota planta maxima ex parte sine folijs spectatur, & multiplici spinarum vallo Erinaceum in se convolutum repræsentat: radix lignosa & magna est pro plantæ proportionem.

Nascitur regno Valentino, affluenter verò circa Siete aguas oppidulum, septimo ab urbe Valentia miliarî, Madritiano itinere, asperis locis & secus vias. Aprili florentem observabam & eruebam iter istac faciens anno M. D. LXV. semen observare non potui, mense sequente in Belgicam reuersus.

INCOLÆ *erice* vocant, hoc est Erinacea, quoniam erinaceum animal terrestre, dum in orbem se contrahit, aut marinum, aculeorum & spinarum vallo planè æmulatur: quæ adeo causa fuit, ut illi Erinacæ nomen inderem, donec còmodius aliquod ex veteribus Scriptoris dare possimus. An verò incolæ ad medicû aliquem usum adhibeant, non intellexi.

TRAGACANTHA ALTERA.

CAP. LXXVI.

TRAGACANTHÆ, quam aliquando Massiliæ florentem, & fructu præditam observare nemini, simillima est hæc planta, fruticosa admodum, multos pedales habens ramulos flexibiles, latè circumquaque sese diffundentes, candicantes, &, dum adhuc tenelli sunt,

Tragacantha altera, Poterium fortè.

Χαλκυσ Anguil. Poterium Dalechampi.



sunt, lanuginosos, multis longis canescentibus spinis horrentes: foliorum plurimè simul junctæ aîæ, Lenticulæ aut Tragacanthæ proximæ, exiguæ, candidæ, lanuginosæque primo verò per intervalla ex eunt, dulcis saporis: folijs hieme decedentibus, nervi illi medij quibus folia inhærebant, in rigidas & acutas spinas evadunt, ut eo tempore tota planta sine folijs conspiciatur, contra quàm in Tragacantha, quæ hieme etiam folia retinet, nec ea abijcit donec nova sequente anno adquisierit: tum demum deciduis vetustis folijs, nervi illi medij etiam in spinas abeunt.

Istam neque florentem, neque semen ferentem vidi: sed sub ea plurimos folliculos bombycinis similes, aut Alceæ illius, quam Matthioli Hypocoum appellat, folliculis seîe pares, inanes inveni, quos ab illâ excidisse, & florem ex similibus prodire album, non magnum incolæ referbant: de semine nihil certi intelligere potui: radix lenta, longa, in multisamos divisa, nigro cortice foris obducta, materie intus candidâ, fungosâ, dulci, interior pars gummosum quidpiam & subdulce refert.

Natalis. Nasctur plurima circa Guadix, & la Venta el peral, Granatensî regno, in collibus, arido & inutili solo: nec alio loco conspexi.

Utiq; nomen. **VULGARE** nomen non intellexi. Sed cum ad eò sit Tragacanthæ similis, faciliè mihi persuaderem esse legitimum *ποτέριον*, quod ab Ionibus *μαράσα* vocari Dioscorides ait, largè fruticare, spinis horrete, spissa lanugine esse, ramulis longis mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthæ proximis, in collibus & aquosis nasci, & radicem recisam proximè terram succum gummi similem reddere tradit: cuiusque Plinius lib. xxvii. Nat. Hist. cap. xii. meminit, illam etiam à quibusdam phrynon vocari scribens.

Phrynia. **BELLONIVS** lib. i. Observat. cap. xvi. duo Tragacanthæ genera observasse refert in Cretensium montium verticibus: earum fortè altera huic similis erit. Certè Rauwolfius lib. ii. suæ Peregrinationis cap. xii. scribit tria Tragacanthæ genera in Libano monte invenisse, quorum unum meam hanc referret, alterum humilius, illi ferè simile, sed luteis floribus, quorum singuli in orbicularibus flavescenscentibus folliculis includuntur, racematim quasi in longiusculis virgulis nascuntur, tertium ejusdem penè altitudinis, pluribus virgis firmioribus purpurascenscentibus assurgens, inæana lanugine Poterij capitula sustinentibus, & putpureis floribus spectabile.

Rauwolfius tria Tragacanthæ genera observavit. **CLA. V. Dalechampi**, optimè de litterariâ re meritis, Poterium in Allobrogibus prope Mutam oppidulum Gratianopoli vicinum in silvosis convallibus reperiri ait. Sed si eam intelligit quæ ab alijs plerisque Poterij nomine donatur, vereor, ut suam opinionem legitimis rationibus tueri possit: quippe cum ea placè penitus à Tragacantha differat, & folia Pimpinellæ vulgaris, quam Germani Sanguisorbam vocant, virentia supernè, paululum candi-

cantia

cantia infernè habeat, minora & reheriora, spinas molles hinc inde per supremos surculos transuersim & oblique sparsas (cujus rei causa à nonnullis Pimpinella spinosa appellatur) & radicem tenuem, duram, exsuccam. Poterium verò teste Dioscoride & Plinio frutex est longos habens ramos, spinis horridos lanugine spissa rectos, Tragacanthæ proximis, radices longas admodum, nervosas & firmas, quæ proximè terram recipiunt dant suctum gummi similem. Pimpinellam illam spinosam aliquoties sanè mihi semine naram, diligenter in horto & scissilibus conservare volui, sed semper hiems subsequens abstulit. nonnumquam etiam mihi missum ejus semen Screebes Theophrasti nomine: & vulgo adhuc ipsam plantam in Creta vocari *σκιόβαν*, scriptum. De illa consule Honorij alteram epistolam, quæ ad calcem harum Observationum adjecta.

Anguillara opinionum lib. viii. videtur Pimpinellam illam spinosam ad *καλάνη* sive *Libanum* Ætariam Theophrasti referre. Doctiss. autem Rauwolfius, qui eam in Libano monte etiam invenit, scribit libro & cap. jam memoratis, ab incolis *Bellam* vocari.

STRABO scribit circa novam Carthaginem plantam quandam esse, de cujus cortice telez pulcritimè conficiantur: an hæc mea sit, ignoro, nullam enim qualem ille describit, dum istic iter facerem, observabam, aut istic nasci ab incolis intelligebam.

CETERVM Dioscorides Poterij radices tulas, præcis nervis & vulneribus glutinandis *Poterij facili* illini, decoctum ejus nervorum affectibus prodesse, testis est. Eisdem facultates tribuit illi *liban.* etiam Plinius, & addit, in vino potum, rubetum veneno auxiliari.

RHAMNUS.

CAP. LXXVII.

Deo Rhamni genera Theophrastus lib. i. cap. xvi. Histor. Plant. facit, album & nigrum, utrumque aculeigerum, & folijs perpetuis. *Rhamni g. n. d.*

Rhamnus t.

Rhamni i. altera species.



Dioscorides tria genera describit, nisi mendosum sit exemplar, ut periclitissimus Anguillara suspicatur, qui tertium adscititium esse putat. Et sanè, cum Dioscorides easdem facultates suo Paliuro tribuat, quas Theophrastus Paliuro libro & cap. supradictis descripto: verisimile est tertij Rhamni descriptionem quæ apud Dioscoridem extrat, ad Paliurij ejus historiam revocandam, pleraque enim notas habet cum Theophrasti Paliuro communes.

EST verò Rhamnus frutex faciendis sepius idoneus, rectis virgis, in multos ramos divisus, candidis, quæque validis ac firmis aculeis horrent: folia plerumque quaternis aut quina ad singularum spinarum exortus nascuntur, oblonga, subpinguia, suboblida, oleæ similia, sed tenera & succulenta, Autumno, novis succrescentibus, interdum decidua: flores Autumno longiusculi, candicantes, extremis oris in quinque crenas divisi: quibus decidëtibus feminis quoddam

Colutea scorpioides altera.



Colutea scorpioides altera.

Hortula.

Colutea scorpioides altera.

Polygala Valentina.



Hortula.

Polygala 1.

similia, sed minora, saturate virentia, ingratum admodum & amari saporis: e singulis ramulorum alis prodeunt tenues pediculi sustinentes plerumque binos, nonnumquam ternos flores Coluteae similes formâ & colore, sed minores & nonnihil odoratos: filique teretes, oblonge, quibusdam veluti articulis distinctæ, oblongæ, lævia, subfusi coloris & ingrati saporis femina, singula singulis articulis inclusa habent: radix lignosa est, longè lateque dispersa.

2. Est & altera humilior, humiq; diffusa, neque foliorum numero, aut situ, aut formâ, neque florum formâ & colore, à superiore differens: sed hujus virgæ palmares aut pedales duntaxat, hieme interdum marcescere solent, & novo vere denuò è radice novæ germinare: filique & semina paria: radix similiter dura & lignosa late se spargit, & fibris aliquot donata est.

Sponte nascitur ad Colontz vicinior, Viennæ montibus abunde, rum etiam in nonnullis Pannonicæ montanis locis. Priorè etiam in Belgicis hortis jam diu antè conspexeram: & ejus Pena & Lobelius in Adversarijs meminerunt, in Valena Mompelliani agri silvâ nasci affertentes. In hortis culta longè major evadit. Posteriorè nunquam antea observaveram. Sed & ea in hortis culta paulò major sit, & plerumque virgæ hieme retinet. Florent Maio.

ALTERA nititur radice crassâ, & lignosâ, lentâ tamen, & flavescenre cortice obtusâ, multusque fibris præditâ: ex qua plures singulis annis incuntes vere novas producit virgæ pedales, nonnumquam etiam cubitales, lentas, vimineas, læves, virides, & in his temerè sparsâ alata folia, quina, septena, aut novena uni costæ inhzrentia, exsiccantis primùm gustus, deinde nonnihil acrimoniæ in summis labris relinquentis: flores in foliorum oblongis virgulis inhzrent copiosi, leguminacei, in orbicularem coronam dispositi, flavi, nullo grato odore commendati: quibus succedunt articulim distinctæ filique superioribus breviores, semen in singulis articulis continentes, Polygalæ valentinæ modo.

Crescit in montem, qui à Danubio & Caspæ illi imminenti ad Alpes extenduntur, radicibus, inter vepres & ad vinetorum margines. Floret Junio, nonnumquam etiam Maior: subsequens hiems virgæ corrumpit.

POLYGALA VALENTINA.

CAP. LXVI.

FRUTICOSA est hæc planta, binos palmos alta, multas ferens virgulas lentas, sparti aut junci instar: folia singulis costis inhzrent impari plerumque numero, quina, septena, aut plura, Lenticulæ similia, magis tamen carnosa, & ad rutæ colorem accedentia, adstringentis & ingrati gustus: flores meliloti similes, lutei, coronæ in modum, summis virgulis (quæ magnâ ex parte nudæ sunt, & maturo semine exarefcere solent) insident: incurvæ, deinde, longæ & teretes succedunt filiquæ, tribus aut quatuor internodijs distinctæ, quæ semen continent durum, oblongiusculû, nigrum, ingrati saporis: radix longa, dura, lenta, crassiuscula est.

Perpetuò

Perpetuò virens est: florereque April, Maio, & Junio, semen verò Iulio maturum. Inveniebam etiam Septembri florentem, & calidioribus locis maturè admodum, videlicet Februario.

Salmanticensi agro frequens est secundum vias: Granatensi, Murciano, & Valentino regnis, locis arenosis & collium declivibus observabam. Apes ex ejus flore plurimum mel colligere creduntur.

VULGO Salmanticensibus *Coronilla de Rey* dicitur, quasi fertula regia, & istic officinæ Meliloti vice utuntur. Granatenses & Murciani *Lentejuela*, id est, Lenticulam, Valentini Polygalam appellant.

IN collibus silvosis Valentini Hispaniæ vicinis invenitur & alia huic admodum similis, *Polygala* 11: sed majoribus virgis, firmioribus, & utcumque rubentibus: majoribus etiam, viridioribus, frequentioribus & carnosius folijs: majoribus & dilutioris coloris floribus: siliquis etiam paulò crassioribus: semine verò omnino simili.

EIVSDEM urbis item maritimis Terna, oblongis, lentis, fungosis seu medullosis, & omnino virentibus virgis prædita, quas rara obsepiunt folia, superioribus adhuc crassiora & molliora: flos Secundæ par: semen observare non potui.

Viret etiam perpetuò utraque: sed in collibus rara diutissimè florere, Vere & Autumno. Prima & Secunda, ante meam ad Cæs. Maximilianum 11. profectionem, in Belgicis hortis aiebantur.

POTRÒ Polygala Dioscoridi & Plinio gustu est adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit.

ANONIS NON SPINOSA, sive MITTOR.

CAP. LXVII.

ALVET Silestiacæ præta Anonidis quoddam genus à vulgari diversum, quod ab alijs minime observarum existimo.

Anonis mitior 1.

Fraxinella.



MULTOS annuatim ex radice durâ, lignosâ, & perenni fert cubitales, nonnumquam longiores furculos, rotundos, leviros, firmos tamen, ramulos, molli lanugine obductos: multa folia alternatiim caulem latâ basi amplectentia, plerumque terna ex eodem pediculo prodeuntia, interdum singularia, molliora & ampliora quàm vulgaris summe virgæ & rami desinunt in oblongam spicam florum vulgari quidem similitum, sed coloris magis sanguinei: fert deinde siliquas vulgari perfrimiles, & ipsum etiam semen. Tota planta lento quodam humore graviter & hircinum virus olente oblitâ est, Fraxinellæ ferè odoris instat: nullo autem aculeorum vallo munita est.

EST & aliud genus huic aded simile (præsertim siutrum q: in hortis colatur) ut ante quàm flores explicentur, nisi diligenter inter se conferantur, vix discerni queant: paulò tamen pin-

Anonis mi-
tior 1. per-
spicua flos.

Anonis mi-
tior 1. latus
flos.

gulus deprehenditur, nec adeò graviter odoratum: præterea ubi sponte nascitur, candidius est: ejus item flores, qui lutei sunt, brevioris spica nascuntur.

*Trifolium
fucoides.*

Prioris semen è Silelia nobis missum est Trifolij majoris & scetidi nomine, plantæ etiam ex eo nasc. Alterum frequens nascitur cum in Narbonensi Gallia, ubi primum observabam, tum in Hispania & Lusitania. Floret utrumque genus Junio & Julio.

Natrix Plinij.

Cum tota quasi facie Anonidem vulgarem, exceptis spinis referant hæc plantæ, sicebit eas nominare Anonides non spinosas sive minores. Posteriorem nonnulli Hispani Ciceris silvestris genus esse autumabant: Pena & Lobelius Plinij Natricem esse censent, cujus lib. xxvi. Nat. Hist. cap. xii. meminit: sed ejus Natricis radix duntaxat hirci virus olet recens cruta, non tota planita. Cumque nullam plenioris descriptionem addat, difficile esse existimo, quænam illa Natrix sit, judicare.

Fraxinella.

Olet etiam hircum vulgò Fraxinella appellata, cujus radix Dictami albi nomine in officinis nota est, & usurpatur. Illius passim in Pannonicis silvis, Viennensique saltu, duo genera inveniuntur: Vnum elatius, oblongiore florum spica, saturatoribusque floribus & nigrioribus folijs: Alterum humilius, brevioris spica, dilutionibus floribus & folijs: Vngari

Varietas.

Dictamus & æraris sic vocant. Crescit & in Francofordiano saltu, in quo aliquot plantæ repetæ niveo flore præditæ.

DORYCHNIUM HISPANICUM.



CAP. LXVIII.

Dorycnio congener planta.



*Dorycnium
Hispanicum.*

FRVTICOSA & tamosa hæc est planta, pedem aut amplius alta, tenues producens virgas, incanas, flexibiles: folia oleæ albicantia, minora & breviora, terna simul, interdum etiam plura ab eodem exortu prodeuntia, in novellis ramis, qui nondum florem protrulerunt admodum frequentia & confertim nascentia, adstringentis gustus: flos copiosus, parvus, trifolij præteritis æmulus, albus, veluti in capitulum congestus summis virgis infidet: quo decedente, quaternæ, quinæ, aut plures interdum succedunt simul junctæ valvulæ, crvi magnitudine, rufescentes, in quarum singulis, ut plurimum singula semina continentur versicolore, qualia penè Tithymali paraly, ejusdemque formæ, coloris & magnitudinis. radix dura & lignosa nigricat. Perennis est, nec sua folia abijcit, nisi novis recepris.

Natice.

Exit copiosè Salmanticensi agro, & alijs Hispaniæ locis, secundum vias & in culinis: memini & Narbonensi agro videre: frequentissimam etiam non modò circa Viennam Austriæ, sed plerisque Pannoniæ locis, calidiore tamen regione magis incanam. Floret Maio & Junio: semen valvulis hiantibus exilit Julio.

Quotquot etiam Salmantici rei herbariæ studiosi, Dorycnium vocabant, eo quo illic verbarar tempore, quo etiam nomine apud Mompelianos, ante multos annos donari fuit. Anguillara

Anguillare etiam hanc sententiam amplecti videtur, Opinionum libro XIII. Ejus semen à C. V. Vlyffe Aldrovandro aliquando missum fuit Trifolij albi appellatione, & ex illo plantae nate. Salmanticense vulgus *magedeja* vocat.

Ceterum, licet cum Dorycnio Dioscoridi descripto nonnullas notas communes habeat, ejus tamen historiz per omnia respondere non videtur.

Hic ferè similis planta Valentino regno & quibusdam Bætica locis nascitur, cubitalibus & viminis modo lentis virgis, superiore gracilioribus, brevioribus & latioribus folijs, brevique pediculo ternis aut quinis simul junctis, ramulos amplectentibus, salsi & nonnihil acrimoniz obtinentis gustus: oblongi ramusculi, ternos, quaternos, aut quinos flores sustinent, Medica majores, viridis coloris: alioqui tota planta candidior est superiore, imò tota incana: ejus neque semen, neque radicem observabam: sed ramulum qualem equitando ab rampere potui, exprimi jussi, & hic apposui.

Veteres porò Dorycnium somniferum esse scribunt, & copiosius haustum mortem adferre. An verò planta, hoc capite descripta, soporifera sit, neminem periculum fecisse arbitror.

GENISTA TINCTORIA.

Genista tinctoria Hispan.



CAP. LXIX.

Genista tinctoria vulgaris.



Ad duorum cubitorum altitudinem crescit interdum hic frutex, nudo stipite, nodi, recto, digitali crassitudine, candicante cortice tecto, qui in multiplices brevesque ramos, tenellos & fragiles summa parte dividitur: hos ornant folia Lini aut Thymelææ, frequentia, suprenè virentia, infernè verò incana & argentei planè splendoris, gustus initio exsiccantis & non nihil adstringentis, deinde subamari: flores summis ramulis nascuntur spicatim congesti Genistæ tinctoriæ Germanicæ similes, lutei. Tota planta elegans est aspectu.

Quo tempore floret, sub ea crescit Hæmoderi quoddam genus elegans, pedalis altitudinis, brachialis interdum crassitudinis, multis floribus à medio scapo ad summum usque exornatum, magnis, oblongis, luteis, extrema parte hiantibus & in quinque partes divisus: totum humidum est, pingui oleagine oîaque materia turget.

Nos quædam hunc fruticem conspexim, quàm Murciano regno secundum vias nascentem, & Martio mense florentem. Incolæ stirpem ipsam *scopa* appellabant, Hæmibderum autem sub eâ nascens, *yerna tosa*, quia forsitan si vaccæ eo vescantur, ad venerem excitatæ taurum appetunt.

Ceterum suffruticem illum qui à tingendi usu, floribus Tinctorij, vel Genistæ tinctoriæ nomen

nomen invenit, in Hispanijs videre non memini: at in Austriz & Pannoniz silvosis locis, & ad montanorum pratorum margines frequentissimum conspexi. Vngaris *Felsz treg* dicitur. Frequentissimus etiam in omnibus pratis quibus proxima silva, cum Francotordiano agro, tum plerisque alijs Germaniz locis.

SPARTVM GRÆCORVM.

CAP. LXX.

Genista Plin.
sp.

OMNIBVS notissimum, Spartum, five Spartium Dioscoridis, esse Plinij Genistam, five Hispanicam & Africanam odorato flore, virgulis planè junceis & fractu contumacibus, quibus rara quædam, dum floret, inhzrent folia brevi decidua, ut tota deinde planta sine folijs conspiciatur.

Spartium Dioscoridis Genista Plin.

Spartium 11. Hispan.



Illius historiam, cum à plerisque diligenter & accuratè sit perscripta, hic proponendam non duxi: sed si alia quædam ejus genera, quæ in Hispanijs observabam, tanquam nova, & à nullo adhuc exhibita, oculis subijcerem, operæ precium me facturum existimaui.

Spartium 11.
Hispan.

EST verò unum cubitali plerumque stipite, pollicem crasso, scabro & striato cortice tecto, qui in plures cubitales virentes & striatos ramos dividitur, & hi deinde in junceas, striatas, virides virgulas, quæ novellæ adhuc & primum germinantes, aliquot folijs exornantur, statim atque planta florere incipit deciduis, ut tota deinde *apollæ* conspiciatur: è virgularum lateribus prodeunt longi pediculi, è quibus dependent aliquot exigui flores, glycyrrhizæ vulgaris aut trifolij pratensis floribus pænè similes, lutei, inodori: succedunt cartilaginei, rotundi (culi lobi, vulgari fabæ quæ in jumentorum pabulum cedit, persimiles, ex flavo rufescentes, in quibus unicum maxima ex parte semen (raro bina) continetur, durum, nigrum, exiguo reni simile, quod in lobis agitatè aut concussis crepitat, & sonitum edit: radix dura est & lignosa.

Spartium 111.
Hispan.

ALIVD longè majus, & hominis altitudinem superans invenitur virgulis priorè tenerioribus, lentioribus, & magis obsequentibus, flore ejusdem cum superiore formæ, sed paulò majore, & omnino albo: lobi etiam conveniunt, minores tamen sunt & minus semen continent.

Natalis.

Primum varis Castellæ utriusque locis crescit arenoso solo, & Maio floret, semen maturum est Julio. Alterum Gadibus duntaxat, & locis vicinis aurâ marinâ perfusis, mihi conspectum

Spartium 111. Hispan.



Chamaenista 7.



speciem est atenofo & sterili solo, suis floribus onultum Februario. Lobos observare non potui in ipsa planta: sed mihi deinde ab amico missi sunt ex Hispanijs.

UTRUMQUE genus Hispani *retama* vernaculo sermone appellant: Genistam verò odoratam *hiniefla* & *yniefla*: vulgarem & Septentrionalibus regionibus peculiarem, quæ istic etiam plerisque locis nascitur, *lobos*, quod illà, quemadmodum nostrates, scoparum, quibus ædes purgant & everrunt, loco utantur.

CETERVM hanc plantam ad Spartum, quod Dioscorides *amapris* vocat, referendam omnino existimo. An verò ipsæ facultatibus prædita sit, non intellexi.

De Sparto autem Hispanico junci folio, de cujus usu Plinius lib. xix. cap. 11. Natur. Histor. prælixè agit, postea scribemus.

CHAMAENISTA.

CAP. LXXI.

GENISTAE illius, quæ per universam Germaniam, Galliam, Angliam atque Belgicam vulgatissima est, cuiusq; flores nondum expansos Belgæ muria condiunt, & caprarum loco edunt, spontè nascentis nulla vestigia observare potui in Pannonia & Bohemia, neque totâ Austria & Moraviâ. Sed duo Chamaenistæ genera plerisque locis scisse obtulerunt.

PRIMUM multis palmaribus, interdum etiam pedibus aut majoribus virgulis humi diffunditur, teretibus, lentis, striatis, virentibus, & in aliquot ramulos divisis: per quos confuso ordine, & quasi temerè sparsa sunt foliola, bina, terna aut quaternà, ab eodem exornu & tuberculo prodeuntia, Genistæ vulgaris Germanicæ folijs similia, eminentiore dorso, & quasi complicata, superne viridia, inferne nonnihil incana, amariusculi gustus: ex illorum alis singuli aut bini flores lutei, quatuor foliolis constantes, Genistæ germanicæ florum æmuli, sed minores, nullo interdum, aut certe per exiguo odore præditi, nonnullis locis satis odorati, nascuntur: quibus deinde succedunt plantæ filiquæ, hirsutæ, exiguè flavescens semen Cytisi generibus simile continentes: radix est dura, lignosa, aliquot fibris donata: sed & virgulæ secundum radicem, quæ terrâ integuntur, plerumque fibras agunt.

Nascitur multis Pannoniæ locis ad viarum & silvarum margines, editis, siccis, atque desertis nonnumquam agris. In cultis & inter vepres aliquando magis luxuriat, & in majorem altitudinem excrescit. Floret Maio, quandoque etiam Apelio.

ALTERA, quæ planto eoque altero ex altero nascente est folio, quod deinde in cauliculum convertitur, historiam, cum ab alijs sit prodita, hic retexendam non æstimavi.

Hanc plantulam olim apud Helvetios cum istac iter facerem, & quibusdam Germaniæ

locis colligere memini. Deinde in Pannoniâ sponte & copiose nascentem observabam in silva



silvâ Nemethwyar Ill^{us} Dn. Balthafaris de Bathyan urbi & arci munitissimæ proxima, atque supra Sopronium urbem vulgo *Orbemburg* dictam, Austriacis: sed omnium affluentissimè inter *Sakurnya Ill^{us} Comit*is de Zrinio minutissimam aream, & *Fridaw Magnifici* Dn. Michaëlis de Zck aream in Tollibus: & nunc proximè in silva quadam militari circiter infra Franeufortum, ad sinistram Mœni fluminis, ubi etiam frequens Primum genus, & pleræque aliz surpes.

TERTIUM porro elegans quoddam genus, Secundo quodammodo affine, foliis Valentini regni locis incultis & alpenis observabam, quod prætermitti non debuit.

Chamægenista peregrina.

Vix palmari magnitudine asurgebat hæc Chamægenista, admodum tamen fruticosa, folijs Chamelææ proximis, brevioribus, duris, & carnosiss, aliquantulum in ambitu sinuosis & crispis, rigidiusculisque, uno ex altero è medio folij nervo prodeunte, quemadmodum in superiore, interdum etiam binis ternisque simul exorientibus: hic verò nervus paulatim intumescit, & in ramulum convertitur, sic cum tota planta foliosa sit, & non nisi folijs constare videatur, fit tandem admodum fruticosa: in extremis istis folijs quini, senive, aut plures flores simul juncti, ex villosis calycibus nascuntur, minores quàm in Genistâ, aurei planè coloris, nisi bina inferiora folia incana lanugine pubescerent. Florentè duraxat colligebam quo dixi loco, mense Martio. Postea tamen rescicatas plantas nactus sum pedales aut ampliores.

AVSTRIACI Vngaris vicini Priorem *Geniste* hoc est, trifolium luteum appellant: Alteram Germani *Erbfiummen* id est terrestrem Genistam, nonnulli Genistam sagittalem. Tertiz nullum vulgate nomen intellexi.

CETERVM in Pannonia etiam vulgarissima est ea Genistæ species, spinis & aculeis horrens, quam nonnulli Genistellam spinosam nominant, Vngari *Iglucsa*, hoc est, Aculeatam, Germani *Stechend schrammen*. Frequens est & circa Francofurtum & multis alijs Germaniæ atque Belgicæ locis.

ANONYMOS COLYTHEÆ FLORE.

CAP. LXXII.

FLOREM similitudo & aliz quædam notæ faciunt, ut hanc *Arabis* quidem, sed elegantem, & à nemine adhuc, ut arbirror (præterquam à me in Pannonicis) descriptam plantam superioribus subjungam.

Arabis Colytheæ flore.

RADICEM autem habet longè lare quæ summa tellure serpentem, lignosam, lentam tamen, & subinde capillares fibras agentem, ex quâ prodeunt multi lenti & obsequentes ramuli,

Ananymos flore coluteæ.



multi, dodranteales, & circa exortum, qua terrâ ioteuntur, fibras plerumque agentes: folia in his buxi æmula fere, carnosa, viridia, paulo tamen magis mucronata, confuso ut plurimum ordine disposita, gustantibus ingrata primum, deinde amara & acris: in extremis ramulis prodeunt inter folia flores terni aut quaterni, oblongi, majore ex parte odoris expertes, nonnullis autem locis suavem & narcissinam quandam fragrantiam referentes, tribus folijs constantes, quorum duo alba sunt, & alarum modo sursum expansa, exalbida galeola illorum exortum in tegente, tertium in longiusculum veluti tubulum convolutum, sursum per longitudinem apertum est, extremitate concavâ & incurvâ, lutei coloris, & per vetustatem omnino interdum purpurascens aut rubescens: floribus succedunt latæ & compressæ siliquæ, Thlaspi latifolij rhecis paulo minores, virides, quæ bina plerumque (nonnumquam unicum tantum) continent grana, exigui ervi magnitudine, nigricantis ex cineraceo coloris, hirsuta, & veluti quoddam animalculum eementita, Polygalæ vulgaris majotis rubræ (de qua postea) semini baud absimilia, minora, quæ, aperientibus sese per latera loculis, sponte decidunt.

2. Interdum etiam pro loci natura floris colorem variare deprehenditur: nam bina illa folia alarum instar sursum expansa, galeolaque eorum exortum tegens, alba non sunt, sed pulcherrimè ex purpura rubent, tertium autem ve-

interdum C. f. variat.

luti in tubulum convolutum flavescit, ejusque extrema pars aurea est.

Frequens est Prior non modò in montibus Calenberg, Medeling, & Baden sibus thermis imminuentibus, sed & in alijs ad Austriacas & Sciriacas Alpes excurrentibus, qui omni Resiniferarum arborum genere integuntur, inter saxa: plurimis etiam Pannoniæ locis est obvia, veluti apud Posonium, Soponium, & Zolonock. Altera multò rarior inventu. Floret verò utraque Aprilis & Maio, scem prioris (nam alterius non observavi) Junio perfcitur.

NVLLEVM nomen huic suffrutici imposui, cum dubitem an à veteribus fuerit observatus: præterea ut studiosius aniam præbeam diligentius veteres Audiores excutiendi, & apud illos aptam aliquam appellationem inveniendi, ne perpetuò *ἀνώνυμος* maneat. A rusticis negligitur, propterea nullo illam nomine dignantur: quidam tamen, à perpetua viriditate, *ἀνώνυμον* appellari dixerunt.

SPINOSI SVFRVTICES ET ΕΠΑΛΛΟΚΑΤΑΟΙ.

NUNC serè peractâ Arborum, Fruticum & Suffruticum descriptione, opetæ precium me facturum existimavi, si spinosos Frutices & suffrutices, easque Stupes que caduca per se consistere nequeunt, sed alarum admiculo egent (Theophrastus *ἐν ἀνώνυμοις*, vel *ἐν ἀνώνυμοις* appellat, *Gaza amplexicaules* vertit) adjungerem. Initium autem faciam ab illis Suffruticibus, qui Genistæ flores sunt præditi.

ASPALATHVS ALTER.

CAP. LXXIII.

TAMETSI sciam hunc fruticem non esse legitimum Aspalathum alterum: quia verò tale nomen à plerisque obtrouit, immutandum oòo putavi, præsertim cum ad quem fruticem veteribus descriptum referri debeat, adhuc ignorem, nisi fortè Scorpij geocibibus ascribendum esse quis censcat.

TOTA PLANTA cubitum non excedit, fruticosa admodum & ramosa, multis horrens spinis deorsum inflexis, firois, acutis, in quibus enascuntur pusilla folia lentis magnitudie, viridia, qualia etiam (sed teneriora) fert in novellis ramulis, quibus sub sunt recens nati aculei: flores in firmioribus & rigidioribus spiois, terni, quaterni aut plures simul nascuntur, Genistæ similes, minores, coloris nunc lutei, nunc pallidèctis: semen in parvis siliquis exiguum.

ALIVD

Aspalathus alter 111.

Aspalath.
alter 111.Aspalath.
alter 111.

Gaza.

Gaza.

Gaza.

Scorpius 1.

Gaza.

Scorpius 1.

Scorpius 11.



ALIVD ejus genus robustius, & aliquantum firmius, nonnumquam altius excrefcens, cujus flos perpetuò pallidior est, alioqui non multum priori diffimile.

TERTIUM genus ad cubiti nonnumquam magnitudinem accedit: plerumque tamen minus est, & pedalis tantum altitudinis, totum etiam tenerius: ramuli in multo plures spinas divisi, istæ denud in alias, sic ut singulæ spinæ rotidem Abrotoni multifida folia videantur, nisi aculei obfisterent, qui, à negligentius confiderantibus, vix animadvertuntur: Vere ex ramulorum lateribus exigui alij prodeunt ramusculi cani & hirsuti, quibus adnata sunt mollia & incana lentis folia, majora quàm in primo genere: in fummis illis ramusculis flores priori similes, paulò majores, lutei nascuntur.

Crescit Primum, cum in Cantabris superato Pyrenæo saltu, tum varijs alijs Hispaniæ locis, & Narbonensi Gallia. Secundum in Castella veteri tantummodo observabam. Tertium in Cantabris duntaxat tertio à Vidoria urbe miliari, ad radices Pyrenæorum, quæ Hispaniam spectant.

PRIMUM genus ab Herbariæ rei studiosis Salmanticæ & Mompelij Aspalathus alter vocabatur, vulgo Salmanticensium, & aliorum, apud quos nascitur, Hispanorum, *salvia*: secundum Castellanis *salvia*: tertium Cantabris *ballada*.

FLORIBUS priotiscum sacchato fermentatis, Salmanticenses ad firmandas & crescantandas collapsas vires utuntur.

SCORPIVS. CAP. LXXIII.

VO plantarum genera, quæ plurimum ad Scorpij, quem Gaza Nepam interpretatus est, historiam accedere videntur, in meis peregrinationibus observabam.

PRIMUM cubitali aut ampliore altitudine assurgit, multis virgis ex atro virgibus, striatis, densissimo spinarum vallo oblitis fruticosum, quæ deinde spinæ alijs minoribus sunt circumseptæ: folia nulla, nisi primo vere, apparêt, brevi decidua. Flores Genistæ minores pallidi, interdum verò adeò rufescentes, ut rubete videantur, præsertim sub Autumnum: siliquæ deinde succedunt breves, cylindraceæ, magna ex parte inanes, aliquando tamen ferentes exiguum semen pallidum aut subfuscum, ut Genista vulgaris Septentrionalium: radix singularis in alias tenues se spargens, & interdum latè se propagans.

Floret Maio & Junio, & quandoque totà æstate: circa Autumnum verò, denud floribus onusta conspicitur, eoquæ tempore saturiores & magis rutili sunt, ut plurimum, flores.

ALTERVM pedis altitudinem raro superat, totum densissimis spinis horrens, quæ non confuso ordine ut in superiore nascuntur, sed seriem quandam setvant, & semper contrario inter se exortu binæ nascuntur, virenes quidem, sed languidius quàm superioris, neque aliæ ex alijs: fummis ramulis inhaerent bini aut terni

Scorpius II.



terni flores superiori similes, lutei coloris, mentem Martio: quo tempore exiguas brevesque filiquas, vel potius semina erui magnitudine, inclusa membranâ quadam multa incanaque lanugine hirsuta, deprehendebam densissimis ipsius plantæ spinis occultata, ut ex superiore ætate deciderant: adeo verò canescebant, ut initio aranearum telas esse existimarem: radix singularis, sed in plures deinde propagines sparsa, dura, & lignosa est.

Primum varijs Belgicæ, Germaniæ, Galliz, Hispaniæ, Angliæ locis conspexi, nusquam tamen frequentius, quàm incultis illis locis supra Burdegalam, Bayonensi itinere, & apud Cantabros Pyrenæorum jugorum accolis, ubi tantâ magnitudine assurgit, ut duorum hominum altitudinem æquare nonnumquam viderim, crassitudine verò brachium humanum. Alterum collibus Granatæ vicinis itinere Cordubensi duntaxat, nec usquam alibi mihi conspectum. An porro Echinopoda, cujus doctissimus vir Honorius Bellus in alterâ ad me epistolâ meminit? plurimum certè ad illam mihi accedere videtur.

GALLI primum genus *lanc marin*, Aquitani *jauger*, Belgæ *Eschdoene* appellant: nullum vulgare nomen Hispanicum intellexi. Alterum genus Granatenses *Molino* vocant.

Quas facultates Scorpius planta habeat, nemo tradit. Solus Plinius aduersus sui nominis animal valere auctor est.

ERINACEA

CAP. LXXV.



PLANE nova, & tota elegans est hæc planta, dodrantalis, in orbem per solum diffusa, multis spinis virentibus, sive aculeis horrida: flores Genistæ, ex cæruleo purpurascens, minores, calyculis inclusi hispidis, villosis, omnino ferè incanis, bini aut terni simul semper conjuncti: foliola interdum, dum floret, producitur, sed rarò, eaque perpauca, Lenticulæ similia, quæ cum brevi marcescant & decidunt, tota planta maxima ex parte sine folijs spectatur, & multiplici spinarum vallo Erinaceum in se convolutum repræsentat: radix lignosa & magna est pro plantæ proportionem.

Nascitur regno Valentino, affluenter verò circa Siere aguas oppidulum, septimo ab urbe Valentia miliari, Madritano itinere, asperis locis & secus vias. Aprilis florentem observabam & eruebam iter istac faciens anno M. D. LXV. semen observare non potui, mense sequente in Belgicam reuersus.

INCOLÆ *eriza* vocant, hoc est Erinaceum, quoniam erinaceum animal terrestre, dum in orbem se contrahit, aut marinum, aculeorum & spinarum vallo planè æmulatur: quæ adeo causa fuit, ut illi Erinacæ nomen inderem, donec commodius aliquod ex veteribus Scriporibus dare possimus. An vetò incolæ ad medicû aliquem usum adhuc habeant, non intellexi.

TRAGACANTHA ALTERA.

CAP. LXXVI

TRAGACANTHAE, quam aliquando Massiliæ florentem, & fructu præditam observare memini, simillima est hæc planta, fruticosa admodum, multos pedales habens ramulos flexibiles, latè circumquaque sese diffundentes, candicantes, &, dum adhuc tenelli sunt,

Tragacantha altera, Poterium fortē.

Xαλκίον Anguil. Poterium Dalechampi.



sunt, lanuginosos, multis longis canescentibus spinis horrentes: foliorum plurimę simul junctę alę, Lenticulę aut Tragacanthę proximę, exiguę, candidę, lanuginosęque primo vere per intervalla exeunt, dulcis saporis: folijs hieme decedentibus, nervi illi medij quibus folia in hærebant, in rigidas & acutas spinas evadunt, ut eo tempore tota planta sine folijs conspicitur, contra quę in Tragacantha, quę hieme etiam folia retinet, nec ea abijcit donec nova sequente anno adquirebit: tum demum deciduis vetustis folijs, nervi illi medij etiam in spinas abeunt.

Itam neque florentem, neque semen ferentem vidi: sed sub ea plurimos folliculos bombycinis similes, aut Alceę illius, quam Marthiolus Hypecum appellat, folliculis ferē pares, inanes inveni, quos ab illā excidisse, & florem ex similibus prodire album, non magnum in colore referrebant: de semine nihil certi intelligere potui: radix lenta, longa, in multos ramos divisa, nigro cortice foris obducta, materie intus candidā, fungosā, dulci, interior pars gummosum quidpiam & subdulce refert.

Natalis. Nasceretur plurima circa Guadix, & la Venta el peral, Granatensī regno, in collibus, arido & inuti soli: nec alio loco conspexi.

Verticibus montis. VULGARE nomen non intellexi. Sed cūm adeo sit Tragacanthę similis, facili mihi persuaderem esse legitimum *πρωτόριον*, quod ab Ionibus *ρωπαῖα* vocari Dioscorides ait, largē fruticare, spinis horrere, spissā lanugine esse, ramulis longis mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthę proximis, in collibus & aquosis nasci, & radicem rectam proximē terram succum gummi similem reddere tradit: cujusque Plinius lib. xxvii. Nat. Hist. cap. xii. meminit, illam etiam à quibusdam phrynon vocari scribens.

Phrynon. BELLOMIVS lib. i. Observat. cap. xvi. duo Tragacanthę genera observasse refert in Cretensium montium verticibus: earum fortē altera huic similis erit. Certē Rauwolfius lib. ii. fuz Peregrinationis cap. xii. scribit tria Tragacanthę genera in Libano monte inventisse, quorum unum meam hanc referret, alterum humilius, illi ferē simile, sed luteis floribus, quorum singuli in orbicularibus flavescenscentibus folliculis includuntur, racemacim quasi in longiusculis virgulis nascuntur, tertium ejusdem penē altitudinis, pluribus virgis firmioribus purpurascenscentibus assurgens, incana lanugine Poterij capitula sustinentibus, & purpureis floribus spectabile.

Rauwolfius. Cla. V. Dalechampi, optimē de litterariā re meritis, Poterium in Allobrogibus prope Mutam oppidulum Gratianopoli vicinum in silvosis convallibus reperiri ait. Sed hanc etiam intelligit quę ab alijs pleniusque Poterij nomine donatur, vereor, ut suam opinionem legitimis rationibus tueri possit, quippe cūm ea plāta penitus à Tragacantha differat, & folia Pimpinellę vulgaris, quam Germani Sanguisorbam vocant, virentia supernē, paululum candi-

cantia

cantia infernè habeat, minora & teneriora, spinas molles hinc inde per supremos furculos transversim & obliquè sparsas (cujus rei causa à nonnullis Pimpinella spinosa appellatur) & radicem tenuem, duram, exsuccam. Poterium verò teste Dioscoride & Plinio frutex est longos habens ramos, spinis horridos lanugine spissa rectos, Tragacanthæ proximis, radices longas admodum, nervosas & firmas, quæ proximè terram recitæ dant succum gummi similem. Pimpinellam illam spinosam aliquoties sanè mihi semine natam, diligenter in horro & siliis conservare volui, sed semper hiems subsequens abstulit, nonnumquam etiam mihi missum ejus semen Stœbes Theophrastinomine: & vulgo adhuc ipsam plantam in Creta vocari ἀστίδα, scriptum. De illa consule Honorij alteram epistolam, quæ ad calcem harrum Observationum adjecta.

Anguillara opinioem lib. viii. videtur Pimpinellam illam spinosam ad χαλκον sive *χάλκον* *Ætariæ* Theophrasti referre. Doctiss. autem Rauwolfius, qui eam in Libano monte etiam invenit, scribit libro & cap. jam memoratis, ab incolis *Beilan* vocari.

STRASO scribit circa novam Carthaginem plantam quandam esse, de cujus cortice tepe pulcerrimæ conficiantur: an hæc mea sit, ignoro, nullam enim qualem ille describit, dum istac iter facerem, observabam, aut istæ nasci ab incolis intelligebam.

CETERVM Dioscorides Poterij radices tulas, præcis nervis & vulneribus glutinandis *Præcis sanant.* illini, decoctum ejus nervorum affectibus prodesse, testis est. Eisdem facultates tribuit illi *taur.* etiam Plinius, & addit, in vino potum, rubetari um veneno auxiliari.

RHAMNVS.

CAP. LXXVII.

Vo Rhamni genera Theophrastus lib. iii. cap. xvi. Histor. Plant. facit, album & nigrum, utrumque aculeigerum, & folijs perperuis. *Rhamni gener.*

Rhamnus 1.

Rhamni altera species.



Dioscorides tria genera describit, nisi mendosum sit exemplar, ut peritissimus Anguillara suspicatur, qui tertium adscititium esse putat. Et sanè, cum Dioscorides easdem facultates suo Paliuro tribuat, quas Theophrastus Paliuro libro & cap. supradictis de scripto: verisimile est tertij Rhamni descriptionem quæ apud Dioscoridem extat, ad Paliuricujus historiam revocandam, plerisque enim notas habere cum Theophrasti Paliuro communes.

EST verò Rhamnus frutex faciendis sepibus idoneus, rectis virgis, in multos ramos divisis, candidis, quæque validis ac firmis aculeis horrent: folia plerumque quaternis aut quina ad singulorum spinarum exoritur nascuntur, oblonga, subpinguia, suboblida, oleæ similia, sed tenera & succulenta, Autumnino, novis succrescentibus, interdum decidua: flores Autumnino longiusculi, candicantes, extremis oris in quinque crenas divisi: quibus decidëtibus feminis *Rhamnus 1.* quoddam

quoddam rudimentum, ut in Iasmino, relinquitur: numquam tamen ejus fructum videto mihi contingit: crassa multiplicique radice firmatur.

Rhamnus 1.
altera Theophr.
11, 6.

2. Istius generis alium observabam Rhamnum pæne similem, sed humiliorem, frequentioribus ramis fruticantem, minoribus folijs, magis carnosus, salis gustus, superiore candidiore: floribus ejusdem cum illo formæ, sed purpurei planè coloris.

Rhamnus 11.

Rhamnus 111. fortè niger Theophr.



Rhamnus 11. ALTERA flexibilibus est virgis & ramis, spinarum etiam vallo horrentibus, angustioribus folijs, neque adeò carnosus, perpetuis tamen ut in priore: flos oleæ herbaceus circa ramos frequens, deinde fructus rotundus, maturitate flavescens & tota hinc in frutice permanent. Totus autem frutex pulvere resperfus videtur.

Rhamnus 111. TERTIUM his addo fruticosum, frequentibus ramis, Spini in sepibus nascentis & pruna silvestria ferentis magnitudine, cortice nigro tectis, & longis spinis armatis: folia ex quibusdam tuberculis, ut in priore, multa simul enascuntur, longa & angusta, carnosus, viridia, adstringentis gustus, & Rhubarbari saporem utcumque referentis, perennia: flos Veris initio parvus, herbacei coloris, pluribus & confertim juxta folia nascens: æstate nigrum fructum fert parvo pruno silvestri similem, rotundum, acerbum.

Natalis. Prior Rhamnus multis Hispaniæ, Lusitanie, Narbonensis Gallie locis nascitur: Illius alteram speciem uno tantum loco proximè Horiuclam urbem, veteribus Orcelini dictam, ad flumen Serabin, nunc Segura appellatum, Valentini regni extremis limitibus observabam. Alter non modo in Belgieis maritimis, sed etiam in quorundam montium vallibus, secundum amnes crevit. Tertium incultis Granatenfis & Murciani regni locis, frequentem inter alios frutices inveniebam.

Nomen Græcum *ῥάμνος*, Latinum etiam Rhamnus Hispani priorem *scambones* appellant, alteram ejus speciem *gino*, tertium *gino negro*, qui ad Theophrasti Rhamnum nigrum fortitan referri possit. An verò is sit quem Bellonius in Creta inveniri ait nigro fructu, ignoro. Missus est ad nos ex Hispanijs, ejus fructus Lycij nomine, ex quo nata plantæ.

Taculorum. DIOSCORIDI omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. Sic etiam Plinio. Salmannicæ & alijs quibusdam Castellæ locis, prioris folia cum turionibus, ex oleo, aceto, & sale eduntur primis mensis, habent enim acrimoniam quandam cum aciditate conjunctam, quæ saponis gratiam conciliat. Ternj fructus decocto, relaxata & dissoluta membra, podagrarum etiam dolores utiliter foveri incolæ referebant.

LYCIYM.

LYCIUM QUORUNDAM.

CAP. LXXVIII.

SUPERIORIBVS adijcieodus videtur hic spinosus frutex, multas ab radice virgas proferens, cubitales, vel etiam ampliores, rectas, tenues, rubentes, multis ramulis præditas, qui in acutam spinam plerumque desinunt, tamen alios aculeos hinc inde sparsos habeant, breues interdum & infirmos, nonnumquam verò firmos, & multis folijs obritos ut in Rhamno priore: folia nullo ordine digesta sunt, spini foliorum æmula, sed multò breviora, Myrti Tarentinæ aut Buxi folijs quodammodo similia, leni gustus & cum aliqua aciditate mordicantis. Nec florem, nec fructum videre contigit: nam Novembri, & novo vere duotaxat huoc fruticem inueniebam aliqua ex parte suis folijs viduatum.

Apud Complutum urbem, quam Hispani *Alcala de Henares*, quòd propter eam labatur amnis Henares, alijsque novæ Castellæ locis, & Bæticæ parte, quam vulgò Extremaduram cognominant, circa fluentia, & declivibus locis, hieme ex undaonibus nascentè observabam.

QUONIAM referendus est hic frutex, diu dubitavi, & etiamnum dubito Sunt nonnulli qui ad Lycium referri debere putant. Castellani, quibus scoparum usum præbet, & in falces colligatus calcificandis piscorum clihanis servit, *samajos*, sive *samaños* vocant.

CETERVM, vox *samaños*, mihi in memoriam revocat quandam suffruticem in incultis nascentem, quem incolæ *samajos* appellant. Assurgit is pedali altitudine, frequentibus ramusculis præditus, qui adeo exiguis & còsertis foliolis onusti sunt, ut ramusculorum lignum vix conspici possit: ea ex cineraceo virentia sunt, & extremitas amaritudinis.

Fuerint autem veteribus cognitus hic frutex, & quo nomine ab illis vocatus, ignoro.

Legitimum porò Lycium, in sua Peregrinatione observavit Doctus Leonardus Rauwolfius, cum in Libano monte ubi ab incolis *zarea* vocari ait, tum Hierosolymis Ioppen proficiscens, cujus succum Arabibus *Hadhadh* appellatione cognitum esse scribit, & fruticis iconem lib. II. inter pleraque alias exhibet.

SPINA INFECTORIA PYMILA.

CAP. LXXIX.



INFECTORIA Spina, cujus baccarum succo, viridem colorem conciliant picturis, & libris, quæque Rhamnus solutiva à Recentioribus nuncupatur, multis Pannoniæ locis vulgarissima est, ubi interdum arboream amplitudinem adipiscitur. De ea nobis non est sermo: sed de alijs duobus fruticibus, qui illi admodum affines esse videntur.

PRIOR bicubitalibus assurgit ramis, in multas alas divisus, cortice lævi. Spinæ infectoriæ colore & substantia simili tectis, qui membranâ superiore detractâ, ex viridi pallescit, & amariusculi saporis est: ramuli paucis spinis horrent, sed ipsi in spinas plerumque desinere solent: folia illi vulgari ferè similia, minora, angustiora, ad pruni silvestris sive spini folia plurimum accedentia, gustu linguam exsiccante: florem ut in vulgari congestum, ejusdem coloris & formæ, hoc est ex pallido herbaceum, quatuor foliolis constantem, minorem rami habet, radicem ut in alijs fruticibus lignosam.

CUBITALES habet Alter ramos, mihi interdum digiti crassitudine, magna ex parte minores, nigro rugosoque cortice obductos, superiore parte in ramulos divisos, qui tenuiore leviorique cortice tecti, plerumque in acutam spinam desinunt: folia Myrti, aut Pruni silvestris potius, breviora tamen & minora, viridia, per ambitum nonnihil ferrata, adstringentis primum, deinde nonnihil amaricantis gustus: Flores inter folia herbaceos, quatuor folijs constantem.

testi fructum deinde Spinæ infectoriæ vulgari non absimilem, binis, nonnumquam etiam ternis vel luti commissuris distinctum, initio viridem, deinde per maturitatem nigrum: radicem craffam, lignosam, duram, raras fibras in latera spargentem.

Exit Prior frequens in Leytenberg & vicinis montanis silvis. Alter abundanter in monte

Spina infectioxia pumila 11.

Smilax aspera
rutilo fru-
ctu.

Smilax aspera rutilo fructu.

Smilax aspera
rutilo fru-
ctu.

Tempus.

Badenſibus thermis imminente, & vicinis ju-
guſ loco petroſo & ſalebroſo. Vterque ſtoret
Maio, & Iulio fructum perficit.

SPINAM infectioxiā pumilam hos fru-
tices appellavi, quia magnam affinitatem cum
vulgari habent, licet minores ſint. Si quis ta-
men Lycij genus potius eſſe cenſet, ejus arbi-
trio permitto in quam referat claſſem velit.
Neutrius vulgarem appellationem intellexi.
Et haud ſcio, an aliquo in uſu ſint apud eorum
locorum, in quibus naſcuntur, accolae.

SMILAX ASPERA.
CAP. LXXX.

ASPERÆ Smilacis duo inveniuntur ge-
nera: unum frequentibus ſpinis horti-
dum, rutilo fructu: alterum paucioribus acu-
leis armatum, ſed folia nullis, nigro fructu.

PRIMA Smilax, longis, frequentibus, val-
de implicatis ſarmentis, nunc in hanc, modò in
alteram partem, certā quadam ſerie ſervatā,
inflexis, lentis, & multis ſpinis horrentibus na-
ſcitur: ex ſingularum alarum ſinu capeſcos
producent, quibus proximos quoſque frutices
& arbores amplectendo, ab imis ad ſumma re-
pit: folia ad ſingulos inflexus, hederæ, non an-
guloſa, ſed à pediculo latiora, deinde ſenſim in
mucronem deſcendentia, nunc ampla & viridia,
modò anguſtiora & albus maculis conſperſa,
ſpinòſa cute, ut inquit Plinius, hoc eſt nervo
illo medio eminentiore & foliorū oris aculea-
tis & ſpinòſis flores exigui, ſtellati, ſex folioſi
conſtantes, multi, ad ſingulos extremorum ra-
muloſum inflexus (qui multiplices ſunt) con-
junctim ex eodem tuberculo, ſive (ut Theo-
phraſtus ait) *ἀπὸ τοῦδε τοῦ οὐλοῦ* ex uno & eodem
veſtigio exeunt, cādē, odorati, racemi in mo-
dum propendentes: fructus deinde exiguis
uvīs Labruſcæ æmulis conſtans, maturitate
rutilus, nucleos tres, bino, unicū, pro acino-
rum magnitudine continens, duſcos, oſſeos ve-
lut Alſparagi, ſotis nigros: radix longè lateſque
ſerpentes ſub terrā fibras habet, renues, candi-
das, & germinā ſummā tellure ſpargit minimi
interdum digiti craſſitudine, nodola ſeu arti-
culata, albicantia.

ALTERA ſimilibus cum priore ſarmentis &
claviculis proxima quæque amplectentibus
naſcitur, non eſt tamen adeò ſpinis horrida:
folia etiam paulò breviora, atriora, molliora,
nullis, aut certè rariffimis aculeis obſita habet:
flos alteri omninò formā ſimilis, ſed colore
diſſerens: nam ex albo quaſi catueus eſt, fru-
ctusque rudimentum, quod ex medio flore
tamquam umbo prominere, ruſcit, plenus
autem & maturus fructus non eſt rutilus ut in
priori, ſed omnino niger, & ſucculētiſ, quan-
tum quidem mihi videtur: oſſicula cōveniunt.

Serius florent, imò Autumno etiam ipſo,
cum ſuo fructu Octobri & Novembri floren-
tes reperiēbam: at ſtigidis regionibus culta, &
ſiccilibus adſervata, Autumno duntaxat floret,
numquam

Smilax aspera nigro fructu.



Rosa centifolia Batavica.



numquam semen perficit. Mihi magna ex parte alteto duntaxat à satu anno germinare cepit, nonnumquam & tertio. Perpetuò folia retinet.

Crescit prior varijs Hispaniz locis, & in Narbonenſi Gallia, aspero & arido solo nascitur & in alijs calidioribus regionibus: rara in Lusitania conspiciebam. Alteram autem plerisque illius Provinciz locis circa sepes, & collum convexa, & extremà Batizæ parte, quà Lusitaniz contermina est.

Σμύλαξ τραχύη Dioscoridi appellatur, *σμύλαξ* simpliciter Theophrasto. Gaza Hederam Ciliciam interpretatur, quia Plinius lib. xvi. cap. xxxv. scribit Smilacem Hedera similem, primum è Cilicia profectam. Hispani priorem *zarzaparrilla*, hoc est Rubivinculum appellant: Secundam extremæ Beticæ incolæ *uva de Perre*, id est, uvam eamnam, Lusitani contermini *recrema*, Olysiptenſes *adega casta*.

CETERVM Dioscorides ait folia & acinos, ante & post eporos, venenorum antidota esse: & acinorum succo, inquit Plinius, infantibus sæpius instillato, nulla venena postea nocitura. Mihi in Hispanijs relatum est, ejus radice usos, Americanz Zarzæ parillæ loco, non sine successu: & multorum opinio est Zarzam parillam Smilacem esse novi orbis.

ROSA. CAP. LXXXI.

NON minùs varia Rosarum genera conspiciuntur in Austriæ hortis, quàm in alijs plerisque Provincijs. Aliquot tamè istic aluntur quæ ante videre non memini. Sunt & Sylvestres prius mihi non conspectæ, de quibus omnibus suo ordine. Sed ante quam ularum historiam describere adgrediar, quædam de Centifolia rosa, ejus Theophrastus, deinde eum sequuti Plinius & Athenæus, meminerunt, præmittenda esse existimavi: & de quibuldā alijs rosis, quæ postea ad meam notitiam pervenerunt, dicendum.

Theophr. ergò Plant. Hist. lib. vi. cap. vi. sic ait. *Τὴν δὲ Ρόδον πολλὰ καὶ διαφόρᾳ πλεῖθ' ἔχει φύλλων, καὶ ὀλῆθενται, καὶ τραχύπτερι καὶ λείοντι, καὶ κραιῖ καὶ πύσσει. τὰ μὲν γὰρ πλεῖστα περὶ φύλλα, τὰ δὲ ὀλῆ καὶ φύλλα, καὶ ἰσσοῦ φύλλα, τὰ δὲ ἔτι πολλὰ καὶ λείοντι αἰόντα τούτων. ἑνὶ γὰρ εἴδει φασὶν εἶναι καλοῦσθαι καὶ τοσαύτα φύλλα: πλεῖστα δὲ τοιαῦτα ἴσθ' ἡμεῖς Φιλίππου, οὗτοι γὰρ λαμβάνονται ἐκ τοῦ Παγγαίου, φυνύσσου, καὶ γὰρ ῥήνεται πολλὰ. σμύλα δὲ σφόδρα τὰ ἐν τῷ ἡγάρβου αὐτοῖς οὗτοι, ὥς τ' ἵνα τὰ μὲν ἐν τῷ, τὰ μὲν ἐν τῷ, οὐκ ὡς σμὰ δὲ, οὐδὲ μὲν γὰρ τοῖς μὲν γὰρ: ἐν δὲ τοῖς μεγάλοις ἐν τῷ μὲν γὰρ ὡς τραχὺ ἔστι καὶ τῷ.*

Plinius autem lib. xxi. cap. 1111. Nat. Hist. de Rosa agens sic scribit. Genera ejus nostri fecere celeberrima, Prænestina & Campana. Addidere alij Mileſiam, ejus sit ardentissimus colos, non excedens duodena folia. Proximam ei Trachiniam minùs rubentem,

mox Alabandicam, vilioiorem albicantibus folijs, vilissimam verò plurimis sed minurissimis

Spineolam. Differunt enim multitudine foliorum, asperitate, sapore, colore, odore. Paucissima quia folia, ac deinde numerosiora. cum sit genere ejus, quam Centifoliam vocant, quæ est in Campania Italix, Græciæ verò circa Philippos: sed ibi nõ lux terræ proventus Pangæus mons in vicino fert, numerosis folijs ac parvis: unde accolæ transferentes conferunt, ipsaque plantatione proficiunt. Non autem talis odoratissima est, nec cui latissimum maximumque folium breviterque indicium est odoris, scabritia corticis.

Athenæus verò lib. xv. Deipnosoph. (ejus verba latine expressa addam, nam græcum exemplat præ manibus non habeo) Rosarum multa esse genera, Theophrastus lib. vi. inquit, & horum plurimi in flore quinque folia, quibusdam duodecim, alijs viginti, nonnullis circa Philippos (Macedoniæ oppidum) centum, quas plantant ex Pangæo translatas, ubi copiosæ proveniunt. Harum pusilla valde sunt interiora folia: sic enim illa prodeunt, ut intrinsecus alia sint, extrinsecus alia, sed nec ampla, nec odoris jucundi. Suavius olent quibus folia quina, si scaber est cortex inferior. Præstantissimus odor Cyrenis: quamobrem nobilissimum est illic roseaceum unguentum.

Odoratissimam etiam apud Cyrenas nasci, auctores sunt locis suprâ citatis Theophrastus & Plinius.

Herodotus autem in *Fræniâ*, five lib. viii. rosas in Midæ Gordio geniti hoctis sua sponte nasci refert sexagenum foliorum, fragrantiore odore quàm ceteras.

A n potèd, quæ apud Baravos Centifoliæ nomine dicitur Rosa, ea sit, cujus prædicti Auctores mentionem faciunt, heræo. Nam illi Centifoliam inodoram esse, & pusilla habere folia, scribunt. Quæ autem apud Baravos alitur, non modò refecente N. V. Ioanne ab Hoghelande (qui binas ejus plantas sub anni M. D. xcx. initium mihi misit, quas cum prævaluisse putare, corruptas esse deprehendi, præter unius radiculæ fragmentum) Prænestinæ majores, & perinde ferè odoratas intellexi: sed etiam Francofurti ad Mœnum apud Balthasatem & Carolum Huyke Belgas fratresque germanos illo ipso anno conspexi: sequente verò, ex neglecto illo, & veluti abjecto fragmento nata mihi est stirps, quæ altero anno nempe xci. circiter quadragenos flores tulit, non omnes tamen ejusdem amplitudinis, sed in nonnullis numeravi centena vicena folia, extrinsecus majora, intrinsecus pusilla, staminum locum explentia, & in ipsum calicem reflexa, odorem autem deprehendi prænestinæ, ad albam nonnihil accedente, colorem prænestinæ non dissimilem.

Istius etiam stirpem unam, quæ album florem ferat, habere se ait idem Hoghelandus, medix inter illam & proximè sequentem magnitudinis, quam albam majorem provincialem appellari ait, ut superiorem, majorem Prænestinam.

Sed & rarius aliud Centifoliæ genus apud eosdem Batavos inveniri, nuper ad me scripsit ille ipse Hoghelandus, priore aliquanto minus, hoc est, medix inter illam & vulgarem prænestinam magnitudinis, alioque, color, odor, forma, conveniunt: quod verum esse ex ejus planta ab illo M. D. xcii. missa, sequente anno deprehendi.

Prioris generis aliquot parvas stirpes postea accepti ab ornato viro, eodemque docto & diligente pharmacopœo Delphensi, Theodorico Clutio, quarum paucæ quædam bellè germinarunt, ut permansuras sperem: sequente anno una florem tulit.

Non defunt, qui Prænestinam albi coloris inveniri asserant: nisi certè nondum videre contigit, nisi forte ea sit quam honestus vir Wilhelmus Osterreich Francosurtenis civis unicam in cultro suo orto alit. Illius flos multò dilutior Prænestina, & ferè albicans, perinde tamen magnus & plenus, in quo nonnulla etiam folia observavi media ex parte candicantia, altera purpurea scentia, vel similis coloris venis aspersa. Anno etiam M. D. xciii. florem mihi protulit ea quam ad me Hoghelandus miserat, planta.

Illi congenere esse videtur elegans illa rosa, de qua honestus vir Ioannes Resleau, civis Colonienfis, superioribus Autumnalibus nundinis apud me verba fecit: se videlicet Colonie in suo orto alere foliam Prænestinæ similem forma & magnitudine, quæ ut plurimum dimidia ex parte candida folia haberet, reliqua rubra, aut tertia duntaxat ex parte alba, vel nunc integra alba, modò integra rubra inter se commixta conspiciantur. Ejus prolem sequente Octubri ad me mittebat, quæ prævaluit quidem, sed nondum florem ullum dederat, quum Francosurto excessi.

Accipio etiam flavas rosas multiplici foliorum serie prædictas extare: nuper enim Vienna Austriæ ad me scribebat nobilis Matrona, ejus ipsi factam esse speciem, & aliæ similes expectare retulerunt. Memini certè aliquando videre, Constantinopoli allatos chartaceos quosdam hortulos varij generis stirpibus ornatos, quæ ex chartâ tenuissimè incisâ tam affabrè constructæ, & singulæ suis coloribus adeò eleganter depictæ erant, ut magnam admirationem & voluptatem spectatoribus adferrent: inter eas erant & flavæ rosæ plenæ, & aliæ plæteque stirpes raræ & elegantes.

CETERVM ad eas quæ præter vulgates à me observatæ sunt, redeamus. Illarum autem varietates sunt species.

PRÆNESTINÆ, quam vulgus Provincialem vocat, valde similis est Prior, nec illâ minus altè assurgit: in solo flore discrimen est, qui circiter quadragenos aut pluribus folijs, paulò amplioribus, & saturatis nonnihil rubentibus constat, multis staminibus flavis umbilicum occupantibus, alabastroque multo crassiore & brevior, quam ob causam *Tulpe rose* vulgo appellatur:

*Cynnaia
rosa.*

*Rosa 60-fo-
liorum.
Centifolia
Batavica I.*

*Centif. Ba-
tavica alba.*

*Centif. Ba-
tavica II.*

*Prænestina
alba.*

*Rosa versif-
color.*

Flavaplena.

*Admiranda
horri Charta-
tata.*

Rosa I.

appellatur: odor minus suavis, & albæ ferè proximus. Hujus genus album florem ferens apud Batavos invenitur, Centifoliaque alba illis dicitur, de qua luprà.

Valde frequens est Viennoentibus hortis, & tota Austria, nullius tamen apud illos usus, quàm ad eliciendam stillatitiam aquam. Francofurti ad Mœnum quædam ejus stirpes Prænestinus mihi aluntur. Floret cum ceteris Junio, interdum etiam Maio.

Rosa sine spinis.

Rosa Cinamomea pleno flore.



MULTIS statim à radice assurgit Altera virgis, humanam altitudinem interdum æquantibus si fertili solo & umbroso loco pangatur: ut plurimum verò longè infra eam magnitudinem, & cubitalibus dumtaxat, vel sesquicubitalibus, levibus & sine spinis, viridibus, in varios ramos diductis folia habet alata, hoc est ternis aut quinis uni costæ (quæ subspecta est) inherentes, binis semper inter se oppositis, extremo impari satis amplo, constantia, fusca viriditate supernè nitentia, in setinè canescentia: extre mis ramis insident flores, oblongis hirsutisque pediculis inhxerentes, multiplici foliorum numero constantes, Prænestinis majores, medijsque inter illas & rubras coloris, jucundi odoris: fructus brevis, crassus, penè orbicularis, maturitate rubens, inæquale semen, & ut rectè Theophrastus notat, *αμαρόδεν*, ut omnia Rosarum genera, lanugine involutum continet: radix dura, lignosa plerumque, aliarum instar, sub terra propagines io lateribus spargit.

Hujus cognitionem acceptam feto C. V. D. Joanni Schrôtero seniori, Ienensis Academig in Thuringia Primati, & Ill^{mo} Ducum Saxoniz, Landgraviorum Thuringiz, & Principum Coburgensium & Wimarensium tom Medico, qui ab Ill^{mo} Principe Principum Wimarensium matre eam nactus, liberaliter Viennam usque mihi misit anno M. D. LXXVI. Floret autem Junio. Vidi etiam multos postannos in quorundam Prætoriorum hortis Francofurti ad Mœnum. Nec desunt qui flore albo se confpexisse affirmant.

2. Aliud ejus genus invenitur non valde dissimilibus virgis, Viennæ Austriæ etiam antequam in eam urbem adventum, in quibusdam hortis cultum, quod minores & rariore foliorum textura constantes flores profert, colore penè secum vini rubri.

PARI propè Tertia est magnitudine: rarò enim duorum cubitorum altitudinem superantem Viennæ observavi, frequentibus & brevibus ramis donatam, purpurascensibus, quibus & brevibus spinis armati sunt: foliorù alx illis similes quæ in Rosa, vulgo Canellæ cognomen adepta, sunt, hoc est, ex quinis aut septenis folijs æquali inter se spatio distantibus coequant, uno hinc, altero inde, geniculatim conjugatimque semper adhxrente, unoque in cacum ene exeunte, coloris superius parte viridis, inferna candicantis. Flores vulgari Cinamomeæ rosæ similes, sed majores, & multiplici pusillorum foliorum glomeratione constantes, quemad-

Rosa sine spinis.

Rosa sine spinis.

Rosa sine spinis.

Rosa Cinamomea pleno flore.

quemadmodum alba & Pnestina: odor ferè qualis in Alba vulgari plena fructum nondum videre licuit, tamen in multis annis aluerimus: ejus radix latè admodum scripit, & vivax est, novas virgas subinde producens.

*Eius natalis
dubij.*

Vnde primùm Viennam allata sit, plerique dubitant: nōnulli tamen ex Tyrolensi Comitatu originem ducere existimant: alij è Gallia Moschari pleno rubro flore nomine missam. Tunc in omnibus Cæsareis hortis, quorundamq; Principum virorum, & Nobiliorum matronarum, & aliorum qui herbarie rei studio oblectantur, alebatur: multò verò frequentior postea apud Mag^{tes} ac Generosos Dominos Adolphum Hermannum & Georgium Oxidest^{rum} Episcopi patrueles, Hassiæ Marechalcos hereditarios: sed omnium frequentissimam Cassellis in amoenissimo cultissimoq; horto Ill^m Principis Wilhelmi Landgravij Hassiæ, &c. altius multò, & supra humanam altitudinem sese attollentem, interdum etiam Autumno rursus florentem, quæ tamen florem minus plenum superiore, quæ Viennæ est, habere mihi visa, & stolonum atque ramos minus rubentes.

Rosa campestris odorato flore.

Rosa campestris cum suo fructu.



QUARTA humilis est & fruticosa, folijs illi quæ album florem fert, persimilis: sed ejus flores, licet albi, longè minores, neque unquam planè sese explicantes, ejusdem cum alba vulgari odoris & coloris, qui tamen plus carni admistum habet. Paulò ferius alia floret.

Hanc primùm observabam in cultis. D. Ioan. Acholtzj horto, unde illam acquisivisset ignorantis: deinde Francoforti a I. Mœnum in quorundam Patriciorum hortis. Plurimum autem meo iudicio accedere viderur ad Græculam Plin. quam lib. XXI. cap. xxx. describit.

*Rosa granata
Plin. ferè.
Rosa campo-
stra odora.*

QUINTA cubitalibus alijs, aut ad summum, sed rarissimè, bicubitalibus assurgit virgis, firmis, duris, lignosis, rubescentibus, densissimo spinarum vallo munitis, ex quibus frequentes confuso ordine oriuntur spinosi ramuli, virides, singuli suum florem sustinentes, album, odoratum, quinque folijs constantem, luteæ aut Caneleæ rosæ vulgaris æqualem, capillaceis quibusdam staminibus cum suis apicibus luteis medium floris umbilicum occupantibus: fructus rotundus, brevis, in initio viridis, deinde, plenam maturitatem adeptus niger, crassa, angulosa, candida, dura semina continet: folia sunt inter eam quæ luteis simplicibus fert flores, & illam quæ ab aggeribus in quibus sponte provenit, sive à Pimpinellæ foliorum similitudine nomen apud Belgas accepit (dunnen roosen & pimpinelle roosen enim appellant) ferè media, per ambitum ferrata, & nullus splendoris, radix dura, lignosa, in diversa tendit.

Invenitur multis circa Viennam locis, præsertim editoribus & montosis. Floret Maio, quo tempore rusticæ mulieres plurimos ejus fasciculos, ob odoris granam, venales in forum deferunt. Fructus Augusto maturit.

SIXTA

Sexta pedales, atque aliquando cubitales etiam ex eadem radice profert virgas, virides, lentas, inferne paucis, superne multis spinis rigeantes: foliorū alas rubræ simillimas, quioque aut septem folijs superne viridibus, inferne candicantibus constantes: summis virgæ & ramulis innascuntur satis magni calices sive alabaſtri, hirti barbatiq̃ue, quales in rolis rubris simplici foliorum ordine contantibus, ex quibus deinde sese explicant magnæ, non omnino odoris expertes rosæ, quinque folijs præditæ, in riu rubræ, deinde paulatim remittunt & quasi evanescunt rubedine, carnei ferè coloris, multis luteis flaminibus, floris umbilicū, quemadmodum in alijs rosis, occupantibus: fructus ruber, rotundus, omnium maximus & pyri ut modum turbinatus, sulvescente pulpa, inæqualia alba semina continet.

Nascitur passim in cædis silvis, aliarum silvarum marginibus, sublimioribus & desertis agris per Aultriam inferiorem & universam Pannoniam. Floret Junio, fructus matureſcit Augusto, & plerumque tota hieme ipsi stirpi inharret.

Non ineptè, meo quidem iudicio, γαμπίδος ὅς ἔστιν ὁ ῥοζὸς dicitur hoc Rosæ genus, Latine Rosæ-pumila: Austriaci *Erntrosen* vñ *Sperdosen* Vogari verò *Paragi-rosa* appellant.

RVVS IDÆVS PLACÆ.

CAP. LXXXII.



IDÆI rubi genus mihi ostendebat C.V. Ioan. Ines Plaga Medicus & Professor Valentinus, eodem cœnobio, quo Perleæ superius detinpram, primo ab urbe Valentia miliari, sine spinis, folijs rubi mollioribus, longis famentis per terrā sparſis, cujus fructum dicebat Rubo vulgari minorem, alijs illi admodum similem.

Ansam fortè præbuit Placæ ut hanc plantam rubum Idæum censeret, Dioscoridis Latinus codex, qui capite de Rubo idæo, quod est in quarto libro, hæc verba, *quandam & sine spinis invenitur*, addita habet, præter Græci codicis fidem.

CETERVM in Austriacis & plerisque Germaniæ silvis sponte provenit Rubus ille baccis sive moris rubris, nō modò saporis, sed etiā odoris gratia commendaris: Eum Germani *Spindel* Galli *framboisier*, fructum *framboises* appellant: peritiores Idæum esse censent, de quo Lioſc. ut dixi, lib. iiii. Plinius lib. xvi. cap. xxvii. Nat. Hist. & lib. xiiii. cap. xiiii. in hæc verba scribit.

Idæus rubus appellatus est, quoniā in Ida, non alijs, nascitur. Est autem tenerior ac minor, rariotibus calamis ionocentioribūq̃ue, sub arborum umbra nascens. Hujus flos cum melle epiphoris illinitur, & ignibus facris, stomachicūq̃ue ex aqua bibendus datur, ubi stomachicus legendum cum Dioscoride: nam lib. xvi. cap. xxvii. contra stomachi vitia bibi scribit.

Rubus porro idæus hic in hortis colitur duorum generum, rubro videlicet & albo fructu.

RVVS SAXATILIS, SIVE PETRAEVS.

CAP. LXXXIII.

PEOALEM non superat altitudinem, teretibus, subrubentibus, & hirsutis viriculis, iocibus bina aut terna folia, Rubo Idæo à plerisque nuncupato penè similia, hoc est rema simul ex eodem pediculo nascentia, rugosa, non hirsuta tamen, nulliq̃ue spinis horreoctia, valè exsiccantis & adstringentis gustus, deinde amariuseculi in summis viticulis & supremis earum alis flores quidem fert (sed cujus formæ aut coloris, ignoro, verisimile est Rubo Idæo aut humili pares) deinde fructum rubo vulgari aut Idæo minorem, hoc est minore acinorum numero constanter: etenim binos rannū, ternos, quarernos, aut ad summum quinos acinos habet, longè tamen majores quàm in ullo alio rubi genere, omnimodò rubentes, & adeo succi plenos, ut quodammodo transparent, acidi & palato gratissimi saporis: continent singuli illi acini singula grana alba, rugosa & inæqualia, adstringentis gustus: radix longè lateq̃ue serpit, & longas interdum viticulas humi spirgit, quæ subinde radices agunt.

Abundè provenit in saxosis collibus Neuberg monasterio immincentibus, sub celsissimo ejusdem oominis monte, cujus summum jugum perpetua nive obſitum. Crescit & in alijs scopolis qui circa celsissimorum montium radices sunt, non tñ ipsi montium jugis. Augusto mense colligebam maturo suo fructu onustum.

RVBVM

Rubus saxatilis alpinus.

Nemina.

Rubi idem.

Rubi idem
G. J. J. J.

CHAMAEMORYS.

Chamaemori
Anglicana.

Natalis.

Nemina.



RUBVM saxatilem sive petrarum appella-
vi, quia foliis saxosis & petrosis locis inveni,
aliud enim nomen magis proprium mihi non
fuecurrebat. Rustici montani *Stinber* hoc est
petras baccas vocant. *Χαμαίμορις* Theophras-
ti non ineptè in eo iudicio etiam dici posset:
Gaza humirubum interpretatus est. Quan-
quam proximè ad Chamaebaton etiam acce-
dat humilis ille rubus plerisque Belgicæ silvo-
sis locis & agrorum marginibus interdum na-
scens, baccis sive moris succulentis, paucis &
exiguis acinis constantibus, modò nigris, mo-
dò cæruleis, palato admodum gratis. Occupat
etiam ille multos Austris & Pannonis agros,
Vngaris *szodory* dicitur; vulgaris verò rubus
chypkefa, & *szody seedor*, id est terrestris morus.

Notus autem Gelnero haud dubiè fuit hu-
milis hic rubus, cum què in descriptione mon-
ti-*fracti* idem appellat. Rubus idem inquit,
fructu rubi ferè, absque ullis spinis, humilis
planta, lignosa radice, folijs rubi vel fragi,
acinis binis, ternis, aut singulis in uno fructu aci-
do sapore, in saxo. Meminit & in Epistolis.
Similis etiam Commentario de Alpibus.

Similem planè meo suis baccis onustum,
eodemque nomine apud montanos palliores
insignitum, ex Silesiæ montanis scopulis eru-
tum, ad me mittebat D. Achilles Cromerus
anno M. D. LXXX. quem copiosè ad meralli-
cas fodinas *schumann* nasci postea sciebat.

CAP. LXXXIII.

INTER mites Rubos etiam censenda est
hæc elegans planta, cujus iconem & histo-
riam nobis communicabat C. V. Thomas Pen-
næus, Londinensis medicus, suprà memora-
tus, Chamaemori appellatione inditâ.

DODRANTALIUS autem prædita est viti-
culus, in quibus alternarim tria, quatuor, raris
quinque, folia scabra, malva, vel porius mori
(*novella videlicet & primùm nata, malum tamen
cum Rubus vulgaris folijs conferre*) folijs non val-
de dissimilia, in quinque præcipuas partes di-
visa, & per ambitum serrata, longis pediculis
innixa, qui ex binis alis sive apophysiis cau-
liculum amplectentibus exeunt. Summū cau-
lem exornat flos unicus quinq; foliolis ex ni-
gro purpurascensibus constans. Fructus mori
fructu (*rubi vulgaris varietas*) similis (unde
nomen) sed paulò minor, primùm albicans &
acerbus, postea ruber, ex acerbo dulcis: radix
utcumque nodosa, ex singulis nodis paucas fi-
bras spargens, mirè se propagans, & quam lon-
gissimè serpens, adeò ut brevè tempore maxi-
mum spatium occupet. Floret Iunio & Iulij
initio: fructus Augusto maturus est.

Nivola & aperta loca amat, summosque
montes, & magnâ copâ inter ericas provincit
monte Engleborow totius Angliæ celsissimo,
duodecim miliaribus à Lancastria.

Angli *knobberries* appellant, hoc est, nodo-
sam baccam, à fructu nodis simili. Gullu ad-
stringit, exsiccat, & refrigerat.

CHAMAE-

CHAMÆMORO superiori valde affinem in Norwagiâ & finitimis regionibus nasci, ex doctissimi viri Hennici Hoiæ Medici, ad præstantissimum virum D. Petrum Pauvium publicum in Lugdunensi apud Batavos Academiâ Professorem epistolâ intelligebat: qui & ejus fructum conditum sub extremum annum M. D. XCIII. mittebat, & insequentis anni Ludovigulas, cum folijs & flore inter chartulas repositas.

ERANT autem hæ virgæ tenues, digitalis longitudinis, fusci coloris cortice obductæ, quibus inhærebant uncialibus petiolis folia, vulgaris Ribes folijs nõ valde dissimilia, sed paulo magis orbiculata, in brevès aliquot lacinas divisa, tribusque eminentioribus nervis aversâ parte prædita, è quibus multæ venæ ad circumferentiam sparguntur, in ambitu dentata: è summis virgæ exeunt oblongiores tenuioresque petioli sustinentes singularem caliculum, è quo flos emergit candidus, nunc quaternis, modò quinis foliolis constans, umbilicum occupantis multis exilibus flaminibus albis cum flavis apicibus: flori fructus succedit, fragi magnitudine, rubens aut pallidus, cujus interior pulpa mollis, humida, mucilaginosa, exilium acinulorum plena, gustu non insuavis.

Paludosis & humidis locis gaudere, ex Hoiæti epistolâ didici, & maturitatem adquirere fructum, mensibus Junio, Quintili, Sextilibus incolis verò *Motessem* appellari.

CETERVM, quæ conservandi hujus fructus ratio, quàm admirabiles ejus facultates, cum ex ipsius Hoiæti epistolâ, tum ex ijs quæ ipse anno sexto & nonagesimo supra millesimum & quingentesimum præfens mihi Lugduni confirmabat, subijcere libuit.

EX ipso fructu, inquit, Electuarium rudi minervâ conficiunt quotannis Norwagi, atque Finmarchij, in hunc fermè modum. Baccas in silioli aut atheno per se ad medicocrem consi-

stentiam coquunt, nullo alio addito liquore: cum enim succi plene sint & molles, alieno humore irrigari non expetunt. Quanquam in delicatioribus sunt nonnulli, qui melicari Fionensibus (quo summe deficiuntur Septentrionales isti) aliquid affundant. Hanc confectionem idoneis vasibus exceptam, & ne corrumpatur ab ambiente aëre, butyro dissaluto obductam, usui studiosissime reservant: nobile sanè, & probatissimum illis ad versus scorbutum remedium. Etenim non facile credas, quæ miracula ista gens, solâ hac medicinâ faciat quotidie: ut omnino fatendum sit, nihil ad hanc esse vel cochleariam illam tot encomijs hæcenus celebratam, vel becaubungiam, vel sisybrium cardaminem, & id genus alia, quibus Germani sese effertunt. Et meritò admiranda singularis Dei benignitas, quod Nordlandiæ longius ad Septentrionem remotæ, & sædissimis morbis ob cæli solisq; inclementiam miserabiliter laceranti, indigenis remedijs prospicere voluerit: enim verò morborum crudorum, putridorum, melancholicorum, mira hic ubique feges. Idcirco necessitas miseris rusticanos varia auxilia edocuit, ut nunc vel in gravissimis casibus pauperculus aliquis accommodatè sibi suisq; mederi sciat. Ita nonnulli scorbuticos, quamvis ridiculè, tamen benè atque utiliter hunc in modum curant. In viciniam aliquam insulam moris abundantem exponunt, ibidemq; solos relictos, domum non transferunt, priusquam sanitati sint restituti. Tum enim illi, quasi ab omni humanitate exclusi, vitæ tamen (quod credibile est) cupidi, moris istis vesci coguntur, si ve ut extremo remedio promissam sanitatem recuperare tentent, si ve ut sitim, quæ ut plurimum torquentur, extinguant. Dumq; hoc ad satietatem agunt, sine dubio intra paucos dies oppiddò convalescunt. Hieme verò quando id non licet, electuario suo non minus feliciter utuntur, sine certâ dosi, aut custodiâ. Aliqui toto curationis tempore, nullo alio alimento utuntur. Hæcenus Hoiætus.

SEXO & ille ipse alterius cujusdam Bacciferæ, similis præne superiori folijs, à se in Norwegia observatæ historiolum mihi anno M. D. XCVI. communicabat.

PROXIMAM (id superiore videlicet) inquit, laudem meretur, fruticosa quædam stirps, quæ Ribesium foliolis & fructu, pro suâ proportionè aded æmulat, ut nõ dubitem tertiam Ribesij speciem appellare. Dodrartalis est, cortice petiolotum nigricante, folijs latis, dissectis vitis foliorum modo: baccæ in cusuque pediculi apice quamplurimè conjunguntur tamquam in umbellâ, non, ut in vulgari Ribese, è multis oblongis racemulis pendentes, rubent, acidulæ, saporis valde grati. Incolis *Cattentem* nuncupantur.

CVM in Ribes vulgaris mentionem inciderimus, significandum existimavi Austriacas & Striacas alpes ejus quoddam genus alere, nihil, vel quàm minimum à vulgari differens, fructu tamen non acido, sed dulci.

Est præterea Secundum genus amplioribus folijs & majore fructu, licet acidi saporis ut vulgares hujus enim flos variat, quia qui in vulgari herbacei coloris est, in hoc eleganter rubet & puniceus est. An huic similis quam N. V. Ioannes Boisor in horto Bruxellis alebat?

Mittebat etiam anno M. O. XXXIX. aliud Ribes genus ex Angliâ acceptum ad me N. V. Carolus de Tassis veredarius Antuerpiæ præfectus, quod vix Crispæ rubro fructu appellatione inscriptum erat. Postea tamen è Jacobi Gareti epistolâ Londino ad me missâ fructum ferre intelligebam (meus enim frutex flores quidem tulit, deinde corruptus est) vulgari sim-

Chamæmorus Norwagica.

Natela. Nomen.

Condimento. Fructus.

Facultatem.

Scorbuticos curandi apud Norwagiam ratio.

Chamæmorus altera Norwagica.

Orthocentrus.

Ribes vulgare, dicitur fructu.

Ribes vulgare, rubens flos.

Ribes vulgaris fructu dulci.

Berberis vulgaris.

Ribes mon-
ogynum.Grossularia
fructu obli-
quo purpu-
rascente.Grossularia
major fru-
ctu
Ribes vol-
garis nigro &
albo fructu.

Theophr.

Ribes legi-
tim. Arab.

Halep.

Berberis vul-
garis.

milem, paullo majorem, confertum tamen in eodem pediculo non nascentem, sed singula-
tem ut in uvâ crispâ.

Certe anno M.D.XCIII. Leydz conspiciebam Grossulariæ genus amplioribus nigrio-
ribusq; folijs, spinas ad singulos foliorum exortus binas vel unicam habens (interdum etiam
nullas) breves & vulgari multò infirmiores, præter alias inertes & longè breviores sparsim ra-
mis cortice ex fusco purpurascente testis innascentes: fructum, dum immaturus est, vulga-
ris instar videntem, qui maturus purpurascit, plenâ autem maturitate ex purpurâ atrum co-
lorem contrahit perinde ac nonnulla pruna. Atque id esse arbitror, quod paullo supra signi-
ficavi ex Anglia missum.

Vulgaris tamen genus etiam invenitur uberius nascentem, amplioribusq; folijs & majori-
bus baccis præditum.

Vngari porro vulgarem rubro fructu (nam quæ nigrum fert illis est ignota multò autem
magis quæ albo fructu prædita est, mihi paucos ante annos eum Grossulariâ fructu obcurâ
purpurascente cõmunicata) *apros senjers cõs*, id est, minorem marinam uvam appellât. Qui-
dam, teste C. V. Iacobo Dalechamptio, hunc fruticem & Grossulariam sive uvam erispam
vulgarem, Theophrasto cognitos esse volunt *ῥῶν* nomine: an verò Grossulariæ hæc appella-
tio convenire possit, ambigo, quandoquidem Theophrastus nullas spinas *ῥῶν* (quem Gaza
Aequum interpretatus est) tribuit, quam notam adeò insignem & singularem diligentissimus
& accuratissimus scriptor haud dubiè non prætermisisset. Eius verba subjungam, ut sunt lib.
III. Hist. Plant. cap. XV. *Τὸ δὲ ῥῶν, τὸ μὲν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν, καὶ τὸ αἰθρὸς ὑμᾶν τὸ καρπὸς κα-
τὰ λόγον ὁ μὲν λευκὸς δὲ μέλας ὅτι μὲν ὡς περ ἀνὰ μέσον διὰ τὸ αἰθρὸς ἵπποφύλλῳ καὶ ἐπὶ οὐκ
πρὸς μετὰ λευκὸν ἐστὶν, ὡς περ τὸν ἔχει δὲ καὶ τὰ φύλλα λευκότερα καὶ λευκότερα καὶ τὰς ραβδούς, τὸ μέλαν.*

De Ribes autem legitimo, libenter acquiesco sententia C. V. L. Rauwolfij, qui nascentem
ejus plantam in monte Libano observavit, ut ipse lib. II. cap. XI. I. sup. per ea loca Peregrina-
tionis scribit. Legitimum, inquit, Ribes Arabum istuc inveni Septembri mense, tamquam
primum, & præter anni tẽpus et umens, sine flore & semine, duobus duntaxat folijs prædi-
tũ, hirsutis, orbicularibus, Petasitis foliorũ vulgo crediti amplitudine, quæ brevis, sed cras-
sis & nõ minùs succulẽtis, quàm ipsi caules, pediculi in hæreticæ quibus caulibus fit (quem-
admodum in Halepo confixi) legitimũ Rob Ribes Serapionis. Gaudet humidis locis, cras-
sam habet radicẽ ex nigro purpurascens, longiusculâ, rugosâ, incurvâ & flexuosâ, sa-
tis ingrati saporis: caules, ut præcedẽte capite adnotat, pænè cubitales, hirsutos, unciâ crassos,
virides, infernẽ (ut etiam Serapio prodidit) purpurascens. Ante ipsum porro, etiam illo ipso
loco observabat Petrus Bellonius, ut apparet ex libro, in quo de Coniferis arboribus agit.

CETERVM per Vngariam, Austriam & vicinas Provincias, frequētissimũ etiam est spi-
nosũ

Spina appendix Plinij.



Clematis daphnoides latifolia.



Ad eorum autem classem non dubium est quin referenda sit vulgaris illa omnibus, quas adij Provincijs, planta, vicinis arboribus & sepius sese implicans, crassis, rugosis, lenitque farmentis, folijs quinis ex uno nervo prodeuntibus, gustu acerbis, floribus albis, multa ita-

nosus ille frutex, qui in officinis Berberis appellatur, Germanis *Erbsl*, Gallis *Effine vinette*, talis *Cressino*, Vngaris *iröm barbara*, & *fej seska*, hoc est, vinum barbarum, & arborea acetosa, nuncupata. Hadrianus Iunius vir eruditissimus, & alij docti, Spinam appendicem Plinij esse censent. Ego, tametsi illorum sententiae facile subscribere possem, retinent me tamē dubium quædam notæ peculiare & manifestæ in Cressino, sive Berberi officinarum, quæ in Spinæ appendicis historia non fuissent prætermittæ, si eam intellexisset Plinius, nempe flavum lignum, & magis flava radix, etiam ad tingendum apta, deinde trium illarum spinarū ad singulos nodos perpetua series. Sic verò ego existimo, Spinæ appendicis descriptioni non minùs bellè quadrare eam Spinam, quæ passim tonsilis, præsertim apud diligentes & curiosos hortorum in Belgio cultores, macerie implexâ, extimas hortorum oras ambit, rubentibus baccis forundas, quam Germani *Aschafenburg*, Galli *Anke effine*, Vngari *Galazinya* se appellant: vulgus Herbariorum *Oxyacantham* nominat.

P. 4. T. 4. verò multiplices facultates Berberis vulgaris, quæ officinis notæ sunt, & à C. V. Matthiolo descriptæ, hoc secretū ab amico accipiebam: vinum album tenue, in quo medianus ille cortex qui inter extimum & ligno adhaerentem est, lineo panniculo involutus, per trius horarum spatium maceratus fuerit, mirificè, si bibatur, purgare.

Ilius porro Berberis genus, Aschafenburgi ad Mœnum quinis supra Francofurtū milianbus, inveniri, cujus bæccæ sive acini granis interioribus careant, ad condiedum proculdubio aptissimi, non modò intelligebam, sed magnū ejus fruticem in culto horto Ioannis Mûler diligētissimi Phamacopæi & civis Francofurtensis cōspiciebā.

CLEMATIS. CAP. LXXXVI.

CLEMATIDIS duo genera facit Dioscorides, & diversis locis describit. Prior *Aschafenburg*, cognominata, vulgo Vinca pervinca, quo nomine etiam ab ipso Plinio vocatur, qui lib. XXI. Nat. Hist. cap. xv. Ægyptiam quoque cognominare videtur. Ejus autem binæ sunt species: Vna vulgarior, cæruleo, ut plurimum, flore, sed quæ eum etiam variat, ut nūc albus, nunc subpurpureascent, qualem apud Allobroges sponte nascentem inter vepres observare memini, præsertim circa Lausannam, eumque interdum aliū florem medium complectentem: Altera longè amphora habet folia, crassiores viticulas, majoresque flores colore cæruleos: ea sponte nascitur cum multis Hispaniæ locis, tum in Narbonensī Galliā, magnā præsertim copiā circa Mompelum.

Alterā Clematis à Diosc. lib. I. Plin. lib. XX. cap. xv. describitur: facultates enim ab utroque Auctore traditæ conveniūt. Hujus varia genera in Belgicis hortis aluntur peregrè accepta, quorum tandem coloniam in Austriacos hortos etiam tradecebam.



Clematis cærulea Pannonica.



(plantâ nondum conspectâ) ad amicos in Belgicam mittebam: ex eo procreatâ plantâ simi-

Hanc stirpem primum inueniebam anno quinto & sexagesimo supra millefirmum & quingentesimum, inter Alindum (vulgo *Medina Sidonia* appellatum) & Calpen, secundum fluentem, vicinas arbusculas operientem & suo pondere deprimentem: deinde alijs Bæticæ locis, Ianuario jam suos cincinnos explicantem.

Non dubium est quin ad *Almatidâ*, cuius Dioscorid. lib. 1111. meminit, referenda sit, cum & formâ & temperamento sit illi valde similis.

CLEMATIS CÆRULEA PANNONICA.

CAP. LXXXVIII.

TAMETSI hæc fruticibus sese non implicet, ut superiores, sed satis firma sit, nec adminiculis egeat, Clematidis tamen nomen imposui, quia ejusdem est temperamenti, & florem purpureæ Clematidis fere simile habet.

QUATERNIS autem vel quinis affurgit sarmentis cubitalibus, rectis, duris, lignosis, fulvescentibus, quadrangulis, striatis, quibus multa innascuntur folia, asclepiadis pæne folijs respondentia, bina semper inter se opposita, quæ initio sese invicem amplectentia, folliculi, aut tumentis vesiculæ formam exprimentur, deinde expanduntur, lata, venosa, non valde dura, fervidigultus, quemadmodum Flammulæ Matthioli folia: extremis sarmentis & lateralibus ramulis quibus divisa sunt, singulares propendent flores magni, quatuor folijs crucis in formam decussatis constantes, deorsum nutantes Clematidis alterius purpureæ florum modo, mucronibus tamen exterioribus nonnihil reflexis, eleganti cæruleo colore foris saturatiore, intus dilutiore præditi, nonnihil odorati, medirullium occupantibus multis staminibus villosis ex flavo purpurascenscentibus: quibus succedit semen Pullatillæ semini fere simile, in rotunda capitulo, & veluti pilulas Atragænæ glomerato fructui similes congestum, longâ villosâ, reflexâque comâ exornatum, nullius acrimoniæ particeps: radix satis crassâ, sarmentitica, multas obliquis & fulvescentes fibras spargit, peninde atque Clematis altera purpureo flore. Caules sive sarmenta singulis annis ad radicem usque marcescunt, & ineunte vere novella, frequentioraque ex ipsâ repullulant.

Invenitur sponte nascentem in pratis circa Stampfen duobus ultra Posenium Vngariz miliaribus, & alijs ad Danubij ripas sitis supra Posenium, medio fere itinere inter eam urbem & Tuben, ubi etiam legitimam rubiam sponte crescentem legebam. Floret Maio & Junio, semen maturum est Augusto.

CVM primum Viennam Austriæ appellerem anno videlicet M. D. LXXIII. illius semen mihi communicabat doctissimus vir Ioannes Aicholtzius ejus urbis Medicus & Professor publicus, Clymeni nomine, quo etiam ego

Natalis

Clematis Pannonica cærulea flore.

Natalis

Flammula Matthioli.

Flammula
Matthioli
durr. gener.

10.

11.

Apocyni va-
ria genera.

Apocynum l. latifolium.

Apocynum l.
latifolium.Apocynum 11.
angustifolium.

ciscatur) cacumina superat: sunt verò ea sarmèta dura, lignosa, lenta, fractu invicta, rursus
ex fusco coloris, multis nodis, sive geniculis distincta: quibus bina semper folia ex adver-
so nascencia prodeunt, dura, superioris folijs nigriora, multò longiora, mucronata, plurimò
venis transversum ex medio nervo orientibus insignita, quemadmodum Netij folia, non tamen

lem appellationem istic retinuerunt, licet anno
sequente, cum Maio mense, quibus dixi locis flo-
rentè deprehendissem, sedulo amicis monerem,
Clymeni non fuisse semen quod miseram, sed
alterius plantæ, quæ ad Clematidis alterius ge-
nus aliquod verius referri deberet.

CETERVM Clematis illa altera, sive Flammula
Matthioli, cujus modò memini, adeò frequè
in Austriâ inferiore & Pannonia, ut nullæ sint
ceduæ silvæ, præsertim circa fluviorum in Danu-
bium delabentium ripas, illis tumescens in un-
dantia foliis, quæ eà non abundant. Duorù ve-
rò generum, ab ijs qui diligentius observant, esse
deprehenditur. Vna enim sarmenta rubescencia
habet, quemadmodum & foliorum nervos & pe-
diculos, præcociorq; est, & odoratè fert florem.
Alterius autem sarmenta cum foliorum pedicu-
lis virescunt, & florem senius proferunt. Huma-
nam verò altitudinem utriusque sarmèta ut plu-
rimùm superant, & singulis annis nova, eaq; fre-
quentiora ineunte vere (marcidis & corruptis
prioribus) renascuntur.

Huc protus similem mihi natam memini, se-
mine ab amico mihi misso Clematidis flore al-
bo pleno appellatione. An verò talis reperitur,
me latet: mihi certè nunquam videre contigit.

APOCYNVM. CAP. LXXXIX.

STIRPVM quæ ad Apocyni historiam à Vete-
ribus traditam plurimum accedere videntur,
tria observabam genera: quibus & quartum ad-
di poterit.

PRIMUS stipes pollicari est crassitudine, brevis,
cineraceo cortice tectus, in plures alas sive ra-
mos divisus, qui hæc lèvi sint & viminei, rarè ta-
men vicinis fruticibus sese advolvunt aut impli-
cant, sed nullo adminiculo egentes, per se subsi-
stunt: folia perpetuò gemina inter se opposita, ad
singulos ramorum nodos adnascuntur hederacea
formâ, molliora, quamvis satis carnosâ, qui-
bus vultus aut fractis, ex albo pallescens succus
emanat: flos pusillus, albus, Asclepiadi non dissi-
milis, ex alarum sinu quasi umbellatim prodit.
Fructum non observabam, sed Asclepiadis fructui
pænè similem inrelligebam: semen certè quod hoc
nomine aliquando ad me missum fuit, Asclepia-
deo par erat, planum, in medio aliquantulò in-
tumescent, nigrum, albâ interiore pulpâ, quod terræ
commissum, non est natum. Plantam autem ipsam
satis crassâ radice, pingui, succo turgidâ, & fragili
accipiebam à C. V. Alphonso Pancio Serenif. Ferrariz
Ducis Medico, & Academiæ Professore. Videbam deinde Cassellis apud Illustriss. Principem
Hassic & Cattorum Wilhelmum & Clariss. viros
Camerarium & Aicholtzium, sed & ego Viennæ
Austriæ albam, hieme quidè folia abscidentè,
illius autem inclementiâ facile ferentem.

ALTERVM amplexicaule est, vicinis pedamentis
sese convolvens multis longissimis sarmentis,
quibus etiam præaltorum arborù (si vicinas nan-

adco

Apocynum II. angustifolium.



Apocynum III. latifolium.



admodum angusta, neque dura, lacteo succo plena. Flores extremis ramulis lateralibus infidet quaterni, quinti, aut plures, Asclepiadis nigrae floribus formae similes, multo tamen majores, coloris nigri ad purpureum tendentis, cui non nihil viriditatis admixtum sit, qualis ferè color in Aristolochiae rotundae priores & Polyrrhizae flore nigro, conspicitur. His deinde succedunt oblongae & torosae siliquae Rhododendri siliquis parè similes, geminae ut plurimum, & extrorsum aliquantulum inflexae, sive divaricatae, deinde mucrone tutum coalescentes (quod Plinius his vocibus divisio acuto intelligere videtur) quibus dehiscentibus, semen apparet priori majus, & plenius, multum lanugine, ut Asclepiadis semine, involutum: radix longa, samentosa, late se spargens, & subinde germinans.

Ejus alia species per omnia ferè similis inventur: sed tenuioribus ramis, multoque angustioribus folijs, non minus tamen vitidibus & nervosis. Vtraque Secundi generis species, femine ex Italia accepto mihi nata est, cum in Belgio, cum Viennae Aulicæ, perennissimè est, deciduis tamen hieme folijs, serius flores producens, quam ut fructus ad maturitatem (quemadmodum & Rhododendri) pervenire possit.

TERTIUM, longis, tenuibus & frequèntibus samentis proxima quaque scandit, multiplici circumvolutione & arcto nexu illa amplectens, vitidibus, geniculatis, folijs hederæ mollioribus, subcineracei coloris, lacteo succo, ut etiam samenta, admodum turgidis, ut vel levissimo vulnere, non minus copiosè, quam ex quovis Tithymali genere profiliat. Flores ex alarum suarum multi umbellæ ferè in motu prodeunt, candidi, parvi, quinque folijs perinde ac Asclepiadis flores constantes: siliquæ præterea similes, multo tomento & lanugine plenae, quae semen occultatum, planum, ex cineraceo fuscum, Asclepiadeo semini par. Molestissimæ sunt hujus radices, quæ samentosæ & fibrosæ admodum, eadè ferè crassitudine longissimè hæc illac serpunt, & late vicina circum loca occupant, candidæ alioqui & fragiles, admodum tamen vivaces, ut, si vel minima fibra sub terra latens oculis illa eruentis effugient, proximo vete germinare, & vicina loca occupare conspiciatur. Itaque, non minus exosa hæc planta rei herbariæ studiosis, quam Aristolochiæ clematidis illud genus, cui vulgus Sarraceniæ cognomen imposuit. Hujus cauliculi & samenta hieme exarescunt & pereunt, sed novo vere alia & frequentiora germinant.

Illic siliquas femine plenas, paucos annos post meum ex Hispaniis in Belgicam reditum, cum aliquot alijs seminibus & plantis, Pincii vique mihi mittebat optimus vir Ioannes de Soigny Fabricarum illic Praefectus, hispanica inscriptione addita, *que trepa par les arboles*, hoc est, per arbores cepit: postea radicibus admodum multiplicata est, ut nemo esset in universo Belgio rei herbariæ studiosus, qui eam ex suo horto penitus erutæ non cuperet.

CAETERVM in regni Valentini & Narbonensis Galliae maritimis, praesertim litore illo quod inter Volcatum stagnum & mare mediterraneum est,

Convolvuli genus herbicidis locis observabam, proximè descripto Apocyno non multum dissimile, cum samentosis ramulis, tum folijs quæ magis quidè orbiculata, in mucrone tamen desinentia, cineracei coloris. Tota etià planta lacteo succo pergenans, & vicinarum stirpium cauliculis sese implicans, cujus semen mihi non conspectum. Ejus autem iconem, qualis istic

Apocyn. 1111. latif. Scammonea Valent.

A. Sclepi nigro flore.*A. Sclepi* nigro flore.*A. Sclepi* nigro flore.*Scammonea* Valentini & Mompelliani. *Apocyni* f. *Sclepi*.

Lupulus.

*Lupuli* facul-
tatis.

florens & sine radice à me lecta, studioforum oculis subijcere libuit.

Si n. etiam ad Apocyni classem referendam censet Fabius Colūna V. C. & accertimi, in examinandis stirpium notis, iudicij, plantam illam, quam quotquot de re herbaria commentarios hactenus scripserunt, pro Asclepiade, nigro flore, exhibuerunt. Constat Leclor ejus librum cui titulus OTTOBAZANOC, cap. de Apocyno.

Ad veterum porro Apocynū, *αποκύνος*, quod Dioscorides etiam à nonnullis *κυνόραμβος* appellari ait (differentem tamen à Cynocrambe, de qua peculiari capite postea agit) referendæ hæ plantæ videntur: sed prima omnium maximè. Sunt qui *παραδοξά* ac nomine omnibus Amplexicaulium generibus communi, appellant. Quartum genus Valentinis & Mompellianis Scammonea dicebatur, plurimum tamen à legitima Scammonea distans.

PLINIVS Apocyni femine ex aqua dato, pleuréticos & omnes lateris dolores sanari tradit lib. XXI. Nat. Hist. cap. XI. perniciosum autem esse hunc fructicem canibus, & omnibus quadrupedibus, in cibo datum, & ipse, & Dioscorides, scriptum reliquere.

PAULVS SANÉ, quod hoc cap. descripti, Apocyni periculum fecit in canibus Ill^{mo} Cartorum Princeps Wilhelmus, fecit & arsenici, aconiti Lycostoni, quod vulgo Napellum vocant, & Nerij: sed nullum magis præsentaneâ perniciem adferre deprehensum est, hoc Apocyno. Id autē factum est ab ipso Principe anno M. n. xxx. præsentibus ejus Medicis Mauritio Thaurer & Laurentio Hyperio, cum experiri vellet, an Silesiaca terra, quæ apud Stregam cruta, eas facultates adversus venena obtineret, quales, qui venale proponebat, habere affirmabat. Quotquot autē canibus, propinato veneno, tanrondè terrę in potu datū est, post aliquot symptomata restituti sunt: quibus verò terra non est exhibita, perierunt, ac qui Apocynum hauserat, omnium citissimè.

Ad hujus libri porro calcem adijcienda putavi, quæ, dum Salmanticæ viverem, de Lupuli sive Lupi fascitarij (stirpis etiam amplexi caulis) facultatibus intelligebam, non adscripta tamen ejus historiâ, quæ à plerisque tradita est.

Vulgo ergo & vetulæ Salmanticenses, sæpe numero medicinam empiricâ faciliare solitę, ad curandam alopecia à veneræ lue natam, hæ ratione lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à fordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant: post tridie in illâ ipsâ aquâ, lento igne & fumi experte, ad tertię partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabāt. Addebant interdum apij sive selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnumquam etiam pallas uvas à gigartis mundatas.

CAROLI CLUSII RARIORVM PLANTARVM HISTORIÆ

LIBER SECVNDVS.



ARBORVM, Fruticum, & Suffruticum, absolutâ historiâ, quam priore libro complexi sumus: hoc secundo, de stirpibus, quæ bulbaceâ aut tuberosâ constant radice, agemus, quarum magna pars florum elegantia & varietate omnium oculis ad se allicit, & mirum in modum recreat, nec postremum locum inter coronarias obtinere debet. A liliacei verò generis plantis, ob earum magnitudinem & florum pulchritudinem, initium faciemus.

TVSAI, sive LILIVM PERSICVM.

CAP. I.



BICVBITALI aut etiam ampliøre assurgit TVSAI interdum caule, firmo, crasso inrus fun-

goso, viridi, rotundo quidem, sed ad cubiti altitudinem striato, multisque liliaceis ferè folijs nunc æquali, modò confuso ordinè cum ambientibus, exornato, elegantis viridis splendentisque coloris, sed foetidi odoris, æquali hircini, nares etiam procul ferientis: idem ille deinde caulis pedali, nonnunquam etiam cubitali, supra folia emicat longitudine, nudus & sine folijs, neque striatus & viridis, sed levis & purpurascens coloris, qui tamen in summo totidem panè in angulos definit, quot flores sustinebit, nempe binos, ternos, quaternos, quinos, senos, aut plures, omnes verò quasi æqualiter, sed contrario situ nascentes, singulosque iorer bina folia, inferioribus longè minora & angustiora, æquali ferè longitudine propendentes elegantissimo spectaculo: supra flores caulis denuo attollitur dodrantali plerumque, aut majore amplitudine, folijs exilibus & angustis onustus: nonnunquâ supra flores nullus cauliculus eminere, sed conferta duntaxat angustorû foliorum coma: interdum etiam mihi nati sunt supra flores non unicus cauliculus sive ramulus, sed bini, terni, aut plures suis etiam folijs singuli ornati.

Crevit porò Viennæ Austriæ in meo hortulo anno M. D. XXC. atque etiam alijs, planta undenis, pluribusve aut paucioris floribus prædita, cujus caulis supra septenos æqualiter propendentes denuo nudus, quasi dodrantali longitudine

assurgens, reliquos flores singulos inter folia nascentes proculit, longâ, densâ, & multifidâ aliâ foliorum comâ supra eos fusâ. Sed & intelligebam ab his qui aliquot annis Constanti-nopoli hæserant, caulem nonnunquam, supra priorem illam florum æqualiter propendentium seriem, dodrantali longitudine attolli, aliâque florum seriè gestare, aliquando etiam tertiam, ac tum demum foliorum comam supereminentem: eas verò stirpes unicum florum ordinem subsequen-tibus annis plerumque ferè observavi, ut peculiare genus non sit censendum, sed Naturæ luxuriantis quidam duntaxat lusus, licet mihi altero etiam anno duplicem florum seriem gestare similem plantam meminere.

Habuit

Tufai five Liliū Perſicum. 11.

Tufai cum ſemine.



Tufai floris.

Habuit autem Viennensis quædam patricia, cujus caulis supra terram planus pedali longitudine extabat, deinde in binos ramos ſindebatur æquali longitudine excreſcentes, ſingulos undenis floribus onuſtos, magnâ etiam ſuſâ ſupra eos foliorum comâ: habuerunt & alij, & ego anno nonageſimo ſupra milleſimum & quingenteſimum, ſimiles plantas in binos caules cubitali pæne ſuprà terram altitudine diſiſas, quorum alter octo aut plures, alter quinos aut ſenos flores tulit: mea verò planta hoc etiam peculiare habuit, quod eminens coma multiſida fuerit.

Tufai radice.

At quæ Viennæ in meo hortulo obſervata eſt *Tuſai* planta dum anno m. d. xxci. in Angliâ peregrinaretur, reliquas quas poſtea obſervavimus ſorum numero ſuperavit: nam quinquagenis aut pluribus floribus onuſta fuit. Et Illuſtriſſimo Cartorum Principi Wilhelmo, cum annum proximè præcedente ſurſum planta quadragenis floribus prædita. Iacobus etiam Garetiſ civis Londoniſis & Aromatarius anno m. d. xcii. me monebat plantam habuiſſe quæ binos & ſeptuagenos flores protulerit. Habuerunt & alij ſimiles interdum, in quibus plures flores nati, vice in nempe, triceni, aut quadrageni: quotquot autem tam numeroſos flores tulerunt, planos, latoſque, & valde ſtriatos habuiſſe caules animadverti, atque proximo inſequenti anno ad ingenium rediſſe, hoc eſt, caulem rotundum, termiſ, quinis, ſeptenis, aut octonis floribus præditum habuiſſe. Vt porro ad huius ſtirpis hiftoriam revertamur: cum flores primùm erumpunt, inter folia latent, candicantesque ſunt, deinde paulatim incrimentum ſumunt, unâ etiam ſuccreſcente eâ caulis, quæ illos ſuſtinet, nudâ parte: ſorum verò pediculi in augmento deorſum inſeſcuntur, & ipſi flores palleſcere incipiunt, venis tamen purpureis ſecundum foliorum (quæ ſena ſunt, lata & per extremum mucronata) longitudinem & latera excurrentibus, ungue autem ſingulorum foliorum nonnihil foris eminente & ex nigro purpureſcente. Flos iam abſolutus & maturus expanditur, tintinnabuli modo propendens, aurei mali five citri colore, ſed pallidiore, venis illis purpureis ſumam venuſtatem adherentibus: ſingula floris folia internâ parte in ipſis unguibus ſingularibus tuberculis candidis prædita ſunt, quæ meridiano etiam ſole limpidiſſimam dulcemque aquam exſillant lachrimarum in morem, ut umones propendentes videantur, ſed abundantius pluvio tempore: ea deinde tubercula marceſcentibus floribus in albas lacuras abeunt: ex medio flore ſex candida ſtamina cum palleſcentibus apicibus prominent, breviori trifido ſtilo inter ea latitante. Flori ſuccedunt magna trigona, interdum etiam tetragona, capita, ut in Liliō puniceo, à nonnullis Martagon appellato, quorum ſinguli anguli utrinque pinnati ſunt & alati: excuſſo autem flore, ſtamen ſuſum emigrant quæ ſecunda futura ſunt capita, magnâ Dei omnium rerum conditoris providentiâ, ne, deſilcenuſ illis, ſemina ante maturitatem

turritatem excidunt: sunt verò ca. plana, lilacea, paullo oblongiora, cartilaginea, subrufa, duplici ferie in singulis angulis digesta, quemadmodum in Lilij generibus, Tulipis, congeneribusque plantis. Radix bulbosa est, craffa. ex magnis, crassis, & succulentis squamis compacta (memini binas & amplius libras pendentes erare) colore interdum albo, nonnunquam etiam purpurascente, plerumque autem pallido, foetido admodum odore, hircumque, uti folia, olente.

* Ceterum Aliud geous est, nec caule, nec folijs, nec florum formâ à superiore differtens: nam & illos io extremâ lavis & nudi caulis parte æqualiter ferè in ambitu nascentes, singulosque ioter bina angusta folia sustinet, uti superius, sed color variat, nec ut in præcedente flavus, vel verius pallescens, sed rubet, aut sandaracæ sandicisq; colorem refert, instar astaci elixi chelaram ferè: sex etiam lais & mucronatis folijs constat, unguibusq; ex purpurâ nigricantibus, cum suis interiore parte candidis tuberculis limpidum rorem stillantibus, & sex laminibus, stiloque æquali longitudine propendeotibus. Hoc genus superiore magis venustum mihi videtur.

Variat item in nonnullis plantis florum color: est enim vel medius inter utrumque genus, vel ad prioris, secundive colorem quam proximè accedit.

Sed & Quartam quandam differentiam observabam, licet ejus florum color proximè ad Secundum genus accederet: angustiora enim folia habebat, illaque & radicem nullo terro odore, quantum quidem naribus manifestè percipi posset, prædita.

Floret porro hæc plauta Aprilis, interdum etiam Martio, si ætis temperies paullo calidior fuerit, unâ cum præcibibus Tulipis, atque etiam maturius: semen Junio maturum.

Nulquam verò sponte nascentem hanc plantam conspexi: sed Constantinopoli delatam, eò, quo ad Maximilianum Cæsarem hujus nominis II. Viennam evocatus sum, anno, primus Belgicæ hortis communicavi: & in Viennensibus reposita felicitè provenit. Ante meum tamen ex Belgio discessum, ejus iconem (qualem C. V. Rembertus Dodonæus in Purgantium historiz Appendice exhibuit) III. V. Ioanni de Brancione miserat C. V. Alphonsus Pancius Serenissimus Ducis Ferrariæ Medicus, utrique nostrum amicissimus.

Hæc enim nullam plantam observare memini, quæ Hemerocallidem Dioscoridi descriptam exactius (meo quidem judicio) referat, quàm hæc. Alij conserant, & judicent. Alij vero est Hemerocallis, cujus Athenæus lib. xv. Deipnosoph. meminit suis verbis. Floris Hemerocallis qui noctu flaccescit, ad exortum solis mox reviviscens, Cratinus in *Effeminatu* sic meminit.

Anemonarum vernæ calicibus, serpillis, crocis, hyacinthis, Elichrysi ramis, ænanthe, carag. mihi hemerocalle.

Pancius verò illius, de qua nobis sermo, iconem mittebat *Cerona Imperiali* nomine insignitam, quam appellationem apud Herbariorum vulgus adhuc retinet: bulbi verò à Cæsareis Oratoribus Constantinopoli missi, aut delati, nunc *Tusyschachi*, modò *Tusai*, sive *Tausai*: sic enim u. pronuntiandum Germanico more, & elevatione vocis in ultima, nomine: *Tuscheas* autem (ut ab ijs intelligebam qui Constantinopoli vixerant) Lilium regium significat. Interdum etiam bulbi missi *Turfani* & *Turfanda* appellatione: sed postremæ hæc voces à Turcis duntaxat nominibus adijci solent, ad rei, cui adnexæ sunt, magnitudinem exprimendam: exempli gratiâ, *Cavala lale turfanda*, id est, Cavala flos (Tulipam intellige) magnus & amplus, qualem scrotozæ plerumque Tulipæ habere solent: si verò *Turfani* aut *Turfanda*, nullo adjecto alio vocabulo scribunt, de magnis & amplis intelligendum.

Ex Persiâ verò Constantinopolim delatos illius bulbos omnino mihi persuadeo, quoniam eum eos primùm accipiebam, inter reliquas hæc fuit inscriptio, *Tusai, flor Persiano rosse de discolorite, con la testa abasso*, hoc est, Tusai, flos Persicus ruber aut decolor, nutante capite.

Ceterum, an apud eos medicum aliquem usum obtineat, non intellexi: arbitror tamen venustatis & ornatus potius causâ hanc plantam io suis hortis illos alere, quàm ob ulla ejus facultates. Nam Turcæ omnium elegantium florum, etiam nullo odore prædistorum, sunt studiosissimi: nec ullis sumtibus parcunt, ut eos undiqueque conquirant.

Dioscoridis autem suæ Hemerocallidi has facultates tribuit: radix pota, aut cum melle & lanâ in pesto apposita, aquam educit & sanguinem: folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumque collectiones mitigant: radix & folia igni ambullis utilissimè illiuntur.

LILIVM SYRIANVM.

CAP. II.

EODEM cum superiore nomioe, imò inter ipsius bulbos Constantinopoli missa fuit hujus plantæ bulbosa radix, alio post meum in Viennam adventum anno: cum tamen ceteris esset candidior, & nullo virulento odore prædita, seorsim tetræ committebam, diversam à Tusai esse ratus: nec meâ opinione falsus sum. Nam novo subsequente vere maturè admodum germinare cepit, tandemque caulem protulit cubitalem, rotundum, multis circum septum folijs digitalis longitudinis & latitudinis, longè quàm Turai modo descripti folia angustioribus, illis ferè similibus quæ in summo ipsius capite nascuntur, virelcentis ex cineraceo coloris, sive quodammodo æruginosi, qualis in Tulipæ folijs conspicitur: contorquentur

Lilij Sufiani. Bos.

Lilij Sufiani scapus cum radice.



Tempus.

Nomen.

Natalis.

queuntur verò illa, buxeique sunt odoris. Florem mihi non protulit, sed paulatim planta con-
tabuit: at quæ Generoso viro Vricho de Khunigspers anno M. D. XXXIII. floruit, præce-
dente anno cum plerisque alijs elegantibus stirpibus Constantinopoli allata, flores habuit
sex folijs constantes, magis patulos quàm in picturâ expressi, foris purpure valde obsoletæ co-
lore præditos, internè paullo dilutiores, inodoros, quorum unguis subvirescebat: ex umbi-
lico fex inæqualia staminula prodierunt purpureis apicibus primum conspicua, qui obverfi,
flavo polline conferti apparebant: tria deinde longiora staminula coibant, stylumque me-
dium florem occupantem æmulabantur: subsequuta deinde sexangula capita, sive triangu-
la, quorum singuli anguli binis alis erant præditi, Tusai capitibus ferè similia, sed minora &
breviora, femine Tusai etiam simili, paululum tamen breviora, plena. radix magna est, Tu-
sai radici parè æqualis, è paucis sed magnis squamis contexta, candidioribus tamen & ali-
quantulum longioribus, nulloque (ut iam dixi) tetro aut gravi odore nares feriente prædita.

Floret April, semen illius maturum cum Tusai femine aut paullo post. Nullum autem se-
men tulit, quam mihi idem Dn. de Khunigspers ex sua natâ dedit plantæ: terti tamen caules
anno M. D. XXXV. ex illa prognati, singuli floribus, hic vicenis, ille tricenis, tertius pluribus
onusti. Bulbos cum selectissimis quibusque alijs, sequentis anni rigida & aspera hiems corru-
pit. Anno verò M. D. XC. III. quos postea adquisiveram bulbos; non modò flores, sed abundè
semen maturum protulerunt Lugduni Batavorum.

MSSI aliquoties hujus stirpis pauci bulbi Tusai bulbis permixti, cum inscriptione *Tusai*
fior Persiano, si domanda Penachio Persiano; tædem postremò acceptus ejus bulbus *Sufam-gule*
appellatione, quod è Sufis primum Constantinopolim allatus sit: hæcque adeò de causa Li-
lium Sufianum nuncupavi.

Paullo autem ante meum è Belgica discessum, munere Mag^{ti} Viri Jacobi Contareni pa-
tricij Veneti, miserat consanguineo suo Ill. Joanni de Brancion, Generoso Jacobus de Cou-
denhove ex Italia similem bulbum *Penachio Persiano* nomine, qui, eo defuncto, ad Gen. Jo-
annem vander Dilst, pari cognationis vinculo ipsi junctum, ex legato, cum multis alijs taxif-
simis plantis pervenit. Is anno M. D. LXXVI. bicubitalem aut ampliore tulit caulem, quin-
quagenis floribus onustum, nullum autem semen: imò ne germinavit quidem subsequente
anno, ut ipsemet vander Dilst ad me Viennam perhibebat. Illius iconem, dum florebat,
suis coloribus exprimebat Raphael de Coxia Regius pictor, & exemplar mihi mittebat, ex
quo hæc icon imitata.

Illius etiam iconem habeo, sed non magno artificio depictam, eamque sine bulbo, cum
Lilij rubri sive miniatij Byzantini (de quo proximo capite) munere doctissimi viri summi-
que omnium Naturæ miraculorum scrutatoris & admiratoris, Nicolai Raslij Regis Galliarum
chirurgi,

cheiungi, qui Hyacinthi maioris nomine appellabatur cum apud illum anno M. D. LXXI. Lutetie efflet.

De hac etiam planta ad nos in Belgicam scribebat Alphonsus Pancius, quando Tufai iconem mittebat, his verbis *Penachio Persiano è pianta bellissima, & è specie di Giglio à Martagen, diuerse della Corona Imperiale*: hoc est Penachio Persiano elegantissima est planta è Lili) aut Martagonis generibus, differens à Corona Imperiali.

LILIUM RYBRYM sive MINIATVM Byzantinum.

CAP. III.



VENUSTA admodum est, & dum ejus historiam describebam, satis rara hæc planta, cujus folia Lili) albi folijs similia, breviora tamen latioraque, & in lateribus subhirsuta, confuso ordine caulem amplectuntur, qui cubitalis aut major est, ex viridi purpurascens, digitalis crassitudinis: flores summo fastigio proferit languido collo deorsum propendentes, sex folijs convolutis & reflexis, ut in Lilio montano, sive Martagone Matthioli, constantes, elegantissimo minij, aut ceræ rubræ recentis colore: è medio flore exeunt sex candicantia flamina, croceis apicibus insignita, stilo inter illa prominente. Floribus succedunt capita ipsæque in Lilio sylvestri sive montano nascuntur plurimum respondentia, atque simile paleaceum fuscumque semen continentia. Radix interdum valde magna non est, nec Lili) sylvestris radicem multum superat, illique (recens eruta) colore valde similis est, diutius autem extra terram adservata, aliquando exalbescit, nonnumquam squamæ vel totæ purpurascunt, vel quibusdam notis saturatè rubetibus asperguntur: augetur verò latiore solo conlita, & subinde in plures bulbos dividitur: omnes autem hujus plantæ caules in finis parte paulo supra bulbum, fibræ ut in Lilio sylvestri, sunt donati.

Floret Junio cum Lilijs, aut paulo serius: semen etiam serò admodum, videlicet sub Augusti finem, aut de muni Septembris maturum est.

Constantinopoli Viennam delata fuerat, ante meum in eam urbem adventum, hæc planta, & aliquot nobilibus Matronis communicata. Unicum postea bulbum inter alios *Sultan Zambach* nomine missos à Generoso & Mag^o Viro Davide Vngnad, cum apud Turcarum Imperatorem Cæsarem Orator esset, accipiebam, qui primis annis unicum florem semper mihi protulit: sed anno M. D. LXXIX. quaternos, altero cum insequente, senos, eosque omnes ex summo extremoque caule simul prodeuntes, quemadmodum & ea plantæ Generoso Viro Wolfgango Christophoro ab Entzestorf anno M. D. LXXC. II. floruit, tredecim flores extimo caule, eoque unciam lato sustinens saturatè rubentes, cum præcedente anno quinque duntaxat extimo etiam sed rotundo caule, ut meus, tulisset.

Sed & Patricia quædam Viennensis aliquot plantas habuit, Inter quas una extimo caule duas uncias lato tres & viginti flores tulit, in reliquis plantis quæ vel in ipsius, vel aliarum nobilium Matronarum, vel Entzestorfi, qui instructissimum habuit, vel meo hortu alebantur, plerumque unicum, interdum alterum & tertium in singulis caulibus florem natum conspiciebam. Gen. porro Ioan. vander Dilt plantam habuit semine natam, quæ primo quo flores proferre cepit anno, octonos, proximo autem insequente, qui fuit septuagesimus octavus supra millesimum & quingentesimum, quadragenos protulit: an verò planus fuisset caulis, & illius extimo fastigio nati flores non significabat. Sed pictura illa à Ralio mihi donata, cujus superiore capite memini, vicanos aut plures flores ab extimo caule plano propendentes habebat.

Anno præterea secundo & nonagesimo supra millesimum & quingentesimum binas habui saturatius flores gerentis plantas, quarum prior quaternos, altera sepe nos flores tulerunt, omnes summo fastigio æqualiter innascentes, non temere per caulem sparsos, quemadmodum Lili) album aut sylvestre ferre solent: singulæ autem hoc peculiare habuerunt, ut unus medius inter reliquos surrecto pediculo nasceretur, & in altera quidem ille duodenis folijs constans, & quodammodo gemellus, ut in secunda subjecta icone videre licet.

CETERVM

Lili) Byzantinum
flos emittit
bulbosis.

Tempus

Zafnieri
Wolmbis.

Zafnieri
miliare.

Lil. Byzant. min. satur. flore nodis 54.

Lil. Byzant. miniat. dilutione flore.

Zufniare
varietas.

Nomen.

CETERVM duorum generum esse videtur hæc planta, una videlicet dilutionibus floribus prædita, altera saturationibus. Ego sane longâ experientiâ didici, eas plantas quæ dilutione ferunt flores, caulem & folia viridiora habere ijs quibus saturationes sunt flores: postremis enim caules & folia plerumque ex purpurâ nigricant. Deinde mihi conspectæ sunt radices Constantinopoli allatæ, quibus color purpureus fuit, dilutione protulisse flores: aliæ contra saturationes. E florum verò numero, an certa aliqua differentia (ut initio existimabam) constitui possit, plurimum ambigo, cum eas stirpes quæ numerosos tulerunt flores, subsequente interdum anno, paucos, aut unicum dumtaxat habuisse observa verim: at læto & pingui solo depositos bulbos, plures ut plurimum proferte flores animadvertum.

HANC plantam Clariss. Matthiolus *Hemerocallida* alterius nomine appellare videtur, & in lapidæ montibus eruisse ait: sed illius descriptione m valde mutilam proponit. Eruti portò annis septuagesimo nno supra quingentesimum & millesimum atque cum subsequen-
tibus bulbi, in hortis supra sinum in Cornu Byzantino vulgariter Pera nuncupato sicis, allati sunt plerisque nobilibus viris & matronis *Zufniare* appellatione, cum à Generoso viro V. richo de Khunigsperg, tñ ab alijs qui proximis subsequen-
tibus annis Constantinopolim honorarij conducendi gratiâ missi, inde redierunt: tametsi in schedis interdum esset additum, à nonnullis *Coronadi* & appellari.

Memini & *Zufniare* nomine inscriptum semen, quale ante descripsi, accipere, cum primùm Viennam appulsissim: sed terræ commissum non prodijt, nimis vetustum fuisse puto. Quæ tamen postea ex meis plantis collegi semina, commodò tempore sata, feliciter proveniunt, plana quæ foliola in irio dederunt, qualia ferè Tusci prima folia, altero deinde anno latiora, tertio cauliculus aliquot folijs onustum, quinto denum & sexto florem.

CETERVM Lilium hoc miniatum novo vere cum Martagone primùm emergere solet: Salsan verò *Zambach* de quo quinto sequente capite, etiam ante hiemem cum Lilio albo.

Mihi autem relatum est, conspectas esse Lilijs hujus Byzatini plantas, quæ florem non miniatum ferrent, sed prorsus niveum, in ceteris alteri parem. In chartaceis sanè illis Adonidis hortis, quorum in Rosa memini, nullæ *Zufniare* stirpes albo flore erant, sed omnes vel saturo rubro, vel dilutius rubente, atque etiam flavo colore præditi, illique jam singulares, modò terni aut quaterni æqualiter nascentes.

Zufniare ni-
væ flore.
Zufniare
flavo flore.

LILIVM



HABEBAT porro amplius vir Ioannes Mat-
totti Patricius Francofurtensis & Sena-
tori ordinis, postremis annis quibus in ea ut-
be habitavi, aliud genus Lilij rubri, ex Stut-
gardensi Ill^{mi} Ducis Wirtembergici orto ac-
ceptum, quod uno ferè mense maturius By-
zantino flores proferebat, nempe sub finem
Maij, aut initium Iunij, ut mihi referebant
qui viderant, & ipse anno tertio & nonagesi-
mo supra millesimum & quingentesimò vi-
dere avebam, nisi infortunium luxati femoris
dextri accepissem, quod non modò tunc lecto
adfixum detinebat, sed postea dextri cturis
usum prorsus ademit. Etat autem floris color
(illorum testimonio) minus satur & longè di-
lutioreo, qui in floribus præcedente capite de-
scriptis apparet: caulis sanè, ut ex plâta, quam
unicam alebat, quamquè mihi Francofurto
discedenti liberaliter donabat, deprehendere
licuit, gracilior & brevior erat Byzantinis ad-
ulcis, cubitalem videlicet altitudinè non mul-
tum excedens, folia quæ inhærebant angus-
tiora & magis saturatâ viriditate prædita: bul-
bi squamæ (nam squamatam radicem habet
perinde ac Byzantinum) longè etiam brevior-
es erant: tulerat verò illo anno tres flores sum-
mo caulis fastigio æqualiter insidentes, mihi
autem Lugduni apud Batavos, sequente pro-
ximo anno unicum (tam longâ enim in itine-
re morâ radix valde afflicta fuerat) ejus, quem
supra dixi, coloris, proximè autem insequente
binos duxerat: anno verò M.D.XCVI. bulbis

Ed. R. præ-
cox.

mibi furto sublatas cum selectissimis quibusque quas in orto alebam bulbaceis & tubero-
sis stirpibus. Licet autè maturius altero flores proferret, illo tamen seriùs germinare solebat.

CETERVM sub initium anni quarti & nonagesimi supra millesimum & quingentesi-
mum, monebat me doctissimus vir Thobias Roëlius, Mittelburgensis in Walachia παλα-
της, Ioannem Somet, Prætoris ejusdem urbis filium, ex Italicâ peregrinatione varias & ele-
gantes stirpes attulisse, inter quas bina essent Lilia miniato seu rubro flore, maturius Byzan-
tino flores proferentia, quorum alterum angustiora folia haberet illo quod Constantinopoli
allatum: alterius verò folia multo breviora essent, ac paullo latoria. Horum icones suis colo-
ribus expressas, sed radice mutilas, cum aliquot utriusque plantæ folijs sequente Iunio ad
me mittebat.

Quod latiore est folio, non videtur ab simile illi, quod modò descripti à Patricio Franco-
furtensi acceptum.

Valde autem diversum est Angustifolium, non quidem floris formâ (nam ejus etiam fo-
lia circumvoluta & reflexa) sed colore, qui Lilio cruento majori non bulbisfero similis est,
tum situ, foliorumquè per caulem sparforum dissimilitudine: multa enim & conferta fert
folia cubitale & ampliore caulem confusè vestientia admodum angusta, & longa, inslar
pennæ foliorum Tragopogi: caulis item fastigium flores profert non eodem orru, ut in Byzan-
tino, sed in summi caulis alis, inter angustissima foliola παραλλήλους nascentes: an utriusque
radix Byzantini radicem æmuletur, me fugit: nam neutrius plantam videre mihi congruit.
Sed & triennio post iconem suis coloribus expressum ad me mittebat idem Ioannes Somet,
qualem ille depingi curaverat ad noticiam ejus plantæ quæ ipsi eodem anno quinque & tri-
ginta flores protulerat.

Ed. R. præ-
cox 12.

Ed. R. præcox
11. angustifolium.

LILIUM porro silvestris, sive Martagonis Matthioli (cujus proximo capite mentionem
fecimus ob affinitatem, quam cum Lilio Byzantino rubro habet) differentias, quas quidem
mihi observare licuit, non incommode forsitan hic subijciemus.

VNUM autem genus majore excrevit altitudine, & ampliora nigrioraque habet folia:
multo etiam plures flores saturatè purpurascens, qui frequentibus interdum nigricanti-
bus maculis aliquando raris distincti sunt, atque, prius quàm expandantur, multâ lanugine
pubescente conspiciuntur.

Varia nonnunquam hoc genus: nam non procul Mautpach Aultrix, eructe memini, Varias.
M. cujus

Ed. R. præcox
sive Martagon.

1.

Various.



ejus caulis viridis, caput non inflexum, sed surrectum, multa nihilominus lanugine etiam hirsutum, flores dilute purpurascetes, nec ullis maculis aspersi.

11. **ALTERVM** humilius est, ejus folia dilute virent, rariore flores producit, eosque dilutiores, ac multis nigricantibus maculis notatos: precocior est reliquis, ejusque flores, ante quam explicetur glabri sunt & purpurascetes: caulis etiam purpurascit.

Varietas.

Istius generis alteram speciem etiam humilem erubam ultra Dravum flumen ad Greben in Pannonia Interamni, quæ tamen serius reliquis florebat, etiam in hortulo Viennæ proximè reliquis hujus generis stirpes reposita: illius flores valde obsoleti, nigrique punctis internè distincti.

Tertia etiam humilis est species apud Maupach cum majore promiscuè nascens, ejus caulis leviter purpurascit, coma inflexa est, flores glabri foris, explicati verò, dilutissimè purpurascetes, & quasi carnei coloris, nec ullis maculis aspersi.

Natalis.

Passim utrumque hoc genus provenit in silvis & umbrosis pratis Leyrenberg, eorumque montium, qui à Calemberg Austriæ, ad Alpes usque procurunt: Nascitur & in plerisque Stiræ ac Ungariæ silvis, atque montibus illis silvosis, qui non procul Francofurto in ripâ Mœni sito, ad Septentrionem absunt. Minus autem olim observare memini in multis Germaniæ silvis, non modò editiore loco sitis, sed etiam in plano.

111. **TERTIVM** porro quoddam genus silvosis illis montibus modò memoratis ad Francofurti Septentrionem inventum, humile, Secundo generi proximum: florem tamen colore varium: nam ante quàm explicentur, foris carnei quodammodo coloris sunt, explicati verò, intus albi, & notis quibusdam purpureis insigniti. Similem stirpem habui munere N. V. Joannis Boissier veteris amici, quæ tandem adoleverat perinde ac primi generis plantæ: sed ejus radix ochræ colore minus tincta, quàm superiorum. Sed Francofurtensis quidam civis unam habebat, ejus flores interiore parte omnino nivi, nec ullis notis distincti.

Ex fil. minus
flore.

1111. **EST** etiam Quartum quoddam genus, ejus flores Primo non dissimiles, sed serius sese explicare soliti, illique non insuavi odore præditi.

Omnium flores terram spectant, & per intervalla in summo caule nascuntur, foliaque ad pediculum reflexa habent: semen etiam in trigonis capitibus duplici serie in singulis angulis continetur, fuscum, planum, cartilaginofum. radix luteo ochræ colore infecta est, quam ob causam à Germanis *Gelbwurzel* id est, aurea radix appellatur.

Nomen.

Sultana Zam-
bach.Martagon
Cristiani al-
bifloro.

cuniâ (cujus sunt valde avidi) redimi non possit.

Biennio autem post quam superius dictas radices terræ credidisset, cum omnes quas fer-
vaveram, flores proferrent, certissimè comperi, nihil aliud esse quàm Lilij albi genus, vulga-
ri proximū. Hujus tamen caules, licet vulgari non breviores, à diligentiùs observantibus
graciliores, rarioribusque & minoribus folijs septi deprehenduntur, ipsiusque flores paulo
minores, æquè tamen ac vulgares flores odorati. Nonnullæ verò radices in tantam molem
excreverant, ut vix utraque manu comprehendi possent: una etiam illarum plures quàm se-
xagenos flores in plano tresque ferè uncias lato caule protulerit: subsequente autem anno,
rursus paucos in tereti, ut reliquæ, caule.

Memini cum anno M. D. LXXXIII. Vlyssipone essem, Liliaceam radicē in foro emere, quam
Petro Coudebergo pharmacopœo doctissimo Antuerpiam cū Draconis arboris ramo, Co-
locasiâ, varijsque alijs rarissimis isthe observatis plantis misit. Ea ipsa flores huic prorsus similes
(nisi memoria fallit) postea tulit: sed quia plerumque in extimo caule confertim nascebantur,
& interdum informes erant, vitiumque contrahebant, ipse Lilium fatuum cognomina-
re solebat.

ZAMBACH porro vocem, testis est Amatus Lusitanus, Commentarijs in Dioscoridem ca-
pite de lasmino unguento, idem Arabibus significare, quod nobis lasminum, topiarijs ope-
ribus nobile & accommodum, cujus florum odor suavissimus quidem est, sed caput etiam
ferit. Versimile autem est, Turcas hanc Arabicam vocem, omnibus plantis quarū odor pæ-
ne lasmini florum (quos etiam in Asiaticis hortis ultra Bosphorum rubri coloris invei-
re in-
tellego) suaveolentia similis est, tribuere: sunt enim Turcæ valde oegligentes & imperiti in
rebus propriè nuncupandis Sic illi, con Zambach appellant, Narcissi marini bulbū, qui Mom-
pellianis Pancratium flore Lilij, Valentinis Hemerocallis dicitur, quod ejus flos non modò
Lilij quodam modo formam, sed etiam odorem referat: sic vocem Gal, quæ illis Rosam signifi-
cat, omni-
bus floribus rosarum æmulis accommodant, addito catamer vocabulo, si pleni
sint, ut Gal catamer, illis est & Rosa plena, & Anemone flore multiplici foliorum textura
constante, & Papaver, & Malva Hortensū & similes pleno flore præditæ, omnes enim hæc
simili nomine nobis fuere misse.

Lil. alb. 3p.
centia.Lil. alb. 3p.
xano, 3p.
centia.Lilium fa-
tuum.Zambach
quodLasmini rei
flos.Gal catamer
vulgaris.

*Lilij puniceï
differencia.
non bulbifero-
rum et aliorum
non bulbifero-
rum inter se.*

L I I I Puniceï, five, ut appellant, eruenti, multa sunt genera: nam Vnum nullos bulbos in summis alis fert: Alterum verò ijs est præditum.

N O N Bulbiferi binæ sunt differentiz omnibus notæ. Vna enim longo & præalto assurgit caule, valde dilutos fert flores, serotinaque est, cum Lilio albo duntaxat florens: in qua sexagenos aliquando flores uno cauli inhaerentes, observare memini. Altera longè humilior præcociorque Priori, puniceos & quasi rubentes profert flores, nonnunquam vicenos aut plures: memini & plenos videre, duodecim, viginri aut plurium foliorum texturâ constantes: singulare etiam habet hæc planta, quod ex majore bulbo obliquè & in latera propagines sub terrâ graminis modo spargat.

Bulbiferorum.

B U L B I F E R I autem tres differentiz apud eos qui rem herbariam excolunt, observantur, sed non ab omnibus, quas operæpretium duxi sigillatim hic exprimere.

Martagon bulbiferum 1.

Martagon bulbiferum 11.



- I. **PRIMUM** igitur bulbiferum Lilium, bicubitali interdum assurgit caule, firmo, crasso, folijs septo liliacis, subbatts, in summis alis crassiores bulbos gestans, & amplos flores rubros, Lilio puniceo minori non bulbifero concolores. Teneriores hujus plantæ, ante quàm flores ferre incipiant, bulbis secundum caulem inter folia natis non minus donatæ sunt, quàm reliquæ duæ species: sed quando vetustiores sunt, floresque aliquot annis prorulerunt, vix, nisi in summo caule, ubi in alas dividitur, & secundum flores, majores bulbi nasci solent.
- II. **ALTERVM**, vix cubitalem excedit altitudinem, caule etiam est firmo, striato, ex viridi nigricantibus folijs prædito, quæ tamen cum summo canle incanâ lanugine pubescunt: ejus flores igneo rubore non rutilant, ut in superiore, sed magis pallescunt, & ad Lilij puniceï non bulbiferi majoris colorem plurimum accedunt. Ejus adultioris caules, paucos etiam bulbos, eosque superiore minores, nisi in summis alis gestare solent.
- III. **TERTIVM**, inter duo superiora mediæ plerumque est magnitudinis, licet nonnunquam prioris altitudinem attingat: caules habet graciliores & infirmiores, atque ipsi cum folijs dilutius virent: flores Secundo genen persimiles. Hoc semper fecunda bulborum inter folia nascentium sobole onustum est: ejusque radix, Prioris radice minor, è lateribus propagines plerumque spargere solet, quæ ad singula genicula in candidos bulbos excrecentes, subinde novas in ambitu plantas producunt, Lilij puniceï non bulbiferi minoris instar: ejus bulbi in alis nati, secundæ speciei pares, prioris magnitudine inferiores: omnesque, terræ commissi, sui generis plantam procreant, & secundo anno in caulem bulbis onustum excrescunt.

Fecunt



Ferunt tamen omnia hæc Lilia in triangulis capitibus latum, cartilaginofum, subfuscum semen, quemadmodum lilium vulgare quod sterile nō est, sed sui generis plantas etiam profert: verum quæ ex bulbis in alis natis crescunt plantæ, multo celerius adolefcunt.

Florent omnes hæc plantæ Junio, aliz alijs paulo maturius, semenque perficiunt Augusto: Tempus. bulbi in alis hæret solent, donec vento aut contactu excutiantur, imò interdum plantæ adhuc in hærentes, fibras deorsum spectantes agere solent, tamquam ad communem matrem terram aspirantes, & illà se condi cupientes.

Prior nullibi sponte nascens à me observata est, sed eam primùm Lixæ conspexi in cultissimo orto Generosæ matronæ Mariz de Brimeur Magi viri Conradi Scheri uxoris, quæ deinde bulbis in terram depactis, reliquis Belgicis hortis breviter tempore communis facta est, atque etiam nunc Viennensibus ac alijs vicinis, meâ operâ: nam ipsa ad me aliquor majores bulbos à Belgica mittebat. Reliquæ dux in montanis Austriæ & Srynix pratis sponte cre- Natalis. scunt: secunda autem rarior inventu.

Solent verò cum hæc, tum aliæ dux non bulbiferæ, cùm primùm florum gemmas ostendere incipiunt, à formicis admodum infestari, si ut eo tempore numquam immunes ab ipsis conspici liceat: non secus ac Pæoniz flores ante quàm explicentur, qui mirum in modum etiam à formicis appetuntur, præsertim qui plenus est, & ille etiam explicatus atque apertus.

PORRO Liliasphodelus ille puniceo flore, quem C.V. Dodonæus Hemerocallidem esse censet, valde luxuriat in omnibus Austriæ, plurimiq; Germaniæ hortis: at qui luteum odoratumq; nec ita caducum habet florem, Austriæ incognitus erat ante meum istuc advèrum: illum autem maximâ copiâ sponte nascente in multis uliginosis pratis, non procul ab opido & munitissima Nemerhwywar Ill. herois Balchazaris de Batthyani p. m. arce, quâ Occidentem spectat, annis M. D. LXXI. X. & LXXX. deinde inveni. sed incolis neglectam, ubi florentem sub finem mensis Maij, & Junij initio eruebam. Batthyanius admiratus adeo eleganter & odoratum florem in ipsius fundo nasci, multas ilico illius plantas cum suis cespitibus erui iussit, & coribus in suum hortum inferri. Ungari *Zedlitzium* appellant: Croatz autem, apud quos etiam albo flore inveniri mihi asserabant, *Liljam æwæ*. Liliasphodelus puniceus, L. liliæphod. luteus.

TULIPA, sive LILIONARCISSES.

CAP. VII.

LILICEAS stirpes subsequi debet peregrina illa, & ob insignem in flore colorum varietatem omnibus rei herbariæ studiosis merito gratissima planar, quam vulgus Tulipam, Doctiores Lilionarcissum appellant.

M 3

Lilium nap. et al.


Illius autem duo hactenus primaria genera observabam, præcox vnum, fetotinum alterum, tamen inveniuntur quædam veluti dubiæ, quæ medio inter utrumque genus tempore florere soleant, potius tamen inter ferotinas habendæ, quàm inter præcoces. De utroque genere peculiari capite agemus, atque hoc VII. præcoxi tribuemus.

Tulipa præcox hiberna.

PRÆCOXIOR Tulipa unicum fert caulem, pedalem maxima ex parte, interdum amplior, rotundum, virentem, & brevi quadam incanaq; lanugine aspersum, non concavum, sed firma medulla plenum: hunc plerumque terna amplectuntur folia, nonnumquam quaterna & quina, inferiora lata admodum, ut etiam palmarem latitudinem explere viderim, & liliacea, longiora tamen & crassiora, carinata, supra terram sese pandentia & contortentia, superiora autem minora & angustiora, eaq; vel propendentia & nutantia, aut interdum erecta, omnia autem colore ex cæruleo virente aut æruginoso, & veluti farina asperso. Summo cauli insidet magnus flos, unicus (geminus etiam aliquoties vidi, vel summo caule conjunctum nascentes, vel bifido inhaerentes) sursum spectans, sex folijs ut plurimum constans (tamen & septenis & octonis conspexerim) ejusdem initio cum caule coloris, & interdum ad terram sese inflectens, illiq; incumbens, ut colubri aut serpentis caput in terra decumbentis ementiat, deinde paulatim sese subleuens, & colorem mutans, atque tandem sese explicans, & calathi cyathive instar in fundo pandens, ex quo sena, aut totidem quot folijs constat, stamina prodeunt, modò lutea, modò pallida, modò nigricantia, pediculis etiam quæ stamina sustinent, mirum in modum variantibus. Excusso flore, succedit membranaceum triangulare caput satis magnum, oblongiusculum, vel brevius, ventreq; magis prominulo. quo in tres partes à summo dehiscente, conspiciuntur sex ordines seminis plani, cartilaginei, liliacei ferè, & citrinatæ propemodum rotundioris interdum, alterà tamen parte, quæ capitis centrum & interiora pertingit, oblongiusculi ut plurimum, pallidi, fulvi, aut rubescentes, & si imbres frequentiores ceciderint, etiam fusci. Radix bulbacea interdum brevior est, nonnumquam oblongior, crassa inferiore sede nonnihil prominente, uti Colchici radix ferè, fibris aliquot tenuibus donata, & foris vel fulvescente, sed magna ex parte nigricante membrana obducta, quæ interna parte lanuginosa est, castaneæ arum corticis instar, aliquando autem adeò denso tomento plena, ut molliissimè recubet bulbis, qui solidus est, fitimus, & velut albumen ovi coctum candidus, gustantiq; dulcis, saltem non ingratus.

Tulipa præcox flava.

T. Præcox flava varietas.



T. p. alba.

T. p. purp.

SUMMA autem in Præcoce est coloris varietas: nec majorem in ullo alio flore videre memini, nisi fortè in Papavere. Etenim aut omnino luteus est, aut ruber, aut albus, aut purpureus: interdum etiam bini vel plures ex his coloribus in eodem flore permixti conspiciuntur. Non defunt qui cæulei omnino coloris se vidisse afferant, mihi sanè hactenus videre non contigit.

Lutea Tulipa vel ad auri fulgorem accedit, aut pallet, foliorum autem unguis plerumque aurei sunt, licet etiam habuerim veluti fuliginæ asperfos: odor quasi cærx recentis, sive etiam croci, interdum nullus, vel admodum imbecillus.

Rubæ color nunc saturatior est, modò dilutior & gratissimi aspectus, interdum etiam inelegans, & obsoletus: foliorum unguis vel lutei omnino, aut tanquam levi quadam fuliginæ in luteo aspersi, in quibusdam nigra macula medium unguem luteum tantummodo inficit, in alijs totum ferè ita occupat, ut nihil nisi lutea quædam linea nigrum unguem ambiens conspiciatur: interdum adeò magni sunt isti unguis, ut dimidiam folij partem occupent. Hujus verò odor aliàs gratus est instar mali auri, magna verò ex parte valde obscurus, vel papaveris virus quodammodo referens.

Albæ omnino candidus est, nisi tria exteriora folia dorso cineracei vel interdum etiam cærulei quiddam coloris admixtum habere videntur: unguis lutei, nonnumquam veluti fuliginis aspersi, apices & stamina pallent. Habui, quibus unguis profus albi essent, apices nigricantes.

Purpurea aliàs saturatior est, & violaceum, sive amethystinum colorem habet, aliàs Præcox flo.

Tulipa præcox tubra.

Tulipa præcox alba.



Tulipa præcox purpurea.



nix floris æmula, nonnumquam dilutior, & Damascusnam sive Provincialem (quam eruditiores Prænestinam vocant) totam colore referens, interdum verò aded diluta, ut albescere videatur, aliquando ex purpura nigricat & obsolescit est: omnium autem ungues cum apicibus aut pallent, aut lutei sunt coloris, tamen nigros etiam apices habeant nonnullæ, & pediculis ea sustinentes quidam veluti fuligine infectos. Invenitur & odora, & inodora.

Facete verò non possum, quin hic adjiciam, quæ circa simplices has, & unius coloris Tulipas observavi. Habui enim anno. M. O. xxv. & aliquot subsequenteribus, cujus flos, cum præcedentibus annis elegans ruber fuisset, postea variè commixtus ex rubro & flavo inter se confusus coloribus, modò flavo medio quasi solum occupante, modò rubro vel utroque radiatim per oras discurrente fuerit. Similiter flavam quæ flavum & rubrum: & purpuream quæ album & purpureum colores variè inter se commixtos, & radiatim folia secantes habuerint. At illud etiam observabam, quod quod sic nativum colorem mutarunt, subinde corrumpi solitas, voluisse tamen ante, hac colorum varietate heri sui oculos oblectare, tamquam ipsi extremum vale didicere.


Tulipa in coloribus interduca ludent.

Varia aded multiplex est, ut difficile sit omnes ejus differentias verbis exprimere. Nam cum cumque tandem præcoci Tulipe semina excussa, & tellure seculi germinet, non omnia retinent nativum matris coloris, sed in varios colores transformant

formant flores: præsertim Albæ, ejus semine prognatas plantas insignem colorum varietatem præ reliquis nancisci, experientiâ & diligenti observatione didici. Semina enim in eodem capite nara, à memet ipso collecta, eodemque seie momento terræ, autumno, com: misa; quo tempore, non verno, secunda sunt omnium bulbacearum & tuberosarum semina, ut feliciter proveniant, vel etiam maturius eum sponte defluunt plantulas proximo subsequente vere produxerunt, quæ post quintum, sextum, septimum, imò etiam (ut alix alijs facilius adolefunt) octavum, nonum & decimum annum flores protulerunt, eosque aut omnino albos & matrem referentes, atque albos varios, vel luteos & luteos varios, aut rubros atque rubros varios, vel purpureos ac purpureos varios, quorum videlicet purpurea folia albis oris ornata fuere. Quantum ad Flavas aut Rubras attinet, præterque proles matris colorem retinent, sæpe etiam in alium commutant. Omnes potèd has colorum differentias, quàm aptissimè poterimus verbis exprimere conabimur.

Tulipa præcox F. v.

V.
T. p. r. v.
deferentia



5. modo superant. Aliorum exteriora tria folia mucronata & lutea sunt, præter oras quæ purpurâ rubefcente radiatim intercurrentibus insigniuntur, deinde extremæ oræ luteæ sunt, interiora parte circiter medium folium, frequentes rubri coloris radios habet: interiora folia orbiculato mucrone prædita ab infimo ad summum oblongis rubris lineis distinguuntur, præter extremas oras quæ luteæ sunt, interior pars minus radiata quàm exterior, unguis magni, lutei, quemadmodum stamina cum suis apicibus: hi odorati. Est & cujus folia extremam cuspidem orbiculatam habent, foris omnino aurea, luteis oris: intus autem omnino lutea, aurei sive potius rubri coloris flavo permixti lineâ radiatim medium folium, transversimque secante: pediculi lutei sunt, apices cineracei: aliquantulum odoratus est. Cujus item folia orbiculato prostris sunt mucrone, dorso in exterioribus ad extremum usque mucrone in luteo, oris latis, ex aureo rubris, unguibus luteis dimidium folium occupantibus, staminibus & apicibus luteis: nonnihil etiam odoratus. Alij similiter huic pares, sed dilutioris colore præditi, staminibus & apicibus duntaxat variantibus: sed nec hi odore carent.

VI.
T. p. r. v.
deferentia

- Rubra: variz flos exteriora folia magna ex parte mucronata habet, interiora orbiculata. Aliquando autem utraque magnis oris auri fulgore splendentibus sunt prædita, magnis unguibus luteis, apicibus vel nigris, vel obsoletâ purpurâ cinctis, & staminibus ea sustinentibus plerumque velut fuligine infectis: hujus flos satis odoratus est. Interdum exteriora folia luteas oras foris habent, interiora autem dilutius rubent, & quasi radiatim in luteas oras satis latus rubedo definit: interiora verò similiter rubent, sed latiores oras habent, rubro colore radiatim ut in exterioribus delineant, unguis luteos, stamina cineracei coloris: & istius flos nonnihil odoratus. Nonnunquam dilutioris minij colore rubent utraque folia, mediores

ORAS

Luteæ: variz igitur flos (ut eandem seriem sequamur quâ in primis coloribus describendis tenuimus) explicatus, nonnunquam primis diebus totus luteus apparet, quarto deinde, aut quinto demum die, illius folia rubris virgulis extrinsecus leviter per oras distinguuntur, interiore parte omnino lutea remanent, præsertim tria externa, & unguem nonnunquam habent veluti fuligine tinctum, apices interdum luteos, & pediculos eos sustinentes fuscis. Interdum externa floris folia circa mediū raris rubris radijs insignita sunt, interiora autē frequentioribus, & ad extremum usque folium ferè excurrentibus, atque aureos unguis, pallida stamina habent. Nonnunquam exteriorum foliorum oræ foris planè rubent, interiora à medio ad extremas oras rubris virgulis distinguuntur: interiora folia extrinsecus omnino rubet, internè autem à medio ad summum, rubrum nervum protensum habent, lætè verò rubentibus radijs exornata. Sunt etiam quorum exteriora folia dorso omnino luteo sunt, per oras verò, dilutioris cinnabaris colore virgatim distincta, interiore parte ad unguem usque cinnabaris color tota occupat: interiora autem folia cinnabaris eadē colore omnino infecta conspiciuntur, nisi duplex nervus luteus secundum longitudinem, & luteæ virgule in extremas oras excurrentes, illius apices nigricat, pediculi eos sustinentes lutei, nonnulli tamen fuligine infecti, unguis aurei, magni, stamina quodam-



oras habentia, foris minij colore interiora folia ferè tota occupante, virgatim tamen in oras luteas defuente, magnis unguibus flavis, apicibus cineraceis, pediculis ea sustinentibus luteis: flos etiam urcumque odoratus. Aliorum exteriora folia, medio dorso luteo sanguineis virgulis distincta sunt, reliquà parte rubrà, oris tamen luteis: interiora omnino ferè rubra, sed rubro colore radiatim in aureas oras deficiente, interiore parte torà propemodum luteà, nisi circa medium folium rubris radijs distinguerentur, unguis cum pediculis lutei, apices nigri. Quorundam folia omnia mucronata, externè dorso lutei coloris, reliquà parte sanguinei, præter oras quæ luteæ sunt, internè sanguineis radijs rora respersa, extremis tamè oris luteis: interiora foris sanguinis modo omnino rubent, luteæ seu flavæ oræ sunt, coloribus ramen sese invicem commiscennbus, internà parte omnino flava sunt, nisi circa medium crebrioribus sanguineis radijs instar orbis quodammodo insignita essent: unguis, stamina & apices cum superiore genere conveniunt. Sunt aliorum etiam omnia folia mucronata, oris aureis reliquà parte rubris, præter exteriorum foliorum dorfa, quæ aureis quibusdam virgulis aspersa sunt, omnium unguis lutei radiatim in rubro commixti, pediculi lutei, apices nigri. Nonnullorum externa folia mucronata, interna orbiculata, tota rubra, exceptis oris, quæ autè coloris sunt radiatim in rubro definentis: exteriora verò folia saturatiora sunt, omnia tamen interiore parte magis aurea sunt, unguis, stamina, pediculi, cum præcedere conveniunt: omnium istorum flores sat odorari. Invenitur etiam cujus folia parvas oras aureas habeat, elegantissimo rubro colore reliqua occupante, unguis flavos, stamina veluti fuligine tincta, apices obfoletè purpureos.

Alba, varia aut omnia folia extremà parte mucronata habet, aut etia duntaxat exteriora, sed interiora orbiculata. In nonnullis externa folia ad extremum usque mucrone omnino ferè alba sunt, exceptis oris quæ elegantis & dilutè admodum purpurascens sive carnei virita dicam coloris sunt: interiora verò magis purpurascunt unguis lutei, deinde exalbidi, stamina cum suis apicibus flava. In quibusdam exteriora folia exalbido sunt dorso purpureis virgulis asperso, reliquà parte purpurascunt aut incarnatà: interiora folia omnino purpurea sunt, unguis stellatim flavi, deinde albi, apices lutei, pediculi eos sustinentes veluti fuligine aspersi. Aliorum externa folia albo etiam sunt dorso, pluribus purpureis punctis distincto, interiore parte dilutiorè purpurâ nitè: tria interna folia saturatioris sunt purpureæ quàm in superiore, unguis flavi radii stellæ instar, apices nigri, fusci pediculi. Inrerdu externa folia magnas oras carneo colore præditas habent, reliquà parte alba: interiora verò quasi carnei sunt coloris. Nonnunquam externa folia pallescentè sunt dorso, aliàs omnino alba, præter oras quæ foris brevibus & talis purpurascenibus radijs exornantur: interiora tota alba sunt,

oras

- oras tamen longioribus & frequentioribus purpureis lineis insignitis foris habent, interiore parte omnino ferè alba sunt. Quorundam exteriora folia dorso & extremo mucrone pallè, alioqui candida omnino, oræ interiore parte paucis purpurascens radijs distinguitur: interiora folia à medio ferè ad extremas oras purpurascens radijs foris aspersa sunt, intus verò omnino alba, præter oras quæ rarioribus virgulis distinctæ sunt. Aliquādo externa tria folia protus alba sunt: interiora autem oras nunc paucis, modò multis purpurascens sive carnei coloris virgulis distinctas habent: omnium unguis & pediculi pallent. Invenitur etiam cujus omnia folia coloribus quidem albo & carneo permixtis prædita sunt, sed qui cineraceum carneo coloris temerè perfusum referant, vel similis planè coloris cum tenuiore illo sericeo panno carnei coloris, cujus subtemen album est, Germani *Silberfarb* hoc est, argenteum colorem vocant: hujus unguis exalbidus, apices obsoletè purpurascens, pediculi albi sunt.

Tulipa præcox r-v.

VIII.
T. p. r-v.
Argentea

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V



Purpureæ varietatis flos magnâ ex parte omnia folia mucronata habet, interdum tamen externa duntaxat mucronata sunt, interiora autem orbiculato & obtuso mucrone prædita: est etiam cujus omnia folia orbiculatum habent mucronem, ut ex singulorum descriptione videre licebit. Nonnunquam igitur omnia folia mucronata Pæoniz polyphyllæ & pleno flore purpureum colorem imitantur, orasq; habent ex albo purpurascens, unguis ex luteo viridique coloribus simul quodammodo permixtus subobscuro, exalbido orbe radiatum eos ambiente, pediculos flavos sed veluti fuliginè infectos, apices nigros: illius flores magni sunt & admodum paruli. Mucronata etiam singula folia, foris ut plurimum purpurea sunt, interius mediâ parte carnei coloris, oris ex albo pallescens, unguibus, staminibus, & apicibus flavis sive luteis. Interdum omnia folia mucronata, foris & intus purpurea sunt omnino, extremaq; oras albas habent, unguis luteos albo orbe circumdatos, apices obsoletè purpurascens initio, deinde ubi obversus sunt (solent enim omnes bulbacei generis florum apices explicante sese flore aperire & invertere) flavo polline aspersos, flavos pediculos. Aliorū singula folia etiam mucronata, & saturatiore purpureo colore prædita, omnium oræ exalbide, unguis albi, in imo tamen flavi, apices & stamina pallida. In quibusdâ omnia similiter folia mucronata, sed color purpureus dilutior magisque floridus, oræ exalbide, unguis ex viridi

- pallentes, pediculi nigricantes, apices pallidi: odoratus est plerumque istarum Tuliparū flos, reliquarum inodorus, ut etiam subsequentiū. In sexto etiam genere omnia folia mucronata, obscurioris purpuræ & quasi amethystinæ colore prædita sunt, magnis autem oris albis, unguibus, staminibus & apicibus flavis. Quorundam contra flori singula folia orbiculata sunt oris, ijsq; magnis & albis, reliquâ parte saturatiore nitenteq; purpureo colore prædita, flavos unguis ambit albus oris, cineracei apices, flavi pediculi. Nonnullorum interiora folia aliquantulum orbiculata, dilutiore purpureo colore splendent: interiore parte tota ferè alba sunt, omniū oræ magnæ, albæ, unguis, stamina & apices flavi coloris. Repentur etiam cujus externa folia mucronata & reflexa, exteriore parte obscurioris purpuræ colore prædita sunt, interiora verò orbiculata & dilutius purpureo colore, utraq; autem in magnas albas oras definitia, & interiore parte veluti purpureum orbem, totum florem pet medium ambientem habentia, luteos vel flavos unguis albo orbe inclusos, apices obsoletè purpurascens, flavos pediculos. Est præterea cujus omnia folia mucronata, & tria externa foris purpurea, omnia autem magnis oris albis prædita, interioreq; parte omnino alba, nisi mediam eorum partem veluti purpureus oris secaret & varium faceret, ejus unguis flavos ambit albus circulus, stamina cum apicibus pallent.

Sed ante quàm finem huic capiti imponam, adjicienda prætaui, quæ circa Tulipas semine Constantinopoli misso natas observabam.

Magnum seminis illarum cumulum acceperat Illustris vir Augerius de Busbeque cum perisq; bulbaceis stirpibus eo anno quo Viennam veni, hæc, cum sequēt anno in Galliam proficiscer-

profici feceretur, mihi reliquit: ea verò demùm annis septuagesimo quinto & sequente supra mille si mum, & quingentesimum confertum (quodd vetusta essent, & vieta, vixque nascitura, existi mare in) terræ mandavi. Ex his tamen ingens Tuliparum numerus prognatus est, quarum nonnullæ quintæ, sextæ, atque etiam sequentibus annis flores tulerunt insigni colorum varietatē & commendabiles. Nam flavos omnino, rubros, albos, & purpureos, vel ex his coloribus in ter se commixtis distinctos hoc est. r. v. r. v. a. v. r. v. nactus sum præcoces: Sed inter illos etiã fuerunt, qui diligentius observanti, potius ad Dubiarum vel Serotinarum Tuliparum classem referendū videtur, quàm Præcocium: nam licet æquali cum Præcocius magnitudine nonnullæ duntaxat assurgant, eodem tamen cum Dubijs sive Serotinis tempore florere animadverti: de ijs autem proximis capitibus.

Hæc igitur sunt quæ de Præcocium Tuliparum varietate nunc commemorari libuit: non me fugit tamen, quin plures differentię tradi poruissent, sed ejusmodi quas ad jam enumeratas, tamquam primarias, reduci atque sub illis comprehendī posse existimo. Nunc autem ad Serotinarum descriptionem transeamus.


TULIPA SEROTINA.

CAP. VIII.

SEROTINA Tulipa, majore est amplitudine, cubitalem enim & tripedalem interdum habet caulem, firmiorem, crassiorē, rotundum, fungosā materie plēnū, & brevi etiã incanascē veluti lanugine, sive efflorescentiā quadam aspersum: hunc alternatim amplectuntur quaternæ plerumque folia, nonnumquam quia & sena, carinata, firmiōra quàm in Præcoco, ut plurimum erecta, non nutantia aut ad terram inflexa, atq; oris interdum adeo reflexis, ut sinuosa videantur, aliquando omnia æqualia. Summo caulī, qui pedali vel majore plerumque, imò cubitali etiã nonnumquam longitudine hūius supra folia eminet, unicus infidet flos magnus & oblongus, cyathi modo concavus, sex folijs constans, extremo apice omnino mucronato vel orbiculato, aut tribus exterioribus duntaxat mucronatis, interioribus orbiculatis, ut in Præcoco, & e contra: caput ut in illa triangulare, membranaceum, crassius ut plurimum, & prominulo ventre, quo à summo dehiscente, sex ordines feminis plani, cartilaginosi, fulvi, aut rubescentis, majorisq; quàm in Præcoco conspiciuntur: radix præcoci similis, longiore tamen majorēq; bulbo constat plerumque, in reliquis cum illa conveniens.

Tulipa serot. ποδολιανος minor.

Tulipa serot. ποδολιανος major.



Tametsi autē in hæc Tulipa non fecus ac præcox unito ut plurimum constet caule, cum tamen interdum ποδολιανος & ramosus habet: nam sæpe mihi fusc rubro flore atq; etiã flavo prædita; quibus ex infimi folij ala alius nudus & pedalis ramus, gracilior tamen, & ad summi

T. serotina minor wald. aloni.

summi folij exortum tertius, crassitudine primarium caulem propemodum æquans eademque altitudine nudus excrefcens adnascetur, singuli etiam suum florem sustinentes: interdum quaterni, quini, & plures (nam anno xci. habui sex ramos toridem floribus constantem) flores singuli suo graciliori ramo ex alis nascentre insidentes provenerunt, sed alij alijs majores, nonnulli etiam vixati. frequentius verò accidit ut unico ramo donetur, quàm binis aut pluribus.

In hac porro tam insignem colorum varietatem non deprehendi, sed flavas duntaxat, vel ad auri colorem inclinantes, & rubras unguibus plerumque nigris, orbe aureo cinctis, casque vel odorato vel inodoro flore.

Tulipa serotina flava.

T. f. flava.

T. f. rubra.



FLAVA ejusdem ferè coloris est cum præcoce, hoc est, dilutioris & quodammodo flavi, vel pallefcantis, vel intensioris & quasi auri modo rutilantis, vidi etiam cujus foliorum oris sanguineis guttis aspersæ essent: foliorum unguis plerumque cæcæ recentis colorem refertur, interdum nigricantibus quibusdam venis distincti conspicuntur, vel nigra macula notati: apices cum pediculis vel flavi sunt coloris, aut cineracci, vel fuliginæ quadam infecti, aut omnino nigri.

RUBRÆ color plerumque saturatior est, & quasi nigricat, interdum dilutior & perelegans: foliorum unguis aut omnino flavi sunt, quales in quibusdam præcocibus, aut omnino nigri, qui Sole illustrati cæruleum quiddam permixtum habere videntur, vel macula nigra nunc minore, modò majore (eaque tenui orbe aureo inclusa, ut oculum quendam modo exprimere videatur, quæ de causa à nonnullis *Oculus de Sale*, hoc est, Solis oculus cognominatur) flavum insciente, nonnumquam etiam totum ferè occupante: apices cum pediculis vel omnino flavi sunt, vel nigri, interdum apices cinerei coloris, & pediculi flavi.

Ceterum harum Serotinarum Tuliparum quæ vel flavi, vel rubri coloris flore præditæ sunt, nullæ hæcenus varietatè in fatione mihi pepererunt, nisi quod interdum ex rubræ semine, flavæ, contrà ex flavæ semine, rubræ natæ sunt, unguibus sæpenuero variantibus.

TULIPA DUBIA.

CAP. IX.

Tulipa dubia
hybrida.


TULIPA medio inter præcocem & serotinam tempore florentes, videlicet quæ marcescente præcocium flore suis explicant, & serotinis florere incipientibus, jam senescentibus, imò interdum cum illis etiam florent, Dubiæ quodammodo appellari possunt, cum utriusque generis naturam referant. Sunt verò inter eas nonnullæ, quarum flores & ipsa planta serotinarum magnitudinem æquant: aliæ quæ præcoces non superant, nec illis formæ sunt ab similes, & illæ quidem vel amplissimis floribus præditæ, vel præcoce non majoribus: sunt etiam quædam præcocibus humiliores. Singularum autem differentias quàm dilucidè poterimus hæc explicabimus, earum videlicet quæ nobis sunt conspectæ: nam quis reliquarum infinitam varietatem verbis exprimere queat?

T. dubia
major. 1.

1. DUBIÆ igitur majores, florem non minus amplum habent, ut diximus, quàm serotina. Illum autem vel pallidum admodum, vel flavum, omnibus folijs mucronatis, & unguibus flavis instar cæcæ recentis. Invenitur etiam cujus omnia folia omnino flava, extremas nras orbiculatas habent ad præmaruti aurei mali colorem accedentes: stamina cum apicibus flava sunt: illius flos odoratus. Alia item cujus color omnino aureus, æterna deinde folia flavo dorso prædita, nras dilutioris cinnabaris colore radiatis distinctas adquirent: interiora verò folia cinnabaris etiam colorem, atque insuper binos luteos nervos secundum longitudinem, & flavos radiolos in latera excurrentes: unguis hujus magni, flavi, altitudinem superant apicem, qui nigri sunt, pediculi flavi, sed fuliginæ aspersi. Nonnumquam omnia folia orbiculato mucrone prædita flavi coloris sunt, rubra venis secundum eorum longitudinem excurrentibus, nunc tenuibus, modò crassioribus, atque etiam totum dimidium folium interdum inscientibus. Sunt quibus flores dilutius, sive, & cinnabaris colorem quodam

Tulipa dubia 1. major.

Tulipa dubia 1. major altera.



quodammodo referunt, omnium foliorum extremis oris mucronatis, vel saturatiores sunt, & quodammodo nigricant, exterioribus folijs mucronatis, interioribus orbiculatis: unguibus flavis, magnis vel parvis nonnumquam veluti fuligine asperfis, vel in omnibus folijs, vel in exterioribus duntaxat: apices modò flavi & leviter nigricantes, modò omnino nigri, flavi etiam pediculi media ex parte nigricantes. Aliarum flores sunt coloris albi exoleti, qui αὐτοκτονος diei queat: nam folia ex albo pallefcunt; eorumque dorsum flavescit: interiora folia orbiculata, ungues & apices pallent. Nonnullarum flores omnia folia habent extremo mucrone orbiculata diluvissimi purpurei coloris, & quodammodo carnei, maximos ungues albos, qua capiti adhærent flavescentes cū staminibus & apicibus. Quarundam paulo saturatius purpureas, & aliquarum prædulcium præcociorumque rubescensium uvarum, quas Germani *Terminen*, Austriaci *Muskateller* appellant, coloreni referunt, interiora folia orbiculata, ungues cum apicibus flavescent. Reperiuntur item quarum flores saturæ admodum sunt purpureæ & nigrorum acidorum cerasiorum fuceum præne referunt, Austriaci *Winterfarb* vocant: harum ungues vel subcærulei sunt, vel ex cæruleo nigricantes, stamina fusca sunt.

6.

7.

8.

9.

DUBIAE medix quæ amplissimum florem habent, paucæ sunt à me observatæ. Earum una valde pallidi coloris, eodum sulphur ferè referentis, propterea Austriacæ nobiles matronæ *Stuektsfarb* id est, sulphurei coloris cognomen illi indiderant: omnia ejus folia mucronata, ungues fuligine infecti. Ejus unicum bulbum Byzantio allatum habuisti Generula Dn. de Heylenstain, quæ illius prolem communicavit: floruit quidem illa anno m. d. x. xvi. & bonum semen dedit, sed subsequens rigida hiems cum matre corrupta: semen anno sequente terræ commissum, Viennæ in meo hortulo relictum. Altera flavi elegantis coloris florem habet, ejus omnia folia mucronata, nigri ungues, nigri apices, fuligine infecti pediculi. Hæc anno m. d. x. x. ix. florem mihi tulit seddecim folijs constantem, ejus vero proles tredecim, at sequente anno, mater duntaxat octo, proles sex. Tertiæ flos r-v. est, hoc est ex flavo & rubro coloribus permixtus, magnis sex mucronatis flavisque folijs constans, quæ ab ungue omnino nigro, rubras venas per foliorum longitudinem radiatum excurrentes & in latera sparsas habet, nunc raras admodum, modò densas & confertas.

Dubiarum mediarum, quarum flores præcocius sunt æquales, & caules intra illarum magnitudinem nonnumquam consistunt, ut plurimum autem Dubiarum majorum altitudinem æquant, multiplex est genus, ejus differentiarum difficiliter distinguere possunt quàm præcocium, ob variam colorum mixtionem per totos flores interdum diffusam, ut longè & diligente observatione didici: aliquas tamen ex his quæ vel mihi floruerunt, vel apud alios

11. Dubia media 11.

1.

2.

3.

111. Dubia media 11.

1.

N

apud alios crevisse

Tulipa dubia 11. media 1.



Tulipa dubia 11. media 12.



Tulipa dubia 11. media 11. versicolor.



crevisse significatum est, quâ potero per spicuitate, pro ingenij mei tenuitate describam. Sunt igitur quædam Flavæ dilutiores vel pallidiores, quarum externa folia quodammodo foris virefcunt: aliæ quarum folia orbiculata sunt, unguis autem subvirescunt: quarum item folia flavi coloris elegantis, interiora tria supernè orbiculata, & quibuldam sanguineis guttis aspersa: nonnullè omnia folia flava habent, unguis cerei coloris, quales aliqui ferotinae habent: aliæ quarum unguis nigræ & (splendente maculâ sunt insigniti, vel ex fulco & viridi coloribus commixtis perfusi. Nonnullæ r-v. sunt, nam licet omnia folia initio flava sint, tertio tamen vel quarto die post quàm explicati sunt flores, singula folia tenui limbo rubro exornata conspiciuntur, nonnumquam etiam in proliis (nam satis fertifica est) nullus apparet, vel alternis duobus annis conspiciuntur quædam flava folia habent, oras autem cinnabaris serè colore infectas: aliarum folia pallidiora sunt, & rubris venis ornatas habent oras: quarum item folia etiam pallent, sed perfusus est mali aurei præmaturi color, præsertim circa oras: invenitur etiam versicolor elegantissima, cujus colores flavus & ruber ita commixti sunt, ut è sericeo panno flavo, cujus subremin rubrum est, constare flores videantur, illius unguis nigræ sunt: a-v. ferotinae f. mihi hæc nata, eleganti- illimum florem tulit anno M. DC. XVII. Aliarum flo-

rum flo-

rum flores albi quidem sunt, sed in flavum degenerantis coloris qui *αγρόλινος*; qualis in Dubia majore descripsus est, harum folia vel omnia mucronata, vel interiora orbiculato mucrone constant, ungues, stamina, apices pallent: nata etiā mihi est ē. v. ferotina femine quod Ioan. Boissot communicavit, sulphurei quædam coloris, qualis illa Hcyenstaina ferē, sed minus ampli floris. Quarundam flores *αγρόλινος* etiam sunt coloris sed alius color adjunctus: nam cuiusdam omnia folia mucronata, extremum illum mucrone rubro colore tinctum habent: alia pallidiora sunt & oras rubris venis distinctas habent: in nonnullis foliorum oræ vel purpureis venis distinctæ, vel carnei coloris omnino sunt, qui etiam media folia occupant. Vnam habui A. v. ferotinæ femine naram quæ anno m. n. xxcix. florem prioris album protulit, licet initio virefens color perfusus quodammodo conspicere, stamina apices fuscī fuerunt. Nonnullarum flores A. v. sunt octavæ A. v. præcocī ferē similes, ijque, vel dilutiores, interioribus folijs quodammodo orbiculatis, unguibus nunc exalbidis circa summum purpurascēte maculā insignitis, staminibus exalbidis, eorum apicibus nigricantibus, modō unguibus & staminibus candidatis, vel unguibus exalbidis subcæruleo orbe inclusis, albis staminibus, nigricantibus apicibus: aut saturationibus folijs præsertim exteriori parte, exterioribus mucronatis, omnium oris candidantibus, unguibus exalbidis subcæruleā maculā insignitis, albis staminibus, apicibus eorum nigricantibus: quarundam folia mucronata dilutiorisq; sunt coloris aut saturationis: Inveniuntur etiam quarum flores plurimum ad A. v. præcocis secunde & tertie colorem accedunt: & alia femine à Boissot missa elegās in cuius flore purpureæ venæ per totū solum dispersæ sunt, floruit hæc primum anno m. o. xc. Purpurearum flores coloris nunc sunt dilutioris & magis floridi, foliaq; interiora orbiculata habent, exalbidis ungues, purpurascētia stamina, eorū apices nigricantes: modō quasi similes Purpureæ dilutiori dubiæ majori, candidatis oris, unguibus vel ex albo flavescētib; vel flavis omnino, aut veluti fuligine infectis, aut ex cæruleo, flavo, & subvirescente coloribus commixtis: modō saturationis coloris, cui albicantes tamen quædam venæ permixtæ sunt, unguibus aut ex flavo nigricantibus, aut flavis omnino, aut ex viridi nigricantibus, aut subcæruleis, five ex cæruleo flavescētib; aut cæruleis omnino, nisi flavescens oris ambiret: sunt etiam quarum flores dilutè purpurei illum scēre colorem referunt qui in Caryophyllis floribus reatissè miniatis è Silesia primum delatis conspicitur, Viennenses & Silesiæ maronæ *Pennansius* / quasi autē mali colorem illis tribuunt, quia dilutius rubenti colorī flavus quodammodo perfusus videtur, horum color vel dilutior, præsertim interiori parte & per oras, vel saturatione, interdum internè dilutissimus, foris saturatior, ungues vel flavi, vel flavum colorem fuliginosus ambit oris, vel ex viridi nigricant, vel fuscī sunt: vidi etiam quarum flos ad postremam differentiam Secundi generis valde accederet, rubro tamen colore alium superante: quædam plurimum accedunt ad eam quæ inter Dubias majores octavo loco reposita est, verum humilior, folijs interioribus orbiculato mucrone præditis, unguibus vel omnino albis, vel candidantibus & superiore parte ad cæruleum colorem tendentibus, staminibus exalbidis, apicibus ad fuscum vergentibus, vel unguibus cæruleis, aut ex cæruleo virefcentibus, vel nigricantibus: aliz Dubiarum majorum nono generi similes ferē, licet minores, quarum ungues vel fuscī sunt, vel ex cæruleo nigricant, vel flavi nigro orbe flavum colorem ambiente. P. V. florum folia vel dilutiorē colore purpureo sunt prædita, vel saturatione, omnium oræ mucronatæ, vel interiorum orbiculatæ exalbide sunt, ungues aut albi, aut subcærulei, aut albi quidē, sed quos latus oris carnei coloris ambit, stamina plerumque nigricantia. Inter reliquas Rubræ mihi natæ quarum folia foris ad purpurascētem colorem accedebant, interius autem coccinei ferē coloris erant, ungues, stamina, apices flavis: item quarum flores rubri, folijs tamen exterioribus secundum longitudinem flavus color asperlus: & quarum color non splendens, sed obscurus & ad lateritium accedens, ungues flavi vel nigri: præterea, quatum flores R. ferotinæ similes, quæ ab unguibus nigris flavo orbe cinctis Oculus Solis cognominata est. Alia itē cuius flos nondum mihi conspectus dum hæc scriberem, verum pictura à nobili viro Ioanne de Hogelande Lugduno Batavorum missa anno m. n. xc. deinde illius unicę quam habebat, bulbus, ejusdē anni autumnum, cuius flos omnia folia mucronata habet, eaq; ut ipse Hogelandius ad me scripsit, initio quidem omnino viridia, deinde oris veluti pallescentibus, quæ tandem in rubrum colorem mutantur radiatim sese alteri colorī commiscētem, color etiam ille viridis senescente flore elanguescit, præsertim interiori foliorum parte: & sanè subsequētib; annis, bulbus ille florem mihi dedit, qualem descripserat, nullum tamen semen nascifici potui. Sed & alia femine mihi nata, similem florem produxit Lugduni Batavorum anno quinto & nonagesimo supra millesimum & quingēsimum. Sunt autem omnes hæc dubiæ mediæ secundæ classis (præter postremum genus) mihi natæ femine, vel Byzantio allatæ, vel à N. V. Ioanne Boissot communicatæ, vel eo quod mihi ferotinæ meæ dederunt, vel (quod magis mirandum) aliquot etiam præcoces. Nam anno m. v. xxcvi. ex purpureā præcocius florentem habui p. ferotinam elegantem dilutiorē, cuius folia interiori parte ad illum purpureum colorem accedebant, quem conspici dixi in quibusdam purpureis secundæ classis Dubiarum mediarum, quæ à Matronis Austriacis *Pennansius* cognominatur, unguibus flavis, in tribus verò exterioribus folijs, nigricantibus: item *αγρόλινος* ē p. v. autem præcoce, p. ferotinam ad rubrum quodammodo tendentē, & p. v. ferotinam dilutiorē elegantem. Anno sequente,

rursus è P. pr. Rub. ferot. elegantem ad carneum colorem accedentem, unguibus ex cæruleis nigricantibus. M. D. XXCVI. I. aurem anno è P. pr. α γ β δ ε ζ η θ ferotinā, R. ferot. unda bus & staminibus flavis, P. ferot. nigricantibus ung. & r-v. ferotinam: ex a. præc. Flavam ferot. & r-v. ferotinam. Contrā ex a-v. ferotinā, natæ sunt præcoces Alba, Flava, Rubra ung. flavis, Rubra *Ochro di Sole*, & P. dilutior.

Ex ferotinā
aliquando
præcoci.

Colorum in
Tulipis san-
na variatur.

Cujusdam porrò a-v. quæ anno M. D. LXXVII. primum Bruxellæ florem protulit, semine, natus est jam dictus Boilot, & quædam nobiles Matronæ dubias etiam Tulipas mirā colorum varietate ludentes, ut ad me perscriptum est: etenim & flavas, & pallentes, ex albo item pallescentes, sive α γ β δ ε ζ η θ, purpurascens, intensius aut dilutius rubentes, lateritij coloris, atque alias alijs coloribus insignitas habuerunt: quibus etiam similes, & aliæ elegantissimis coloribus variè mixtis postea mihi semine natæ, & singulis annis adhuc nascuntur, quibus pares nunquam ante conspexi: ita Deus in istis floribus admirabilem suam potestatem ostendit.

T. ferot. viri-
du dupli-
sulurum in
flore ferot.

CETERVM ANNO M. D. XCIII. mittebat Iacobus Plateau Tulipæ, quæ illi semine nata erat, monstrofa quidem, sed non inelegantis, iconem, colore à reliquis differentem, ejus enim flos, ipso referente, prorsus viridis, internè sex parva crassaque alia folia etiam viridia complectens, caput ambientia, ut initio parva brassica florida sive Cypria videretur. Primum quo florem tulit anno, neglexisse scribebat, vitium aut Naturæ ludum esse existimans: sed cum subsequenter quatuor annis florem non variare animadvertet, nullum autem probum semen præbere, ejus rei pertæsus, bulbum alteri donavit.

T. ferot. viri-
du viri pal-
du, & albu.

SED & mihi biennio post, ex semine natis ferotina mihi florem dedit sex folijs, ut reliquæ, constantem, prorsus virentibus, exceptis oris quæ pallidæ erant, & unguibus, qui ex viridi pallescebant. Floruit etiā mihi anno M. D. XCVI. Alia viridis cujus oræ albe fuerunt. Breve iter, singuli anni nobis proferunt novum aliquod Tuliparum genus, nec ante cuiuspiā conspectum.

Tulipa dubia pumilio.

Tulipa du-
bia pumilio.



Tulipa pu-
milio alba.

HYMILIOR porrò Tulipa pedalem altitudinem non superat, imò ut plurimum infra eam consistit, folijs & flore ad Præcoccem proximè accedens: foris autem folia omnia mucronata, sed exteriora multo longiora, foris obscurè rubra, extremis tamen oris virentibus, interiora omnia folia intensè rubent & splendent: ungues flavi radiati, sed quos nigerrima macula sic inficit, ut orbis aureus & radiatus eam duntaxat ambire videatur, & oculum quodammodo ementiatur: stamina cum suis apicibus nigricant: hujus radix bulbacea interdum eriophora est, nam exterior illa membrana bulbi substantiam amplectens & tegens, plurimo denso, candido, mollique tomento adeò suffulta est, ut mollissimè bulbum recubare necesse sit.

INVENTA etiam alterum pumilionis Tulipæ genus, quod mihi quidem conspectum non est: sed iconem suis coloribus expressam accipiebam anno millesimo quingentesimo sexto & nonagesimo, ab erudito viro Joāne de Jonghe, Ecclesiæ Middelburgensi in Martiacis, additā hac descriptione:

Mitto ad te Tulipæ cujusdam iconem, ad ipsius plantæ similitudinem expressam, hoc est, eadem quā Tulipa magnitudine, paribus caule, flore, folijs (quæ paullo longiora & angustiora habere debet) & bulbo quem erui, ut pictor commodius exprimeret. Tribus jam annis continuis in horto habui florem proferentem, sed unicum, nec florem habuit quamdiu sin-

gulari folio prædita fuit, aliarum Tuliparum modo: nam superiorem anno habui flore suo ornata, & aliam unicum folium producentem, quæ nunc quaternā folia nata, primum florem demum tulit alteri prorsus similem, ut certum sit id genus majorem amplitudinem non adquisitum. Hactenus ille. Tota verò planta (quantum ex iconē deprehendere potui) palmo major non est, quatuor promens folia angusta, carinata, Tulipæ Mompellianæ folijs similia, inter quæ cauliculus prodit uncialis aut paullo longior, nudus (præter aliarum Tuliparum morem) ex viridi purpurascens, summo fastigio florem gerens sex folijs constantem, foris nonnihil purpurascens, intus candidis, umbilicum occupante oblongo capitulo sex

flavis

Tulipa pumilio altera.



flavis staminibus septo, quod, an semen protulerit, ignoro: florem autem tulisse Aptili inde conijcio, quoniam sub Maij initium pistorum mittebat, cuius bulbus exiguus, bulbi tamen aliatum Tuliparum formam refertens, ex spadiceo nigricante cortice tectus. Icone accepta, Croci verno tempore florentis genus initio existimabam.

CETERVM non omnes flores diu in sua coloris elegantia & venustate perdurant, vetim nonnullarum magis caduci, brevi marcescunt, aliarum firmiores sunt & coloris gratiam diutius retinent, præsertim serotinarum & dubiarum: omnes certe nubilo cælo sese contrahunt, & pluvio facile corrumpuntur, etiam ante quàm expandi possint interdum, si continui cadant imbres: contra, temperato sole illustrati, explicantur & diutius conservantur: at vehemente etiam ejus ardore nimium excocti, & suo humore exhausti, facile defluunt. Neque omnes versicolores, tam præcoces, quàm serotinarum, singulis annis eandem coloris gratiam perpetuò retinent, sed alternis variate sæpius observavi, exempli gratia F. v. a. v. uno interdum anno nitidissimæ sunt, sequente vix alius color, quam flavus vel albus in eis conspicitur, sic a. v. & F. v. nonnumquam magnas habent oras flavas & albas, sequente valde exiguas.

Tulipa altera
an pumilio q
annu eleganti
bus præferat
serotina.

CETERVM tametsi feminibus tetra mandatis Autumno (inutilis enim bulbacearum & tuberosarum maximè ex parte verna est ratio)

Tulipa vni
serotina
modi.

hujus plantæ genus conservati soleat: interdum tamen & nucleis majori bulbo adnatis propagatur, sed nulla inter præcoces Tuliparum fertilior rubra, & alba, omnium autem maximè serotina rubra, quæ adeò fecunda est, ut etiam femine nata, & vix bima alias proles generet biennio aut triennio ante quàm florere incipiat, quod etiam faciunt pleræque dubiæ: Solent enim omnes Tulipæ nondum adultæ, & ante quàm flores proferte incipiant, ut plurimum singulis annis tecta & quasi ad perpendiculum in dodrantalem & palmarem altitudinem profundius descendere (Apeninæas excipio, & quasdam alias, quæ non in altum, sed in latus & obliquum, ante quàm floriferæ sint, proles è longis venis dependentes spargunt, ut proximo capite declarabimus) serotinarum autem illarum & dubiarum jam dictarum etiam in veteris bulbi exuvio aliquid substantiæ relinquit, quæ in alium bulbum efformata, similiter in exuvio substantiæ quidpiam relinquit quæ in alium bulbum transit, ut si quis cum dexteritate quadam & industria trimos & quadrimos eruat, exuviorum vestigia sequendo, nonnumquam velut catenam aliquot bulborum coherentium, & ex primo exuvio ortum ducentium inveniatur: licet interdum accidat ut R. serotina jam grandior, nondum tamen planè adulta, instar Tulipæ Apeninæ siue Bononiensis proles in laris spargat, ut in meo hortulo, in quo varij generis Tuliparum stirpes florum elegantia & varietate commendabiles albam & exolebam, dum Viennæ agrum non semel observavi.

Memini & bulbos in infimâ, quasi summa tellure natos, in serotinarum & dubiarum generibus præsertim (licet etiam in a. v. F. v. & quatuorundam aliarum præcocium alio bulbi mihi nati sint) qui telluri commissi, ejusdem coloris cum matre florem subsequente anno producerint: eundem etiam colorem retinent bulbi matri adnati. Ex feminibus verò quæ fit propagatio, plane (ut dixi) incerta est, in præcocibus nimirum & dubijs: nam serotinarum magna ex parte suum genus conservare videntur, quemadmodum superiore capite dictum est: aut si aliquam mutationem adquirunt, exigua ea est, & plerumque in unguem & staminum varietate, aut coloris intensiōe vel remissione consistit.

Tulipa bul.
serotina.

Solet caulis è medio bulbo eruptere: sed ipso cum folijs jam marcido, & siccato, si bulbum eruas, ad latus illius enatum conspicies (quod etiam evenit in Iride bulbosa, Colchico, & congeneribus alijs) novo bulbo paulatim succrescente, & totius plantæ succum ad se recipiente, quo tempore commodissimè erui potest, et utis bulbus diu extra terram ad servari, & in alia loca etiam procul distita sine noxâ transferri.

Omnes autem cujuscumque generis Tulipæ (ut etiam hoc breviter annotem) quemadmodum longæ experientiæ didici, quamdiu florem non fecerint, ævulus planè sunt, & uni-

Tulipa bulbifera.

carthageni-
p. 100.



Natalis.

cum folium singulis annis proferre solent: ac si, dum emerit, sese explicare incipiens, fecuodum etiam eo inclusum appareat, illo ipso anno florem prolaturum spes est, nisi pruina, aut aliud ab insectorum erosione incommodum eam interceptiat.

Quo nomine veteribus dicta sit hæc planta, multi dubitant. Sunt tamē peritiores nonnulli, qui ad Satyrium Dioscoridis, quibusdam *τριφυλλος* cognominatum, referendam censent: ad cuius sanē descriptionem multis notis accedit. An verò ipsdē facultaribus cum Satyrio prædita sit, neminem periculum fecisse intellexi.

Memini ante plures annos Viennensi pharmacopæo ad rubri cancri symbolū plus quādam ceotenos Serotiniq. bulbos quadrimos dedisse, ut saccharo condiret, radicem orchidis instar, & in aliquo, qui ad hujusmodi remedia confugeret, periclitaretur: verū illo negligentia quadam condire obliito, perierunt. At anno m. n. xctt. Ioannes Muler pharmacopæus multos condijt, radicem Orchidis instar, quibus certē longē suaviore & palato gravioris deprehendebam: an verò id præstaret, quod satyrio tribuitur, nondum intellexi.

Potuisse autem ante triginta annos Auerpianus quidam mercator certi quidpiam de ea se itatuere. Is enim cum horum bulborum non exiguum numerum ab amico cum byssinis pannis Constantinopoli sibi missum accepisset, cepas esse existimans, ex illis aliquot sub prunis assari iussit, & vulgarium ce-

parum modo, ex olco & aceto in cœnam sibi parari: reliquos in hortu, inter brassicas & alia olera defodit, ubi neglecti, omnes brevi perierunt, præter paucos quos Georgius Rye mercator Machliniensis, rei herbariæ perquam studiosus, ad se recepit: cuius sanē diligentia, & industria acceptum referre debemus, quòd eorum postea flores, gratissimā varietate delectationem & voluptatem oculis adferentes, videre nobis licuerit.

Hæc genus autem Tuliparum bulbi nobis Byzantio missi sunt, præcocius quidem *Cassê lali*, serotiniq. verò *Cassê lali*: à locis nimirum unde primū Constantinopolim illati sunt, appellacione inditæ: Cassi urbs est in peninsula *Gazaria* dicta, quæ inter Propontidem & Euxinum pontum sita est: *Cassê* verò in Macedonia urbs maritima. Suos qui Tulipam, præsertim purpureâ, Cofinofandalū esse velur à veteribus inter coronarias herbas numeratum.

TULIPA BYZANTINA ALTERA.

CAP. X.

QUIA novum Tulipæ genus hoc capite describemus, operæ pretium me facturum existimavi, si pauca quædam de Apenninea, Narbonica, & Hispanica, quibus nostra hæc aliquot notæ similes habet, prius disliceremus.

Tulipa A-
penninea.

APENNINEA igitur Tulipa pedalem vel etiam cubitalem fere cauleis, in binos aut ternos ramos interdum divisura, quibus singulares insident flores fenis ut plurimum folijs nonnumquam & octonis constantes, foris subvirescentibus, intus flavis, protuberante è medio tollio capite trigono oblongo, utculo, multis flavis staminibus cincto: valde odoratus is flos, leucocy flavi suaveolentiam referens, superioribus Tulipis plerumque magis expanditur, & ferè à meridie sub vespeream duntaxat: folia alijs Tulipis angustiora, etiam carinata nonnullis, sed longe minus: radix bulbosa spadiceo cortice tecta, in binas aut plures soboles singulis annis dividitur, proximo anno flores dururas, quin & alias subinde oblique & in latera spargit: præsertim quæ nondum florem tulic non in altum recta emergit. Floret cum serotinis, aut paullo etiam serius. Nascitur plurima in Apennino, unde etiam memini Bononiâ ad nos ante multis annos mittere C. V. Vlysses Alkivandum, Bononicosem Professore, & omnium Naturæ miraculorum Scriptorem solertissimum: cuius lucubrationes avidè adhuc expectamus.

Tulipa Apenninea.

Tulipa Narbonensis.



Tulipæ Byzantinæ genus alterum.



Tulipa Narbonensis.

Tulipa Hispanica.

Tulipa Byzantina genus alterum.

Hic similis parè est Narbonensis è Cebennis montibus, à C. V. Matthia de Lobel primum eruta, & amicis in Belgicam missa: minor tamen est in omnibus, flores foris magis virentes, intus flavi, delicatius quiddam spirant: radix etiam è renibus nervis in latera foboles & bubillos spargit.

TERTIA in monte quodam Aranjoes vicino nata, in Belgicam à Francisco de Hollebeque Regio hortulano missa, Narbonensi paullo minor est: ejus florem non vidi, sed Narbonensi similem esse intellexi, qui folia tamen habear foris non omnino viridia, verum purpurascens etiam colore perfusa. Illius bulbos aliquando alui, qui unico duntaxat folio semper germinarunt, adeoq; inanes paulatim facti sunt, ut tandem perierint. Miserat præterea idem Franciscus & alios aliquot bulbos (ut Hispania bulbacearum, & variarum aliarum elegantium stirpium maxime ferax est) quorum maximam partem in Hispaniâ meâ peregrinatione non observaram, qui tandem belgicum aërem respuentes, contrahuerunt.

BYZANTINA autem folio prodit liliaceo, unico, si florem non feret, reliquarum Tuliparum more, ac florem prolatura pedalem promit caulem, viridem, rotundum, quem amplectantur bina plerumque folia liliacea, dilutius virentia, & Lily Perfici foliorum modo splendoria, florem summâ parte sustinentem Apenninæ Tulipæ flori formâ & amplitudine parem, sex mucronatis folijs cõstantem, quorum exteriora paulo angustiora sunt, interiora verò latoria, exalbido foris cum purpurascens & viridi mixto colore, internè autem tenuiter rubescens sive diluto carneo, unguibus & staminibus flavis nigricante apice insignitis nonnihil odoratum: eaput trigonum Apenninæ simile,

viridi mixto colore, internè autem tenuiter rubescens sive diluto carneo, unguibus & staminibus flavis nigricante apice insignitis nonnihil odoratum: eaput trigonum Apenninæ simile,

simile, quod ad frugem non pervenit: radix bulbacea Apenninæ planè similis, aliquot fibris donata, quam etiam bulbos in latus spargere observavi.

Floruit mihi hæc anno M. D. XXXVI II. . Aprili mense & alterum in supremâ alâ (quemadmodum ex hac icone, quam ex illa florente ipsemer exprimebam, videre licet) habuit florem: Generosæ autem Domini Vngnadin, quæ præcedente Novembre Byzantio illam cum multis alijs bulbaceis stirpibus acceperat, binæ etiam floruerunt, una binos, veluti mea, gestans flores, altera unicum. An postea aliquæ ipsi floruerint, ignoro, illo ipso enim anno Vienna discessi: earum duarum certè, quas illa donante solum retinueram, quodammodo contemnens, quoddam Apenninæ (ad eodè similes erant bulbi) existimarem, nulla deinceps floruit, sed prolem generantes, unicum folium produxerunt. Misa autem fuit cum hac inscriptione *Lalè di duei fiori*, ex qua conijcere licet, ut plurimum binos profertur flores.

Sed quandoquidem in Apenninæ Tulipæ mentionem incidimus, silentio premeum non duxi aliud Tulipæ genus quod habuit honestus vir Theodoricus Coornhard Amsterodamensis civis.


T. R. Apenninæ similis.

EST autem illa, caule, folijs (quæ tamen paullo viridiora) floribus formâ, Apenninæ non valde dissimilis, nec etiam (ut mihi relatum) radice, quæ, ut inquit, illius instar, oblique propagines spargit: floribus autem color ruber est saturatior sex folijs mucronatis constans, nonnihil odoratus, quorum ungues longi nigri, flavo colore eos ambiente, internis folijs interioribus in ternos radios mucronatos desinentibus, in reliquis ternis, orbiculato mucrone, illis externâ parte omnino flavescens, his verò paululum flavi circa infimum unguem habentibus, trigono oblongo capitulo Apenninæ instar medium florem occupante, tubescens: semen mihi non conspectum. Floret April.

FRITILLARIA.

CAP. XI.

*Fritillaria
hispanica.*



VENERABILISSIMA hæc planta pedali, interdum etiam majore, est caule, rotundo, tenui, floribus ex viridi purpurascens, & obscurioris coloris, intus verò, ut Tuliparum, fungosus: quia plerumque habet folia, interdum etiam plura, incondito ordine, per caulem sparsa, angusta, carinata, digitatis longitudinis vel majoris, superioribus exceptis, quæ breviora sunt, caule viridiora, & Narbonensis vel Hispanicæ Tulipæ folijs forma coloreque proxima: flos in summo caule sæpissimè unicus, interdum bini, raro terni, omnes autem eodem tempore se apertientes nonnumquam gemellus, inodorus, dorsum spectans & propendens tintinnabuli modo, sex folijs constans ut plurimùm, (habui etiam octonis & duodenis) quæ areolis quibusdâ nunc quadratis nunc oblongiusculis, partim candidi, partim purpurei, sive saturatioris, ut ira dicam, carnei coloris, elegantissimo ordine, pulcherrimæque serie distincta sunt, quadris tamen ad latera minoribus: folia interiora parte sunt vegetiore & elegantiore colore prædita, candicantesque, qua parte capiti inhaerent, ut Rosarum folia, ungues habent, à quorum infimâ sede virescens quædam, & herbidi coloris linea, ad medium usque folium ducta videtur: sex stamina medium florem occupant, quorum apices primum pallidi, deinde, ubi obversî sunt, flavi, & quasi pulvere quodam conspersi (quali sunt omnium ferè florum apices) quæ stylum trifidum, ut in plerisque alijs floribus, ambiunt: triangulare deinde succedit caput, unciam plerumque

longum, supremâ parte crassius & sine coronâ, aliqui Narbonensis Tulipæ capiti simile, in quo semen planum, jam dictæ Tulipæ semè quasi referens, membranaceo margine latiore, in quo nullum, contra quàm in Tulipis, germen conspiciunt: radix bulbosa, cædida, solida, nullis tunicis septa, sed veluti in binas easque ut plurimum æquales partes secta, è cujus medio proruberat quasi pulvis quidam, unde caulis emergit, sessilis parte multis fibris donatâ.

Varietas.

Tempus.

Hujus flos interdum variat: nam ut plurimum saturatius purpurascens quadras habet, interdum dilutiores. Vnam habeo seu line natam dilutissimam. Floret cum præcocionibus Tulipis, interdum etiam Martio, in hortis.

Sponte

Sponte quibusdam pratis ad Ligerim flumen non procul Aureliâ urbe Galliz celebri natus, unde primum ad me missa fuit Machliniam, & Belgicę cõmunicata anno M.D.LXXII. (nasci etiam in Nortmanniâ & Britanniâ minore intelligo) Deinde Viennę Austrię, aliquot bulbos accepi triennio post munere Ill. V. Ioannis de Vulcop, Regis Galharum apud Cæsarem Maximilianum II. tum Legati. Misit etiam ad me aliquot post annos Ill. V. Augerius de Bousbeque Serenis. Regina Elizabethę Caroli IX. Galliarum Regis viduz, summus Austrię Præfectus & Cæsari Consilijs, Lutetiâ multos bulbos, ut nobilium Austriacarum Matronarum quę illius floris erant studiosissimę, votis satisfacerem. Anno verò M. D. LXXIX. in quibusdam pratis quadriduano itinere infra Budam Pannonię, ab ijs qui Constantinopoli redibant, mense Martio, flores observata est. Sed & postea pleręque semine mihi natę sunt, quę septimo & octavo demum anno, vel etiam serius floruerunt: quarum aliz binos, quędam ternos, nonnullę vel geminos, vel duodecim folijs constantes flores tulerunt.

Fritillaria dilutior.

Fritillaria Aquitania.



N. V. Ioannes Boissot, vetere amicitia mihi conjunctus, aliud genus habebat magis ferotinum, quod toto bimestri post primum floruisse ad me scribebat, binis ornatum floribus parte interiore ex flavo virentibus, sine ullâ colorum distinctione: foris nervus extuberans & eminentiore ex obscuro virebat, foliorum orę nonnihil reflexę versiculores erant, ex flavo, virente, & purpureo. Ex Aquitaniâ originem ducere asserbat.

Is porro bulbos quem mihi Autumno communicabat anno M.DCCCIII. Maij subsequētis inino florem aperuit sex folijs, ut in præcociore constantem, quorum extremę orę nonnihil reflexę erant, dorsi nervus paululum extuberabat, atque virefcebat, interiora terna folia externis erant latiora, omnia autę exterius ab imo folio ad extremas oras, obsolete purpureę tadijs, sub quibus nonnihil flavi conspiceretur, distinguiebantur, interiüs verò colore ex viridi flavescēte & splendēte prædita erant, veluti sericeus pannus viridis, cujus subtemen flavum sit: sex stamina ex umbilico prodibant pallidis apicibus obfita, alia alijs longiora. Nullum semen tulit, proximo anno imminutus bulbos florem non dedit, tandem subsequens rigida hiems omnino corripit.

CETERVM Fritillarię Tertium quoddam genus habuit Ioannes Somer, cujus paulo antę memini, virqui exoricarum & elegantium stirpium culturâ valde delectatur, ijsque benę instructum habet, quod florem anno nonagesimo septimo supra millesimum & quingentesimum produxit, sex quidem folijs constantem & nutantem, ut superiora genera: sed quorum folia sunt flavi coloris rubris maculis distincti, illorum mediõ nervo prominulõ & virefcentis coloris.

QVI ad me primum genus mittebat pharmacopęus Autelianensis, Noël Capperon vocatus,

carus, ac paullo pōst in schyrica illa communique laniena per universam Galliam grassante sublarus, *Fritularia* nomen indiderat, quōd ejus areolæ versicolores, fritillum quodammodo æmulentur: vulgo Liliū variegatū ante dicebatur. Dodonæus Meleagridem appellare maluit, quoniam ejus folia varijs coloribus picta sint, uti plūmæ Meleagridis avis, quam vulgus Gallinam sive Perdicem barbaricam aut Guineæ vocare solet, diversis tamen. Secunda autem species commodè Meleagris aut *Fritularia* appellari nequit, quandoquidem colorum in eā varietas simili modo non est distincta, ut in priore: tameris & caule, qui aliquantulum tenerior, & folijs, quæ in hac paullo angustiora magisque herbacei coloris videntur, & radice, atque etiam floribus formā nonnihil illam æmuletur.

At apud Recentiores medicum in usum veniat hæc planta, me fugit. Ob florū tamen elegantiam & venustatem expeti, & diligenter in hortis coli potius existimo.

NARCISSVS PRÆCOX SIMPLICI FLORE.

CAP. XII.



Narciss. latifol. simplex.

Narciss.

Narciss. simplex. l. var. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Narciss. latifol. Bylandus medius l. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Narciss. latifol. simplex. l. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Narciss. latifol. rotund. l. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

SIMPLICEM Narcissi florem appello, qui simplici sex foliorum texturâ constat, licet medium calix occupet. Ejus autem stirps, aut laciola habet folia, aut angustiora & tenuia. Vtriusque generis flores colore etiam inter se differunt, omnium porro differentias quâ poterimus perspicuitate hoc capite trademus.

PRIOR ergo latifolius Narcissus tria aut quaterna habet folia, videntia, oblonga, porri folijs ferè similia, caulem cœcavum, striarum, nudum & sine folijs, pedem altum, interdum altiores, in cujus summo, sex aut octo pluresve nascuntur flores, triangulis pediculis insidentes, & è tenui membranaceo involucrio erumpentes, mediocriter amplior, cum gravitate quadam odoratos, sex folijs constantes albis, interdum etiam *ω γαλακτες*, quorum medium flavus omnino calix occupat, sex brevissima stamina cum suis apicibus pallidis connatis: floribus succedunt triangulata capira, in quibus semen nigrum, angulosum. Radix illi facta ampla, bulbosa, nigricantibus aliquot tunicis sepra, fibrisque multis capillata, intus omnino alba, & si præcidatur, lentum quandam succum, ut reliqui bulbi, exhillans.

Nascitur plerisque Hispaniæ, quæ Mediterraneo mari objecta est, locis, & omnibus ferè circa Mompelium pratis. Memini non procul villâ novâ oppidulo Magalonæ vicino, bulbum erueri, cujus summus caulis decem

& sex flores sustineret, ut merito *πολυανθεος* appellari potuisset. Illum in C. V. Gulielmi Rondeleti apud quem vivebam, orto, terræ commisi.

Floret in calidioribus regionibus meise Febuario, erueri memini etiam quasdam plantas Ianuario in pratis Boutoneto suburbano vicinis (ut interdum inter ejusdem generis stirpes alia alijs maribus germinat) Apud Belgas verò non nisi Martio aut Aprili.

Invenitur alius huic ferè similis, sed paullo præcocior, latioresque folijs, & amplioribus floribus, cui plerumque nisi tetni, quaterni, aut ad summum seni supremo cauli insidet. Adfertur Constantinopoli cum plerisque alijs, & in scitibus ut plurimum colitur, ubi floret Aprili, interdum etiam Martio, si veris temperies paullo calidior fuerit: major odoris fragrantia in hoc nares ferire videtur, quàm in superiore.

Hujus generis aliquot bulbos, *Narcisso doppio* nomine, mittebat ad me anno M.D. xc. Illi^{us} Heros Ioannes Vincentius Pinellus, quos plenos flores prolaturos sperabam: sed subsequente vere, meâ spe frustratum deprehendi. Nam elegantes quidem flores habui, sed simplici sex foliorum serie constantes, superiore ampliores, omnino nives, præter medium calicem flavum, odoris fragrantissimi, septenos & plures summo caule simul nascentes: folia carinata, nec minus lara habuit, quàm qui plenum fert florem, & radicem crassiorē. Monitus autem, quos miserat bulbos simplici florem tulisse, alijs me imperij minus crassius, quorum flores, pleni fuerunt, paullo tamen minores Primo, sequente capite descripto.

ALTER prior formâ non dissimilis, folia habet terna aut quaterna viridiora paullo superiore, longiora & angustiora, è quorum medio exiliter caulis larusculus, angulosus tamen & concavus, cui insident seni, septeni, interdum deni flores prioribus similes, sed obliques paullo,

Narciss. latif. simplici flo. protus albo 1.

Narciss. latif. flo. protus albo 11.



paullo, & omnino nivei, quorum videlicet calix ille medius (qui in priore flavus) etiam albus est, odor priori similis, similis etiam tadix. Illius nec capita neque semē observare potui: nam Ianuario extremo, nascentem pingui solo nonnullis Lusitanæ & Bæticæ locis, & uliginosis multisq; adhuc aqua stagnantibus & florentem observabā anno M.D.LXV. tum etiam Februarij initio in summa Calpe eruebam duntaxat. Ejus aliquot bulbi in Belgicam missi nondum flores tulerant, dum octennio post à Cæsare Viennam acceperet. Hæc portò planta, ex illarum est numero, quas magnæ illius & generalis Stirpium Historiæ, ante paucos annos Lugduni expressit Auctor Dodonæo tribuit, & ab eo me sumpsisse scribit. Ego verò non modo hanc, sed plurimas alias quarum descriptionem in Hispanicis observationibus dedi, Dodonæum à me habuisse assero, & omnia quæ in Hispaniâ meâ peregrinatione observaveram liberaliter communicasse dico, quemadmodum ante feceram quæ è Narbonensî Galliâ decennio ante in sportis attuleram. Sed qui quæso scribere potuisset Dodonæus de stirpibus in Hispaniâ aut Galliâ nascentibus, nisi alterius manu ducente, cum ante annum MDLXXXI. quo ad Cæsarem Maximilianum II. evocatus est, numquam Belgicâ excessisset? Hæc autem neminem existimare velim à me dicta, tamquam cum latius luctari, aut defuncti manibus insulzare sit animus (cum enim vivens mihi fuerit amicus, etiam defuncti memoriam colo) sed ut mea, hoc est, meo labore diligentique observatione patta mihi vindicem. Mei numquam fuit pudoris, ut mutuum ab aliquo quidpiâ sumpserim, quin ingenuè semper professus sim à quo habuero: an alij simili gratitudine erga me usi sint, benevolis lectoribus æstimandum relinquo. nec in Appendice ad Purgantium historiam Dodonæus negat, quin illius & aliquot aliarum icones à me acceperit, ut animadvertere potuerunt qui ipsius Dodonæi verba expendere maluerunt, quàm nudarî piâtarum intuitu pascere oculos. Sed de his satis, ad Narcissi historiam redeamus.

Hujus generis alius est, superiote minor, firmioribus magisq; candicantibus folijs, qualia *Narciss. latif.* ferè sunt in Narcisso matino, qui à Narbonensibus Scilla sive Pancratium, dum Mompelij *fol. nivosus* viverem, dicebatur, Valentini Hispani Hemetocallidem appellabant, ut in ejus historiâ dicemus, caule breviori, & binos, ternos aut quaternos duntaxat flores proferente. *alter.*

Ex Hispania post meum reditum missus, reliquis Narcissis setius, hoc est Maio, Bruxellæ in quibusdam hortis floruit.

TEXT. IV. item Byzantio allatus M.D. XXCVII. qui sequente anno folia dedit primo generi *Narciss. latif.* similia. caulem inter folia emergentem, pedalem, qui ternos & quaternos flores dedit ejus. *fol. nivosus* idem cum superiore magnitudinis, nivei protus coloris, id est, calice etiâ niveo, è quo emer- *terram.* gebat sena stamina, terna alijs longiora, flava. Alius præterea adeò illi in omnibus similis, ut vix quis.

vix quispiam discernere potuisset, nisi differe[n]tiam fecissent flores illo minores, & frequen-
tiores in summo caule nascentes, odorem & fragrantiam laetam referentes huius semen in
trigonis capitibus conclusum, nigrum inaequale: utriusque radix minor paulo priore & ni-
grus tunicis septa, *cerinada catamer bianca* nomine missa fuit, ut & quinquennio ante: Flo-
ruit Maio mense.

Narcissi. latifol. flo. profusus flavo.

N. latifol.
flor. profusus.
f. ovata.

Nar. pallida
flore medio
autumni fuit
v.



QVARTVS latifolius etiam Byzantio allat-
us fuit, *cerinada catamer sari* nomine, folia
illi proximè descripto similia: flos in illo va-
riatur, nam vel totus flavus est, vel omnino pal-
let, præter calicem qui in hoc planè aureus
est: semen in trigonis capitibus narcissinum,
inaequale, nigrum: radix tunicis spadiceo co-
loris tecta.

QVINIVM locum obtinebit is Narcissus,
quem cum alijs aliquot elegantibus stirpi-
bus, Kal. Iunij anno M. D. XCVI. ad me Hspa-
li mittebat eruditissimus vir Doctor Simon
de Tovar Hispanensis Medicus, ego verò ex-
tremo insequente Septembri demum acci-
piebam, ab ipsius obitu: nam paulo post in-
telligebam Augusto extinctum fuisse, ma-
gno cum meo dolore, nec mediocri totius
Botanici studij detrimento: doctissimus enim
& diligentissimus erat, egregieq; in hac pa-
lastra versatus, qui si diutius vixisset, multa-
rum exoticarum stirpium cognitionem po-
tius acquirere haud dubie potuissent.

Hujus autem Narcissi bulbis satis crassus
erat, externo cortice spadiceo coloris prædi-
tus, qui Ianuario sequente, quater na protulit
folia, lata & quodammodo carnata, ut præ-
cedentium aliquot, viridia, cubitalis longi-
tudinis, inter quæ caulis prodijt cubitalis aut
altior, deinde duorum cubitorum altitudi-
nem superans (quam in reliquis Narcisso-
rum generibus observare non memini) viri-
dis, striatus, intus cavus, summo fastigio su-

stinens membranaceum quoddam involucrem, è quo exibant suis petiolis innitentes flores,
quini, senis, septeni, aut plures, senis folijs, instar aliorum Narcissorum simplici foliorum tex-
tura constantium prædicti, coloris flavi, non nihil quidem pallascentis, floridi tamen, quo-
rum medius calix aureus, suavis valde odoris. An porro prolificum semen daturus sit, adhuc
ignarus sum, quandoquidem eo flore[n]te ejus historiam concinnabam Martij initio, ut is
annus valde præcox fuit, nullà aut perquam exigua præcedente hieme, quæ demum extremo
Martio valde aspecta fuit, & multas stirpes corruptit.

Non multum dissimilis erat, qui anno M. D. XCVI. mihi floruit, à Joanne Boissot præceden-
te Autumno acceptus, quem Ferrarià allatum scribebat. Misit & alium ejus florem ex pal-
lido virefcere aiebat, calicemque angustum flavum habere: sed utrumque bulbum corruptit
hiems illa rigida sublegetis.

Narciss. lati-
fol. claus. al-
tera.

NASCENTVR & alij Narcissi quibus latiora sunt folia & flores simplici foliorum textura
constantes, in Belgicis & plerisque Germaniæ hortis: de quibus cõsulendæ Cl. virorum Do-
donzi Pemptades & Lobelij Observationes. Illud autem dicendum putavi, Majorem illum
amplius folijs, & in eodem caule binos ut plurimum, interdum ternos & quaternos flores ma-
gnos sustententem sex folijs albis constantes, & pallidum calicem cingentes, odoratos (vidi
etiam qui & duodenis folijs constarent) in Anglia sponte nasci à viris tunc dignis intellexisse.
Alterum verò ex his qui unicum florem ferunt (raro binos) album, cujus calix parvus, palli-
dus, oris fimbriatus purpurascentibus, nascentem observabam in quibusdam Narbonensis
Galliæ pratis, atque etiam semper Constantinopoli missum, cum alijs bulbaceis & tuberosis
stirpibus, *Deve debent, sive bair*, id est, colli vel capitis cameli, nomine, quia floris collum
longius quam ceteri Narcissi, protensum habet.

Narciss. lati-
fol. v.

ILLI non dissimilem Sextum observabam, cui quaterna aut quina Martio mense crum-
punt folia, oblonga, angusta, inter ea deinde caulis nudus, rotundus, intus fungosus, in cujus
summo, è tenui membranâ prodit, unicus, nonnumquam & alter, flos sex niveis folijs ste-
llæ modo decussatis constans, parvum calicem pallidum cingentibus, cujus oræ rubella fimbria
exornatur, sex in eo inæqualibus staminibus flavascentibus: flori suaviter odorato succedunt
capitula

capitula triangula, crassiuscula, in quibus nigrum inæquale semen: radix ut ceteris bulbaceæ, multis candicantibus tunicis constans, extima, quæ reliquas ambit, fusca, è cuius sessili parte plurimæ subfusca fibræ dependent.

Provenit magno milani supra Garingam Chartusianorum monasterium, D. Virgini ad Thronum nuncupatæ, sacrum, pratis quibusdam altissimo lacui vicinis, ad prædium *Narciss* dictum, in quo, curantibus Carthusiæ moderatoribus, perhumaniter & luculenter excepti semper fuimus, dum in summa Herren-alben & Durrenstein jugatenderemus, aut ex ijsjugis Garingam rediremus. Quo ibi tempore floreat, mihi non constat: nec scivissem istuc nasci, nisi ad lacum proficiscens aliquot bulbos rotarum orbitis recens erutos offendissem: biduo enim aut triduo anre rustici forum evexerant. Sed illæ Viennam perlata. Maio mense in meo hortulo floruerunt: verisimile autem est natali loco ferius florere. Memioi & illi ferè similes in Euganeis montibus inventos, à studiosis ex Italia reducibus Viennam ad me perlatos.

SEPTIMO generi latiora reliquis folia, æruginei ferè pallescentis coloris, inter quæ satis latus prodiit caulis, nudus ut reliquis Narcissis, paullo infirmior, foris striatus, intus concavus, summa parte sustinens magnum, laxum, membranaceum solliculum, quo dehiscente, exit unicus, ut plurimum, flos magnus, odoratus, sex albis folijs medium calicem pallidum cingentibus constans, cujus simbria ex pallido purpureo: flori succedit satis crassum triangulare caput, nigrum semen continens: radix crassior superiore, & cum majore illo, quem in Angliâ sponte nasci dixi, comparanda, etiam soboles, reliquarum Narcissinarum instar, satis feliciter procreans.

E Seytrâ allatum, Generosa Dn. de Heusenstain dicebat: ferius etiam reliquis floret, nempe Maio mense. Id genus deinde satis frequens observabam Francofortianis in hortis.

ELEGANTIS porro Narcissi (qui inter eos qui latiora habent folia VII. ERIC) flos cum aliquot folijs mihi mittebatur à doctissimo viro Bernardo Paludano Medico celebri, qui Indicum cognominabat: ego ejus historiam pro meo modulo ita concinnabam.

Narciss. latifol. Indicus rubro flore,



SENA vel plura habet is Narcissus folia, Narcissi vulgaris foliorum instar lōga, ad quorum latus emergebat caulis lævis & enodis, intus concavus, summo fastigio in nodum desinens, membranaceum quoddam involutum purpurascens coloris sustentem, è quo unicus flos sese exerebat sex lōgis & angustis folijs constans, qualia ferè in Narcissi Autumnalis minoris (de quo cap. XVI. hujus libri) flore conspiciuntur, non flavi tamen, ut illa, verum rubri saturi & splendidis coloris, instar floris Arundinis Indicæ vulgo appellatae, cui non valde absumilis est, è quorum medio prodibant sex stamina ejusdem penè coloris, oblonga (quibus infidebant apices fusi coloris quia forsitā ex attritu corrupti) & medius stilus, sub quo rudimentum triangularis capitis, quod haud dubiè semen dedisset, ferè etiam maturum, nisi ipse florem præeidisset, ut mihi conspiciendum præberet: radicem, Paludano referente, habet bulbaceam, capis vulgaribus rubentibus prorsus similem.

Vnicam autem ejus plantam habebat, ipsi missam ab eruditissimo viro D. Simone de Tovar Hispanensi Medico, quæ florem dabat Junio M. D. XCIII. alterum autem expectabat sequente mense, quoniam præcedente anno, eadem planta bis illi florem protulisset, mensibus Junio & Quintili.

AT anno insequente, ex Indice horti Tovarici, & epistolis quas ipse Tovar ad me deinde scribebat, cognoscebam Narcissum Indicum Iacobzum ab ipso nuncupatum.

NARSISSVS Indicus, Iacobzus mihi indigeratus, ut scribit in epistola Cal. Iunij M. D. XCVI. ad me datâ, ex Occidentali Indiâ (ubi *Azcal Xochitl*, quod est, Bulbus flore rubro, vocatur) nobis delatus: nulli rei herbariæ scriptori hæcenus, quod sciam, notus, cujus radix bulbosa, cepæ rotundæ similima, verum supernâ tunica pullâ, folia primum emittit crassa, oblonga, Narcissi marini, tibi Hemerocallis Valentina dicti, æmula: secundum folia verò, atque

Narciss. latifol. VII. ERIC. qui de Narciss. Ig. dant.

Narciss. Indicus Iacobzum. Azcal Xochitl. Natalis.

ad eò ex latere, pedalis & longior etiam emicat caulis, plerumque unus, aliquando verò & alter, nonnumquam pariter (quanquam hoc rarò) interdum successivè, dilutè rubens, rotundus, compresso tamen stilo, cavus, & interiùs subalbidus, qui in membranèam definit vaginulam saturatè rubentem, & ad extremum acuminatam siliamqùe, è quà flos unicus erumpit, oblongus, pediculo nixus viridiore, qui deorsum inflexus & veluti procumbens (ut in Leucoio bulbofo vel Lilio tubro, tamen si non aequè nutràs deorsumq; procumbens) sex munitur folijs elegantì minij colore rubentibus, tribus supetioribus, totidem inferioribus: quorum quod è supetioribus medium est, surrectius eminet: reliqua duo ad latera à medio reflectuntur: inferiora autem deorsum curvantur, cunctis ita còcinnaris, ut ensis etiam rubri, qui ab oedinis Sancti Jacobi equitibus in veste gestatur, formam valde referat, unde Iacobici cognomen ipsi à me inditum. Sunt porrò in hoc elegantissimo flore stamina septem similiter rubra: quorum medium aliquanto longius in triàngularem apicem definit, cetera sex apices transversì finiunt, interiùs fusci, superficìe verò luteo pulvisculo obdusti: cuncta autem, ad mediàm ferè eorum longitudinem, medium ex inferioribus folium ambit: idem etiam à reliquis duobus inferioribus complexum: atque ubi hæc deorsum flectuntur, stamina ipsa sursum elewantur.

Illo ipso porrò anno floris cum suo caule & foliotum iconem ad me mittebat Ill^{mo} Comes Arcebergius, quam ad vivum depingi curaverat ex plantà quæ illi florem prorulerat, à D. Tovare eodem anno acceptà: deinde sequente Febuario bulbi suis coloribus expressi iconem, qui crassus est tunica exteriore fusca tectus, fibrisque infimà sede, nonnihil prominente, frequentibus, crassis plenisq; & in alias tenuiores divisus, & alijs minoribus, præditus.

Hæc sunt quæ de Narcissis latiore folio & floribus simplici foliotum texturà præditis dicenda censui: nunc ad eos, qui simplici quidem flore etiam constant, sed angusta habent folia, pergamus, eorumq; differentias percurramus.

Narciss. juncifol. l. amplo calice,

Narciss. 12.
qui angustifol.
fol. 12.



Narciss. 1.
qui angustifol.
fol. 11. &
juncifolius 1.

DECIMO etiam Narcisso, qui angustiore folio secundus, bina aut terna sunt oblonga folia, angulosa, carnosa, & paxè totunda, juncis viridioribus & medullofis, levore coloreque quodammodo similia, nec minus flexibilia, inter quæ mediis exilit caulis, rotundus, cavus, nullus ornatus folijs, in cujus summo, ex tenui quodam membranaceo involucro, flores terni, quaterni, aut quini prodeunt oblongi (gemelli interdum) forma Narcissinis similes, odoratiores eo qui medio purpureus est, flavi omnino, hoc est tam interiore calice quam amb

NOVO igitur Narcisso (qui primus inter eos qui angustioribus folijs sunt præditi) bina, aut terna sunt folia, pedalis aut majoris longitudinis, crassa & succulenta, instar foliorum Narcissi præcedentis tertij minoris, verum angustiora, & quodammodo media inter illa, & sequentis juncifolij majoris folia, carinata tamen & viridi colore prædita, proximè ad juncifolij Narcissi foliorum viriditatem accedente: prodit inter folia caulis gracilis, instar ejus qui subsequitur, firmus, pedalis longitudinis, qui summo fastigio ex membranaceo folliculo, binos aut ternos flores promit valde elegantes, majores & laxiores quàm reliquorum Narcissorum juncifolio, sex præditos folijs flavis, quorum medium occupat calix major quàm in ullo Narcissorum genere, semunciam namque longus, & per oras veluti sinuosus, paulo saturatioris lutei coloris, continens breviter sex stamina flava apicibus aureis prædita, & solum flavum extimà parte crassiorem: odoratus est is flos, perinde atque Narcissi juncifolij flores: radicem habet Narcissi sequentis bulbo æqualem.

Mihi demum conspectus est hic Narcissus anno nonagesimo quinto supra millesimum & quingentesimum, Aprili mense suis floribus onustus apud Theodoricum Clutium, Academici horti Præfectum, Lugduni Batavorum, quo anno bulbi mihi communicati cùm ab illo, tum à Cornelio van Hille Ecclesiaste Roterodamensi.

Narciss juncifolius II.

Narciss juncifolius minor.



bientibus eum folijs, quæ vel mucronata, vel mucrone nonnihil orbiculato conspiciuntur: his succedunt triangularia capita obtusis angulis ut reliquorum Narcissorum, nigro & anguloso semine plena, minore ramen quàm aliorum Narcissorum: radix etiam minor, candida, nigricantibus membranis tecta.

Istius genus invenitur minus, gracilioribus, rotundioribus, frequentioribusque folijs, *Narciss juncifolius minor.* cauliculus è medio prodeuntibus pusillis, unicum plerumque aut alterum florem duntaxat sustinentibus, flavum & odoratum ut alterius, sed folijs constantem firmioribus & magis orbiculatis.

Prior sponte nascitur in montanis pratis non procul Toletis, & circa Guadalupe. Posteriorem uliginosis inter Hispalim & Gades locis cum ipso flore eruebam Januario mense: ac in Belgicis hortis neuter nisi Aprili floret, vel etiam Maio, licet interdum denuo paullo antè brumam, si mitior sit æris constitutio. *Narciss.*

Intellexi ab Hispanis Narcissi quoddam genus in Hispania inveniri quod omnino juncis etiam sit folijs, sed florem candidum producat, eamque ob causam *lunquillos blancos* ab incolis appellari: sed cum illum nunquam conspexerim, plura hîc adferre non licet. Anno tamen M. D. XCVI. ab eruditissimo viro D. Simone de Tovar paucos bulbos eo nomine insignitos accipiebam: sed adeo exiles, ut post multos duntaxat annos illorum flores sint spectandi. *Narciss juncifolius.*

NARCISSVS PRÆCOX PLENO FLORE.


CAP. XIII.

EXPLICATA præcox Narcissorum qui simplici sunt flore historia, eos qui plenum sive *double* illum habent & colore quidem variantem describamus.

Prior latoribus est folijs quàm primus simplex, & quodammodo carinatis ternis aut quaternis, caulis striatus, nudus, intus concavus, ut in superioribus, pedali alnitudine assurgit, qui è membranaceo folliculo summo cauli infidète, ternos, quaternos, aut plures (nam meminî in hortulo meo Viennæ florere qui septenos habuerit) flores promittit, lenis albis ampliusque folijs, ut prioris simplicis tertium genus constantes, quibus pro calice sex alba alia folia sunt, minora ramen, & flavi calicis fragmentis sic interfecta & disjuncta, ut nulla calicis forma appareat, sed veluti apophysis flava ad singula interiora folia adnata videatur: odoratissimus est ille flos, & graveolentia quadam caput rentans: nullum semen in hoc genere observavi: radix interdum crassissima, multis spadiceis tunicis sepe, & frequentibus fibris donata. *Narciss.*

ALTER folia, bulbum, caulem, priori adeo similia habet, ut neque ab altero discerni queat, soli flores discrimen faciunt, qui etiam è vaginulâ summo cauli infidente, emergunt terni aut quaterni, priori magnitudine æquales, lenisque folijs albis constantes amplum *Narciss.*

Narcissus pleno flore 1.



Narcissus pleno flore 111.

Narciss. plen.
111.

Narcissus pleno flore 112.



aurei coloris calicem eingentes, aded multipliciter mirumque in modum implicatum, ut leucos, flavi polyphyllum forem saturationem quo iam modo amulatur: odor peninde suavis ac in priore.

TERIVS folia & reliqua omnia superioribus ferè similia habet, sed paullo minora. Flores enim in hoc minores, sex albis folijs constantes, medium calicem flavum & plenum habet, emicantibus è medio oblongiusculis angustis foliolis stellatim quasi decussatis, albi quidem coloris, sed cui & vindis foris, & palidus interiore parte permixti sint: odor ferè qualis in priore, sed nescio quid magis aromaticum spirans, medius inter narcissi & muscari odorem.

Omnes Byzantio allari: primus quidem sepiissime, nam singulis annis, cum alijs bulbaceis stupibus Viennam mittebantur: alterum duntaxat conspexi in horto Generosæ Dn. Vigna-
din, anno M. D. XXCVIII. precedente Autumno illi cum alijs & simplicibus niveo flore missum: tertium habui munere Philiberti de Bruxellæ Cæsarei dapiferi cum plerisque alijs bulbis sub anni M. D. LXXV. initium. eodem quidem anno & sequentibus folia produxit, at nullum florem. toto anno M. D. LXXIX. laruit, ut perijisse existimaverim. anno subsequente Martio denovo prodijt, & Aprilis ternos flores, quales in odò descripti ruliit: tulit & proximo subsequente anno plures dum in Angliam peregrinarer, referentibus domesticis. Florent etiam superiores Aprilis. At huic ante hiemem folia emergere non solèt, sed novo vere duntaxat, eo videlicet anno quo florum dabit. Nam si ante hiemem illi pro-

illi pro-

illi prodeunt (ratissimè id fit) proximo anno non florebit. Sæpe etiam in reliquis præcocius Narcissis qui Constantinopoli mittuntur vel pleno flore vel albo medio luteo, accidit, ut sterilitatis indicium sit, si folia ante hiemem emerferint.

ANNI portò M. D. XXCVIII. Augusto mense Byzantio missi sunt magni muneris loco tres *Narciss plen.*
 crassi Narcissi bulbi Ill. V. Davidi Vngnad Baroni in Zonneg & Pleiberg atque bellici *1111. fava*
 consilij Præsidi, qui *Fra* Aphicæ urbe recens allati, magnum florem multiplex foliorum
 numero constantem omnino flavum ferre dicebantur: ille Viennâ discedenti unum dona-
 vit quem, cum propter raritatem mihi carus esset, hortò per hiemem committere nolui, sed
 in fideli summa curâ alui: omnis tamen mea sedulitas inutilis fuit, nam corruptus est. Ean-
 dem fortunam experti sunt quos uxori reservarat, ut ex ipsius litteris postea intellexi.

Narcissus pleno flore v.



Narcissus pleno flore VI.



QVINTVS è genere Narcissi medio purpurei latifolij Sexti qui ex laxo membrana- *Narciss plen.*
 ceo folliculo exit, proditque novo vere cum illo, folijs alijsque rebus omnino similis, solum
 distimen in flore est, qui sex quidem majusculis folijs latè expansis constat, ut ille, sed in ca-
 lice illo rubra fimbria ornato, alia sex folia paulo minora continet, singula peculiarem fim-
 briatum caliculum habentia, è quorum medio aliquot alia minuscula folia staminibus per-
 mixta prodeunt: suavis admodum est odor, ad Mulicari quodammodo accedens. Singula-
 res ut plurimum sustinet caulis flores, interdum etiam binos, ut qui simplici foliorum textu-
 ra constantem florem fert.

Floruit mihi Maio mense anni MDCX. præcedente autumno à Jo. Boissot Bruxellis missus.
 Eodem tempore pro pleno etiâ Narcisso accepi ab honesto viro Ioanne Mermanno Co-
 loniâ bulbum, qui quidem sequente vere prodijt & in summo caule vaginulam tulit: sed illa
 exarefcens floris spem præcidit. At annus XCI. planè similem superiori esse declaravit. Quo
 etiam anno mihi communicavit N. V. Philippus de Sivry, Præfectus urbi Montibus Han-
 noniz, Narcissi bulbum, qui sequente anno florem tulit illis similem, sed viginti, & pluribus
 folijs constantem, intercurrente inter illa fimbriato calice ut in jam dicto. At qui Ill^{mo} Co-
 miti de Arenberg floruit anno M. D. XXXIX. quatuor & sexagena folia habuisse scribebat ad
 me idem Boissot, & unius bulbi, quem ab eodem Comite impetraverat, prole superiori Au-
 gusto cum alijs aliquot raris bulbaeis stirpibus ad me mittebat: verum tabellario, cui pyxi-
 dula, quâ inclusi erant, tradita erat Colonia ferenda, in prædones incidente, cum illi ad-
 junctis petijt magno meo dolore.

SEXTVS paulo angustiora videtur habere folia, alioqui non dissimila: bis floris speci- *Narciss plen.*
 men Viennæ mihi dedit, sed vitium fecit, Francoforti toto biennio folia duntaxat novo vere
 dedit: an id accidit propter fœcunditatem, proles enim singulis annis satis liberaliter sub-
 ministrat

ministrat, ignoro: at qui bulbum cum hac icone mittebat honestus vir idemque rei herbariz studioſissimus & diligens observator, Iacobus Plateau, civis Tornacensis, mihi significabat: unicum summo caule ferre florem sub Maij mensis finem, totum niveum, & multiplici foliorum texturâ consistentem: huius radix minor est quarto genere.

Vnde primum in Belgicâ illata sint quantum & quintum genus ignoro: quod autem Mercurianus communicabat, ex Regis Galliz horto desumptum fuisse intelligebam.

Nemina.

CETERVM hi flores *Narcissos* à Græcis, *Narcissi* à Latinis appellantur, Galli peculiare nomen non habent, *Narcisses* tamē nominare possent, Germanis *Narcissen* respondent. Priori simplici flore *Lirio blanco* ab Hispanis nomen impositum: alteri *Lirio blanco* & *Cebollino*, à quibusdam etiam *Narcisso de Senida*, id est, *Narcissus Hispalensis*, vel quod circa Hispalim plurimus nascatur, vel quod à me primum, deinde ab alijs ex cā urbe sit missus. Eius altera species *Tanquillos blancos* appellata fuit, tamen præter floris formam nihil affine habeat cum *Narcisso juncifolio*. Tertijs & Quartis historiz Turcicum nomen adscriptum. Octavum & Nonum à similitudine quam ejus folia cum juncis habent, Hispani *Tanquillos* vocant, nos *Narcissum juncifolium* flore flavo vel tenuifolium diceremus, ad differentiam *Quarti*, cui flavus etiam flos, sed latiora folia. Dodonæus Bulbum vomitorium esse contendit: quo autem argumento ipse & reliqui qui ejus vestigia sequuntur, id probare possint, libenter intelligerem: certe *Narcissorum* cujuscumque generis radix vomitum præmansa ciet, ut deinceps dicemus.

Omne potest *Narcissum*, præter eum quem peculiari nomine *Drebbolini* dictum dixi, Tutæ proprie appellant *Serin cada*, hoc est, Regum calicem, quod flavum illud in medio flore, calicis formam quodammodo refert: qui verò mittit ejus bulbos vario corruptoque nomine, ut plurimum inscribit, nunc *Zeremcada*, modò *Zerem cada*, in cetis idem ineprore *Zeremcada* addita voce *bianco*, vel *giallo*, cum colorem album vel flavum designare voluit. At qui pleno est flore, plerumque *Zerem cada catamer* appellantur, additis ipsæ vocibus *bianco* & *giallo*, pro coloris florum quos mittere se putabant, varietate: tamen sæpissimè nobis impositum deprehendimus: nam multos simplici flore hoc nomine accepimus, contra nonnumquam pleno flore præditos, hac simplici *Zerem cada* inscriptione. Iutetudum etiam tam plenus, quam qui amplo simplici est flore, præsertim crasso præditi bulbo, *Penacho* nomine missi, vel *Gual cataver lala* (qua appellatione & *Anemomen* pleno flore, & alias quædam stirpes accepimus) quæ voces *Rosa* plenæ florem significant. Sæpissimè etiam ejusdem generis bulbis diversa nomina adscripta fuisse cõperimus: ut scilicet additis minime fidendum sit, sed cujus coloris florum sint habituri *Narcissi* bulbi, ipsa *aurora* nos docere & certos reddere debeat.

Facultates.

NARCISSI cujuscumque generis radicem præmansam vomitū ciete jam diximus, quem admodum sæpenumero expertus sum: quâ facultate præditam esse, ipse etiam Dioscorides testis est, apud quem reliquas *Narcissi* facultates requirere studiosos ne pigeat.

NARCISSE SÉROTINS.

CAP. XIII.

Narcissus serotinus.

Natalis.

Nemina.

Narcissus Persicus.



VNICVM cauliculus, digitalis longitudinis, gracilem, vacuum habet hic *Narcissus*, in cujus summo flore *Narcissinum* odoratū, sex foliis albis constantem, & in medio exiguum calicem flavum continentem: flori succedit exiliter trigonum caput, exiguum nigrum angulosumq; semen continens: radix *Narcisso juncifolio* valde similis, minor tamen, multis candidis tunicis, leotoque succo prægnantibus constans, sed nigra quadam membrana tecta. Tota planta amara est, ut superiores *Narcissi*, verèq; dixit Plinius, odorato saporem raro ulli non amarum.

Nascitur plurimus ad Anan flumen in Turdulis, ubi florentem, & suis capitulis jam mature scere incipentibus eruebam sub Octobris finem, nullis bulbis natis folijs, nec ulla eorum vestigia observans, quod sanè mihi admirationi fuit.

Incolæ *Tosada* appellabāt, nos *Crocium* nuncupavimus, possemus & Autumnalem minorem vel minimum dicere: nam *Narcissum* vix minorem inveniri posse puto.

NARCISSE PERSICUS. CAP. XV.

ΑΚΑΤΑΟΣ planè est hæc planta, & floris duntaxat pedicello prædita, veluti *Crocium*, *Golchicum*que: exilit ergo & membranaceo cucullo,

Narcissus Perficus.



cullo, tamquam ex vasculo aurillico flos nobilior, Croci aut Colchici floris æmulus, sex folijs cõstans ex flavo palléscentibus, quorum tria intrinseca paulo angustiora sunt, exteriora latiores, & summo mucrone omnihil incurva, sive *aristata* quandam habentia, qua inferiorum mucronem amplectuntur & comprehendunt, ingrati odoris, & papaveris quasi virus redolentis, stamina sex medium florem occupant, in foliorum unguibus nata, sed interiorum foliorum reliquis longiora, exilior è medio oblongior filius gracilis, & tunc capite. Folia illi sunt Hemerocallidi Valentini, de qua paulo post, non multum absumilia, lata, plana, ejusdemq; cõ illis coloris, hoc est, ad virgineum tendentis, quæ ut plurimum convolvuntur, aut sese circumagunt: radix crassa, bulbosa, à basi (quæ multis fibris donata est) statim extuberans, intrus candida, foris pallidior quidem, sed aliquantum etiam nigricans.

Semel duntaxat Constantinopoli allatum est hoc bulbi genus, mihiq; communicatum à Philiberto de Bruxellis, cujus ante memini, anni M. D. LXXV. initio, quem postea varijs amicis cum in Belgicâ tum in Germaniâ distribui. Initio Narcissum Aurnumalem majorem sequente capite describendum ex bulbi formæ esse conjiciebam, in qua opinione valde me confirmavit flos sub fine Septembris emergens. Sed postquam folia non subsequi animadverti, & intente demum vere prodire observavi, eaque ab illius folijs colore difficietia: tum exactius collatâ inter se utraq; plantâ, dispares esse manifesteprehendi: ætate brevis inter folia

caput; pollicem crassum, brevi pediculo iohærens, & summa tellure vix emergens, ferè aliquotie observavi, quod cum inane esset, seminis concipiendi spes omnis sublata.

Nomen scilicet illi additæ inscriptum erat *Zarum cada persiano*, id est Narcissus Perficus. Maitem verò convenire videretur cum Narcisso vel Lilio albero Theophrasti, cujus meminit Hæstorix plantarum lib. sexto, cap. vi. florem amplum illi tribuens, coloremq; (ut eruditiones voluit) melinum, non nigrum, figurâ oblongum, ferotinumq; admodum, post Anthium & circa æquinoctium sese ostendere, vel, ut sequente capite air, autumnoprimis imbribus, quemque libro vii. historix cap. xii. caulem tantum floris habere dicit, ut crocum, cum omnibus alijs assurgat.

Narcissus.
Lilium ali.
Theophr.

NARCISSUS AUTUMNALIS.

CAP. XVI.

PERFICO Narcisso valde affinis est hic Narcissus, tametsi nuper flore Narcissum æmuletur, sed folijs folijs, & radice. Quina aurem aut sena habet folia, oblonga, pollicem lata, præ viriditate ferè nigricantia, splendèntia, humi plerumq; sparsa, intrinseca brevis exit canaliculus viridis, rotundus, vix supra terram se attollens, cui insidet flos superior formâ fœmilis, sed brevior, flavi omnino coloris ex membranaceo folliculo emergens, cujus exteriora tria folia interioribus majora sunt, eaque velut amplectuntur, omnia autem mucrone sunt magis orbiculato; quàm Perfici folia: sex stamina suis apicibus ornata, & stylus è floris umbilico emergunt: radix crassa est rotunda, intus candida foris, ut Narcissus, nigricans.

Narcissus aut.
Lilium ali.
Theophr.

Hujus alia species invenitur angustioribus folijs, in reliquis cum illa conveniens.

Sub Augusti finem, & Septembris germinare incipit, & plerumque florere. Gaudet montanis quibusdam Hispanix pratis. etiam in Italia sponte nasci audio. Ex Thracia ante paucos annos etiam adferri cepit, cujus bulbos quod siccare non nihil palleferent initio Perfici Narcissi esse putabam: sed emergentia illico, postquam telluri fuerunt commissi bulbi, folia, omnem dubitandi occasionem ademerunt.

Tempus.
Lilium ali.

ALTER Octobri mense, quemadmodum Perficus, nudum è vaginula membranacea profert florem sex oblongis & angustis folijs cõstantem, non æqualibus, nam exteriora paulo longiora & latiora sunt, omnia autem mucronata foris flavescentia & splendèntia, toties flava ad majorem colorem magis accedentia, flava stamina medium florem occupant. odoratus est hic flos, soloq; pediculo innuens, supra terram non attulitur: flore jam marcido, emergere interdum incipiunt folia, ut plurimum autem ineunte vere duntaxat, tertia aut quaterzæ plana, viridia, & splendèntia iustat foliorum majoris, sed longè angustiora, &

Narcissus aut.
Lilium ali.
Theophr.

Narcissus autumnalis major.

Narcissus autumnalis minor.



ra, & præter aliorum morem sese contorquentia, & cincinnorum instar convolventia: semen primum mihi tulit anno M.D.XCI. initio Iunii in capitulis uncialibus, ferè trigonis, rotundum, nigrum, cui inhærebat albicans quædam & spongiosa ab uno latere materia: radix pusilla, nigra tunica tecta, inferiore quæ sede tenuibus fibris firmata.

Nemina.

NONnulli vocant hanc stirpem Narcissum autumnalem, alij Colchicum luteo flore, cum tamen nihil cum colchico commune habeat, præter florem, reliqua sunt Narcissi. Quod si à floribus similitudine colchicum dicendum, omnia croci genera etiam Colchicum appellare licebit, cum florem colchico similem habeant. Hispani *Aspernam amarillam*, id est, Lilium flavum: Thracia verò allatum *Ciden sari* nomine. Posset etiam non incommode forsitan ad Lirium alterum Theophrasti referri, vel *νάρκισσος ἐν ὄρει* græcè dici: Secundus autem *νάρκισσος ἐν ὄρει ὁ μικρότερος*, sive Narcissus autumnalis minor. Verum quidem est mihi missum à Generoso Viro Carolo de Houchin Domino de Longatre Colchici lutei minoris nomine, à Iacobo Plateau verò, Colchici montani minimi lutei appellatione.

Sparganium Plac.

SVpra Valentiam salebrofis & petrosis locis nascitur quædam planta bulbacea binis folijs prædita, humi stratis, longis, crassiusculis ex viridi nigrescentibus, Narcissi majoris autumnalis folijs ferè similibus, sed quibus interna parte secundum nervi medij longitudinem alba quædam lariuscula linea ducta est: radix bulbosa multis tunicis constans candidibus, & lenti viscidique succi plenis, ingrari amarique saporis, foris nigro cornice obductis.

Eam C.V. Ioannes Placa Medicus Valentinus, pedalem caulem (nam radicem cum folijs duntaxat, eo demonstrante, eruebam) lævem, aliquor in summo flores Lilij æmulos, candidos ferentem habere, deinde rotunda capitula, in quibus exiguum semen contineretur, asserbat, & Sparganium vocabat.

PSEUDO-NARCISSVS.

CAP. XVII.

Pseudonarcissus vulgaris.

PSEUDO-NARCISSVM illum vulgarem maturè admodum florem proferentem sex pallidis, & stellatim decussatis folijs constantem, magno, longo flavoque & fimbriato calice & medio protuberante ornatum, tanta à bundantia in pratis, Londino (aris vicinis, crescere certum est, ut in celebri illo vico vulgo *Ceapside* nuncupato Martio mense rusticæ mulieres maximâ cupiâ flores venales proponant, & omnes tabernæ eo flore exornatæ conspiciantur. Crescit & alijs Angliæ, & plerisque Germaniæ locis: meminimus olim, cum Lovanii humanioribus litteris operam darem, ad silvæ illius, cœnobio vulgo *Perec* dicto vicinæ, margines legere sponte natum.

Reperitur etiam illius genus magis præcox, alioqui non valde diversum à jam memorato, cuius nos non pallidus, sed aureus instar majoris Hispanici.

Hune



Pseudo-narcissus minor Hispanicus.



Hunc verò, colorem interdum mutare observavi, hoc est, calicem illum medium non minus pallidum habere, quàm sint sex illa externa folia ipsum ambientia.

Nunc etià apud Belgas in hortis alitur aliud genus prorsus illi simile, folijs, bulbo, ceterisque rebus, sed diverso flore, qui videlicet medio illo calice caret, & ejus loco, plurima folia externis illis omnino similia & pallida habeat.

At aliud genus nonnullis veteris Castellæ pratis, & humidis montanis locis, Anglico quidem simile, sed folijs longè majoribus, magisque virentibus, longiore caule paullo minore flore, eoque prorsus flavo, & quasi auteco, videlicet tam externis folijs quàm calice: radix hujus crassior est quàm in superioribus.

Est etiam alius, qui novo vere terna aut plura profert folia, majori forma coloreque similia, sed longè minora & angustiora, florem pusillum, majori ramen Hispanico & forma & flavo colore persimilem, insidètem digitali, tenui, viridi cauliculo inter folia emergenti: flori succedit trigonum, obtusis tamen angulis, & fere rotundum capitellum, in quo semen inæquale nigrum, satis magnum pro plantæ proportionem: radix bulbosa, exigua, foris nigricans. Missus mihi hic fuit primum à Jo. Moutono, Narcissi minimi montani latifolij nomine: deinde à Generoso Dn. de Longatre, pro Pseudonarcisso minimo Hispanico flavo.

NASCITUR verò qui busdam Lusitanicæ Beturicæque collibus, Pseudo-Narcissi genus aliud, cui folia non lata ut superioribus, sed valde angusta, sive potius juncea, caulis tenuis, nudus,

nudus, palmum altus, cujus extremitati insidet flos è vaginula emergens, qui sex folijs ex herbido pallescentibus & expansis constat, quorum medium calix flavus, calathi instar oblongus, oris præditus non sinuosis & fimbriatis ut superiorum, sed æqualibus: ita exiguus Narcisso similis, intus candida, foris nigricans.


Florebat Ianuario, cum Vlyssipone Hispalim proficisceret: & Inco'z *Campanilla*, hoc est, Campanulam vocabant.

Se d. & expressâ meâ Stirpium quas in Hispania observabam Historiâ, m'isit me Ioannes Moutonus Tornacensis pharmacopæus diligentissimus & fidelissimus, id est, quæ rei herbariæ penitissimus, elegâtes Pseudo-narcissi juncifolij icones, quas e plantis, ipsi medio Martio anni M. D. LXXVI. florentibus delineari iusserat: eas porro aliquot ante annis à quodam è Gallicia redeunte in Cantabrorum jugis erutas accepisse, scribebat.

Harum prior, illi per similes est, quem proximè descripsi: imò illam ipsam esse certus sum. Nam anno M. D. LXXXI. III. trium harum stirpium singulares bulbos ad me misit, qui omnes sequente anno non modò egregiè creverunt, sed etiam flores protulerunt ipso Februario, quia fortè in siccili repositos diligentius adieci vaveram.

Pseudo-narcissus juncifol. III. flavo flor.

Pseudo-narcissus juncifol. III. albo flor.



Pseudo-nar-
cissus juncifol.
folijs III.

Pseudo-nar-
cissus juncifol.
folijs III.

Nomina.

Alter tenuiora paullo, licet surrecta, habuit folia, florem flavum, hoc est, calicem per oras leviter & tenuiter fimbriatum, & sex illa foliola calicem ambientia, ex herbido pallescentia, in capitulo flori succedente nigrum rotundiusculum semen etiam tulit: radix pusilla foris nigricans, bulbacea, tenuibus fibris è sede prodeuntibus firmata.

Tertius quaternæ aut quina folia habuit tenuissima, & capillaria, viridia, humi procumbentia & sparsa, inter quæ cauliculus emerit infirmus, palmaris, tenuis, nudus, unicum in summo florem è membranaceo folliculo prodeuntem sustinens, tenellum, candidum omnino & calicis oris fimbriatis: hujus semen non observavi: radix superiori similis. Omnes verò has elegantes plantulas mihi abstulit asperrima illa anni xxvi. hiems.

VULGAREM porro Dodonæus appellat Narcissum silvestrem: sunt qui putent Theophr. lib. vi. Hist. cap. vii. βαλβω καὶ ὄρεινόν εἶναι, cujus solû inter coronarios flores, & qui maturè erumpunt, meminit, sive Plinij lib. xx. Hist. Nat. cap. xi. Codaminon, quod bis florere ait, vere & autumno. Germani getz *heymische blumen*/ Austriacæ mättronæ getz *breitel*/ id est, flavum caliciculum, & getz *Wittblumen*/ hoc est, flavam violam martiam, Belgæ *gent ryeclouf*/ Galli nonnulli *Coguelouder*, alij *Perrien*, à potraceis videlicet folijs appellant.

HEMERO-



H V i c plantæ, quæ inter Narcissi genera referenda, quina aut fena sunt folia, oblonga, lata, Narcissifimilia, fed planiora, firmioraque, subcineracei quodam modo coloris: caulis inter ea affurgit cubitali interdum altitudine, & Leucoij bulbosi quarti (de quo paullo infra) crassitudine firmior, nudus & sine folijs, qui cacumine promit membranacei involucri, & eo dehiscite quinos aut fenos, interdû plures flores, Pseudo-narcisso vulgati similes, lilij odorem spirantes, albos omnino: præter externorum sex foliorum nervum, & extremos mucrones, qui viridi colore nonnihil alperius conspiciuntur: è medio oblongo protuberante calice per otas laciniato exeunt candida sex oblonga stamina suis apicibus flavis ornata: & medio longiore stilo, ut lilio albo sere: marcidis & defluentibus floribus subijunt triangularia capitula, in crassitudinem successu temporis extuberantia, quibus semen continetur nigrum, magnum, compressum, fungosum: radix bulbacea, magna, alba, oblongior, lento humore plena, nigricante cortice obduta, quæ interdum adnatis Narcissiforum modo se propagat. Caulis etiam & folia confusa aut contracta lentum humorem exillant.

Handwritten:
die valmire
killeme.

In maritimis circa Valentiam Hispaniæ frequens, & toto illo maritimo tractu infra Mompeliun, ubi Maio mense florentem, Iulioque & Augusto semen maturum ferentem magna difficultate ante multos annos eruebam, tam altæ arenâ maris fluctibus aggestâ, mersa erat. Illic vivebam, Constantinopoli, Narcidis varij tituli inscriptione, albos ac odoratos flores proferro sapore: & ceteris his autumno flores dederunt re-Christophoro ab Entzestorf Austriaco: sed illæ tulerunt, quemadmodum nec ex omnes quas am delatas, vel femine natas aliquot annis ali-
quidam, in illarum classem reijcio, quæ mutato na-
tali, cum videlicet concepto jam in ipso bulbo
sâ bulbos ad me Neapoli mittebat Ferdinandus
de Illi Viro Ioanne Vincento Pinello J Franco-
sinem Septembr. M. D. XCII. quos subsequens
bulit.

Notes

Eo porro tempore quo Mompelii apud C. V. Gulielmum Rondeletium vivebam, Scilla vocabatur, atque ex catrochisofcos qui Theriacam ingrediuntur pharmacopœi parabant: postea Pancratium flore Lilij vocari cepit. Quæ in Valentino littore nascitur, D. Ioanni Placæ Medico & Professori illius urbis celeberrimo Hemerocallis nuncupabatur, qui et Eliciaeos quidem flores ferre affirmabat, sed flavescens aut pallidi coloris. Hispanorum vulgus *Amores miei* vocat. Itali quidam *Giglio marino*, apud quos rubro aut purpureo flore et invenitur, præterim Ostiensis portu, mihi aliquando relatum est.

511

Pancratium

LILIONARCISSVS **HEMEROCALLIDIS** Valentinae facie.

CAP. XIX.

QUANTUM cum Hemerocallide Valentina magnam affinitatem habeat, eodem tamen capite non complectendam, sed peculiare caput illi tribuendum oportere primum duximus: notas enim quasdam habet ab Hemerocallide alienas.

Semine autem ex Italia misso nata est hæc planta Ioanni Bidaut Canonico Insulano, rei herbarizæ (ut intelligo) studiosissimo, qui floris iconem N. V. Ioanni Boifot mittebat, is verò ad me anno M.D. XCII.

Jacobus etiam Plateau, cujus frequens in meis Observationibus mentio, eodem anno scri-
bebat similem plantam ipsi natam femine Florentiâ misso Maragonis rarissimi appellatione,
quod tamē ipse, propter dissimilitudinem aliter appellare maluisset. Sequentē anno, meo
rogatu

Lilio-narcissus Hemerocallidis facie.

Lilium-narcissi
histeria.

rogatu ejus imaginem misit, & litteris ad me exaratus descriptionem addidit, quas, quoniam gallicè loquebatur, latinas sic faciebam: Mitto, uti petieras, iconè ejus Narcissi, quem satione adquisivi, & eorum, quæ circa eam plantam observavi, descriptionem.

Est Muscari crassitudine æquar, vel etiam superat, pauloq; longior est, multis tunicis involutus, quarum extrema fusca est, sequens subrufa, tertia candidior: ejus radices seu fibræ, graciliores & frequentiores, quam in Muscari: sub Aprilis de muni finem (nulos bulbos memini adeo tardè emergentes) senu aut plura producit folia, duplò ferè latiora quam Muscari, sed illis breviora, & sub extremum Augustum marcescentia, dissimili planè ratione quam tua Hemerocallis Valentina, cujus folia Augusto emergunt, deinde tota hieme viridia permanent. Ex eodem bulbo bini interdum prodeunt caules, ferentes singuli, circiter Junium mensè, folliculo inclusos sex aut octo flores parvo lilio non dissimiles, medium occupante parvo calice albo, in multas lacinias per oras scisso, odorato, in quo sex alba stamina flavis apicibus prædita, & medius stilus albus: semè in thecis nigrum, rotundis & magis rotundum Hemerocallidis semine. Ego Lilio-narcissum Orientalem appellarem: sed tuo judicio permitto.

Illius porro iconem, ex ea, quam ipse Plazeau mittebat, expressam hic subjecimus.

LEUCOIVM BULBOSVM.

CAP. XX.

Leucium
bulbif. præcox
majus.Leucium
bulbif. præcox
minus.

ALTERIVS folia non multum à superioris folijs forma discrepant, verum angustiora sunt & firmiora, ad Pseudo-Narcissi vulgaris flavo flore foliorum colorem æruginosum & quodammodo cineraceum magis accedentia: cauliculi graciliores, palmares nudi & con-

TRIA Leucoij bulbosa radice apud Panones observabam genera: quorum duo præcoxia sunt, tertium serotinum. Præcoxibus addo aliud peregrè Viennam allatum, deinde minimum genus in Hispanicâ peregrinatione erutum.

PRIMUM, Narcissi autumnalis majoris folijs similima habet folia, admodum viridia & nitida, non tamen adeo attà viriditate splendens: caulem è medio illorum exeuntem, sesquipalmarem, nudum, striatum, infirmum, concavum, membranaceum folliculum, sive vaginulam in summo ferentem, è qua unus, interdum alter, raro tertius erumpit flos, sex folijs æqualibus constans, candidis, sed extrema & angustiore parte veluti maculâ è viridi flavescente infectis, nutans & deorsum spectans, exigui cymbali modo, medium occupantibus (sex flavis staminibus cum candicante stilo, florisque Spinæ appendicis, sive Oxyacanthæ vulgo creditæ odorem referens, nec ingratus: flori succedunt membranacea capitula, pyti modo turbinata, semen ex candido flavescentis contiuentia, oblongiusculum, durum: radix bulbosa est, multis candidis tunicis (extima tamen fusca) constans, & densâ candicantium fibrarum comâ firmata.

Leucoium bulbos. præcox minus.

Leucoium bulbos præcox Byzant.



cavi è vaginulâ illi insidente, unicum semper florem (plures observare nō memini) promunt superiore minorem, nutantem etiam & pendulum, atque sex folijs præditum, quorum tria externa omnino nivea, alijs duplo longiora latioraque sunt, radijsque foliatis illustrata, aut fudo cælo, alarum modo se explicant, tria interna breviora sunt, & cordis, ut vulgo ab impetitis pingitur, formam, sive sagittæ crenam referunt, binis viridibus maculis circa crenam foris notata, internè sex viridibus radijs ab umbilico ad extremas oras insignita: medium florem sex etiam flaminula crocea, stilusquo exilis, candidus, occupant, odor nullus, aut perquam exiguus: similia superioribus serè capita succedunt, minora tamen, & olivæ virentis formam penè exprimentia, in quibus semen altero candidius: radix superiore minor, multis etiam tunicis albis constans, externâ nonnihil nigricante, & sessili parte multis tenuibus fibris prædita.

Prodit utrumque maturè admodum, statimque intrer bina folia florem ostendit vix liquidis nivibus, quas secundum genus nonnumquam etiam penetrat: Maio mensè semen maturefcit, & folia marcescunt.

TERTIUM genus secundo ferè simile est, ineunteque Martio bina folia promit illi similia, sed latiora, æruginei etiam coloris, floris gemmam ut in illo complectentia: crassiusculus caulis tandem succrescens, unicum florem vaginulâ inclusum sustinet, formâ superiori similem, duplo ferè majorem, tribus externis folijs alarum modo expansis, prioribus niveis, interioribus verò brevibus, bifidus ut in superiore, simul coeuntibus, & veluti tubulū quempiam efformantibus, foris plerumque circa ungues virentibus, reliquâ parte albis, oras tamen secundum crenas virides maculæ inficiunt, interior verò aut magna ex parte viridia sunt, aut octo radijs ab imis unguibus secundum longitudinem ductis prædita: prioris fragrantiam utcumque æmuletur hic flos, & suavius quidpiam spirare mihi videtur: radix secundo major.

Primum, in silvâ quadam non procul Zolonoë k III. Dn. de Barthyan oppido udis locis solum modo observabam: crescit etiam plerisque Germaniæ locis: Alterum nō modò in Viennensi & Leytano saltibus, sed etiam plerisque Pannoniæ pratis: umbra tamen magis delectari videtur: Tertium Byzantio Viennam inferri cepit, Narcisci bulbis permixtum, post annum M. D. XCII. Sed & simile penè mittebat Doctus Imperator, cum multis alijs bulbis, Neapoli, sub Autumnum anni XCII. è monte Virgineo erutum.

QUARTO quinque aut sex sunt folia Narcissinis similia & virentia: è quorundam medio caulis pedalis aut amplior affurgit, nudus, concavus, aliquantulum planus, & binis acutioribus angulis præditus, viridis, è membranacâ vaginulâ quinos aut senos flores summo fastigio profertens,

P

Leucoium bulbos. ferotin. majus. c.

Leucoium bulbos. autumnale tenuis.



profereos, tintinnabuli modo pendulos, sex aequalibus & oiveis folijs cōstantes, quorū extrema parte virides maculae inficiunt, senis intus itaminibus flavis, medioque lacteo stilo, apice viridi insignito: floribus succedunt magna & trigona angulis obtusis capita, pyri in modum ferē turbinata, nigrum semen orobaceum, Lithaphodeli flavo flore semini non abſimile continetur: radix crassa & bulbacea multis succulentis tunicis constar, & plurimis fibris donata est.

Natalis.

Seriū superioribus plerumque germinare solet, atque Maio demū mense flores proferre: Vno duntaxat interamnis Pannoniae loco hoc genus observabam uliginosis pratis supra Waradinum anno m. d. lxxxix. Memini & illi simile planē, duodecimgota prius annis eruerē in Pratis Laterae vicinis cū Mompelii viverem.

Sed & ejus genus quibſdam pratis ad Danubium sitis infra Vieonam Austriae nascitur, cujus folia quidem similia, sed pallidiora, nō adeo mucronata, & veluti bifido mucrone praeſita: flores item inaequalis ex viridi magis pallentibus infecti. Aliter hoc etiam in Germanicis & Belgicis hortis.

Leucoium bulbos. autumnale tenuis.

Quoniam cauliculo est palmum alto, gracili, unicum, interdum alterum & tertium ferens, florem omino lacteum, pendulum, sex folijs constantem, & tintinnabuli modo formatum, inodorum, ingratiq̃ gustus, in quo pallida flamina: flore jam aperto, demum prodeunt quaternaria aut quina capillaria viridiaque folia: radix bulbosa, satis crassa pro plantae exilitate, & multis glutinosis tunicis compacta & amara, quae candicante mēstrana integitur.

Extrema Bætica, quā Lusitaniae contermina est, non procul Badajoz, quam nonnulli Paetem Augustam esse existimant, ad flumen Anam sitam, nascitur, ubi sub finem Octobris & Novembris initio, cum suo flore eruebam Vlyssiponem proficiscens. unde in Belgicam cum parvo illo ferotini amicis mittebam: qui diu in pensilibus suis hortis utriusque aluerunt, nullum tamen, quod semem, florem videre potuerunt, & an haecenus bulbos conservant, ignoto.

Nomen.

Primum genus à thizotomis mulierculis *Mosstus* quasi dicas palustrem violam, nominatur: in Germania vetō ubi plerisque locis nascitur, *viole hyemalis blum*: id est, candidus Februarij flos, ad differentiam Pseudonarcissi vulgaris, quem *viole hyemalis blum* appellari dixi. Alterum ab ijdem mulierculis *viole vert* & *Emmelen* hoc est, alba viola & nivea gutta, ab insigni videlicet candore appellatur. Setotini majoris oullum vulgare nomen intellexi, quemadmodum neque Quinti, quod Leucoium autumnale dici poterit, cum autumnoduntaxat, ut puto, floreat.

SCILLA

SCILLA HISPANICA.

CAP. XXI.

Scillæ hispanicæ flos & semen.



S CILLÆ historiam plerique dederunt: sed quia nemo hactenus legitimam ejus iconem exhibuit, facere non potui quin meis observationibus intererem, cum eam & primum emergentem, & florentem, semineq; onustā, plerisque Hispaniæ & Lusitanie locis eruerim.

EST verò Scillæ caulis pterumque cubitalis aut major, rectus, nudus, absque folijs, plurimis candidis & stellatis floribus ornatus, Asphodeli minoribus, ornithogalo majori (quod quidam Scillam Epimenidiam putant) valde similibus, qui ab imis (uti verissimè Theophrastus Hist. lib. vii. cap. xii. scribit) explicari incipiunt, quemadmodum Asphodeli & quarundam aliarum bulbacearum stirpium flores: his succedunt triangula capitula compressis angulis & velut inania, in quibus tamen nigrum, planum, paleaceum semen: quinque, sex aut plura demum emergūt folia liliacea, lata, viridia admodum, densa five carnosā, humi expansa, nonnihil carinata: radix crassa est, multis tunicis albis lento quodam humore plenis prædita, multisq;e crassiusculis fibris capillata.

Copiosè nascitur supra Olyssipponem, & plerisque alijs Lusitanie & Hispanie locis. Floret ^{Natalis.} Augusto & Septembri, semen Octobri & Novembri maturescit: folia maturo jam semine, & exarido caule, emergunt Novembri & Decembri.

ΓΑΡΚΙΣ σκίλλα, Latinis etiam Scilla dicitur, cujus Plinius tria genera facit, masculum ^{Nomen.} folijs albis, feminam nigris, & tertium cibus gratum Epimenidium, quod angustiore est folio, & minus aspero, vel, ut Theophrastus habet, lævior. Hispani *Cebolla albarrana* appellant.

Cum porrò Epimenidia scilla, teste Plinio, edulis sit, Hemerocallidem valentinam, illam esse non posse, certissimo argumento est exemplum de duobus piscatoribus, quod intetudum C. V. Rondeletus referre solebat: id autem est ejusmodi. litorum piscatorum altot cultum, Hemerocallidis, eo concisæ, succo intinctum, sodali, quem odeat, cibum sumpturo adposuit: ille bonæ fidei, nec in insidias metuens, carnes propolitas secat, ipsæque velicetur, absistente alio, qui se fame premi negabat: post paucos deinde dies miser ille, qui carnes ederat, sublatu.

PANCRACTIVM.

CAP. XXII.

PANCRACTIO amplitudo major est, extimæ tunicæ rubent, foliaq;e ampliora, longiora, ^{Pancraticum.} magis carinata & quodammodo sursecta.

Abundè crescit in Hispania mediterraneis, aded rusticis exosum, ut me ejus bulbos eruentem admonerent ne degustarem, præsentaneum enim esse venenum. Germinat eum Scilla: ^{Natalis.} florentem autem, aut semen ferentem nunquam hanc plantam confexi.

P 2

Fabiano

Pancratium.

Memia.



Bulbus Eriophorus.



Bulbi eriophori bulg.

SUNT ergo Bulbo eriophoro multa oblonga folia, Hyacinthinis scilicet similia, non Narcissinis,

Fabiano autem liges, ut ad me scribebat anno M.D.XCII. in pensilibus hortis non modò caulem protulit, sed etiam plurimos flores spicæ instar in eo nascentes, sex folijs constantes, scillæ (quantum ex pictura, quam epistolæ conjunxerat, colligere licebat) florum æmulus.

Παγκράτιον ἢ *σκιάλα* Græcis, Pancratium Latinis dicitur, Hispani eodem quo superiore nomine donant, *Cibella albarrana*.

Dioscoride teste Scillæ vires & preparationem habet, eodemque pondere in morbis efficaciter assumitur: cui tamen mitior, quàm Scillæ, facultas inest. Plinius easdem facultates, atque etiam plures illi tribuit. Hispanis rusticis, licet exosa, aliquo tamen in usu est: nam aqua, dum illa assatur, exstillantem scabiem utiliter illini, & curari mihi asserebant.

BVLBVS ERIOPHORVS.

CAP. XXIII.

Hic est ille bulbus, cujus florem tanto tempore Belgica videre desideravit. Nam cum primum nacti munere amplissimi viri Iacobi Antonij Courtij paricij Patavini, plurimis annis summa diligentia istuc excoluimus, atque adhiberè omni curà, ut ad florum generationem perduceremus, subinde etiam mutatis terræ generibus, sed operam lusimus: in maximà tamen amplitudinem excrevit, & se mirum in modum adnatà sobole propagavit. Et postquam accessit Illustrium quorundam Venetorum qui ad nos scripserunt testimonium, ejus florè (tameñ plus decennio bulbum in suis hortis aluissent) nunquam conspexisse: factum est, ut sterilem esse murato natali solo, neque florem proferre arbitramur, præsertim cum id vitium numerosa nucleorum prole abundè compensaret. Verùm aliter rem se habere, anno M. D. LXXV. mense Maio deprehendi.

Nam cum præcedente eum annum brumà aliquot illius bulbos *Muscari* majoris nomine cum plerisque alijs rarissimis plantis, Constantinopoli sediens attulisset Philibertus de Bruxella, cuius ante memini, & ex illis nonnullos pro nostra à amicitia mihi dedisset, partem ipse retinere concredidi, partè in pensili orto C. V. Ioannes Aicholtzius Medicus & Professor Viennensis: mihi omnes penerunt, ille verò duos conservavit, quorum alter etiam floruit non sine ingenti meà lætitià, quam omnibus rei herbariæ studiosis, istius bulbi suis floribus onusti delineatione ad vivum expressi à peritissimo artifice Martino Rota S.C. M^o sculptore, atque descriptione in Appendice ad Hispanicas observationes, illo ipso anno testatam esse volui. Eam cum deinde in Pannonicis observationibus evulgassem, significavit mihi Generosus Dn. de Longjumeu ipsi etiam Junio anni M.D.XCIII. flores dedisse. Mihi verò, ab eo tempore quo iconem delineari curabam, illius florem nunquam videre contigit, licet multis annis postea bulbum aluerim mirà fecunditate plurimas soboles procreantem.

cissimis, minus carnosa & succulenta, duriora etiam, viridia, mucronata, ingrati saporis, quibus minutissimæ etiam contractis, tenuia quædam stamina instar telæ aranearum diduci possunt. Ex horum medio caulis exiit cubitalis, aut amplior, rectus, Scinlini caulis æmulus, levis, nudus, virescens, supremâ parte ad cæruleum colorem tendens, oblongamq; ac densam veluti spicam, in denos vel plures versus, ante quam explicetur, distinctam, primum viridem, sed paulatim (dum sese explicat in flores) cæruleum colorem contrahentem: flores fenis foliolis stellatim expansis constant, triangulo umbone in medio protuberante. Hyacinthi autem naturalis floribus valde similes, inodori, cærulei cum suis, quibus insident, pediculis, & internis staminibus, quorum apices initio purpurei, ubi sese expanderunt, pallidescere quadam veluti farinâ aspersi sunt. Incipit florere ab imo, ut Scilla, & reliquæ magnâ ex parte bulbosæ stirpes, flores racemi aut spicæ instar confertos habentes, solent. Semen observare volumus, sed flores admodum caduci, statim marcescere ceperunt, & relictis tantum in caule pediculis deciderunt. Radix crassa & bulbosa est, plurimis tunicis albis contexta, tomentosa, & veluti aranearum telis obfusa, multos ut plurimum bulbos ad latera adnatos habens, & crassius oblongisq;que fibris nitens.

Etiophotus Peruanus.



ALIUD porro elegantissimum Etiophori *Etiophorum Peruanum.* genus ab eruditissimo viro Doctore Simone de Tovar Medico Hispanice celeberrimo, anno M. D. XCVI. accipiebam, nunquam ante mihi conspectum, quoddam descripto adjungendum putavi.

MULTA id ex radice promit folia, surrecta initio, deinde in terrâ sese inclinantia, dēsa, carinata, instar foliorum Hyacinthi, viridia, splendētiaq; que minutim cōtracta, tenuissima stamina præbēt, haud secus ac Primum genus: inter hæc folia sesquipedalis nascitur caulis, teres interdū & gracilis, firmus tamē, nudus, virescens, qui summo fastigio plurimos fundit flores, initio quasi in spicâ congestos, deinde ab infimo sese explicare incipientes & in latitudinē expandentes, sex foliolis stellatim decussatis cōstare deprehenduntur, coloris purpurei, circa umbilicū autē cærulei, ut & prominens umbo, atq; sena quæ illū ambiunt staminula lata, flavis seu pallidis apicibus prædita, singula florū folia per longitudinē secante venâ ex atto purpureâ, odor valde tenuis & exilis: oblongis verò gracilibusq; innitūtur flores pediculis ex viridi purpurascētibus, quorū singuli ex appendicularū candidarum & membranacearum sinu prodeūt: floribus successerunt trigona mucronatq; capitula, semen continentia rotundum, nigrum semini Hyacinthi Anglici seu Belgici par: bulbos ejus crassus, longiusculus & quodammodo pyramidalis, ex albo flavescens (cujus squamæ, perinde ac in priore, molli lanugine plenæ) infimâ sede multis crassiusculis fibris prædita: floruit extremo Maio insequente.

Ceterum, cum diligenter hanc stirpem considero, & cum Hyacinthi stellati Peruanî iconem confero, plurimis notis convenire comperio, & illâ ipsâ iconem hanc stirpem, aut illi parem, expressam esse, penè mihi persuasit: illud solum interest, quod iconi folia non carinata, sed medio nervo protuberante & sublevato adpicta sint, tum radix nimis obesa mucrone. Hanc ob causam Lectori optionem relinquo, ut quo loco voler, iconem adapter.

Etiophorum, Laniferi nomen huic bulbo indidit, ob tomenti copiam, quo lane modo in *Hemon.* stamina diduci potest.

Theophrastus inter veteres, lib. VII. Plant. Hist. cap. XIII. etiophori meminit bulbi, illum in litoribus nasci, lanamq; sub primis tunicis habere, ex qua togæ & aliæ vestes cōficiantur: deinde, quod internum est in eo bulbo, mandi: cujus in hoc nullum periculum fecimus.

Ejus etiam meminit Plinius lib. XIX. Natural. Hist. cap. II. Theophrasti testimonium adducens: & Athenæus lib. Deipnosoph. II.

Sed satis mirari nequeo, quosdam scribere non esse veritos, Dodonzum vidisse in Ill. V. Ioannis Btancionii horto etiophorum illum bulbum, cujus iconem exhibet in appendice ad Purgantium historiam, cum tamen disertè scribat, etiophorum quidem vidisse (primum

videlicet quem hoc capite nos describimus) ar florem numquam. Iconem autē quam istuc addidit, acceptam fert illi, qui, me urgente, tam miserat. Et certē Dodonaeum aliquos admonuisse memini, ne vulgaret, quod mihi admodum suspecta esset illa icon.

HYACINTHVS ORIENTALIS.

CAP. XXIIII.

DE Hyacintho orientali quidquam scribere non erat animus, quia à plerisque prodita est ejus historia: cum verò de isto flore quædam observaverim ab illis vel non animadvertita, vel neglecta, præter institutum facturus non video, si ea hic protulero.

Hyacinthus orientalis.

Hyacinthus or. *πρωάνθη*.Hyacinth. *orientalis*.

PRÆTER illum ergo qui omnibus jam satis notus est, cujusque florem coloris intensioris vel remissione admodum variare deprehendi (nam totus quasi cæruleus, vel subcinereus, vel dilutus purpureus & hilaris, aut saturatè purpureus & ad violæ nigræ fetè colorem accedens invenitur) in meo hortulo alebam, cujus bulbis reliquorum magnitudinem non admodum superabat: sed folia firmiora erant, caulibus etiā inter illa prodiens major, crassior, virens aut plures flores proferens, alijs quidem similes, sed ex cineraceo quodammodo putrescentes, omnesque in unum latus propendentes, reliquis non minùs odoratos: semen in triangulū capitibus minus altero.

Hyacinth. or. *πρωάνθη*.Hyacinth. or. *πρωάνθη*.

Hujus semine nata mihi est planta *πρωάνθη*, cujus caulis cubitalis, crassus, firmus anno M. D. XXXV. decem & septem flores habuit, non ejusdem cum marce coloris, sed purpureos floridiores, & sub illis binos ramulos, quorum singuli quinque floribus erant onusti: sequente tamen anno nudum tulit caulem paucioribusque floribus, cum longè plures expectassem, quandoquidem primo foetu tam fuisset fertilis.

Hyacinth. or. *πρωάνθη*.
Lat. Plateau.

VERVM diligentissimus & eruditionis non contemnendæ Jacobus Plateau mihi scripsit, Hyacinthum alere se valde amplis folijs, magno, crasso, firmoque caule, multis floribus prædito, colorem non addidit, sed iconem misit Hyacinthi polyanthi majoris nomine insignitam, qualem hic exprimi curavimus.

Hyacinth. or. *albus purpureus*.

Habeo quidem unam stirpem valde lato folio & saturatius virescente præditam, cujus caulis etiam crassus, firmusque, sed in ferendis floribus parcius, utpote qui plures dens non det, eoque non ad latus unum spectantes & cōversos, sed omni latere æqualiter quasi sparsos, saturatius purpureos: capita etiam saturatius virescentia, quasi purpureo inaspero colore.

CETERVM quod silentio minimè premendum duxi, Genesio Wolfgango Christophoro ab Enzelsdorf, semine à me communicato natus est Hyacinthi bulbis, qui Aprili mense anni

Hyacinthus orient. *παραλινος* alter.

Hyacinthus orient. niveus.



anni m. d. xxci. florere cœpit, & sequentibus annis similes primis flores proferre nō desijit. Ejus folia alijs similia sunt, paulò tamen dilutius virentia, inter quæ caulis emergit satis firmos, senos, septenos aut plures (habui enim duodechos & quatuordecim) interdum flores proferens crassiusculos, interiore parte omnino niveos, foris etiam albos, sed quorum externa tria folia ad *α' χαλκιν* colorem quodammodo accedunt, non minùs tamen odoratos quàm superiores Hyacinthos: ijs succedunt trigona capita dilutius virentia, semen etiam nigrum continentia: radix satis crassa, candicans, multis fibris donata.

ANNO porro m. d. xxcvii. Byzantio accepit Genetosa Dn. Vngnadin magni muneris loco, & pro Hyacinthis niveo flore, quatuor exiguos bulbos à reliquis discretos, quorum duo candicantes erant, alij dilutè purpurei & coloris admodum flondi: utriusque generis unum mihi dedit: purpureum utrique subsequens hiems corripit, tamen mei magnam curam habuerim, alter paucos dedit flores edique omnino niveos, altero minores, ut etiam tota planta multò tenerior & infirmior est.

Diversis autem ab utroque, qui pro albo Hyacintho hætenus est habitus, cujusque unicam stirpem à C. V. Alphonsa Pantio missam alebat in pensilibus hortis Ill. Ioan. de Brancione, cum Viennam evocatus sum ex Belgicâ: hujus postea plures bulbos Viennâ illi misi, nam istic satis frequens erat, cum valde sit libetalis in sobole generâda. Sunt verò illius flores ante quam explicentur, albi, sed aperti oras tantùm albas habet, reliquâ parte quasi carnei coloris, cum tamen senescere incipiunt, ferè toti nivei fiunt.

T V X C æ omnes Hyacinthos hætenus acceptos *Zambul* appellatione miserrunt, addidit voce *Indi*, cum Indicum, vel aliâ quapiam, cum locum unde accepissent, indicare volunt. Florent omnes Aprilis.

CETERVM huic capiti annectendam censui raram quandam plantam, nec ante annum m. d. xciiii. mihi conspectam, cujus sanè primam cognitionem acceptam fero Bernardo Paludano, Medico, viro doctissimo, mihiq; amicissimo, & (si quis alius) naturalium rerum peritissimo, atque earum opulentissimum atque instructissimum penù habente. Ipsi enim Cal. Decembris, hujus stirpis caulem ab illo accipiebam bipedalè aut ampliorem, firmum, non concavum, enodem, quem tamen per intervallo ambiebant octo, aut novem folia incondito ordine disposita, & ipsum mediâ ex parte amplectentia, ut nodorum quandam speciem præberent, circa imum longiora, & latiora, supernâ parte breviora, omnia tamè carinata, dilutius virentia, satis dura, & si quis vel in minimas partes confringeret, veluti tenuissima stamina, inftar foliorum Eriophori vulgaris divulsorum ostendètia. summus caulis desinebat

Hyac. orient.
niveus.Hyac. or. ca.
albidus.Hyacinthi
Indici
stirps.

sinebat in duodenos aut plures flores (quorum unicus dūtaxat apertus, reliqui adhuc clausi) confertim & in spicæ quodammodo formam nascentes, unciam longos, summâ parte in sex lacinias aliquantulum reflexas divisos, florum Hyacinthi Asiatici instar, sed longè crassiores & magis succulentos, non minus forsitan, quàm mali citrii flores, sex flaminibus è medio prodeuntibus (quorum apices pallidi) & illis breviorè tubo odoratusne sit, an odoris expers, me latet, quia facis afflictum videretur, & mediâ ex parte contrafactum accipiebam: qualem autem radicem haberet, non erat adscriptum.

Nomen.

MISSA porro fuerat Paludano hæc planta, cum inscriptione, *Bulbus Indicus florem album proferens florum Hyacinthi orientalis amulum*: ego, propter tenuissima illa, ut dixi, instar telæ aranearum stamina, quæ caulis inherentia folia, vel minutim contrafacta reddebant, Eriophori genus aliquod arbitrabar, tamen & caulis folijs ornatus, & florum forma refragantetur, nec radix mihi conspecta esset.

Ex epistola tamen, quam biennio post ab eruditissimo viro D. Simone de Tovar (qui Paludano plantam communicaverat) accipiebam, cum aliquot ejus plantæ, tuberibus verius, quàm bulbis, scrupulus mihi injectus est, an ad Eriophori genus commodè refecti possent etenim in hunc modum scribebat.

Hyacinthus Indicus tuberosa radice.

Hyac. Orientalis Indicus.



Hyac. Indicus tuberosa radice.

liæ, caulis expertis, folia, quæ vultu & contrafacta, non secus in stamina deducebantur quàm breviora illa caulis annexa: radix tuberosa est, Ari. Egyptii, five Colocassæ instar, sed longè minor, adnatis se propagans, nonnullisque fibris prædita, ut ex subjectione videre licet. Itaque si Hyacinthus nuncupanda erit hæc planta, Hyacinthus Indicus tuberosa radice, appellare licebit.

HYACINTHUS HISPANICUS.

CAP. XXV.

Hyac. Hispanicus.


DODONÆI Hyacintho non scripto valde abfimilis non est hic Hyacinthus: folia tamen profert non adeò splendentia, nec humi strata, sed potius surrecta, breviorè caulem, flores dilutius purpurascens, & ad cæruleum colorem quodammodo tendentes, quorum odore etiam magis obscurus: semen, radix, ferè eodem.

Floret eodem tempore cum Dodonæi non scripto, nempe sub Aprilis finem & Maio.

Hunc in Hispaniâ meâ peregrinatione non observavi, sed paucos ante annos è Belgicâ missum accepi à Generoso Dn. de Longatre, Hyacinthi Hispanici inodori nomine. Vnde porro ille habuerit, mihi incognitum.

CETERVM

Hyacinthus Hispanicus.



Hyacinth. obsoleti coloris Hisp. ferot.



CETERVM non scriptum Dodonzi, non modò circa Machliniam & Bruxellas non potestimas Belgicæ urbes in pratis quibusdam & silvulis nascentem conspexi: sed in Galliz parte, Belgicæ vicinæ, vulgo Picardia dictæ, in silvalis erui dum Lutetiam proficiscerer nusquam tamen abundantius, quàm in pratis herbicidisque locis Londino vicinis, & etiam longius ab eâ urbe distitis, ubi etuete memini qui cubitali constarent caule, & tricenos haberent flores, modò inrenius purpurascenres, modò dilurios, aliquando etiam omnino niveos (quales etiam apud Bruxellas nasci solebant) vel mediâ ex parte purpureos, alterâ candicantes: sed carnei coloris etiam inveniri, non modò ad me perscripserit honestus vir, & diligens pharmacopæus Jacobus Garetus junior Belga, verum etiam binos ejus bulbos postea misit, quorum alter corruptus, alter elegantem carnei coloris florem rulit, m. d. xc. i. deinde mirum in modum prolixis auctus est.

Hyac. non
script. Do-
donæ.

HYACINTHVS OBSOLETIOR HISP.

CAP. XXVI.

QVINA aut sena habet hic Hyacinthus folia, oblonga, carinata, succi plena, coloris ex cineraceo virescens, Muscari foliorum æmula scire, angustiora tamen, flexibilia, orbiculari fermè mucrone, candidâ venâ interiore parte per longitudinem excurrente, ingrati saporis: prodit caulis è medio foliorum, pedalis longitudinis, vel etiam amplior, gracilis, firmus tamen, nudus, denos, duodenos, interdum etiam vicenos flores per intervalla ferens deorsum spectantes, Hyacintho Anglico non multum absimiles, lenis folijs constantes, quorum terna exteriora valde reflexa sunt, interiora non adeò, sed veluti rubulum quemdam imitantia: color in his valde obsoletus, ut qui ex purpureo, pallido & virescente permixtus videatur, odor nullus. semen fert in triangularibus capitulis planum, nigrum, cartilaginofum, circinata ferè rotunditatis, scilla semini præparadix globosa & rotunda, multis candicantibus tunicis confit, & numerosis fibris testili parte prædita est.

Hyac. obsolet.
Hisp. ferot.
hullera.

Sponte nascitur quibusdam Hispaniæ locis, unde primum in Belgicam delatus, nonnullis amicis floruit, à quibus semine communicato, natæ mihi sunt plantæ Viennæ, quæ aliquot annis nullum semen tulerunt: anno verò m. d. xxxii. & sequentibus abundè, quinimo semina m. d. xxxciii. nata, atque simul ac maruerunt circa matrem fata, illo ipso anno germinarunt Septembri, & quædam ex illis plantæ biennio post flores dederunt, deinde capitula suum semen continentia.

Serò germinat, & folia in Autumnum ferunt: Iunio autem cū Lilijs floret, flores etiam, semine ex eodem capite excepto natum ibipsum variare solete observabam, ut alij alij obsoletiores conspiciantur.

Paritas.

CVM

Hyacinthi obsolet. Hispan. serot. semen.

Semina.

*¶ variegati.
be à Hedebe-
ga mpt.*



*¶ Muscari hy-
berna.*

Muscari obsoletiore flore.

*Colore flore
varietate.*



CVM in Belgicam amicis primum mitteret hunc bulbum Franciscus Hollebeque, Regis Hispaniae Simplificista & hortulanus in Aranjuez, nomen adscriptum erat *Hyacinthi flore coloris cineracei & terrei*. Er sine dubio inter *Hyacinthi* generaterecensendus est.

Addiderat praeterea sequentes bulbos, vnum quatuor aut quinque flores gestantem albae campanulae modo efformatos: Alium campanulae etiam flore satis magno ad terram inclinato, flavi intus coloris, foris purpurei: tertium flavo flore superiore parte aperto: alium flavo humili flore, cui semen simile *Amortis mus*: Nareissum juncifolium albo flore: Narcissum caruleo flore: Pseudonarcissi genus admodum exile: alium montanum ignotum Croco silvestri simile: *Hyacinthum orientale* Hispanicum: & *Tulipam* Hispanicam, ejus ante nemini. Equibus nullum superesse puto, praeter Pseudonarcissum & *Hyacinthum* Hispanicum, quorum descriptionem suis jam locis inserui.

MUSCARI. CAP. XXVII.

EVICINIS Constantinopoli hortis, ultra Bosporum in Asia sitis, primum nostrae Europae communicata est haec planta, quae ob suavissimum odorem silentio praemenda minimè fuit.

HAET autem quina aut lena oblonga folia, humi diffusa, & oblique inflexa, capicularia, satis crassa & succulenta, *Hyacinthi* confossi majoris, sive primi *Martholi*, folijs perquam similia, & tenuia stamina, si rumpantur, etiam ostendentia, non adeo tamen abundè, ut *Enophori* folia, quae cum primum germinant, vel purpurascunt, aut albescunt, interdum pulcherrimo rubro colore nitent. Ex horum medio caulis verno tempore erumpit satis crassus, rotundus & nudus, admodum infirmus pro sua crassitudine: hunc à medio ad summum ferè racematum cohaerentes ambiunt flores, urceolis propemodum similes, inatio interdum purpurascences, aut virides, deinde ex purpurâ virescentes, aut eù viriditate albicantes, nonnumquam subcaerulei, aliquando nigricantes inio sive saturatè purpurascences, deinde pallidi vel flavescentes, vel ab initio pallidi, postea flavi, postremo ubi tabescere incipiunt, nigricantes aut pulli, ijque mucrone quàm in alijs crassiore & obtusior interdum, qui marcescere incipientes, gratissimum moschi ferè, aut aromatum odorem referunt, licet qui flavo colore est, gravior quidpiam & narcissinum quodammodo spiret: intelligo & niveo omnino flore, atque etiam egregiè rubente inveniri, quos sanè mihi videre nondum contigit. Omnibus succedunt praegrandia trigona & velut pinnata capira, in quibus semen continetur nigrum, rotundum, magnitudine orobi, aut seminis *Hyacinthi* primi *Martholi*, sed majore. radix subest magna, albicans, multis tunicis ceparum modo contexta, & frequentibus crassis fibris ex imâ sede prodeuntibus firmata, perennibus, nec singulis annis marcescentibus & pereuntibus, ut *Hyacinthorum*, *Narcissorum*, *Tuliparum*, *Liliorum*, & multarum aliarum bulbacearum stirpium fibræ. Ab imo flores explicare incipit

ut cæte.

Muscari flavo flore.

Muscari caulis suis filiquis onustus.



ut ceteræ bulbaceæ spicatum vel botryodem florem ferentes. Observavi interdum hanc *Hyacinthi* stirpem, caulem in binos ramos dividere, quorum singuli multis floribus onusti fuerint.

Ad *Hyacinthi* genera hanc plantam siue controversiâ referri debere, nemo est in *Botanica* studio mediocriter versatus, qui non agnoscat. Ejus verò primam notitiam amplissimo viro Iacobo Antonio Cortuso acceptam referimus, qui illam Ill. Ioan. de Brancion summo meo amico, & tamquam fratri charissimo, ante multos annos in Belgicam usque mittebat *Tibetis* nomine. C. V. Matthiolus ejus iconem omnium opinione exhibet Comment. in Diosc. cap. De Bulbo vomitorio, nullâ tamen additâ descriptione. Constantinopoli verò (unde primum eò perlata fuerit adhuc ignoramus) semper missa fuit vel *Muscari*, vel *Muschorami* aut *Muscari* appellatione, ob insignem odoris suavitatem, qui ad eorum passillorum fragrantiam, quos ex benjuin alijsque odoratis pasare solent, quodammodo accedere videtur: eandem ob causam nonnulli etiam *Muschi* *greco* vocant.

HYACINTHVS COMOSVS BYZANTINVS.

CAP. XXVIII.


QUATERNA, quina, aut sena interdum habet folia, humil ut plurimum fusa & expansa, nonnumquam procumbentia duntaxat, oblonga, *Hyacinthi* primi Matthioli folijs valde similia, lanior tamen mucrone prædita, & in larembus veluti renui lanugine obûta, præsertim infimâ parte, circa eorum exortum, ingrati gustus & nausæam facile exciatur: ex horum medio, pedalis, nonnumquam major, nascitur caulis, tetes & rotundus, nudus, intus fungosus, foris viridis lævisque, quem à medio ad summum sexageni plerumque aut plures ambiunt flores oblongiusculi, oris in sex laciniolas divisi, sex staminibus purpureis intus præditi, in odori, initio candicantes, deinde cum marcescere incipiunt, fusci & inelegantis coloris: pediculi quibus flores nutuntur, initio brevissimi sunt, deinde paulatim marcescentibus floribus excrecentes, quatuor unciarum aut ampliorem longitudinem adquireunt, sic ut totus caulis suis floribus ita expansis onustus, aspergillum non minus referre videatur, quam *Hippuris* quoddam genus: caulis suprema pars cum floru. a pediculis purpurascit: incipit florere ab imis: trigona deinde capitula fert, exigua, pro plantæ amplitudine, in quibus paucum semen, interdum in singulis capitulis unicum duntaxat, rotundum, nigrum, *Hyacinthi* comosi majoris semine minus continetur, interdum nullum, nam ut plurimum capitula inania sunt, nec arbitror unquam plura collegisse ex unicâ, quam habebam plantâ, ternis feminibus, aut (quando plurima) quinis aut senis: radix rotunda, bulbosa, multis candicantibus tunicis constat, exteriori subfusca, & basi multis fibris albis fusa.

Hyac. comosus
byzantini
helleri

Circiter

Hyacinthus comosus Byzant.

Hyacinthus comosus albo flore.



Mansuet.

Tempus.

Nominat.

Circiter annum M. D. LXXVIII. primum allatus est Constantinopoli cum alijs varij generis bulbis, Mag^o V. Paulo à Trautzon Cæsareæ aulæ Matiscalco & à secretiore Consilio, in eujus suburbano paucos bulbos videbam Maji inno florescentes anno M. D. XXC. Ex eodem tempore nullos mihi memini præter unum aut alterum, duntaxat semel atque iterum: quia forsitan non expetitur, cum nulla floris elegantia sit præditus.

QVO nomine à Turcis insigniatur, me latet: nam Mufcari bulbis semper permixtus fuit: ego propter comæ & florum quandam cum comoso majore Hyacintho similitudinem, comosum Byzantinum cognominavi.

Hyac. comosus albo flore.

Hyac. comosus major.

I.

II.

CETERVM huic non admodum dissimilem & in Belgicâ, & Viennæ aluimus, nullâ aut perpusillâ comâ præditum, eujus flores obsoletioris coloris albacantis, Byzantini floris satis accedunt, pediculi tamen flores sustinentes in longitudinem non excreseunt, semen & radix satis conveniunt. Vulgare ejus nomen, Hyacinthus comosus albo flore.

Hyacinthi porro illius primi Matthioli, sive comosi majoris à quibusdam cognominati, qui in multis orbis Christiani provincijs sponte nascitur, duo in Pannonijs genera observabam. Alterum præcox, latiore folio, crassiore comâ, ineleganti tamen, majoreque bulbo. Alterum magis serotinum angustiore folio, tenuiore comâ, laxiore verò & elegantiore, hujus flores comæ proximi, ex cæruleo purpureiscent, eujusdemque cum comâ sunt coloris, quæ nota in priore desideratur: bulbus etiam minor. Præcox, Maio: hoc Junio floret.

SEMINI autem ex Hispanijs anno M. D. LXXV. Hyacinthi orientalis hispanici nomine misso (cujus tamen duo esse geneta statim deprehendi, nam magnitudo dispar erat) Viennæ Austriæ bulbaceæ plantæ multi natæ sunt, quæ tandem duo Hyacinthi comosi majoris genera pepererunt, à vulgaribus nec florum comâ, nec folijs differentia, nisi quod alterius folia latiora & Mufcari folijs proxima, incunte vere duntaxat emergere solebāt, alterius angustiora longioraque, etiam ante hiemem: minutius semen Hyacinthi comosi majoris æmulum erat, alterum crassius Mufcari semini perquam simile, quæ adeo caulæ fuit, ut separatim ferretem.

Illud autem peculiare in nonnullis, ut præmaturi flores exculsi, nigrum sive fuliginosum pollinem spargant uslagini fetæ similem.

Nominat.

Bulbi pericarpium elong.

VULGAREM utrumque Vngari appellant *Kyrgo hãgma*, id est, Serpentinam cepam. Belgæ Brabant, *Quipst* hoc est, Alpergillum, propter comam alpergilli instar expansam, Hispani *ajo de ciguñes*, h. e. allium cicconiarum. Non desunt qui Pericarpium bulbum Plinij esse censent, eujus duas species esse dicit libro Nat. Hist. xxv. cap. x. cortice tubo alteram, alteram nigro papaveri similem: sed ex tam mutilâ descriptione, quis sententiam comode ferre queat?

ILLVD

ILLVD aurem verè dicere possum, nullum unquam bulbum gustasse (nam quotquot stirpes invenio mihi parum cognitæ, vel ante non conspectas, gustare soleo, ut de illarum sapore commo- huius iudicium ferre possim) qui maiorem vomendi appetentiam mihi fecerit isto Hyacintho maiore eo modo: ea de causa, illorum sententiam probare nequeo, qui in Esculentorum bulborum classe ponunt.

HYACINTHVS BOTRYADES.

CAP. XXIX.

S PONTE plerisque Parthoniæ locis & copiose nascitur Hyacinthus ille Hispanijs & Gal- liz Narbonensi vulgaris & passim obuius in agrorum marginibus & secundum vias, quem ego à floribus racemi in modum extremo caule congestis *Botryodes* in cognomino, non- nulli comosum minorem appellare malunt: nec defunt qui Bulbinem Plinij esse putent Germani *Bundo* *Woblauch* id est, caninum allium, Belgæ à racemi instar congesta florum spicâ *Drupeken* appellant.

Hyacinthus botryodes r.

Hyacinthus botryodes purp. III.



Eivs duo inveniuntur genera: unum crassioribus, longioribusque folijs, florum etiam racemo longiore, densiore, & odorariore: alterum minora omnia habet, & magis vulgare est. Ilorum duorum generum flores laturum a modum colorem habent, & quali nigrum.

Est verò & rectum genus brevioribus, latioribus, firmioribusque folijs, quæ humi diffundi non solent, nec flexuosa sunt ut superiorum, sed furrecta: hujus flores licet superioribus formâ similes, longè tamen aspectu hilariores, dilutioris purpuræ, atque etiam in cæruleum tendentis colore præditi sunt. Id genus Viennæ, aut vicinis locis sponte non nascitur, sed ex Tyrolensi comitatu delatum esse fertur.

Similes porò omnino plantæ non modò Viennæ, sed etiam ante in Belgicâ è semine Hyacinthi botryodis lacteo atque è niveo purpurascente flore (binæ enim ejus inveniuntur differe- rentiæ) natæ sunt: & inrer illas etiam quæ ramosam rulerunt florum uvam, hoc est, quæ uvæ in modum plures congestos habuerunt racemulos, alios alijs minores & graciliores: quibus similes plantas semine albi à me communicati natus habuit plures quàm quadragenas III. Balrhafar de Barthyan in Zolonock sub Martij finem florentes anno M. O. xxxv.

Verum Hyacinthus *Botryodes* à lacteo flore, à superioribus florum formâ non differt, sunt enim concavi & tumentes, nulla tamen, vel perquam exigua odoris gratiâ commen- dabilis. Is etiam in duas species distingui potest.

Vna enim lacteum omnino florem habet, caulem exalbidum, foliaq; diluvius virentia, & quasi pallescentia: tota etiam planta tenerior, nec nisi primo vere, folia protrudit.

Alterius

Hyac. comos.
major valde
non tam ca-
ditat.

Nemina.

Hyacinth. bo-
tryod. purp.
flora.
II.
III.
III.

Hyacinth. bo-
tryod. III.
uva ramosa.

Hyacinth. bo-
tryod. alba
flora.

II.

Hyacinthus betryodes albo flore.

66.

*Fl. alb.**Hyac. betryod.
var. alba.**Hyacinthus stellaris Peruvianus.**Hyac. stellar.
peruvianus.**Hyac. stellar.
peruvianus.*

Altera etiam elegans, nec mihi cum suo flore, dum hæc scribebam, conspectus: cujus iconem

Alterius flos niveo quidem colore præditus est, sed cui perfusa videatur tenuis quædam & dilutissima purpura, qualis in rosis albis nondum planè expansis, præsertim circa ungues hæc vetustate & marcescente flore intensior redditur: caulis è viridi purpureo, foliaviridiora sunt, & infimâ parte quodammodo purpureo.

Omnium semina in triangulis quibusdam vâculis continentur, rotunda, nigra, exigua: omnium etiam radix plurimos exiguos ucleos in ambitu generare solet, nulla tamen abundantiâ quàm duorum priorum. Florent ut plurimum Aprili, interdum etiam Maio, si vernum tempus ob præcedentis hiemis alpe-ritatem tenuius incipiat.

Lactei prior species olim nobis communi-cata à C. V. Alphonso Pantio, memini & in Baldo monte erutam à studiosis quibusdam ex Italia reducibus Viennam adferri: Altra ab amplissimo V. Cortuio *Dispedi* albi nomi-ne in Belgicam missa.

HYACINTHUS STELLATO FLORE.

CAP. XXX.


MULTA sunt Hyacinthi stellato flore ge-ner, quorum historiam hoc capite de-scribendam duxi: ad cuius calcem nonnulla etiam de Hyacintho vulgari stellato flore dicemus.

PRIMUM autem locum merito sibi vin-dicabit elegans & rarissimus ille, quem, ex Peruano orbe delatum, in suo horro alebat Eue-ardus Munchoven (cui hæc studia cor-di) & florentem suis coloribus exprimi cura-bat: ejus deinde exemplar ex archetypo Eue-rardi imitarè, pro nostra amicitia, ad me mit-tebat Nobilis vir Carolus de Tassis, Regius Antverpiæ Curator Præfectus, mense Au-gusto anni xcii. supra millesimum & quin-centesimum.

LATA, crassa, multaquæ (ut ex icone ani-madvertere licuit) habuit folia, Hyacinthi orientalis, seu potius Enophion bulbi folijs si-milia, humi, magnâ ex parte, sparsa, & viridia, inter quæ prodijt nudus caulis, virescens, summo fastigio multis fl. vibus, spicæ in modum simul congestis, onustus, qui ab imo sese pri-mum explicare incipit, ir. star Scillæ, Ornithogali & similium: pediculi oblongi, ex atro virescentes, ex gracilium & exiguo rum folio-tum alio orti flores sustinent, sex folijs stellæ instar expansis constantes, purpurei foris colo-ris, intrus ex purpurâ cerulei, umbone, quem admodum in vulgari, floris umbilicum cum sex staminibus illum ambientibus, occupan-te. Fuerit ne odore aliquo præditus is flos, aut in semen abierit, nondum intellexi: radix bul-bosa, crassaquæ instar radicis Hyacinthi orien-talis, fusco colore prædita foris, & multis cras-siusculis fibris ab ima sede prodeuntibus fir-mata.

Hyacinth. stellatus Lilij fol. cum flore.

Hyacinth. stellatus Lilij fol. cum sem.



iconem cum sequente descriptione Viennam ad me mittebat Tornaco, Ioannes Moutonus, meâ Pannonicarum stirpium historiâ jam evulgatâ.

ATTVLIT, inquit, qui Pseudo narcissos juncifolios communicabat, ex iisdem jugis erutum bulbum, Liliaceo satis similem, sed oblongiorem, flavescentis coloris, ut Martagonis quorundam, sive Lilij silvestris & montani purpurei radix: sena autem vel plura fert folia, Lilij albi (ante quam in caulem abeat) folijs similia, è quorum medio caulis exilit pede brevior, multos flores in summo sustinens, Hyacinthi stellati vulgo nuncupati floribus, omnino pares, sex folijs constantes intensè caruleis, sive violaceis, eminente ex umbilico quodam veluti umbone, cujus causâ Hyacinthum stellatum *Λιμνοφύλλος* appellavi: hoc succedunt triangula capitula, in quibus semen. Mittebat etiam ille anno M. D. XXXVI. ejus bulbum ex aliquot pallescentibus squamis imbricatis dispositis constantem. Sed cum toto bimestri in itinere hæsisset, atque omnino flaccidus ad me pervenisset, terræ commissum subsequens hiems corripit. Alterum deinde bulbum ab eo accipiebam, & aliquot post annos unum etiam à Iacobo Plateau: sed omnes mihi corrupti. Ejus porro iconem à Moutono etiam acceptam, in appendice ad suam Stirpium historiam, exhibet Lobelius noster. Sed anno M. D. XCV. ejus bulbum à N. V. Ioanne Boisot accipiebam, qui insequente anno mihi flores dedit.

TEXTIO quaterna aut quina sunt folia humi fusa, longa, catinata, dilutè virentia, Hyacin- *Hyac. stellat.*
thinis adeo similia, ut ante quam florem conspicerem, Hyacinthum esse crederem. inter hæc *Hyacinthina.*
emerit digitalis ferè longitudinis, gracilis & infirmus cauliculus, priore anno ternos sustinens flores, altero quaternos aut quinos, sex folijs constantes, dilutè cerulei coloris, inodoros, qui solis radijs illustrati, instar florum Hyacinthi stellati vulgaris sese explicarunt, & ex albidæ fex staminula ostenderunt, quorum apices purpurei, stilo in medio coram assurgente: successerunt triangula capitula, qualia in vulgari, sed inania, ut semen observare nequiverim: radix bulbosa est, non magna, nigro cortice testâ, & fibris subter prædita.

Hunc bulbum Byzantio acceptum cum alijs stirpibus Francosurtum ad me mittebat anno MDXX. Genetosa Domina Vngadin, no mine adscripto *Susungule*, quâ appellatione initio Lilium Sufianum insignitum, deinde, Iris illa bulbosa præcox, quam Marthiolus pro Hermodytlo Constantinopolitano exhibuit, Dodonæus pro Iride tuberosâ. Flores mihi protulit Aprili cum alijs Hyacinthis.

QUARTUM Mittelburgi, in Walachriâ Zelandiæ insulâ, alebat honestissimus ac diligens- *Hyac. stellat.*
tissimus vir Wilhelmus Isarduyn, ejusdem ut bis Pharmacopæus, & prolè anno M. O. XCIII. *Sufianæ*
communicabat: iconem verò cum ejus parvo bulbo (qui penj) mittebat Doctis. vir *1600.*
Thobias Roëlius illius urbis Medicus.

Hyacinth. stellatus Byzantinus.

Hyacinth. stellat. cineracei coloris.



Hyacinth. stellatus albo flore.

Hyac. stellat.
vulgaris &
eximie speciosus.

Is autem multa habet folia humi jacētia, in-
star foliorum Hyacinthi Anglici vel Belgici ferē:
inter quę prodit cauliculus palmatis, vixenos, tri-
cenos, aut plures interdum flores, spicę vel uvę
instar congestos, ferens, sex folijs conflantes, me-
dium occupante umbone sive capitulo, & sex
staminibus, non secus ac in Hyacintho, qui stel-
latus cognomen vulgo obtinuit, sed longę dilutio-
ris coloris, & vcluti ex cinereo cineracei: floribus
succedunt capitula trigona fermen continentia:
radix bulbosa est, candida, instar radicis Hyacin-
thi Belgici.

Floret cum vulgari, hoc est, sub extremum
Martium, vel etiam April.

CETERVM in proximis Viennę silvis, atque in
Pannonia supra Nemethwywar, quę iter ad
Grätzium est, Principum Stirię Regiam, ad vil-
lam Kerth Welyes, vulgaris est is Hyacinthus, qui
à floribus radiatim expansis, & in stellę formam
decussatis, stellati cognomen apud rei herbarię
studiosos invenit, is videlicet qui caruleo est flo-
rem: in quo varietatem etiam observabā, alijs flori-
bus magis saturis & ad violaceum quasi tenden-
tibus, alijs ad carneum colorem proximę acce-
dentibus. Habet autem ipsa planta vel terna fo-
lia, vel, ut plurimum, bina, ut etiā illi bulbi quos
Neapoli Francofurtū ad me mittebat Ferdinandus

Imperator. Qui albo est flore, sponte nascentem nusquā videre mihi contigit: sed binos
aut ternos ejus bulbos Francofurti accipiebā munere doctissimi & ornatissimi viri Philippi
Stephani Sprangeri Pharmacopęi Palatinalis Heidelbergę: alium deinde ex albedo & veluti
cineraceo sub: caruleo ēve flore præditum, Lugduno Batavorū missum à N. V. Joanne ab Ho-
gelide. Omnes autē in statuere corrupti, dū Francofurti Leydam meā suppellectilē transfero.

Superioribus

Superioribus autem generibus maturius flores, & in triangulis vasculis semen fert, non atrum ut cetera genera, sed fulcum & tamquam fuligine infectum: cui non valde dissimile etiam est illius semen, qui albos profert flores.

Viennenses porro Maronem eum qui cœruleum habet florem, *Maron* appellant, quasi cœruleum lilium convallium: nam cœnantben, vulgo Lilium convallium dictam, ipse *Oenanthe*, *Waldean* nuncupant: Belgæ à stellato flore, *Stemmen* vocant.

SED & Hyacinthum stellarum vulgari alioqui formâ similem reperi audio, quorum alter flores proferat suaviter rubentes & quasi carnosos, alter flavos: illos autem videre non dum mihi contigit.

HYACINTHVS AUTVMNALIS.

CAP. XXXI.

HYACINTHI autumnalis duo observabam genera, non forma quidem differentia, sed amplitudine: distinctionis ergo causa, in maiorem & minorem dividemus.

Hyacinth. autumnalis maior.

Hyacinth. autumnalis minor.



MAJOR quina aut sena habet latiuscula & flexuosa folia, viridia, aliquantulum carinata colchici montani hispanici, paulo post descendi, instar, inter quæ prodit unus nonnunquam bini, terni, aut plures cauliculi palmo majores, satis firmi, multis flosculis, sex folijs stellæ instar expanctis constantibus & dilutè purpurascensibus stipati, in quibus quædam staminula nigricantibus apicibus prædita: marcescentibus flosculis illico succedunt tenuia admodum & trigona capitula, quæ brevi matureſcentia & hiantia, pusillum nigrum semen ostendunt, quod terræ gremio litatum exceptum sui generis plantulas generat, quæ mihi interdum tertio anno flores dederunt: radix crassiuscula, candicans, in fima sede multis fibris donata. Hoc genus mihi interdum cauliculos dedit ramosos, quorum singuli ramuli suis flosculis onusti.

MINORI plura & exiliora sunt folia, humi sparsa, inter quæ exit unus aut alter cauliculus dodrantalis, nudus, gracilis, circa cujus summum nascuntur radiati flosculi priore minores, & foliolis minus mucronatis constantes, ejusdem cum priore coloris: semen in trigonis vasculis simile, radix candicans, minor.

Primum in hortulo duntaxat alui, sponte natum non vidi, maturius minore florentem, interdum vel sub Iulij finem, vel Augusti initio. Altetum ante quadraginta annos in vicinis Mompelio colliculis florentem sub initium Septembris crucibam, deinde Madritianâ Partiflorum silvâ, eâ parte quâ ad Bononienſe cœnobium vergit, arenoso solo & falebroſo: postremo Salmanticæ proximis colliculis ad flumen Thormum sitis, lapidoso admodum solo.


AUTVMNALEM hunc Hyacinthum appellabamus, quia non nisi autumnâ florebat.

bat. Quidam Bulbinem Plinij esse existimabant: sed Bulbines apud ipsum lib. xx. Nat. hist. cap. ix. descriptio plane refragatur, cui porracea folia & rubicundum bulbum tribuit. Alij Theophrasti *ripus* esse æstimant, quod lib. vii. hist. cap. xii. inter eas quæ ante foliorum & caulis exortum florere incipiunt, reponit. Verum quidem est, hanc plantam florere incipere ante quàm folia emergant: sed alio loco Tipbyi inter æstivos flores meminit: quæ nota huic non convenit.

ORNITHOGALVM ARABICVM.

CAP. XXXII.

Ornithogali
arabici bulb.



Ornith. ara-
bicum anno-
tata.

Iac. Ant. Cortuso, deinde etiam Constantinopoli cum alijs raris stirpibus accepta. Semel istic florentem vidi: Viennæ autem pærsepe.

Mira autem est hujus bulbi natura: nam plerumque experti sumus vix ulla folia promere, nisi singulis annis exemptus aliquanto tempore adseruetur, deinde autumnò terræ denud concredatur, tum enim demum germinare solet etiam ante brumam: nullus autem florere mihi conspectus est, nisi recens Constantinopoli allatus. Nam ex illorum est numero, qui, nisi istic eruti jam conceptum in utero florem habeant, in frigidiore provincias translati, nullum dent. Præterea cum frigoris valde impatiens sit, neque in Belgica, neque Viennæ hiemem in horto ferre potuit, sed in fistulis reponendus, ubi bulbis circa matrem adnatis feliciter se propagare solet.

Remissa.

Ex Italia porro missus fuit Lilij Alexandrini nomine: Constantinopoli verò semper *Zanbul arabi*, quod Hyacinthum arabicum significat. Viennenses matronæ *wise Joannib*, hoc est, candidum Hyacinthum appellarunt, donec legitimus albus Hyacinthus illis innotescere cœpit. tunc enim, Turcicum nomen imitatz, *Arabische Joannib* vocarunt. Sed quia ad Ornithogal genera potius referendus videtur quàm ad Hyacinthos, Ornithogali Arabici nomen indidi à natali ubi nimirum sponte crescit loco: licet Matthiolus Narcissus, cum quibus nullam affinitatem habet, adnumeret.

ORNITHOGALVM ALIVD.

CAP. XXXIII.

Ornithogali
majus l.

VARIA alia sunt Ornithogali genera, quorum nonnulla ab alijs tradita sunt, pleraque verò à me primum observata: de omnibus igitur ordine disceremus, initium à majoribus facientes.

OMNIVM autem maximum, porracea habet folia fœna aut plura, caulem inter ea emergentem cubitalem aut ampliorem, rectum, nudum, firmum, magnam florum spicam gerentem, qui ex pl. cari fœnis folijs constare conspiciuntur ex albo virecentibus, & foris herbaceis omnino:

Ornithogalum majus.

Ornithogalum majus Byzant.



Ornithogalum Pannon. albo flore.



deinde capira, nigrum rotundum sem in continetia: radix subest bulbosa, longa, candida, lento

omnino: ijs succedunt trigona capita nigrum magnu m; semen cōtinentia: radix satis crassa, bulbosa, multis tunicis candicantibus cōstans.

ALTERVM, non minore altitudine assurgentem habet eaulē, superiori similem, sed viridiorem, quem à medio ferē ad summum fastigium multo plures exornant flores, priore majores, foris præter oras, quæ albæ sunt, omnino virides, interius verò dum explicati sunt, lactei omnino candoris: semen in triagulis capitibus alteri simile, sed paullo majus & oblongius: radix candidior, & longior interdum in amplam magnitudinē exuberat: folia illi longiora, magis viridia, & extremo mucrone acuminato.

Huic ferē simile Tertium, sed paullo humilius, dilutius etiam eaulē & folijs, quod cœpit Byzantio defertur alijs bulbis permixtum, nullo addito nomine.

QUARTO quinque aut sex, ante hiemem, ut Arabico, sed præter reliquorū consuetudinem, germinant folia, humi expansa, angusta, digitalis longitudinis, ex viridi incana, & Caryophylleorum florum alitium folijs forma & colore valde respondēria, aliquantulum hirsuta, herbacei gustus & insipidi: subsequente Aprili, folijs flaccescere incipientibus, inter illa exilit dodrantaliscauliculus fœnos aut plures spicatum coherentes sustinens flores, qui è tenuis foliolis compositi, Maio mense aperiuntur, interiore parte non minùs lactei candoris quàm in secundo genere, foris nervo viridi illorum dorsa occupant, ut in secundo & vulgari: triangula

lento humore plena, gustus primum insipidi, deinde acris, foris cineracea tenui membrana obduta, & sessili parte multis candicantibus fibris capillara. Illud peculiare habet hęc planta, ut narali loco, ubi sponte nascitur, magna ex parte, cum floribus onusta est, sine folijs conspicitur, aut saltem jam ferè evanidis & flaccidis. At in horris culta diutius plerumque folia retinere solet, & in maiorem amplitudinem excrescit, spicam vicinam aut plurimam florula nonnumquam proferens.

Ornith. vulgare.


QVINTVM est vulgare illud, omnibus certè quas peragraverim regionibus obvium in agris, Ornithogalum, à C. V. Dodonæo Bulbi leucanthemi nomine descriptum.

Ornith. aliud vulgare.

Aliud hujus genus alebat Viennæ in cultissimo suo horto, Generosa D. de Heusenstain latioribus folijs, crassiore caule, amplioribus floribus, paullo majore bulbo ex Tyrolèti Constatu allatum: alioqui cum Quinto genere conveniens: quale etiam Neapoli ad me mitteret doctissimus vir Ferdinandus Imperator.

Ornithogalum Hispanic. minus.

Ornithogalum pallido flore.



Ornith. Hispan. minus.

Ex parvo orbiculari albicante bulbo sena aut septena novo vere proferit Sextum folia, Ornithogalo vulgari ferè similia, sed paulo angustiora, nulla vena candicante per longitudinem secta, è quorum medio prodir singularis cauliculus, interdum & aliter, palmatis, teres, sustinens senos, septenos, aut plures flosculos, alternarim quidem nascentes, sed quasi umbellam quandam efformantes, adèd æquali sunt altitudine, non secus atque in vulgari & arabico, senis foliolis ex albo subcæruleis constantes, toridemque candidis staminibus & medio capitulo subcæruleo umbilicum occupantibus: nulla adhuc capitula vel semen observare potui, totà comà brevi à floribus marcescente. Floret April.

Ornithog. Pallido flore.

SEPTIMUM non valde ab simile est Bulbo silvestri Fuchsij & Tragi: majore tamen folio constat, cauleque crassiore, licet infirmo: biniq; aut terni quos sustinet flores majores, minus flavi, sed ex herbaceo quodam modo pallidi.

Bulbus sil. Fuchsij.

OCTAVVM locum dabimus Bulbo silvestri Fuchsij, cujus eum ab alijs sit prodita historia, eam hic repetere non est necesse.

Ornithog. F. s. Almerianum.

Ativo præterea est Ornithogalum, mihi non conspectum, sed N. V. Ioan. ab Hoghelan de eo me monuit. Bini duntaxat id prædicitum est folijs angustis, longis, Hyacinthi borryæ vulgaris cæruleo flore folijs valde similibus: cauliculo inter illa prodeum i infidens flores flavi, duplo majores, staminibus in medio rubentibus: ejus bulbosa radix adèd vulgari jam dicto similis, ut si miscantur utriusque bulbi dignosci non possint. Pro Nono haberi poterit.

Ornithog. F. s. luteo flore.

Vnico Decimum prodir etiam foliolo, duas aut tres uncias longo, angusto, exalbidis coloris & acidi gustus: juxta quod tenuis uncialis cauliculus, unum aut alterum foliolum sustinens, è quorum medio bini aut terni exiliu flosculi stellati, intus flavi, foris ex viridi purpurascetes, sex radiolis & totidem staminibus intus præditi: ijs succedunt pusilla, triangula capitula,



Victorialis longa.



picula, semine ruffo, exili, & inæquali plena. radix alba, rotunda, cineraceo putamine obduda, exigui pili magnitudine. Sed & hoc cultura aliquantulum majus evadit.

Primum satis frequens observabam inter ^{Natales} segetes agris Nemethwywar III. Bathiani vicinis. Alterum etiam inter segetes Mompeliano agro & per Hispanias: Viennæ etiam mihi natum semine à Rasio Lutetia missio, Moly appellatione. Vtriusque Maio floret. Quartum largissimè provenit aperto illo & late patente campo secundum silvulam pago Lachn imminente, & in siccioribus pratis secundum Danubium, in monte Badensibus thermis imminente, totaq; illa mootium ferie, inde usque ad Calenberg excurrente, & Ham burgense monte apertis & gramineis locis. Quintum jam dixi nusquam oon esse mihi cõspectum. Sextum mihi communicabat Generosus Dn. de Longare, Hyacinthi stellaris serotini albo flore inscriptione, & ex Hispania missum dicebat. Septimum observabam in Stiriacarù & Austriacarum alpium pratis ubi silvæ desinere solent. Octavum non modò ubique ad agrorù & silvarum cæduarum margines in Germania frequentos, sed etiam apud Vngaros circa sepes & agrorum margines natum vidi. Nonum circa Alcmariam Hollandiæ urbè repertum est. Decimum eodè quo Quartum nascitur loco apud silvulam illam pago Lachn vicinam: sed apri-co magis delectari videtur, abundantius enim crescit in aperti illius agri margine Meridiei opposito. Observabà etiam in siccioribus agris inter Nemethwywar & Zolonocho oppida sepiùs memorata. Hoc cum quarto genere in Belgicam à me missum Brancioni & alijs amicis altero post quam Viennam appulisset (nam Ratisbona secundo Danubio navi vedussum) anno.

PRIMUM potè appellat Dodonæus Asphodelum bulbosum Galeni, cum nihil Asphodeli præter florù formam habeat. Octavum Vngaris *Tik tara*, quidam *aspodelus* Perdicium Theophrasti esse censeant, quia forsitan lib. Hist. 1. cap. 1111. scribit plures illi radices esse quàm folia: adijcit tamen crassas habere radices, quæ sanè nota huic non convenit.

VICTORIALIS LONGA.
CAP. XXXIIII.

NUNC ad bulbaceas illas stirpes progrediamur, quæ stellatis quidem ut præcedentibus fuerit floribus, verùm minoribus, & in unum caput, ut plurimum, congestis: atque, gravi odore nares ferientes, inter Alij genera potius sunt referendæ.

Eius autem quam hoc capite describemus, ^{Victorialis} caulis, digitalis est crassitudinis, fungosus, infimà parte purpureos, superne viridis & striatus, multos in summo ferens flosculos, oblongos.

gis pediculis iohærentes, se nis candidis folioli stellatis constantes, ce parum floribus similes, se ois intus staminulis, stiloq; præditos: deinde trigona capirula, in quibus semen rotundum, nigrum: caulem circa medium amplectuntur & quasi veliunt, bina aut terna folia, nervosa, oblonga & lata, Gentsianæ majoris folijs penè similia: radix oblonga, extre m à parte bulbosa, multisque

multisque validis & perennibus fibris donata, multiplici cortice varijs fibris transverſim coſ-
untibus conſtante, & quodam modo reticulato, involuta, quæ ſingulis annis feliciter alijs
bulbis circa ipſam adnatis ſe propagat, fibris adeo implicatis, ut difficile ſit, bulbos conjun-
ctim natos & cohzrentes, ſejungere.

*Natalis &
Nemini.*

Copioſe naſcitur in Durrenſtein, duobus ſupra Garmingam milliariis, & mœtanis paſto-
ribus *Zanderſch* dicitur, quibus magno eſt in uſu adverſus corrupti aëris & nebulæ exha-
lationes. Invenitur & in montibus qui Bohemiam à Sileſia diſterminant, ubi à Germanis
Sigurny appellatur, quia qui effodiendis metallis operam dant, magnas certaque illius vi-
res ſe experiri prædicant, ad ſeſe muniendum adverſus impurorū ſpiruum inſulſus, à quibus
frequentiſſimè impetuntur: unde etiam Viſtorialis nomen ab effectu inditum contendunt,
Marthiolus Allium anguſtium vocavit. Joſias Simlerus Allium alpinum nuncupat, *Sigurny*
& *Sibenbantſen* ab involucribus, quibus tamquam reticulo radix involvitur, multitudine.
Vulguſ Herbariorum Viſtorialis longæ aut majoris cognomen dedit, ut à Gladiolo diſcer-
nant, cujus radicem, ob corticis quo integitur, cum ſuperiore ſimilitudinem, Viſtoriale m-
rorundam & parvam appellant.

*Allium aſi-
um
Lilium con-
vallium, ſive
Oenanthe.*

Cum Viſtorialis porro longæ folijs magnam ſimilitudinem habent Allij orſini folia, licet
molliora & teneriora. Frequentiſſimum autem id eſt in omnibus Pannoniæ & Auſtriæ ſilvis,
conjunctim plerumque naſcens cum Lilio convallium, ſive Oenanthe, Auſtriæ, ut ante
dixi, viſſe *Baldani* Vngariæ *Zens gyrgy verag*, hoc eſt, S. Georgij ſlos, dicta, & *Gyrgy Wy-
rag* à nonnullis, quod ſignificat unionis flore.n.

*Xyſthium
minor.*

Xyſthium autem ſive Gladiolus minor, cujus etiam meminimus, multis Pannoniæ
& Auſtriæ pratis, & nonnumquam ad ſilvarum declivi loco ſirarum margines frequens eſt,
illi ſimile quod in Hiſpanijs & Narbonenſi Gallia inter ſegetes naſcitur rubro eleganti flo-
re. Sed & vicinis Pragæ, Bohemiæ Metropolis, locis creſcit.

SCORODOPRASVM.

CAP. XXXV.

SCORODOPRASI duo genera evidentibus notis inter ſe diſcreta, cum Viennæ vive-
rem, obſervabam.

Scorodoprasum 1.

*Scorodopa-
ſum 1.*



*Scorodopa-
ſum 1.*

PRIMUM oblonga & lata proſert folia, por-
taceis majora, carinata, caulem ſeſquicubitale m,
nonnumquam bicubitalem, digitalis craſſitudi-
nis, ſuperiore parte nudum, ferentem in ſummo
caput membranaceo involucri teſtum, ut cepa,
quod explicatum, multos ſoſculos ſimul conge-
ſtos cepaceis ſimiles, ſex exalbidis foliolis conſtan-
tes oſtendit: quibus ſuccedunt trigona capirula,
in quibus nigrum ſemen, cepæ ſemini par: radix
ſubeſt craſſa, parvæ cepæ æqualis, multis albis tu-
nicis conſtans, quæ ſeſili pari plurimis candidis
fibris prædita eſt, & verultate in alios majores bul-
bos ſeſe dividit, atque alios minores ad latera ad-
junctos habet, gravis, medijsq; inter allium & por-
rum odoris. Junio & Julio floret.

BICUBITALEM habet Alterum caulem,
multis ab infima parte ad medium uſque portu-
ceis folijs, priore anguſtioribus, circumdatum,
medio inter porrum & allium odore: reliquam
partem nudam, viridem, levem, ſummo ſaltigio
ſuſtinentem caput è multis bulbis, ut in Moly Io-
dico congeſtum, & candicante membranaceo in-
volucri cuſpide longa, viridi, prædito teſtum,
quod deinde bulbis excreſcentibus rumpitur, nu-
dosque bulbos in initio purpuraſcentes, poſtea exal-
bidos detegit, inter quos ſoſculi quidam naſcun-
tur: ea cauſis extrema pars, cui caput inniſitur, initio
ſeſe cum ſuo capite convolvere ſolet, ut ſerpentis
oborto collo ſimilitudinem quodammodo refe-
rat, deinde ſenſim paulatimque ſeſe explicare in-
cipit, donec tandem caput erigat: radix è multis

nucleis ſimplici aut duplici tenui membrana rectis conſtat, & numeroſis exalbidis fibris ſeſ-
ſili parte donata eſt.

Junij initio ſuum caput contorquet, Julio verò erigit, eodemque menſe bulbos ad mæ-
ritatem perducit, qui terræ crediti, ſui generis plantas procreant.

Primi

Scotodoprasum II.



Moly Theophrasti.



Primi generis patci bulbi ornithogali Arabici bulbis permixti Byzantio demum allati sunt paullo post quàm Vicinam venissem, quorum unum aut alterum Ill. Ioan. de Brancion mittebam, cum aliterius generis aliquot bulbulis. Vnicusquem servaveram mirum in modum se propagavit, ut successu temporis multis elargiri potuerim. Eum autem apud Turcas esse in delicijs, mihi aliquando referebat Ill. Augerius de Bousbeque.

Sunt qui secundum genus *Scotodoprasum* appellent, quia caput cum suprema caulis parte serpentis instar se contorquat.

MOLY.

CAP. XXXVI.

VARIA sunt Moly genera, quorum bina à Veteribus descripta habemus: Homerium, cujus Theophr. Plant. Histor. lib. ix. cap. xv. & post eum Plin. Nat. Histor. lib. xxv. cap. lxxi. meminere: & Dioscoridæum. De his isto capite agemus, atque etiam tertium quoddam genus addemus, nuper ad modum Europæ (ut aiunt) familiare factum.

PRIIMUM, folijs est Scillæ tribus aut quatuor, longioribus, invicem amplexantibus, cubitali aut ampliore caule, crasso, concavo, rotundo, foliorum exparte, multos flores stellatos, candidos, summo fastigio sustinens longis pedicellis inhzrentes, nigro in triangulis capitulis semine, ceparum semini ferè simili: radix crassa, alba, rotunda, nigro conice tecta, quam negat Theophrastus difficulter cfrodi, ut Homerus tradidit. Iuxta caulem inrer folia, alius plerumque exit cauliculus planus & foliaceus, seu verius folium, in summo veluti alij nucleum gerens, initio candicantem, deinde pallescentem, qui, terræ exceptus, germinat, & ejusdem generis plantam profert.

Quod verò in Italia nasci scribit capite supra memorato, cujus videlicet radicem triginta pedes longam, ac ne sic quidem solidam, sed abruptam, & allquod diebus effossam inter difficultates saxæas, Campanià sibi allatam, mihi prorsus est incognitum, nec quemquam audire, vel scribere memini, qui se vidisse diceret.

MOLY alterum genus, Indicum cognominatum (quod nonnullis *Caucasæ* barbaro nomine dicitur) quia ex India primum in Hispaniâ perlatus esse ferunt, & inde ad Italos transivisse (ab illis certè Belgæ acceperunt) superior folijs & reliquâ formâ simile, nunquam flores apud me, neque apud multos alios protulit: sed eorum loco, caulis pedalis, ferè planus, aded infirmus, ut, nisi aliquo fulciatur adminiculo, extolli non possit, summo fastigio conglomeratum caput fert, multis veluti alij spicis mespilij vulgaris magnitudine constans, initio viridibus, deinde pallescentibus quæ etiam in terrâ non repositæ, germinant telluri tamen commixtæ, in majores bulbos adoleseunt, foliaque & caules (non tamen singulis annis, quemadmodum nec ipsa etiam pates) produ-

cunt:

Moly Indicum.

Moly Dioscoridis.



Moly minus.



Moly Dioscoridis.



Moly minus.

Moly minus.

unt: ea lix, ut alterius, cepacea, rotunda, alba, multis tunicis amicta, quarum externa fusca, vestigare sese separans, & in alios bulbos pangens.

Ccepit hoc etiam Constantinopoli Viennam adferri, dum istic vivebam, *Zumbul arabi* bulbis permixtum: & inde foris, etiam in Italiam; à doctissimo tamen viro Ferdinando Imperato intelligebam, Neapolitano regno sponte nasci.

BINA aut terna graminaceorum patet instar folia habet Tertium, mollia, ad terram inflexa, exteriore parte aliquantulum lanuginosa, inter quæ caulis exiit dodrantalis, lævus, rotundus, cavus, summâ parte membranaceum quoddam involucrem sustinens, è quo multi emergunt flosculi candidi, sex foliolis constantes: radix bulbosa, avellanae nuci magnitudine, intus alba, succulenta, aliquantulum acris, subingrati odoris, foris nigricantibus membranis involuta.

Nascens hoc Moly, & initio Februarij flores proferens, Gadibus, ea veteris urbis parte quæ in mare protenditur, eruebam, non procul à sacello locum occupante, in quo Hercules templum fuisse ferunt.

PLURIMUM ad Μαῦλον Dioscoridis accedere mihi videtur, præsertim si pro *πυχλὴν τριανθῶν*, legitur *δανθῶν τριανθῶν*.

Hic valde simile est Moly illud, quod Moerkerck Flandrorum in cultissimo suo horto alebat Ill^{us} Heros Carolus à Divo Andomaro, Dominus de Dranoutre, Moerkercken, &c. Caulis ejus palmaris, viridis, denos aut plures sustinens flores, sex nunci foliolis, non mucronatis, ut superioris,

rioris, sed orbiculatis & majoribus constantes, senis in medio flaminulis, inter bina porracea quodammodo, sed angustiora folia assurgebat: radix erat rotunda, candicans nucis ponticæ magnitudine, albicantibus fibris prædita. Vnde habuisset ignorabat, sed semine percregè accepto sibi natam eam plantam augurabatur.

ALLIUM sive MOLY MONTANVM.

CAP. XXXVII.

MVLTA etiam in Vngariæ, Austriæ, Stiræ, Moraviæque montibus Moly sive Allij sunt genera, folijs, floribus, vel capitibus inter se discrepantia: quorum maximam partem ab alijs hæcenus minime observatam fuisse existimo.

Allium seu Moly montan. latifol. I.

Allium sive Moly montanum II.



PRIMUM, caulem habet duorum cubitorum altitudine excrefcentem, quem, ad medium usque, ambiunt folia, multò quàm in Allij generibus latiora, longa, porraceis proxima: Moly monta-
num I. summo cauli, qui lævis & juncusest, insidet caput è multis bulbis ex atro purpureis simul congestis, satisque crassiss conflatum, inter quos in oblongis petiolis nascuntur flores dilutè purpurascences, quibus succedunt trigona vascula, in quibus semen: radix bulbosa, crassa, ex multis nucleis constans, numerosis albis fibris prædita est: sed & bulbi rotundi radici in-herent. ijs ferè pares qui in capite nascuntur, quique, terrâ excepti, plantas sui generis produ-cunt. Toti stirpi Allij gravis odor incst. Iunio & Iulio flores & bulbos fert.

CVBITALI affurgit Alterum caule, lævi, rotundo, viridi, in quo terna plerumque folia, Moly monta-
num II. superioris folio angustiora, & veluti graminea: summus caulis caput sustinet duabus laxis membranaceis tunicis longiore mucrone præditis obvolutum, quibus sese aperièntibus, mul-ti exigui bulbi simul congesti apparent, inter quos flores, sex purpurascensibus foliolis con-stantes, & oblongis pediculis inhaerentes, dependent: rotundam, albam, longis, candicanti-busque fibris capillatam radicem habet.

EADEM excrefcit Tertium altitudine, totidemque illi sunt juncea folia, viridia, caulis Moly monta-
num III. supra folia lævis, rotundus, viridis, inter binas membranaceas etiam tunicas longà caudà in-singitas, caput sustinet è multis exiguis bulbis, puniceis è viridi coloris, & in longiusculam herbaceam cuspidem plerumque desinentibus, confertumque nascentibus, conflatum, inter quæ dependent in oblongis gracilibusque pediculis flores superioris floribus formâ & magni-tudine similes, coloris exalbidi, quorum media foliola secundum longitudinem, & utraque oras, vena obsoletè purpurascens inficit: radix etiam rotunda est, candicans, longis albican-tibusque fibris prædita.

R

HABET

Allium five Moly montan., III.

Allij montani III. species 1.



Allij montani III. species 17.

Moly mont.
III. species 17.Moly mont.
III. species 17.

III. species 17.

HABET & Quartum terna juncea folia, caulem cubitalem, rotundum, cui insidet caput duabus membranaceis tunicis caudatis conclusum, quo utrinque dehiscente, magna explicatur florum ex lōgis pediculis dependens, coma, qui sex pallidis foliolis constat, totidem etiam staminula cum filis in medio obtinent, qui cum suo caule refecti, & in cubiculum illati, suavissimi odoris (qualis in præcocioris Caryophylleorum florum semini non multum absimile) radix globosa est, superioris similis, & eodem modo capillata, nucleos interdum in lateribus deponens.

Alia invenitur ejus species, pari ferè altitudine excrescens, similibusque propè folijs prædita, cujus coma inter laxas, membranaceasque, & longum mucronem habentes tunicas. latè sese explicat, florum coloris valde obsoleti plenarum radix superiori similis, nucleos etiam in lateribus profert.

Trium istorum postremò descriptorum radix allium subolet, folia autem herbaceà quandam odorem potius referunt.

Alterum & certius genus in longè porrecta illa montium serie, qui à Striacis Austriaci-que Alpibus ad Danubium supra Viennam excurrunt, sponte nascuntur. Quarti verò prior species circa Pofonium, Vngariz nunc Metropolim ad



Allium sive Moly Narcissinis fol. 1.

lim ad sinistram Danubij sitam, in quo Vngarica comiria fieri solent, & locis Niclasburg in Moravia vicinis, omnium autem abundantissimè supra Badenses thermas, crefcit.

PAR 1 altitudine assurgit Quintum, caule nudo, viridi, paucis folijs viridibus obfiso, cujus fastigio infidet caput orbiculare initio, è multis floribus brevi petiolo præditis congeftum, qui sex foliola, nunquam se fe profus explicantia, habent, sex in medio staminibus & stilo, elegantis purpurei coloris: radix bulbosa, alba, nucleos interdum tenui membrana teftos, & proximè caulem lateribus adnatos, habens, & sessili parte multas albicantes fibras. Ejus odor, Allij instar caput ferit.

In Vngaria circa Pofonium dunraxat observaveram, quum Pannonicarum stirpium historiam publici juris faciebam, ad vinerorum in collibus Danubio immincentibus ftorum margines, Maio & Junio floribus onustū. Post quàm verò Vienna discessi, & Francofurtum ad Moenum perveni, aliquot stirpes inter segetes agris illi urbi vicinis invēras, in meum hortulum transtuli propter florum elegantiam, anno M. D. XXXIX. Tertio autem post anno, binos ejus bulbos Neapoli accipiebam à Ferdinando Imperato, qui flores dunraxat prorulerūt Lugduni apud Batavos, ubi demum quale genus Moly montani efflet agnovi: paullo tamen precocius florere mihi visum est illo, quod in Vngaria, quod Francofurti observabam: nam & illud Lugdunum adferebam.

MOLY NARCISSI FOLIIS.

CAP. XXXVIII.

ALLII odor facit, ut binæ hæ tuberosæ stirpes, ad Moly classem, non ineprè, meo judicio (nam & alix accedunt notæ) referri possint.

PRIOR, quina aut sena ex radice promit oblonga folia, plana, succulēta, Narcissi Quinæ simplici flore, h. e. Narcissi alterius niveo flore folijs similia, viridia admodum & splendentia, inter quæ cubitalis plerumque exir caulis, nudus, firmus, viridis, striatus, ferens in summo multos flores, sex purpurascētibz foliolis, totidemquæ interius staminulis præditos, simul congeftos, & veluti globosum caput cōstituentes, quemadmodum in cepa, quibus succedūt trigona capirula, quæ, maturitate dehiscētia, rotundum nigrum semē continere deprehendunt: radix nodosa est, antèrius progrediens polygonari mōdo, extimā parte globosa, candida, multis tunicis circumvoluta, plurimis albis fibris prædita, & adnatis feliciter se propagans.

Aliud ejus genus est nō valde ab simile, mollioribus & magis cineraceis folijs, dilutioribus etiam floribus. Floret utrumque sub extremum Junium & Julio.

HABET & Secunda quina augustina folia, superioris folijs non minis lata, sed breviora, aliquantulum se torquentia, viridia, & splendentia, caulem pedale, superiore graciliorem,

R 2

sed

Moly montanum.

Natalis.

Moly Narciss. fol. 1.

Moly Narciss. fol. 1. altera speciem.

Moly Narciss. fol. 1.

Allium five Moly Narcissinis fol. 11.

Moly Narciss.
fol. 11. altera
Quina.

Natalis.

Folia vomit.
tor.

Allium Tiliag.

Asphodelus r.

Asphodel. r.

sed non minus firmum, striatum, qui summo fastigio è membranacea tunica multos flosculos promit, in orbiculare caput simul coëctos, prioris floribus similes: sed elegantiore purpurâ nitētes capitulis & semine cum Priore responder: similiter & radice, quæ nodosa est, & adnatis in ambitu, non infelicius illâ, sese propagat.

Illius etiam genus invenitur longioribus & angustioribus folijs, neque adeo cōvolutis, cauliculis paullo infirmioribus, floribusque multo dilutioribus. in reliquis satis conveniunt.

Vtraque hæc species serius priore genere floret, nempe Julio & Augusto. In omnium radicibus illud peculiare, ut ramolæ tandè & oblique fiant, vestigia caulis, præcedentibus annis nari, impressa habentes, Polygonati radicem instar, non adeo tamen laxæ.

Nascitur omnes in Leytenberg supra Manderstorf (ubi tepidæ sunt aquæ, quarû usu multi valerdinem eurant, præsertim calculo obnoxii) & alijs montibus urbi Viennæ vicinis.

SECUNDO generi similes plantæ mihi natæ sunt Viennæ Austriz, semine Lutetiâ misso à doctissimo viro, rerumque naturalium peritissimo Nicolao Rasio, Cheirurgo Regio, Bulbi vomitorij nomine, quia facile vomitû ciet ejus radix præmanfa. Eodem etiam nomine aluit in amplissimo, eodemque cultissimo suo horto Caspelli Illustrissimus Cartorum Princeps Wilhelmus. Non desunt tamen, qui Alum, quod Plin. Natur. Hist. lib. xxix. cap. vi. in arvis sponte nasci scribit, esse velint: sed eum ille formam non describat, & Allij genus esse, dūtaxat dicat, certi quidpiam statuere difficile est: nisi ab eo, qui forte periculum fecerit, an aves, eo devorato tanquam sopitæ, manu capi possint.

ASPHODELVS. CAP. XXXIX.

ASPHODELVm cū plerique descriperint, hic subijcere nō erat operæ pretium. Quia autem aliquot ejus genera nemini adhuc delineata, cū Hispanicarum stirpium observationes evulgabam, à me observata erāt, lectionibus tum gratificaturum putabam, si eorū qualemcumque historiam proponerem: quam de novo hic repetō, quod quædam postea observaverim ad eam stirpem pertinentia.

PRIMVS multa habet oblōga folia, angusta, triangula, & veluti carinata, fungosa & lenta, mucronata: caulem rotundum, lævem, bicubitalem interdū, in ramulos superne fissum, quem à medio serè sursum vergendo exornant multi stellati sex foliorum flores, coloris intus albi, foris verò nervo purpurascēte singula folia secundum longitudinem quasi distinguente (ut Ornithogali flōs virgescēte linea distinctus est) totidem quot foliola staminibus medium occupantibus: semen durum, lignosum, rugosum, arrum, & figura triquetra, capitulo orbiculari serè, sed tribus eminentioribus costis prædito, & ex vindipurpurascēte continetur, quod illo per maturitatem dehiscēte, cadit: floret per partes ut verè dicit Theophrastus, & incipit ab imis.

imis. Radices ab uno capite numeroſe exeunt, oblongæ, exiguis napis ſimiles, ſed inferiore ſede craſſiores, æque in hbas deſinentes, ſucci plenæ, candicantes, ingrati & acriſ guſtus.

Iſtus radices videre memini, dum Olyſſipone Hiſpalim proficiſceter, araꝛo ciuitas, quæ *Aſphodeli* ducentos aut plures ab eodem capite pendentes, coſq; ctaſſos admodum napos haberent ut *oxytropidis* quinquaginta aut amplius libra: totam plantam pendiffe putem. Itaque nihil mirum, ſi *Platanus* octoginta ſimul accuſatis ſæpe bulbis referat.

Aſphodelus II.



Aſphodelus minor.



ALTER huic omnino ſimilis, exceptis caule, qui unicuſ eſt neque ſurculofus, & flore, *Aſphodelus* qui omnino albus: illius etiam radix non adeo numeroſa.

Sponſe ſua naſcitur uterque editioribus taxoſiſque Luſitaniz, Hiſpaniz, Galliz quoque *Natalis*. Aquitaniz & Narbonenſis locis. Apud Belgas non niſi ſatus provenit, ut neque in Germania. Floret uterque illic Martio & Aprili: in horris Maio, & etiam Junio.

TRACTIVS, ut folijs, caule, & floribus ſatis ſimilis eſt ſuperioribus, ita radicibus omnino *Aſphodelus* differt, quæ non glanduloſæ, ſed fibroſæ craſſæque & numeroſæ ex uno capite naſcuntur: folia *minor*. *Aſphodeli*, minora, multò anguſtiora, lentiora, dilutiorſque ſunt coloris, è quorum medio ſex aut plures ex eadem radice aſſurgūt caules cubitales, ramoſi, quos ſine ordine naſcentes ſtipant ſtipes, ſuperioribus ſimiles, ſed minores, medium folium purpurafcente vena per longitudinem ſecante: floribus ſuccedunt triangula capitula, initio viridia, deinde exalbida, in quibus ſemen rugoſum, anguloſum, altero minus.

TOTVS Valentino regno nullus ferè eſt alius *Aſphodelus* naſcitur & Gadibus ad ipſum pontem de Suago cognominatum, quo inſula continenti conjungitur, & pleniſque Granatenſis regni locis olim etiam campo illo lapidoſo ſupra Arelatem, Maſſiliam proficiſcens ſecus ſemitas colligere memini. Semine, ex Hiſpanijs à me delato, amicis natus eſt in Belgica, ſed cum frigoris ſit impatientis, peribat hieme, eam ob cauſam annuum cenſebat, donec me monitore (qui magnas illius plantas hieme virentes in Hiſpanijs videram) Ill. Ioannes de Brancion unam ex ijs quæ poſtea ſemine natæ, fideli inditam cõſervaret, quæ aliquot deinde ſubſequentibus annis florens, maturum ſemen præbuit, quod etiam terræ credidum provenit.

GRÆCIS *ἀσφόδελος*, Latinis Haſtula regia. Pliniuſe aulem cum floribus Albuſcum nomi- *Natalis*. nit, quem Græcis *ἀσφόδελος* vocari ſcribit. Idem *Aſphodelum* aliquibus Heroion appellari tradit, & Dionyſio marem & feminam eſſe. Hiſpani priore *Gamonies* vocant; alterum radice fibroſa Valentini *Gamonçillas*, id eſt, parvum *Aſphodelum*, Granatenſes *Cebolla de culibra*, hoc eſt, cepam colubrinam appellant. Patavina ſchola *Aſphodelum* ſubuloſum, quod conca- *Natalis*. va ſola habeat, forſitan. Nihil cum Phalangio commune habet.

Aſphodeli facultates ex Dioſcoride, Plinio, Galeno petendæ: an verò tectius alieujus in re medica ſit uſus, à neimine hæcenus intellexi.



Pseudo-asphodelus 1.

Natalis.

Natalis.

Pseudo-asphodelus 11.

ASPHODELVM porro illum flavo flore palustrem, cujus Dodonæus & Lobelius in suis scriptis meminerunt, vel potius Pseudo-asphodelum (nam nihil Alphodelo simile habet præter flores, licet Dodonæus caulem etiam similem faciat, qui tamen non est nudus, sed multis foliis sive vaginulis illum amplectentibus donatus) Xyphij folijs aut tenuifoliz Iridis, aliquando eruebam in palustribus illis ericetis Maldeghemo vicinis secundo à Brugarum urbe Flandriz celeberrimâ, militari, Maio mense cum Ill. Viro Casolo à Divo Audomaro, Dn. de Dranoutre, Moerkercke, &c. curru vectus relaxandi animi gratiâ, altero à meo ex Hispanijs reditu anno.

ALTERVM autem Pseudo-Alphodeli genus, folijs illi valde simile, sed per omnia minus, in Snealben, Neuberg, Etscheri, atque alijs pratis montanis, & gramineis collibus, Junio florens & Julio semen proferens observabam, quod superiori conjungendum putavi.

NUMEROSA sunt illi folia, sese mutuo amplectentia ut in superiore, & Iride, angusta, breviora, vitidia, dura; amariuscule, & calidi saporis: è quorum medio caliculus gracilis egreditur pedalis interdum, aut major, aliquot nonnumquam foliis inhaerentibus, spicam flosculorum ferens sex foliis constantium, alterius instar, sed minorum, pallidiuscentis ex herbaceo coloris, & odoris expertum: quibus succedunt trigona capitella, interdum tetragona & pentagona, minutissimum rufum semen continentia: radix vix corpus habet, sed tenuibus aliquot fibris duntaxat consistat.

PSEUDO-ASPHODELI minoris sive primilionis folio Iridis nomen indidi, ad prioris differentiam qui Pseudo-asphodelus major appellari posset.



COLCHICVM.

CAP. XL.

PLURA etiam (præter vulgare illud, quod omnibus Germaniæ & Ungariæ pratis obuium est) à me observata sunt Colchici genera, foliorum, florum, & radice amplitudine, vel etiam florum colore, inter se differentia.

Colchic. Pae.
non est fer.
notandum.

MVLTORVM florum est Primum genus, quod in quibusdam pratis Viennæ Austriæ vicinis, nec procul à Danubio sitis, inter vulgaris plantas nascentis, ante multos annos observabam & eruebam, ut in hortulum transferrem, deinde in pratisarci Starenberg Mag^o Dn. de Heukinstain vicinis, magnâ copâ inventum est. Septenos enim, denos, aut duodecos, vel etiam plures interdum promit flores lactei candoris, eleganti spectaculo: hujus etiam folia, vulgares colchici folijs aqualia, sed dilutius virentia, in eunte duntaxat vere exeunt: copiosum fert semē subrufum in laxis triangulis capitibus: radix, vulgaris bulbo, major, ad Secundi tamen

Colchic. L.
Jeanne.Colchic. L.
Jeanne.

sunt allati dum Viennæ vivebam: Generosæ Dn. de Heusenstain, à qua prolem accipiebam & Generosæ Dn. Vignadin anno M.D.XXCVIII quum istinc Francofurtum discederem.

Cum illius flore quandam affinitatem habere viderur flos ejus Colchici, quod Theodoricus Clutius è Lusitania acceperat: nam sex etiam folijs constat purpurei cum albo mixti coloris, & veluti ressellatim (ut in Fritillariæ flore) dispositi, floridioris tamen: umbilicum etiam occupant sex alba staminula, flavis apicibus prædita, & medius stilus in staminula divisus, purpurascens suprema parte coloris: odor aut nullus, aut valde obscurus. Floret cum reliquis Colchicis.

TERCIUM genus habeo munete Gen. Dn. de Heusenstain, quæ in cultissimo suo horto suburbano ad Viennam urbem, binos aut ternos alebat, quos, unde adquisivisset, ignorare se affirmabat. Non minus crasso est id bulbo, quàm Primuin, vel etiam crassiore: Octobri, paullo seriùs quàm superiora, binos, ternos, aut quaternos producit flores, vulgari breviores, & brevi pediculo innixos, ut vix supra tellurem attollantur, quorum interiora tria folia ex purpurâ quodammodo rubent, aut Hispanici montani floribus concoloria sunt, ut plurimum, exteriora autem tria vel omnino lactei candoris sunt, vel internè mediâ ex parte purpurea, aut crassioribus purpureis venis radiatim distincta, vel purpureis maculis aspersa, omnia verò mucrone magis orbiculato & obruso quàm in vulgari: hujus folia ineunte vere geminantia, ex viridi purpurascunt, deinde explicata saturatius virent vulgatis folijs. Semel dumtaxat ejus semen legere memini, prioris semine minus.

Colchic. L.
Jeanne.

QUARTUM genus à Bosforo accipiebam anno M. D. XXX. crasso etiam bulbo, quod terræ commissum non modò non floruit, sed protius perijt. Scribebar autem ejus florem purpurei coloris esse, qui procul aspicientibus vulgari par appareret, ar diligentiùs observantibus, colores ex albo & purpureo distincti videbantur, satis ad Fritillariæ colorem accedentes: folia irem habere ampla, ad terram inclinata. Postea tamen, conspecto Colchici Byzantini, cujus bulbum ad ipsum mitrebam, flore, diversum à meo larifolio, suum Colchicum esse monebat. Foritan verò idem genus erit, cum Lusitanico Clutij.

Colchic. L.
Jeanne.

QUINTO rerna aut quaternaria sunt folia digitalis longitudinis, carinata, firma, humi tamen sparsa, saturatius virentia & splendentia, vix se munciam lata, acidi gustus, rufescentem colorem contrahentia dum tabescere incipiunt: flos sine folijs primuin exilit Septembri, aliquando etiam Augusto, sex longis, angustis, & ex purpura rubentibus folijs, totidem in medio staminibus constans, hunc statum (piæter aliorum Colchici generum morem) folia subsequuntur,

Colchici montani Hispan. semen.

Colchicum mont. min. versicolore flor.



sequuntur, & totam deinde hiemem perdurant, usque in mensem Maium, vel etiam Iunium: radix bulbosa, non magna, multis ex rufo nigricantibus tunicis amicta, intus alba, solidissima & cum quadam adstrictione dulcis, longiuscula sede, quali in ceteris generibus, & adnatis in lateribus se propagans.

Collibus Salmanticae vicinis, solo valde lapidoso primum eruebam cum suo caule dodrantali, firmo & triangulari capite, in quo semen ex tubro nigrescens sive fuscū, laeve, exiguum, subrotundum Maio mense, anno M. O. C. LXIII. Apud Belgas, apud quos, semine quod natali loco collegeram, natum est, nullum adhuc semen dedisse intelligi. Viennae autem Austriae, aliquoties ex mens stirpibus semen collegi, capite inclusum vix terrā interdum emergente, & inter folia iam languida latente, aliquando digitali & palmari cauliculo innitente, uti etiam Francofurti ad Moenum, & Lugduni Batavorum.

Huius non multum ab simile est, quod Iacobus Plateau in suo horto Tornaci alete ad me scribebat, tum folijs, tum bulbo: flores autem differte, quorum omnia quidem folia longa & angusta etiam essent, interiora verò tota alba, exteriora media ex parte viridia, altera carnei quo jammodo coloris.

Pavcos porro Colchici bulbos, vulgatis bulbis valde similes Neapoli Francofurtum ad me mittebat Ferdinandus Imperatus, qui mihi Lugduni Batavorum demum flores dederunt, vulgatis floribus non dissimiles, hoc est vel dilute, vel saute purpurens.

Sed aliud Colchici genus vulgari minus, Salmanticensi agro observabam in altioribus pratis, dilutioris flore, atque in nonnullis plantis, lactei omnino candoris, ineunte vete folia duntaxat profertens.

SYRIACUM autem illud, vel Alexandrinum, à nonnullis exhibitum, nihil aliud esse videtur, quàm Tulipæ genus quale Apennineum forte, cui pictor nimis orbiculata folia tribuerit, ipsi verò plantæ nimis lata & brevia.

FRANCOFARTI etiam ex Italia accipiebam semen, vulgaris colchici semini par, cum suo laxo capitulo, Hermodactyli Syriaci appellatione, quod terræ creditum, necdum germinaret, quum inde discederem. Sed & Illyricum illud Anguillatæ, nunquam mihi cōspectum.

CETERVM hæc planta Dioscoridi καλχέδι dicitur, nonnullis, ipso teste, ισχυρον, βαλβος, εχμος. Qui Theophrasti locum Hist. Plant. lib. vi. cap. vi. integrum esse censent, ejus Narcissum, sive Litum nigro flore esse arbitrantur. Hispani Quisamendias, & Visorita appellant: Germani Wüßstein & Teufel. Galli nonnulli Mort au chien. Primum autem genus, καλχέδι λευκῆ θειο πολυανθε. Græcis: Alterum καλχέδι βυλάρηος πολυανθε. Colchicum byzantinum latifolium multiflorum, non incommode dici posse videtur.

Tertium,

Natali.

Colchic. mont. versicolore flore.

Colchic. Neapolit.

Colchic. german. Salomon.

Colchic. Syriac.

Hermodactyl. Syriac. Mortua.

Colchicum pleno flore.

Colchici wa-
rupensis.

Natalis.

Colchicum biflorum.

Colchic. bi-
florum.

Tertium, *καλχικόν ποικίλον* δις, varicolor. Quinrum verò, *λεπτόφυλλον*, tenuifolium, & montanum Hispanicum. Salmanticenses hoc genus *merenderas* vocabant.

Alio porro elegans Colchici genus apud Belgas invenitur, cujus quidem cognitionem acceptam fero Ill^{mo} Comiti Arébergio, Ordinis Velleris equiti dignissimo, qui præter exoticarum stirpium culturam, cui maxime indulget, magnis etiam sumptibus quascunq; adipisci potest, vivis coloribus depingi curat. Is Autumno m. d. xcv. bulbum ad me mittebat, ut floré conspicere possem: sed cum nulum protulisse intelligeret, insequente Novembri iconé egregiè expressam addidit. Flos vulgari colore perisimilis est, sed pluribus folijs constans, nempe vicenis aut pluribus, valde còfertis, quorum sex externa reliquis majora, vulgaris tamè folijs angustiora, inter quæ stamina ut in vulgari, flavis apicibus prædita. Ex alimenti copia plenum flotem tulisse existimabam inirio, quæ mædmodum natura intendum ludere solet in alijs floribus, qui deinde ad ingenium redeunt: sed ipse Comes affirmabat, tum etiam N. V. Ioannes Boisor, singulis annis plenos flores id Colchici genus proferre, eorūq; plures, majores, & majore foliorum numero còstantes, quo bulbos major & vetustior est. Originè ex Germania ducere aiunt, & primum in Belgium allatū à Rhizotomo, cujus nomen Nicolaus, qui frequenter è Belgio in Germaniā à Nobilibus quibusdam matronis ablegaretur. Sed bulbos anno insequente cum selectissimis alijs stirpibus fuito sublatus.

COLCHICVM BIFLORVM.

CAP. XII.

NOVVM & rarum hoc Colchici genus, mihi sanè, ante annum nonagesimū tertium supra millesimum & quingentesimum, nunquam conspectum, cujus cognitionè acceptam fero doctissimo viro Moyfi Quadrato, qui Autumno præcedente me monebat, verno tempore florés sibi observatū in montano quodam prato, non procul Heydelbergâ, ubi tum domicilium habebat: edoctum tamen ante, similem inveniri placit, ex Epitome de Plantis C. V. loachimi Camerarii inclytæ Reip. Noribergæ, primarij medici. Ioannes Müllerus pharmacopæus Francofurtensis etia assertabat, sibi adolescenti conspectum in pratis Halæ Suevorum vicinis novo vere florens.

PERINDE autem crasso id constat bulbo, ac vulgare Colchicum, ex cujus infimâ parte colise mergit quatuor uncias lōgus, ex membranaceo involucri flore promens oblongo pediculo nitentem, vulgaris flori formâ æqualem, sex folijs còstantem, sed minorem, quorum rena externa majuscula, interna autè tria angustiora & breviora, saturatius paulo purpurascens esse videbantur: nec folia,

nec

nec semen (si quod tulit) observare mihi licuit per morbum; xxv enim Aprilis ejusdem anni, ex casu luxarum mihi est femur dextrum cum summa contusione, cujus rei causa toto trimesi decumbendum mihi fuit, malè administratà curà à cheirurgis, qui luxatione neglegenti, quam non agnoscentes (quum tamen subinde eos monerem, me luxationem sentire) vel malignè dissimulantes, ad solius contusionis curam animum intenderunt. Veram autem fuisse luxationem, etiam nunc cum magno meo dolore & damno experior: nam & mihi dextrum crus contractum, nec pedem promoverè possum, nisi gemino scipione sub axillis fultus, arque quidem non sine cruciatu. Ceterum ad Colchici historiam redeamus, à qua justus animi dolor me averit. Bini igitur majores bulbi ex ijs qui quaremi Heydelbergæ ad me mittebantur, florem dederunt sub fine Augusti, paulo ante necum Francofurti ductissum: nescio an error commisi à legentibus, quum bulbosè retrà eruerunt. Majorem porro bulbum à Moysè accipiebam, cui recens flos adhuc inhærebat, sub extremum Martium, reliquos insequente Aprili. Arque ista ratione, Colchicum biflorum potius nuncupandum esset, quàm Vernum.

Idem ipso autem anno scribebat Iacobus Plateau, Colchicum se habuisse, quod verno tempore flavum florem protulisset: sed bulbum cum eruisset, ut ejus prolem ad me mitteret, utrumque corruptum reperisse.

CROCVM VERNVM.

CAP. XLII.

MULTIPLEX etiam est Crocum verno tempore flores proferens, folijsque & floribus colore valde variat. Nos autem duo ejus primaria genera constituemus: Vnum, latiore folio & legitimi croci aurumq; floris foliorum xmulò, licet breviorè: Alterum, tenuiore & proflus junceò: singula deinde in suas species distribuemus.

Crocum vern. latifol. alb. flo.

Croc. vern. latifol. purpureo flo.



LATIFOLIUM ergo Prima species, terna & quaterna interdum habet folia laniuscula & brevius, duabus albis venis per eorum longitudinem subtus excurrentibus prædita, inter quæ prodit è membrana flos brevi pediculo nitens, sex folijs constans albis, imò parte cum pediculo purpurascens, & in meditullio stamina, cum brevi trifido stilo continens: radix bulbosa, candida, tenui cortice amicta, fibrisque candicantibus infimà sede prædita. Nulla inter reliquas Croci verni species, hæc magis fecunda in edenda sobole. Ejus verò flos interdum variat: nam terna illa exteriora folia, nonnunquam purpurascens venis sunt aspersa, interdum soli foliorum mucrones purpurascunt, aliquando etiam purpureus radius omnia folia secundum longitudinem media secat.

Alterà similis est folijs, paulo tamen angustioribus, inter folia promens è membrana cœo involucri, ejusdem magnitudinis florem brevi pediculo innitentem, sex folijs constans.

Idem verno tempore.

tem violaceæ ad cæruleum tendentis purpuræ colore, unguibus & summo pediculo saturatior purpurâ nitentibus: radix alteri similis, & in edenda sobole satis fecunda interdum. Nonnunquam, sed valde rarò, fert utraq; hæc, rotundum exalbidum semen in triangulo capitulo.

*Croc. vern.
latifol. purp.
flo. majora.*

Perelegans etiam est Croci verno tempore florentis Tertia species, quam ad me Neapoli mittebat doctissimus vir Ferdinandus Imperatus, cum alijs aliquot stirpibus Francofurtum anno M. D. XCII. Ejus verò jam marcidæ & dudum terrâ eruti bulbum unicum accipiebam, qui sequente vere folia quidem protulit, sed nullum florem. Lugduni porò Baravorum, cum alijs Croci verni latifolij speciebus florem dedit, illis formâ similem, hoc est, sex folijs constantem, quorum externa tria paullo longiora, interna tria breviora amplectuntur, multo tamen ampliora quàm in secunda specie, licet illis colore nec valde disparia, nec in jucundi odoris, tria stamina continentem alba, magnis flavis apicibus prædita, & inter illa stilum paullo longiorem, extimâ parte in tres quasi tubulos laxiores divisum, aurei coloris: eum flore, & membranaceo, instar reliquorum, involucri prodeunte, exeunt terna, aut quaterna folia, proximè descripti folijs non dissimilia, paullo tamen longiora: radix bulbosa, superiore major, & ad Quintæ species radicis amplitudinem accedens. Ea deinde mihi furto sublata.

Croc. vern. latif. albo verficul. flo. 1.

Croc. vern. latif. albo verficul. flo. 11.



*Croc. vern.
latifol. alb.
verficul. flo.
11.*

Quartæ folia, Croci fativi & legitimi folia satis referunt, nisi breviora essent: inter quæ, bi- ni aut terni prodeunt flores, Primæ & Secundæ species floribus majores, sex folijs mucronatis constantes, quorum terna exteriora (quæ pallidula sunt foris) tribus radijs ex atro purpurascens, ab infima basi ad extremum folium ductis striata, internè alba sunt, ut & tota interna tria folia, staminaque in medietate habent Croco monrano similia, sed magis pallentem stilum: liberalius hæc semen præbet in triangulis capibus, rotundum, ex rufo candicans: radix superioribus similis, foris membranâ tuscâ obduta, fibris infimâ sede donata, & iatus alba.

*Croc. vern.
latifol. alb.
verficul. flo.
11.*

Illi similem, sed per omnia minorem, ante multos annos in Belgicam nobis mittebat C. V. Alphonsus Pantius Ducis Ferrariæ Medicus, cujus florem interdum oclonis & denis folijs præditum habui, Iacobus Plateau etiam duodenis, illiusque iconem ad me mittebat, peculiare genus esse existimans, sed in sequente anno, simplicem sex foliorum florem tulit.

*Natalis &
Nimrod.*

Primæ, Secundæ, & Quartæ specierum meminit Iosias Simlerus in Helvetiæ de descriptione, atque istic in montanis inveniri, colore purpureo, candido, & utroque mixto: *Spurteiss* vulgo vocari, & à luxæ montis incolis (apud quos in supremo jugo etiam nascuntur) *Reffan* addit radicem suis esse gratam. Audio & in Baldo monte agri Veronenfis provenire. Nascuntur & alijs locis: nam anno M. D. XC. Ferrariâ ad me scribebat doctissimus & diligentissimus stirpium indagator Ioachimus Iungermannus C. V. Ioachimi Camerarij ex sorore nepos, mihi quæ ob morum probitatem, doctrinam, ingenij elegantiâ, & alias animi dotes valde charus, quem etiam non dubito futurum fuisse præclarum lomen Germaniæ, si diutius vivere licuisset: is inquam scribebat, in eâ herbatatione, quam comire Iosepho de Casa buona, Ser^{mo} Ducis Florentini Simplicistâ, ut vocant, ad Tirheni maris littora instituerat, tres Croci verni differentias invenisse. Ex ijs elegantior, vel albicantes, vel purpurascens flores proferre, quorum exteriora terna folia crassiores quasdam venas purpurâ saturâ infectas haberent, quæ mirum flori decorem adderent. Reliquas duas majores esse, Croco sarivo non inferiore, & utrique florem purpureum: sed in una Colchici floris instar dilutum, in altera à

*Croc. vern.
latifol.
verficul.*

Croci



Croc.vern.latifol. flavo flore.



Croci legitimi flore parum diversum. Addebat, Iosephum admonuisse, aliud elegantissimum genus nasci in iisdem pratis circa Liburni portum, quod florem proferret saturatissimam purpuram nitentem, quem, utpote magis serotinum, conspiciere illi non licuisset.

Quinta est, quam Alphonsus Pantius paulo ante mortem mittebat, florem jam marcidum adhuc retinentem, & semen in triangulo capite maturum, ex quo mihi nate plantæ, quæ tertio anno flores proferre ceperunt: sunt verò ij superioribus ampliores, ad Tertiam speciei florum magnitudinē proximè accedentes, sex etiam folijs præditi, quorū externa tria foris ex candido quodam modo purpurascunt, & saturatissimæ, quasi quæ atre purpuræ tribus vel etiam quinque lineis ab infima parte sursum ascendētibus insignita sunt, internæ purpurascunt, interiora verò tria, vel dilutioris, vel saturationis purpurei sunt coloris, circa ungues tamen, similibus, ut exteriora, radijs insignita: semē in triagulis capitibus subtile: folia superioribus speciebus longiora & latiora, Tertiarum folijs non valde ab similia, duabus etiam albis lineis subtus distincta: radix paulo amplior: hujus florem etiam octonis folijs interdum luxuriantem habui, quatuor videlicet internis, totidem externis.

Croc. vern.
latifol. fl.
verfi. fl.

Sextæ, quaternæ aut plura folia sunt, ad Quintæ speciei folia valde accedentia, longiora tamen, & circa exortum latiora, binis candidis venis secundum medium nervum per longitudinem excurrentibus, ut in reliquis Croci speciebus, quæ emergere incipientia, florem simul ostendunt, sex folijs, dum explicatus est, constantem, exterioribus mucronatis, internis panulolum orbiculatis, flavi coloris, utcunque odoratum, tria longiuscula latiuscula: stamina dilutius

Croc. vern.
latifol. fl.
verfi. fl.

dilutius flavescens intus continentem, & longiorem stilum summo fastigio in tria stamina divisum, sarivi et croci staminibus parè concolorem: cui succedit, ut in superiore Croci verni specie, membranacea triangulari capitulum, rotundo rufoq; semine plenum: radix cum superioris radice convenit, vel etiam major est, solida, aliquot candidantibus fibris, sessili parte donata, & aliquot tunicis obvoluta: binos plerumque, ternos, aut quaternos, vel etià plures profert flores: nulla enim Croci verni species hac liberalior in producendis floribus.

Croc. vern.
latifol. an-
teriore.

Ejus alia est species, cujus folia paullo breviora, inferiote tamen parte latiora, illius qui nunc fert florem folijs parè æqualia, flus magis apertus, sex etiam folijs constar altero brevioribus, ferè orbiculato mucrone, coloris prorsus aurei, tria stamina umbilicum occupantia breviora latioraque, stilus alteri similis, summâ parte interdù in quatuor staminula divisus, alterius stilo concolor: florebat mihi anno M. D. XXXI. & sequentibus duobus, paullo maturius flavo, & multos etiam dabat flores.

Croc. vern.
latifol. pal-
lidiore.

Sed & tertia ejus species folia non minùs lata habet, floresque sex folijs magis mucronatis constantes, coloris omnino pallidi, viridibus venulis exteriorum foliorum unguis foris distinguentibus: ceteræ notæ conveniunt.

Omnes hæc trii differentias mihi corrumpebat rigida illa hiems anni octogesi sexti, supra millesimum & quingentesimum, & plures quàm sexagenos bulbos juniores earum semine natos, præter tres aut quatuor qui flavi genus conservarunt.

Croc. vern. latifol. r-v. flore.

Croc. vern. latifol. r-v. flore duplici.



Croc. vern.
latifol. floru
varieg. 1.

Septima, quinque aut sex habet folia, tenuia instar ferè legitimi croci, infima parte ex purpurea nigricantia, è quorù medio unum aut alterum florem promit aurei ferè coloris, legitimi croci odorem nonnihil referentem, sex etiam folijs còstantem ut reliqua croci genera, quorum exteriore tria paullo angustiora, & magis mucronata, tribus crassiusculis radijs ex atro purpurascens ab imo ad summum, secundum folij longitudinè excurrentibus, & multas interdum venas in latera spargentibus, insignita, terna interiora latiora sunt, & unguis habent foris etiam ex atro purpurascens, pediculum qui florem sustinet, totidem purpurei coloris saturi radijs notatum, quot sunt in flore folia: umbilicum occupant tria flava stamina, inter quæ stilus eminet extremâ parte trifidus, aurei coloris: floricibus succedunt crassiuscula trigona capita, aded saturo purpureo colore infecta, ut atra videantur & splendentia, quæ maturitate biscentia, semen continere conspiciuntur superiori æquale, & magis rufum: radix bulbacea ut in superiocius, sed præter illorum morem multiplici reticulatoque cortice obducta, & multis tenuibus fibris sessili parte, per reticulati corticis maculas se exerentibus, prædicta, præ adnatos bulbos proferens.

Croc. vern.
latifol. floru
varieg. 1.

Illius alia est species, quæ, nec radice, nec folijs, neque flore differt, exceptis radijs, qui aded

latè

late sese spargunt, ut præter oras, totum externorum trium foliorum dorsum inficiant, pediculus etiam florem sustinens, totus ex purpura nigricante splendeat. Vtraque species aliquoties mihi florem dedit duodecim folijs constantem, sex internis aurei coloris, sex externis, purpureis radijs insignitis, deinde Sexagona capitula: interdum etiam gemellos uni pediculo inhærentes, quibus etiam gemella capita, utraque semine plena.

Florent omnes hæc differentie: incunte Vere, aluz alijs maturis, Martio, & Aprilis initio: Tempus nulla autem diutius (ob numerum florum subinde nascentium) eâ quæ flavum tect florem, quæ minium etiam liberalissimè semen præbet.

Quæ atuos priorum locum natalem jam dixi, & omnes in hortos transfata, domesticæ factæ Natalis, sunt, t & Quinta quam semine natam dixi, & binæ alię sequentes. Quarum Sexta primum Germaniæ innotuit post annum M. D. LXXIX. Stephanus van Haulen Norbergenfis diligentia, qui ejus anni initio Constantinopoli rediens in comitatu Generosi V. Vltichi à Kunglperg (qui præcedente anno honorarium eò tulerat) in Servia, sive Mœsia superiore, sub Belgrado florentem eruit Martio mense, & paullo post, sub Buda, Fridlarium, cujus supramemini florem observavit. Crocum polica & alij, ante à me admoniti, videntur, justinè Viennam redeuntes, in Thraciâ, non modò flavo flore, sed etiam albo, & subcæruleo: ad eò autem negligentes fuerunt, ut non eruerint, causam prætexentes quòd illis non licuisset, quia properantibus, & iter ad arbitrium Turcarum (qui duces itineris adhibiti) instituentibus Legatis, non sit tutum ex thesâ, sive ciso descendere, illis in locis, ob Plagiariorum & latronum metum. Flavæ autem varietatæ pauci bulbi allati anno M. D. LXXVI. Octobri mense, ipsi, ad eò marcidit & exsuccit, ut verno tempore erutos appareret: nam & flores & folia adhuc retinebant, empti quæ fuerant in toto Constantinopoli. Unus aut alter eorum quos redemeram, & terræ commiseram, podierunt sequente Vere, unicum dumtaxat folium proferentes: & anno demum M. D. XC. & sequentibus, flores quos descripsi mihi tulerunt Francofurti ad Mœnum, & Lugduni apud Batavos.

Croc. vern. angustifol. r.



Croc. vern. angustifol. II.



ANGUSTIFOLIÏ porro species Prior, terna, quaterna, aut plura habet folia, longa, viridia, Crocinis longè angustiora, gracilioraque, rotunda & capillaria ferè, inter quæ prodeunt bini aut terni caulesculi, unciales ut plurimum, angulosi, sustinentes flores sex folijs constantes, ut reliquæ species, imò parte flavescens, intus nonnihil candicantibus, reliquæ ad cæruleum tendentibus, sive violaceis (inveniuntur & toti candidi) odoratos, quibus insunt staminula: his succedunt folliculi, sive capitella trigona, exile semen fulvescens continentia: radix exigua avellanæ magnitudine, duro spadiceoque cortice sive putamine tecta, intus alba, firma, subadstringente gustu.

Alteram, folijs & radice externo cortice illi omnino similem in Beturiz collibus Lusitaniz finitimis observabam, paullo minore flore, ex albo purpureo, vix quæ è terrâ prominente, atque unum bulbum eruebam florem habetum è foliolis octo compositum, quatuor externis paullo majoribus: radix erat gemina, candida, una super alteram insidens, quarum superior firma, dulcis & edulis erat, inferior flaccida.

Croc. vern. angustifol. violaceo flor.

Croc. vernum
angustif. 111.

H. a. a.

Croc. vernum
angustifol.
111. 11.

Vberioribus & crassioribus est Tertia folijs, isq; interdum luteo- & s: flos duarum precedentiu flore longe minor, torusq; caruleus, tribus exterioribus folijs exceptis, quz foris viret & e colore nonnihil aspera sunt. hujus radix priori forma similis, paullo tamen major est, semen etiam crassiusculum.

Frequens invenitur Gad. b^o Prior, atque inter Alindum (vulgo *Medina fidentia*) & Calpen, locus salebrosus & apricus. Tertiam duntaxat Gadibus juxta priorem inveniebam Februarij initio: Secundam Januario.

Ceterum anno m. d. xc. Autumno ad me mittebat diligentissimus vir Iosephus de casa bona Serⁿⁱ

Etruriz Ducis Simplificista, aliquot Croci verni angustifolij bulbulos, quorum nonnulli frequentibus annis verno tempore florem tulerunt. Erant vero illis terna aut quaterna juncea folia, Priori angustifolio Hispanico modò descritto similia, inter quz uncialis tenuis cauliculus prodibat, membranaceum folliculum sustinens, ex quo strobilulus emerit sex foliolis constans purpurei satuti coloris, quibus unguis albis venis distincti, & stilus ex umbilico prodians: fugax admodum fuit hic flos, utpote qui unico duntaxat die apertus manserit: radix Hispanici angustifolij radici par, multis tunicis, sive corticibus duris recta.

H. m. m.

NONnulli Primum genus, Crocum vernum, ob foliorum & floris cum legitimo Croco similitudinem, vocant: Græcè δὲ κρόκος ἰσπανός dici posset: alij Crocum montanum appellare malunt (aliud tamen montanum Crocum proximo capite dabimus) Turcæ *Zafferan* vocant Crocum, & voces addunt *ak, mer, sari*, quum album, violaceum, flavum colorem exprimerent volunt. Alterum etiam genus, Croci verni nomen obtinuit à floribus alio formâ, tametsi Croci folia non habeat, sed tenuia, & planè capillacea. Nomen vulgare Lusitanis Galecie vicinis, apud quos etiam nasci quidam illius regionis incolæ asserebant, *Nosella pequeña*, id est, Avelanæ parvæ. Secunda species incolis *Cibulista*, hoc est, parva cepa dicitur, quo ferè nomine Hispani minores omnes bulbos nuncupare solent. Prior species Angulariaz observata fuisse videtur, & Crocum silvestre angustifolium ab eo vocari.

H. m. m.
Op. m.
C. m.

H. m. m.

Theophrastus Hist. Plant. lib. vi. cap. vii. Leucoium inter eas stirpes quæ verno tempore florent, reponit: sequente verò libro, bulbosa radice constare ait, illique adjungit Bolbinam, Opitionem, & Cyceum: quid si postremarum harum duarum alterum nomen, Croco verno tenuifoliorum tribuatur?

PORRO latifolij generis radice quidam foris utendum censent, illamque pubi, uninas crebras atque crassas elicere, tumores hydropicorum discutere, & spicula evellere. Angustifolij nullas facultates cuiquam exploratas intellexi.

CETRYM sæpius miratus sum, nec in Austriacis, nec in Stiriacis, neque etiam in Pan- nonicis montibus, ullum Croci verno tempore florentis genus invenisse, tametsi diligenter perlustarim: quum Helvetici Alpes, illis etiam frigidiores, aliquot ejus genera sponte alant.

CROCVM MONTANVM.

CAP. XLIII.

Croc. mont.

TRIA Croci montani genera mihi sunt cognita: unum, in Lusitanâ observatum: altum, Bruxellis acceptum: tertium, in Thraciâ narum, & Constantinopoli allatum.

Croc. mont.

PRIMUM, flore est larvi Croci, sed dilutiore & minore, tribus intrus croccis staminibus, & stilo luteo summâ parte in aliquot staminula diviso: folia illi quaterna Crocinis similia, breviora tamen, in inferiore parte, lineam quandam candicantem secundum longitudinem, exteriori verò, bonas tanquam canaliculos seu sulcos utrinque secundum nervum excurrentes habentia: radix minor quàm in sarivo, candida, plena, & veluti internodijs distincta, quia (quod omnibus alijs Croci generibus, gladiolis, & silyrinchio etiam accidit) planta florente, superior radici pars augetur, inferior autem flaccescit & minuitur, utraque tamen denso quodam cortice è multis villis contexto involuta & recta, & nubibusque fibris per corticem se exerentibus, sessili parte donata: subdulcis porro illa est initio, deinde ingrati saporis.

Croc. mont.
111. 11.

ALTERVM, illi ferè simile, florem sine folijs promit Septembri, unciali aut longiore pediculo innitentem, satis odoratum, sex aequalibus folijs orbiculato mucrone præditis, & furarioris purpurei coloris pæneque violacii, constantem, tribus ex umbilico prodeuntibus flavis staminibus, & stilo extremum mucronem multitudine, crassiusculumque habente:

nullum



nullum adhuc semen mihi observare licuit: nec qui bulbum mittebat, ullam ejus mentionem in epistola faciebat. radix Prioris radici valde similis, cōrtice ē multis villis contexto involuta, oblongos interdum nucleos satis procul à matre spargens.

TERTII flos inodorus etiam est, vel tenuis admodum & evanidi odoris, senis, ut reliqua croci genera, folijs, quorum interiora terna paullo breviora sunt, omnia autem orbiculari mucrone, albicantis initio coloris, sed in quo deinde, temporis successu, dilutius quidpiam cæruleum perfusum videatur: stamina ex umbilico prodeunt terna, flava, & in medio stilus, five penicillus in tria vel plura staminula divisus, flavi etiam coloris: flaccescente vel jam marcido flore, quina, sena, raro plura emergunt in ambitu folia ex renui membrana quæ florem initio obvolverat, Croci verni latifolij folijs pænè similia, hoc est, paullo latiora quàm sativi, albâ lineâ singula folia per longitudinem supinâ parte distinguente, & pronâ brevius: semen hæcenus nullum observavi, licet multis annis aluerim: radix digitalis, vel enam pollicaris est crassitudinis, orbiculata ferè, alba, solida, tunica spadicei coloris obducta, multis albis fibris sub eâ nascentibus prædita, quæ florum satis ferax est: nam & ternos, & quaternos, interdum etiam quinos profert flores.

Nascitur Primum in nonnullis Lusitaniz rupibus, præsertim ijs quæ non procul à mari absunt, ubi Novembri observabam, & cum suo flore cruebam, anno sexagesimo quarto supra millesimum & quingentesimum, & amicis in Belgium mittebam. Illic etiam Septembri floruit, Vienne Aultrix & Francofurti ad Mœnum, Octobri, interdum maturius: Maio tulit crassa, angulosa capita, semine plena, quale Croci verni latifolij Quartæ speciei semen est.

Theophrastus lib. vi. Hist. Plant. cap. vii. *κρόκον ὀρνίθινον* appellat, Latini Crocum montanum & silvestre. Lusitani *Pie de borra*, id est, pedem asinum (quâ de causâ nescio) vocabantur.

Alterum Croci silvestris appellatione ad me mittebat Nobilis, idemque doctissimus vir Ioannes Bosot, vetere amicitia mihi conjunctus, Francofurtum anno M.D.XCI.

Misum est Tertium Byzantio anno Millesimo Quingentesimo octogesimo septimo, Octobri mense, *Zaffran maly*, hoc est, Croci cærulei, nomine, quod tamen, ut ante dixi, prolius cæruleo non esse flore, idem mensis declaravit: nam octiduo post quàm terræ commisitsem, flores proferte cepit.

IRIS BULBOSA.

CAP. XLIIII.

Aliquot Plantas in Hispanica mea peregrinatione observabam, quæ licet flore Iris & Xyridis essent, erutas tamen, bulbacea radice esse deprehendebam, quæ ratio me movit, ut priores Iridis bulbosæ nomine donarem. De illis igitur, & alijs earum semine postea

postea natis, in quarum flore magna colorum varietas conspicitur, hoc capite agemus: altero autem proxime sequente, de ijs quæ florem Xytidi magis similem habent.

Iris bulbosa latifolia. sive 1.

Iris bulbosa violac. flo. sive 11.



Iris bulbosa latifolia.

PRIOR, fœna, ut plurimum, habet folia longiuscula & latiuscula, Heme-ocallidis Dodonæi, sive Lili-alphodeli folijs ferè similia, breviora tamen, alternatim invicem amplectètia, mollia, in tetram prona, supernè ex viridi pallentia, infernè verò incana: è quorum medio flos exilit, è membranaceo involucri, unicus, o foratus, cæruleus (interdum lactei candoris) novem foliolis constans, Iridis figura, quo marcescente, utrinque alij singulares succedūt. Nullus est illi caulis, sed flos longo duntaxat pediculo insidet, ut in Croco: radix bulbosa, candida, avellanæ instar dulcis (nam degustabam) multiplici cortice nigricante involuta, cui (præsertim dum floret) aliquor, præter fibras, crassæ, longæ radiculae subnascuntur, ut in Hyacinthi radicibus interdum fieri solet.

Notabo.

Invenitur in Lusitaniz Bæticæque collium radicibus, non procul ab Anà flumine sitis, & copiosè circa Antequeram & Cordubam. In Lusitania porò Ianuario, in Bætica autem Februario florentem observabam & eruebam: apud Belgas delata (Corduba enim ad amicos Belgas aliquot bulbos mittebam) nondum flores dederat, quum octennio post inde discessi, ad Cæsarem Maximilianum II. profecturus, ideoque nullum semen observare potui: in illis tamen, quas in Hispaniâ eruebam, stirpibus, inferiorem partem pediculi, qui primum florem sustinuerat, & inter folia reconditam, in rudimentum longi triangularis capituli desinere conspiciebam, multa candida granula continenti: quo argumento adducor, semen Aprilis aut Maiomaturum ite esse posse.

Iris bulbosa 11: flor. violac. lat. a.

CRASSIORE est Altera folio, ac veluti cepaceo, viridiore, parte interiore catinato sive striato, multisque quasi bulbis argenteis resperso: crasso firmoque caule, quem quaterna aut quinq; folia amplectuntur: binos ex vaginulis, ut plurimum, promit flores invicem succedentes, interdum unicum duntaxat, novem folijs constantem, violacei prorsus & elegantissimi coloris, interdum dilutionis, inodorum tamen, quorum tria majora sunt, ad terram inclinata & prona ut in vulgari Iride, & laborum instar propendunt, tria alia angusta & extima parte bifida alataque ijs incumbunt, usque ad luteam maculam (quæ majoribus pro fimbria est) pertingentia, tria alia surrecta, supermaque parte latiuscula, infima verò valde angusta: floribus succedunt trigona laxaque capita, quibus semen rugosum, fulvescens, crvi magnitudine, quod maturum, in capitibus crepitat, si moveantur: radix magna, plurimis membranæ tenacibus, nigricantibus circumvoluta, intus alba, & sessili parte fibris prædita, quæ singulis annis nucleos circa latera deponit. Hujus folia novo Vere de muni germinant.

Quia

Quia C. V. Mathias de Lobel medicus, de re herbaria optimè meritis, hanc Iridem primus Belgis communicaverat, missis ex Anglia aliquot ad amico: bulbis, sponte istic nasci existimabam, & in Angliam profectus anno Septuagesimo primo supra Milleimum & quingentesimum, frustra in agris & collibus requirebam, donec Bristolium quum venissem, ubi Lobelium conveniebam, ab eo intelligerem, istic primum illi innoverisse, ex hortis, in quibus colebatur, erutam, unde Londinò amicis misisset. Verisimile est, Hispanicis navibus quæ plerumque Bristolium commeabant, primum istuc ex Hispaniâ aut Lusitaniâ delatam.

Iris bulbosa III. sive *versicolor*.



TERTIÆ, quinque aut sex sunt folia angusta & tenuia, cubitalis longitudinis, internâ parte striata & candida: rina, externa autem rugosa, vitidis cum cinereo commixti coloris, caulem amplexantia cubitalem, interdum etiam majorem, nodosum, unicum plerumque florem, raro binos, è membranaceis vaginulis proferentem, Iridis angustifoliz floribus forma similem, cujus tria latiora & ad tetram inflexa folia, extrema parte ampliora sunt, & candidantia, luteaque macula insignita, ea videlicet parte, qua folia his incumbantia, & ligulam occultentia, bifidaque, & in parvas alas reflexa, desinunt, illaque subcæreulei ex candido coloris: reliqua tria erecta sunt, oblonga, & dilutius ex cæreuleo purpurascantia: totus flos jucundo spirat odore, præmansis coriandri obducti saccharo, sive præparati instat. Flori succedit longum triagulum caput, altero gracilius, neque laxum, semen angulosum, subrotundum, continens. Radix bulbosa, candida, subdulcis, spadicis aliquot membranis involuta, minor superioris radicis, & illâ liberalius nucleos producens, quibus facillimè feri potest.

Est verò hæc vel brevioris latiorisque flore, & illo dilutior, aut saturatior, maculâ etiam illâ in propendentibus laborum instar folijs brevior, vel angustior & longior: ac labris illis similiter dilutioribus aut saturatioribus, illisque interdum adeo saturis ut violacis appareat.

nihilque in illis albi conspicitur, sed cæreuleis duntaxat color amibens flavam illam maculam, quæ in hoc genere longior ut plurimum esse solet. Rursum quæ latior est flore, plerumque liberalior est angustiflorâ in binis floribus producendis, brevioris quæ siliquam, sive trigonum caput, & æqualis ubique crassitudinis habet: angustifloræ autem longior est, & infimâ parte gracilior siliqua. Item latioræ radix, brevior & crassior est: alterius, longior & gracilior. Istam autem varietatem, ratione conciliatam esse, non dubium est.

Pinciz, quæ vulgo *Falsadelid* nuncupatur, Hispaniæ urbe, primum data mihi fuit hæc planta à Ioanne loigny viro optimo & humanissimo, natione Gallo & istic Architecto, qui hortulum peregrinis stirpibus satis instructum ponè xedes habebat, à quo, nonnulli Castelli collibus sponte nasci intelligebam. Floret in hortis Junio cum Gladiolo, aut paulò maturius: semen sub extremum Iulium & Augusto maturum est.

Quod porro in hoc flore & quibusdam alijs mihi contigerit anno Nonagesimo secundo supra millefimum & quingentesimum, hoc loco adscribendû existimavi. Is enim, ut propter magnam humiditatem à frequentibus imbribus, fetax fuit proferendis amplioribus foliis floribus, eorumque nonnullis geminato foliorum numero: ita multas stirpes, quæ singulati caule, eoque non ramoso ut plurimum esse solent, *παραλάνθες* reddidit. Nam habui Tuliparum plantas, quæ vel unico, vel binis, ternis, quaternis, etiam quinis tamis (singulis suum florem sustentibus, ut capite de Tulipa diximus) caulem præditum tulerunt: multas Xyphij stirpes, quæ unico, aliquot quæ binis quatuor vel quinque floribus ornatis: plurimas Iridis bulbosæ quæ binis vel ternis, binas quæ quaternis floribus fuerunt onustæ. Summo enim caulis fastigio innati bini ex iisdem vaginis emet gentes, quemadmodum in Secundo genere solent, alter alteri succedentes, in nonnullis etiam tertius: Aliæ, præsertim versicolores latioræ saturatioræ, præter geminos illos flores in summo caule natos, ex singulari vaginâ infra illos sitâ, & altera sequente, singulares produxerunt ramulos, teretes, geniculatos, (sustinentes binas vaginas, è quibus emerferunt singulares flores (ut in subiecta icone videre licet) primarijs non minis elegantes, & perinde odorati. Habui etiam anno xcvi. multas Iridis bulbosæ plantas, quæ quaternos flores tulerunt.

Multos

Arvus M D XCII. modifera.

Iris bulbosa versicolor variata.

Iris bulbosa, versicolor *αἰωδιανός*.

Iris bulbosa flavo flo. five v.



Tulipa bulbosa.

Iris bulbosa
versicolor
lata.

Varietas.

Natalis.

Iris bulbosa
versicolor
lata.

Natalis.

Multos etiam dedit is annus Tuliparum bulbos in infima ala (quod succi & humoris abundantia tribuo) nascentes.

QUARTA, jam dicta Tertiz per omnia ferè similis, brevior tamen est caule, gracilioribusque & ex viridi pallentibus folijs: flos unicus, interdum bini, constatiore, latiores tamen, ex vaginulis summo cauli inhaerentibus prodeunt, lutei coloris, inodori, mediae inter secundum & tertium genus magnitudinis, quemadmodum & siliqua, seu caput trigonum, in quo semen superiori simile continetur: radix tertij generis radici similis, quæ nucleis, non secus ac illa, propagatur.

Sed hæc in flore quandam etiam differentiam habet, licet exigua: nam invenitur latior aliquantulum, saturatioreque & magis rutilante auteo colore, radice item brevior & crassiore, membranacea præterea illa vagina, unde primum folia emergunt, sanguineo colore, à summis vaginæ oris in inferiorem illius partem radiatim desinente, magis infecta est, quàm illius, quæ dilutior est flavo colore; nam illa interdum sanguineo hoc colore caret. Vtriusque autem, quemadmodum & Tertiz, folia ante hiemem germinare solent.

Nascentur pingui solo, & petrosis collibus ad Tagum sitis supra Olyssiponem, ubi cæ eruebam Decembri anno M. D. C. X. III. cum aliquot alijs rarissimis stirpibus, & inde ad amicos in Belgium mittebam. Floret paullo maturius Tertio genere, eodem ferè quo secundum tempore: brevi tamen se mutuo consequuntur, & interdum simul florere conspiciuntur.

QUINTA mihi primum conspecta est Lugduni Batavorum anno supra millesimum & quingentesimum, nonagesimo quarto. Nihil verò ea differt caule, folijs, & forma floris, ab Iride bulbosa, cujus flores versicolores, folijs floris color diversus est. Nam novem, ut ille, folijs constat, quorum terna inflexa & terram spectantia, cæruleum habent colorem, venis saturationibus à medio folio in latera excurrentibus distinctum, & ab illo ad unguem usque, maculam flavam faris laram, medium folium per longitudinem secantem. terna illis incumbentia & gibbosa ejusdem etiam sunt coloris, paullo tamen dilutioris: tria surrecta folia magis saturata, odor parvè florum Tiliz: binos autem, ternosve in eodem caule fert flores, qui reliquarum Iridum bulbosarum floribus magis sunt serotini, ipsque marcidis demum aperuntur sub initium Julij. Floribus succedunt triangula oblonga capita, ut in versicolore Iride bulbosa.

E Lusitania porrò hoc Iridis bulbosæ genus, paucos ante annos, primum in Belgicam delatum fertur.

Sequente autem anno, è tribus bulbis ab amico acceptis, unus flos longe elegantiorum jam descripto tulit, amphoribus labris nempe constantem, ut bulbij folijs surrectis latioribus, gibbis

Irid. bulbosæ v. semen.



rem notam habent, quoddam milvinorum uogium inllar contrahantur: quod etiam aliorum Iridis generum floribus evenit.

CATERVM sunt & aliz Iridis bulbosæ species, non ex quidem aliunde inuestig, sed semine apud Belgas naxæ, quarum historia prætermittenda non videtur, eam ob causam, superioribus adiiciendæ esse existimavi.

PRIMA igitur Vericoloris quoddam genus est, à superioribus diversum, non folijs, caule, aut radice, his enim cum Tertio aut Quarto genere convenit, sed floris colore: quia tria ejus folia ad terram inclinata, sive labra, flava sunt, & Quarti generis propendentibus labiorum inllar ferè similia, magnâ tamen aurâ maculâ in prominente & reflexo labro insignita, ad quam ab infimo folij ungue intrinsecus excurrunt aliquot venæ quodammodo purpurascences, tria autem gibba & illis incumbientia, dorso & alis pallent, lateribus candicant, tria verò sursum erecta, ex albo subcerulea sunt, hoc est, albicantis sunt coloris, quem subceruleæ saturatiores vel dilutiores venæ distinguunt.

ALTERAVS terna inflexa folia pallent, & labrum habent flava maculâ insignitum, à qua ad unguem usque angustiora sunt, ut in ceteris generibus, & internè quibusdam venulis purpurascensibus distincta sunt, tria gibba folia ligulam tegentia *αγχαλίαν* sunt coloris, vel albicant, summo tamen gibbo pallescens; terna surrecta exalbida sunt, nervus tamen per longitudinem excurrès flavescit. Vtriusque flores odorati, Tertij generis supra descripti florum inllar: radix etiam non minus quàm in illo forcunda producendæ nucleis.

Illas habui munere Ioannis Boissot anno M. D. XCVI. quadriennio verò post, tres alias communicabat, quæ infrequente anno hos flores protulerunt.

PRIOA, quæ citillius Tertium genus ab ipso acceptum, latiore, brevioræque fuit flore, ejus terna inflexa folia, lato & propendente sunt labro, mediâ aurâ maculâ (quam albus orbis ambit) insignito, per oras crispo, cerulei coloris, à maculâ autem usque ad unguem folia, extenditur nervus extrinsecus virefcens, intrinsecus pallidus, multis purpureis venis in latera excurrentibus, tria gibba alataque folia purpurascens sunt coloris, gibbus albicans, alæ ceruleæ, tria sursum erecta folia, ex ceruleo purpurascunt.

ALTERA, sive ejus Quarta, florem habuit, ejus terna folia terram spectantia, flavi sunt coloris, aurâ maculâ labrum occupante, à qua ad infimos ungues, interiore parte iparè sunt quædam venæ dilutius purpurascences, folia ijs incumbientia exalbida sunt, præter medium nervum ad extremum folium excurrentem & gibbum qui pallidi sunt coloris, surrecta terna folia, infimâ parte ex ceruleo purpurascensibus venis sunt distincta, supernâ candicant.

TERTIA,

gibbis etiam amplioribus, totumque adeo florem multo saturatior purpurâ nitentem, & magis expansum, idem tamen qui in altero odori caulis præterea circum nodos quibus folia inllarebant, ex purpurâ nigricabat.

PRIOA, latifoliæ cognomen dedi, à foliorum, *Nemian*, præ reliquis, amplitudine, & ceruleæ sive purpureæ, à floris colore: Hispani, vel *Larto* simpliciter, vel *Lirio spadalal*, Cordubenses, *Lirios azules*, appellant, hoc est, Lirium, Linum ensiformem, & Lirium ceruleum. Alteram, violaceam cognominavi, Lobelius cum Pena Hyacinthum Poëtarum esse censet, vulgare hujus nomen nullum scio. Terciam angustifoliâ versicolorem sive variam nominavi; Hispani *Liris idryca* appellabant. Quartæ à floris colore, Flavæ, sive Luteæ cognomen indidit: Lusitani, *Replabey*, vocabat. Quintæ, quum mihi sponte nascès non sit observata, nullum nomen vulgare intellexi: sed qui hortorum culturâ delectantur Batavi, Lusitanicæ cognomen dederant. De illarum autem viribus & facultatibus, nihil compertum habeo, aut ab alijs traditum accepi.

Omnium porro istarum floribus, illius præsertim quæ vario est flore (quia, ut opinor rosicidum quendam succum in lateribus exsudant) formicæ mirum in modum sunt infestæ. Præterea omnium istarum, tam illarum quarum mentionem fecimus, quàm subsequentiū flores marcescere jam incipientes, hanc peculiarem compertum habeo, aut ab alijs traditum accepi.

*Iridis bulbosæ
versicoloris,
classis II.*

I.

II.

III.


IIII.

- V. **TERTIAE**, sive Boiſoti Quintæ flori, terna ineurva ſive inflexa folia, prorfus lactei candoris fuerunt, præter maculam illam medio labro impreſſam, quæ aurei coloris erat: gibba præterea folia illis incumbentia, alba fuerunt, ut & terna erecta, exceptâ illâ infimâ parte citæa ungues, quæ tenuè quidpiam ſubæruleum habere viſa eſt. Odorati etiam hi flores erant.

Ex cujus generis ſemine nacti ſunt hæc varietates, nihil ad me perſcriptum, nec forſitan quidpiam tam exactè obſervavit: odor tamen qualis in Verſicolore illâ, in Tertiæ genere ſuprà deſcriptâ, me in ſuſpicionem adducit, ex illo originem ſumpſiſſe.

Iris bulbofa F-V h.c. i. claffis tertiz.

Iris bulbosa
varia claffis
111.



- III. **TERTIAE** F-V. floris forma eadem, & terna illa folia flavi coloris, auræâ maculâ inſignuntur, quâ verò parte bifidis & gibboſis illis folijs integuntur, radijs obſoletè purpuraſcentibus diſtincta ſunt: ſurrecta terna folia ex cæruleo purpuraſcunt, medius autem per longitudinem excurrrens nervus, flavefcens eſt coloris: & tria alijs incumbentia, obſoleti, cui flavi quidpiam permixtum eſt.

- IIII. **F-V. Quarta**, etiam latiflora, terna inflexa folia pallida habet, auræâ maculâ inſignita, quâ autem parte camerato folio integuntur, purpuraſcentibus venis ſunt diſtincta: gibba folia, etiam purpuraſcunt. tria verò erectiora folia, cæruleum habent colorem.

- V. **QUINTA** F-V, quæ anguſtiſlora eſt, tria ad terram ſpectantia folia, flava ſunt, auræâ etiam maculâ medio labro inſignita; & incumbentia illiſ folia candicant, nervus tamen eminentior, quodammodo *εὐχέλαιος*: ſurſum aſſurgentia folia exalbida ſunt, imâ parte ſubæruleis quibuſdam venis leviter diſtincta.

- VI. **SEXTA** F-V, etiam anguſtiſlora, & humilior, non valde abſimilem matri, hoc eſt, Primæ à Boiſoti miſſæ, habuit florem: ſed quibuſdam notis ſecundè ab ipſo acceptæ reſpondentem, ut media quædam ſpecies inter utramque cenſeri poſſit.

- VII. **LATIFLORA** eſt, & elatior Septima F-V, cujus inflexa folia habent latiora labra, flavi coloris, auræâ maculâ inſignita, quâ verò parte gibbis folijs integuntur, ad unguem uſque interius ex cæruleo purpuraſcunt: gibba & alata folia etiam purpuraſcentis ſunt coloris, gibbo tamen dilutiore: ſurrecta folia latiuſcula ſunt, & illis magis purpuraſcunt, cæruleiſque quidpiam admixtum habere videntur.

- VIII. **HUMILIOR**, latiflora tamen, eſt Oſtava F-V, cui terna terram ſpectantia folia flava ſunt, auræâ maculâ majuſculâ notata, internâ parte quæ cameratis bifidisque folijs tegitur, purpuraſcentibus radijs in latera excurrentibus diſtincta: gibba enſitataque folia, purpurei cæruleo commixti ſunt coloris, ipſo gibbo ex purpura flavefcente: erectiora folia, cærulei purpuræ permixti ſunt coloris.

ANGUSTI-

ANGUSTIFLORA, sed humilior etiam, est Nona F-V. cuius trium foliorum terram spectantium labra longiora sunt & pallida, orisque aliquantulum purpureiscentibus, macula aurea longiore insignita, reliqua parte bifidis folijs tecta, interne purpurascente, præter mediū nervum qui aurei est coloris, foris ex viridi pallescentis: gibba cum suis alis cristatis folia, purpurea, gibbus paullo dilutior: surrecta terna folia, purpurā saturatiore nitent.

DECIMA, ejusdem scilicet altitudinis est cum superiore, ejusque terna folia ad terram prona, pallescente sunt labro, brevis flavā maculā in longos radios delincente insecto, angustior folij pars foris virescens, interne viridibus venis prædita: alata & bifida folia, exalbida sunt, ad apicem colore m tendentia, gibbus pallescentis: terna folia quæ sursum attolluntur, alba sunt, medio nervo circa unguem pallescente.

VNDECIMA, eadem quidem forma, sed dissimilis prorsus color: nam terna inflexa folia alba sunt, flavā ramen maculā insignita: gibba his incumben tia, purpurea sunt: terna sursum erecta purpurei, seu violacei sunt coloris: breviter non multum assimilis est Angustifloræ versicolori saturæ, in Prima classe.

MEDIA quodammodo inter Latifloram & Angustifloram est Duodecima, eaq; elatior, labristrium foliorum terram spectantium ex albo purpureiscentibus, aurā maculā notatis, quæ medium etiam folium per longitudinem secans, ad infimum usque ungum angustior procedit, ejus latera intensus saturationibus venis purpureis distincta: folia cristata & bifida illis incumben tia, diluti purpurei, & quasi ad rubedinem tendentes terna cubitis, gibbo paullo magis saturo: similis præne coloris sunt surrecta folia, eorum tamen ungues aliquantulum saturatiore.

Istarum potest omnium flores odorati sunt, & Tertij generis floribus versicoloribus, odoris gratia respondent.

Ex hæc quidem summa sunt differentie Iridum bulbosarum prædictarum, quæ mihi semine F-V. primæ Buisoti nate: alix tamen etiam nate, sed quarum colores proximè ad istarum colorem accedent: propterea, minimè huc inferendas putavi. Nam in tantā varietate, quis singularium discrimina commodè verbis exprimere queat? In flavæ autem & Purpureæ violacæ semine natis plantis, nullam hæcenus varietatem observavi, sed omnes matrem colorem retinuerunt, & illum quidem intensiorem vel remissiorem.

Illud præterea in istarum Iridum plantis semine natis observabam, plurimarum vaginam illam initio emergentem, & quæ, ut in primo descriptis exeunt folia, rubri sive sanguinei coloris radiis esse insecta, non secus, ac Quartij generis primæ speciei in prima Classi: vaginulam.

SEPTECIMUM tertium genus semine mihi narum, quod florem demum tulit anno supra millesimum & quingentesimum nonagesimo quarto, quadriennio videlicet postquam semen telluri creditum. Cubitali verò assurgit caule, nodoso & geniculato instar aliarum Iridum hujus generis, quem ambiunt longa & angusta folia, carinata ut in superioribus reliquis: summus caulis sustinet florem reliquis formā similem & novem folijs constantem, sed colore diversum: nam terna majora labro propendente prorsus cærulea sunt, tument maculā aurei coloris: à medio labro ad infimum folij ungum disciteta, his incumben tia, fornicataq; & alata folia, saturæ purpureæ colore sunt, ligulamque tegunt, terna surrecta, oblonga, angusta, saturā purpurā (cui rubedo levis à mixta) nitent: odor tenuis, nec ad eas quæ versicolore sunt flore suavitatem accedens: capirula trigona longaq; instar caprum versicoloris, quæ tamen nullum semen tulerunt: radix bulbosa ut reliquarum Iridum bulbosarum, pluresque velcos ad latera generans.

Floruit primo anno circiter quindecim dies ante illas quæ cæruleo & flavo sunt flore: alitero cum ipsæ, Junio videlicet.

Huic prorsus similem Hispani accipiebam anno M.D.XCVI. ab eruditissimo viro D. Simone de Tovar Hispanensi Medico, ut ex ejus flore quem insequentis anni Maio dedit, observare potui: an verò semine ipsi nata esset, aut aliunde missa, nihil adscribebat.

SUPERIORIBUS annis, ut ante dictum est, in Flavæ Iridis bulbosæ semine natis plantis nullam varietatem observaveram: at anno M.D.XCVI. cum in hac, tum alijs insignè varietatem habui. Nam anno nonagesimo tertio supra millesimum & quingentesimum scersim in diversis pulvis Flavæ, Albæ, F. versicoloris semina terre commisi sub finem Novembris; nate ex ijs plantæ nec loco mox, quarto post anno flores protulerunt; ex Flava quidē, aut flavos prorsus, aut flavos quorū surrecta folia aut pallebant aut exalbida erant, vel cærulea erant, vel fuliginè insecta cum fornicatis folijs, ex F. versicolore autem, flavos item quorum surrecta folia alba erant, vel initio labra habentes flava aurā maculā insignita, deinde flavus ille color maculam ambiens cæruleum colorem prorsus contraxit, folia fornicata & surrecta saturā purpurā nitebant, vel etiam alios illos per similes, quorum tamen flava labra oras auream maculam ambientes habuerunt virescen tis ex cæruleo coloris: & alios matris similes: ex Alba verò pallidos, surrecta folia alba aut exalbida habentes, aut ex cæruleo purpurea, aut matris prope modum similes. Quam varietatem producent reliquæ plantæ illis seminibus nate, indicabit dies.

IX.

X.

XI.

XII.

Semina varietatis in Iridis bulbosæ semine nate.

XIII.

Quædam varietas in Iridis bulbosæ semine nate.

IRIDIS bulbosæ proximè, sine controversâ, sublequi debet planta quædam flore Xyridis, minore tamen, & radice orbiculata, ut Xyphium, cujus duo genera in Hispanica peregrinatione à me observata.

Sisyrrinchium majus.

Sisyrrinchium minus.

Sisyrrinchium
majus.

VNUM oblongis angustisq; folijs, mollioribus quàm Iridis bulbosæ folia, & ad Allij aut Hyacinthi botryodis folia proximè accedentibus, striatis, viridibus, & humi plerumque suffis, rotundo, dodrantali, striato firmoq; caule, qui ex multis involucris tanquàm vaginulis flores promit quatuor aut quinque, alternatim prodeuntes, hoc est, ut primo marcescente alter succedat, deinde tertius, & sic deinceps, Xyridis potius florem referentes, quàm Iridis, ex novem foliolis compositos, quorum tria, ut in jam descriptis Iridibus bulbosis, deorsum inflexa, pro fimbriâ, luteam maculam etiam habent; alia tria sursum aliquantulum attolluntur tria verò reliqua, quæ in alijs ligulam tegere solent, surrecta, lummâ parte divisa & bifida. Est verò totus flos pulcher aspectu, coloris cærulei, præter maculas illas, & odore quidem præditus, sed valde fugaci: floribus succedunt folliculi, vaginis quibusdam cutaceis inclusi, adeò tenui membranâ constantes, ut semen rotundum, parvum subrufum, quod in illis continetur conspici possit: radix bulbosa, gemina, plantâ ipsâ florente, & altera alteri insidens Xiphij modo, superior plena, candida, dulcis, edulis, & pueris expetita, inferior flaccida (totam nimirum substantiam ad se trahente superiore, ut in Croco, Xiphio) & tandem evanescens cum inhaerentibus fibris: multiplici verò cortice reticulato, crasso, nigro integitur Xiphij radices instar, & adnatis sese propagat: nam quinas interdum, etiam senas, aut plures plantas, quarum singuli bulbi suo retiformi tegmine involuti erant, alio villosa capaciore quæ tegumento simul comprehensas erueri memini, in collum supra urbem Olyssipponem acclivitatibus, apud suburbanum Magnifici & Generosi viri Ferdinandi Cotinho, equitis Lusitani, multis peregrinationibus in exterâs regiones factis, clari atque etiam Gadibus, non procul à ponte, qui eam in sulam continenti nunc conjungit: unde ejus bulbos in Belgium ad amicos mirtetbam N. & C. V. Caroli Tifnac, concilij Belgici tunc in Hispania Præsidis, operâ: qui succellorem deinde habuit C. V. Ioachimum Hopperum.

Natalis.

Sisyrrinchium
minus.

ALTERVM genus superiori simile est, minus tamen, gracilioribusq; folijs: flores è vaginulis prodeuntes, colore superioris floribus similes, sed magis odorati; tenuiores etiam folliculi minore & exiliore semine pleni: radix item minor, non minus tamen, quàm superioris, reticulato cortice tecta, & gemina.

Natalis.

Crescit Valentino Hispaniæ regno, sed Murciano frequentissimum observabam, atque crucetbam,

eruebam, præsertim tribus leucis supra ejus regni metropolim, *Marcia* vulgo appellatam, quæ Veteribus *Margu* dicebatur, irinere Granatensi.

Florere urrumque genus Martio, natali solo: sed apud Belgas, Maio duntaxat, intermedium Junij initio, idque valde rarò, utpote quod æternis ut plurimum, annis duntaxat prodire soleat, imò paulatim plerumque contabescens, prorsus tandem sæpenumero pereat.

PRIMUM genus Lusitani *Nozelhai* (quasi nucas aut parvas nucas diceret) appellant, quia pueri istic ejus bulbo perinde atque avellanis, vescuntur, eumque in delictijs habent. Alterum incolis, *Liru*, nonnullis *Macneus* dicitur. Porro hæc planta ad eum bulbum plurimum accedere videtur, quem Theophrast lib. vii. Histor. Plantar. cap. xiii. *σικυρῶνος* appellat. Scribit enim peculiare Sisyrinchio esse, ut una radix primo augeatur hieme, tum in eunte Vere, quod in imo excreverit, contrahatur, supremumque crescat, quod manditur. Plinius verò cum sequutus, lib. Natural. Historiæ cap. v. Genera, inquit, Græci hæc fecere, Bulbinem, Setanion, Pythion, Acrocorion, Agilopa, Sisyrinchium: in hoc mirum, imas ejus radices crescere hieme: verno autem cum apparuerit viola, minui & contrahi, tum deinde bulbum pinguescere.

SECUNDVM genus, ad ventris tormina utile esse referebant incolæ: sed devorata radice, illico corpus saltatione esse exercendum.

QVO potissimum referrem hunc elegantem florem, diu fui dubius, sed & adhuc hæreo: nam ex mutila iconè, concinnoanda mihi fuit illius historia, nec certi quidpiam statuere licuit. Ne tamen locum non haberet, propter cognationem, quam cum Sisyrinchio habere, mea opinione, videtur, Sisyrinchij capiti addendum putavi. Si quis verò aliò pertinere censuerit, per me quidem semper licebit: pertinaciter enim mea opinione tueri, non est animus.

EST ergo hujus stirpis flos (cujus supremam caulis partem cum flore suis coloribus duntaxat expressam, anno nonagesimo quarto supra millesimum & quingentesimum, Pragâ accipiebam ab Esaiâ le Gillon, æneæ sororis filio) pulcherrimus, summo caulis facis gracili & virefcenti inanitis, & ex membranaceo involucrio, instar folliculorum, qui Iridum flores ambiunt, emergens, tribus tantum folijs (si picturæ fides est adhibenda) constans mucronatis, binas uncias longis, minimum digitorum laris, dorso elatiore, cærulei coloris adeò elegans, ut cum Gentianæ illæ cæruleis floribus contendere possit: in retinâ parte ramosa quadam flamina in multas tenues fibras secta continete videtur rufi coloris, apicibus verò albis: infra illam addita erat alterius floris gemma suo membranaceo folliculo etiam involuta.

Expressa autem fuerat hæc icon Constantinopoli à pictore industrio, de alterâ, quam pictor quidâ Persicus è Persia attulerat, ubi nasci, & *Lâlè* vocari assererat. Constantinopoli verò esse ignotam hanc plantam. *Lâlè* porro, Turcis florem significare, ante dicere memini.

IRIS. LATIFOLIA MAIOR.

CAP. XLVI.



IRIS ex earum stirpium est numero, in quibus summam varietatem observabam. In nullam enim provinciam peregrinationem institui, quin ejus aliquod genus antea mihi non conspectum invenerim, ut ex meis Hispanicarum & Pannonicarum stirpium historijs quæ seorsim sunt editæ, videre licuit, & etiam ex hac apparebit. Omnes autem in Latifolias, & Angustifolias dividimus: à Latifolij initium facturi, quas in duo capita distribuimus, priorè quidem majores, alterò minores & pumilas comprehendimus. Angustifolij deinde suum peculiare caput dabimus.

PRIMUM verò locum inter majores Latifolias ob floris amplitudinem & venustatem meritis sibi vendicare videtur, quæ sena aut octona habet folia Iridis Lusitanicæ bifloræ folijs non abimilia, mutuo sese ut in alijs Iridum generibus amplectentia: è quorum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rotundus, geniculatus, digitalis crassitudinis, florem sustentens omnium quos usquam in Iridibus conspexerim maximum, novem, ut reliquorum, folijs constantem, colore tamen ab illis differentem: nam tria ad terram inclinata folia, crassa sunt, interiore parte omnino nigra, nisi quedam venæ ex purpura candicantes intercurserint, ab infima basi ad medium usque nigris villis latè obdita, maculâ nigra, sericei villosi nigri panni instar, medium folium occupante, foris multò ditiora sunt: terna illa minora tunc incumbunt quæ ligulas

Tempus.

Nomen.

σικυρῶνος

Familia.

Iris Persica
Sisyrinchio
congenita.

Iridum sena
classis.

Iris minor
latifolia. s. Iris
Sisytana.

ligulas tegunt, fornicata & bifida sunt, & ejusdem fetè coloris, paullo tamen dilutioris, licet ad obscuram purpuram accedat: otistria surrecta, palmaris sunt amplitudinis, & membranaeae parè tenuitatis, plurimis lineis ab infima basi ad extremum usque folium excurrentibus, partim nigricantibus, partim ex cineraceo candicantibus, ut Americani pavonis expansionem caudam ferè imitentur, intetnè circa unguem nonnihil hirsuta. Nullum odorem in hoc flore deprehendi, sed solà coloris varietate, & raritate commendabilis est. Illi succedunt, sed raro admodum, capita trigona crassa, uncias tres, quatuor, & quinque interdum longa, numerosum semen rugosum, fuscum, pilis ferè instar magnum, continentia.

Natalis.

Constantinopoli primùm Viennà delata fuit hæc Iris ipsa brumà Ill. V. Augerio de Boufbecke p.m. Cæsaris olim, ad Turcarum Imperatorem, Legati munere septenni fundito, postea autem Ser^{ma} Elizabethæ Austriacæ Galliarum Reginarum viduæ felicis. m. summo Aulæ Præfecto, & Cæsari à Consilijs, anno M. D. LXXIII. cum recens eò advenissem, qui una radice me donabat, alias in Belgicam amicis mittebat. Subsequente anno similem attulit Mag^{us} V. Carolus Rym Dn. de Eeckbecke Cæsareus etiam Legatus ad Turc. Imp. Constantinopoli rediens cum affine Philiberto de Bruxella. Deinde quotquot aut Legati, vel Honorarij ferendi gratià Constantinopolim missi, Viennam redeunt, cum alijs exoticis stirpibus etiam attulerunt. Hiemis injurijs difficilis fert in horto reposita, reliquis Iridis generibus, ut ego & plerique alij nostro damno experti sumus. Rarius etiam ceteris floret, & unicum, ut plurimum, florem profert, Maior semen maturum Julij initio.

Iris Asiatica cærulea five latifol. m. r.

Iris major latifolia, five Asiatica cærulea.



SENA, septena, octonaque habet Altera folia, omnium Iridum amplissima & in latum expansa, viridis cui ærugo permixta videatur, coloris, mutuo se amplectentia, è quorum medio caulem promit sesquicubitalem, interdum etiam bicubitalem vel ampliorem, firmum, crassiores superiore, lævem, geniculatum, multisq; alis concavum, è quibus copiosi (nullam enim feraciorè conspexi) vaginulisq; inclusi prodeunt flores, magni, novem folijs constantes, quorum terna inflexa dilutè purpurascens atque ad cæruleum tendentis sunt coloris, multis purpurascens venis ab infima parte & stamineâ fimbriâ flava in longitudinem & latera excurrentibus: bifida folia exalbescent, gibbo tamen illorum dilutè purpurascens: tria quæ sese attollunt folia, angustiore & ima parte quibusdâ purpureis brevibus venis distincta sunt, ubi verò se in latum expandunt subcortuleum habent colorem, dilutiorè ad hæc quàm inflexa, & fl. xum Sambuci odorem, graviorem tamen, quodammodo æmulantur: ijs succedunt rariores siliquæ, five capita, crassa, magna, triangularia, & obtuso mucrone prædita, quæ maturitate deliscentia, semen continere deprehenduntur crassum, angulosum, durum, flavescens, superiori ferè par: radix crassa est, magna, nodosa, multis longis crassisque fibris donata, latetibus, ut reliquæ, se propagans, & si repurgata exsicce-

tur, odorata.

Constantinopoli mihi missa fuit ab Ill. V. Davide Vignad, Cæsareo tum apud Turc. Imp. Legato, nunc bellici Consilij Præfide. Floret etiam Maio.

Hi v. r. non valde absimilis est, quam ante multos annos, in Belgicam usque ad nos misit Doctiss. Alph. Pantius, nisi quòd flores, illi concoloris, (summo caulis fastigio magis confertos habere videtur, jucundissimo spectaculo: semen etiam in breviori capite minus, pallidum, angulosum, rugosum.

N. & c. illi dispars est folijs & radice, quam N. V. Ioannes ab Hoghelande Lugduno Batavorum ad me misit anno M. D. XC. Damascenæ nomine, ipsi semine natam. Cubitalè autem biennio post aut paullo majorem protulit illa caulem, in quo multi ut in Asiaticâ cærulea flores, totidem quot ea folijs nec minus amplius constantes, ejusdemq; penè coloris: terna tamen inflexa paullo dilutius purpurascere & ad cæruleum colorem tendere videntur, atque magis complicari: terna bifida & gibba villosa fimbriæ incumbens, angustiora & cinere quodammodo coloris: terna verò surrecta dilutioris cærulei sunt coloris, & latis interdum candican-

Iris major latifolia, five Asiatica cærulea.

Iris major latifolia, five Asiatica cærulea.



terna inflexa folia, licet illius folijs non sint disparia, oras ad flavum obsoletum accedentes habent, venasq; paullo dilutiores, terna sursum erecta obsoleti sunt coloris ex flavescente & purpurascente mixti, Versicoloreis, quam à Camerario accipiebam, folijs non ab similia, paullo tamen dilutiora, circa ungues etiam magis flavescencia, & teneuioribus purpureis venis notata, angusta alataque folia simili colore prædita, præter medium nervum qui magis purpurascit: odor etiam florum Sambuci æmulus.

*Iris latifol.
major xi.*

ILLI paria Tertium habet folia, inter quæ cubitalis ferè & superiori æqualis affurgit caulis, ternos aut quaternos è vaginis viridibus, oras purpurascences habentibus, ferens flores, quorum tria inflexa folia Decimæ quartæ non valde ab similia, longius tamen protectam habent fimbriam illam villis constantem, quam ut à bifidis & gibbosis folijs tora tegi possit, quorum coloro bifcurior & saturatior, quemadmodum & sese attollentium, quibus non unquam insperæ lundæ mæule: Odor idem cum superiore Paulo tamen serius hæc floret.

*Iris major
latifol. xii.*

QUARTVM (quod mihi perijt) huic colori satis respondere scribebar, & peculiare id habere, ut inflexa folia duobus diversis coloribus secundum longitudinem sunt discreta, altera videlicet parte reliquorum foliorum colori respondente, altera diverso: eamq; à Bruxellensi cive accepisse, qui semine natum sibi assereret, cum alijs Indibus, quarum nonnullæ unicum duntaxat folium variegatum habebant, quædam versicolorem tantum nervum medium folium secantem, cumq; vel ampliorem & latiore, vel angustiore, ut mirum dictu sit quo modo Natura in his floribus ludat.

*Iris major
latif. xiii.*

ALIVD præterea genus eidem civi semine natum scribebar, instar prædicti varietate colorum conspicuum, non adeo tamen elegans, sed coloris ex cineraceo pallidescens, ut versicolor cærulea dilutior dici queat ea Iris.

*Iris major
latif. xiiii.*

AMPLA sunt XIII. folia, & latiora longioraq; quam in præcedentibus, viridia admodum, rugola, aliquantulum erispa, mucrone nutante, è quorum medio emergit cubitalis aut major caulis, lævis rotundus, viridis, in aliquot ramulos divisus, qui è virentibus vaginulis satis amplos promunt flores, nonnihil odoratos, & ad vulgaris Oxyacanthæ floris odorem accedentes, quorum tria reflexa folia pallida multis crassis purpureis venis à folij infima sede & à fimbria, ad extremas oras sparsis prædita sunt, labris etiam saturæ purpureæ nitentibus: tria illis incumbencia, sub quibus occultantur ligulæ, coloris pallidi: tamquam fuligine perfusi, ut etiam sunt tria erecta, sed magis luridi: nullum mihi hæcenus semen tulit, tamen multis annos illam jam aluerim. Maturius paullo floret secunda, & color floris aliquando saturatior, interdum dilutior.

Hanc

Hanc nactus sum à C.V. Ioachimo, Ioach F. Camerario Reip. Notib. Medico primario, Natalis.
& amico cariss. unde verò ille habuerit, ignoto,

Iris latifol. maior xv.



RUGOSA sunt etiam isti folia, minus tamen ^{tria maiora} lata, longa, & viridia quàm in XIII. secundum radicem omnino interdum purpurascens, è quorum medio caulem promittit cubitalem, laevem, viridem, aliquot ramulis donatum, quibus insident flores è vaginulis emergentes, magni, vel prorsus inodori, vel Oxyacanthæ vulg. florum instar odorati, coloris varietate còmendabiles: nam tria folia quæ sursum spectant & attolluntur, rard se mutuo amplectuntur, aut eacumine nutant, sed plerumque (nisi marcescere incipiant) recta sunt ut in Iride bulbofa, nonnihil tamen convexa, angustiora, lutei coloris, quæ modum & illa quæ ligulas fimbriamq; contegunt: tria ad terram inflexa, circa basim & exortum pallent, reliqua parte candicant, multis tamè purpureis radiis ab ipsa sede ad extremas usque folij (quod plerumque saturatus purpurascit in eorum stirpem floribus, quæ circa radicem nulla purpura sunt suffusa) pallidas oras, elegantia pictura decurrètib; villosa fimbria, qua parte integitur, lutea est, extrema verò exalbida, pallentes ligulæ, magna triangula & obreuso aliquatulum mucrone capita, semen orobi magnitudine, fuscum, rugosum còmentaria: radix nodosa, vulgaris Iridis instar, foris flavescens, multis utrinque nascentibus fibris firmata, quæ repurgata & exsiccata, odoratissima est, & cum lilyrica, quæ in officinis habetur, odoris gratia contendere posse existimo.

In montanis supra arcem Divi Georgij her. ^{Natalis} bido solo, & collibus Stamphen imminèntibus

in Vngaria transdanubiana, aliquot miliaribus supra Pofonium, primum observabam genus illud ejusfolia purpurascens colore circa radicem non sunt persufa: deinde frequenter utrumque genus in Leytenberg mote supra Mandersthorf, & succionibus pratis Sopronio vicinis. Crescit etiam in collibus non procul ab Entzefforff im-lange-thal, Magnif. Dn. de Entzefforff Floret Maio, sub Iunij finem semen maturum.

Hic valde similis, & illius quidem semine natam puto, quæ mihi etiam conservata est, ^{tria maiora} ex superiorum quas Boissor misit numero: folia tamen illi breviora, & (quod rarum) magna ^{latifol. xv.} ex parte duobus coloribus distincta albo & viridi, sic quidem, ut albus per longitudinem excurret, nonnumquam dimidiatum folium occupans, interdum ferè totum, aliquando ejus dimittat partem: ipsæ etiam coloribus interdum distinctæ vaginæ flores insidentibus: qui terna ad terram inflexa folia superiori similia habent ferè, staminea tamen fimbria tora flava est, bifida folia illam tegentia flava, cujus etiam coloris sunt terna illa sese attollentia, & tota ferè surrecta ut in præcedente, infimâ autem & angustiore parte, purpureis velut maculis internè aspersa sunt: odor qualis in præcedente, nonnumquam ad eò imbecillis ut vix deprehendatur. Floret Maio cum superiore.

EIYSDÈM Boissor alia pedalem habuit caulem, rotundum, geniculatum, binos aut ternos ex membranaceis vaginis promens flores, quorum terna terram spectantia pallèscētis ex albo sunt coloris, multis purpureis venis ab infimâ foliorum basî, quæ angustior est, in latera, tùm à sinistrâ, quæ flava est, ad extimas foliorum oras procurentibus, quibus singulares, interdum binæ purpureæ maculæ sunt aspersæ: bifida folia fimbriam tegentia ^{αὐχάνη} αὐχάνη sunt coloris, cujus etiam terna surrecta (excepta eorum angustâ basî, quæ flavescens) multis purpureis venis in latera procurentibus est ornata.

BYZANTIO etiam missum aliud Indis genus folijs Quinto generi non dissimilibus, sed breviorè aliquantulum caule, in aliquot ramos diviso, qui sustinent flores è vaginulis emergentes jam dictis paullo minores, quorum color medius inter secundi & quinti generis flores. radix quinto generi similis. ^{tria maiora} ^{latifol. xv.}

Plurimum convenire videbatur cum Dalmatica illa minore, quam à Pantio missam Belgici horti alebant ante me in Austria dissectum, floribus purpureæ dilutionis colore præditis.

ILLI magnitudine par, angustioribus tamen folijs, quam à Boissor accipiebam, caule gracili, pedem & semissem interdum etiam cubitum alto, in ramulos diviso, quibus insident flo-

Iris latifol. major XVIIII.

Iris latifol. major XXII.



res omnibus prædictis minores, tribus folijs ad terram inclinat, dilutè purpureis, tribus verò erectis obsoletis purpurei coloris, qualis in vulgaris quodam genere conspicitur: radix nõ magna, nodosa. Ejus flos mihi primùm conspectus anno M. D. XC. ceteris florentibus.

Iris maior
latifol. XX.

ALIA ex earum numero quæ anno XC. ab eodem Boissot missæ, biennio post duntaxat florem tulit. A proximè autem descripta nec gracilitate caulis, qui in ramos etiam divisus, nec angustia foliorum, nec radice differt, flores similiter magnitudine pares habet, sed diversi coloris: nam terna ad terram inflexa, diluti, & quidem obsoletis purpurei sunt coloris, multis saturationis purpuræ venis à fimbria ad oras se spargentibus: fimbria flavis staminibus conflata. bifida folia illam regencia obsoletè flavescent: terna surrecta infernè angusta flava etiam, sed purpureis venis distincta, latiore autem parte pallescunt, quodammodo tamen suffusi levissimè, & quæ vix apparet, purpuræ: Sambucinū odorè refert, sed paulo graviorem.

Iris maior
latifol. XXI.

NON minus ampla habet folia hæc Iris, quàm superior, inter quæ caulis assurgit pedalis, teres, geniculatus, viridis, sustinens membranaceas thecas virides, per oras leviter purpurascens, & quibus emergunt bini aut terni flores, jam descriptæ paulo minores, nove m folijs constantes, quorum terna terram spectantia ab imo angustiora, candicantia interius, saturæ purpuræ venis eleganter distincta sunt, latiore verò parte omnino purpuræ: villosa fimbria infernè parte flavescit, supernè purpurascit: bifida foliola sub quibus latet, floridi purpurei sunt euloris, ut terna folia surrecta: flos tenuiter odoratus.

Hæc mihi nata est Francofurti ad Mœnum, semine sponte deciduo, & florem dedit anno M. D. XCII. Maij initio.

Iris maior
latifol. XXII.

BIFLORÆ Lusitanicæ folia vulgari breviora & angustiora, alioqui non valde dissimilia: in summo pedali caule flos è purpurascens, vaginulis prominet novem ut aliarum Iridum flores folijs constans, violacei omnino, sive saturationis purpuræ coloris, qui in inflexis & propendentibus folijs intensius nitet, villosa illa fimbria quæ donata sunt, profus candida. Vnicum autem singulares caules plerumque flore m ferunt, interdum, sed rarè, alterò, rarissimè tertium, singulari quemque vaginula inclusum, jucundissimi odoris, & cenanthem lilium convallium cognominatam æmulantis: conspectus aliquando mihi ejus flos duodenis folijs constans, hoc est, quaternis ad terram inflexis, totidem minoribus ligulas tegentibus, & quaternis etiam erectis, ut interdum Natura in floribus luxuriat. Semen angulosum, rugosum in triangulari capite satis crassum, sed rarius, fert: radix illi subest, nodosa, geniculata, solida, pollicaris crassitudinis gibba, intus cæcida, ingrati saporis initio, & paulo post, fetidissimi gustus, multis fibris summa tellure hæret, & subinde in plures propagines è lateribus nascens divisa.

Natalis.

Nascitur multis Lusitaniz locis supra Tagum vel pingui solo & in arvis, ut circa Conimbricam,

bricam, celeberrimam Lusitaniz urbem, ubi illam florentem mense Novembri eruebam, vel salebrosos & lapidosos locis, ut circa Caxcays marinam urbem & portum, unde delatam Olyssipponem, ad amicos deinde in Belgicam misi, & inter charas repositam cum alijs plantis ipse detuli: nam licet integro anno isthe latuisset, terræ tamen commissa in horto Ill. V. Caroli Audomari, sequente Vere floruit, postea etiam Autumno, cujus rei causa bisseram cognominavi.

NON multum ab ea differre videtur, quam aliquando Venetijs accepit C. V. Io. Aicholtziz Iridis Illyricæ appellatione, in cujus caputissimo horto florentem Maio conspicebam. Quina enim aut fena ex singulis radicis capitibus promit folia, illius folijs similia: caulem, raro ampliorem, qui in summo è vaginulis purpurascentibus florem promebat Lusitanicæ forma persimilem paulo tamè majorem & tenetorem, nec adeò suavis odoris, licet ad eum satis accerret. nullum semen observabam: radix nodosa & geniculata ut superioris, odoris, cum virens est, ingrati, exsiccata verò satis grati: & insipidi initio gustus, postea tamen fervidi, faucesque urentis.

ILLI ferè par quæ Vicnnam ante aliquot annos mihi missa à Ioan. Boissor, Romanæ majoris cæreule flore nomine: etenim caulem, folia, radicem omnino similem habuit, anno verò M. D. CCXCV. florem etiam parem, exceptis tribus turnis folijs quæ ad cæreuleum colorem magis tendebant, simbriaque inferiorum magis flavescente, & odore vulgaris Oxyacanthæ, qui in precedente ad bisseram Lusitanicam magis accedit.

ALIAM in cultissimo Aicholtziz horto paulo maturius jam descriptis florentem, sub Aprilis videlicet finem observavi, unde aurem illam nactus, ipsemet ignorabat. Ea verò lata habebat folia, rugosa, pedalis fere longitudinis, circa radicem nonnihil purpurascentia: caulem non prodeuntem è medio foliorum, ut aliz, sed seorsim sine folijs, pedalem, in quo tres aut quatuor flores è purpurascentibus vaginulis exeuntes, magni, purpurâ saturatione nitescentes, inodori, quorum tria folia ad terram inclinata, ab ipso exortu, usque ad simbriz, quæ tota candida est, extremum, albis radijs insignita sunt: his succedunt triangulares siliquæ, magnæ, obruso mucrone, magnum semen continentes aliarum Iridum modo: radix crassa, geniculata, intus candida, foris furvi coloris cortice tecta, satis odora, ad Pbu sive Valerianæ domesticæ odorem accedens.

Peculiarem autem habet hæc, præter ceteras Irides, notam, ut nulla folia per hiemem retineat, sed omnia flaccescant & exsiccantur, nudaq; conspiciantur; deinde ineunte vere nova germina proferat: similem, si nō eandem, postea conspicietis Francosurti, in horto Mulleri.

DUBIUM non est quin ex ejus semine, quod cum aliarum Iridum seminibus, & multarum radicibus ante aliquot annos in Belgicam ad amicos Vienna mittebam, prognata sit elegans illa Iris quam ex Anglia rediens anno M. D. CCXI. florentem conspicebam Augusto in insitissimmo horto nobilis V. Ioannis de Hoboke, archigrammatei tum Antuerpiani: nam per omnia illi respondebat, nisi quod folia circa radicem saturatius purpurascere mihi visa sunt: an porro hieme folia amittat, me fugit.

LATA pedalisq; fere longitudinis folia habet elegans aliud Iridis genus, Iridis Aicholtzianæ modo descriptæ folijs proflus similia, radicem etiam & caulem, qui perinde atque in illa ad foliorum latum ex radice nascitur pedalis, tenuis, in quo singulares aut gemini flores è vaginulis ex pallido virentibus prodeunt, forma Aicholtzianæ similes, sed colore variantes, nam terna folia propendente candicant, purpuræ exoletæ venis ab infima eorum sede per latera excurrentibus usque ad extimam simbriam subcæreuleis villis constantem: tria autem incumbente & ligulam sive stamina tegentia, alba sunt, earum tamen gibbo subcæreuleo: terna surrecta etiam candida, & ab infimâ sede multis purpureis venis distincta, donec in latitudinem expandi incipiant: flori successit triangulum caput binas præter uncias longum, crassiusculumque, quod maturitate dehiscens lilio, semen ostendit rugosum, subfusculum, ervi magnitudine: radix hieme folia non tetinuit.

Floruit Aicholtzio primùm Maij initio, Anno M. D. CCXIII. unica quam habuit planta, eadem areola in qua vicesima quinta Aicholtziana reposita erat, & quæ etiam oppositifoliam areolam occupabat. Itaque non dubito quin ejus semine deceduo nara sit, tamen si hujus flos odoris gratia commendabilis non fuerit, qui tamen in altera deprehendebatur. Mirum enim in modum variant quæ ex semine nascuntur Irides, non secus ac præcoces & dubiæ Tulipæ, atque Papaveræ, ut longæ experientiâ didici.

MYLTA folia hæc XXVIII. habet invicem amplectentia, ceterarum Iridum instar, unciam lata inrer quæ pedalis geniculatus, teres viridis exilit caulis, summo satiguo sustinens binas membraceas vaginas ex vitidi pallescentes, è quibus emergit flos reliquis Iridum generibus forma similis, colore autem diversus, nam ex albo pallefcit sive *ωχρολευκός* est, & terna repanda folia ab imo ad extimas oras flavescentibus venis sunt distincta, simbria albicante, sed quatenus à bifidis folijs (quæ simili colore sunt prædita, gibbo tamen dorsum nonnihil purpurascente) integitur, flavescente: surrecta folia ab imo gracilia, intemâ parte multis in latera sparsi venis obsolete purpurascentibus sunt distincta, ubi verò sese in latum expandunt, *ωχρολευκός* sunt coloris. Nullum in hoc flore odorem deprehendi: sed cussus sursum Maio florere intem observabam Francosurti in Myleri Pharmacopzi horto.

2. Et similem nec ulla ferè in re differentem etiam alebat, foli flores discrimen faciebant, qui paullo candidiores videbantur.

Non dubium est inultro plura inveniri majoris Iridis genera. Sed quæ mihi, aut amicis fide dignis, cõspicua, Lectiorib' proponete volui, qui boni cõsulerent, ut spero, hos nostros conatus.

Iris latifolia,
major,
vulgaris
albifolia.

Alba.

Memoria.

Hic porro adadiendum eriam censui, vulgarem illam & omnium tritissimam Iridem, in omnibus quas adij Provincijs observasse, vel hortis, vel muris, aut etiam interdum testis innalescentem: alteram obsoletioris trium surrectorum foliorum coloris odoris florum Sambuci, quæque in Belgicis hortis rarior esse solebat, vulgarissimam in Austriz & Vngariæ hortis conspexisse. Albam autem istic rariorem & meâ tantum operâ illis cognitam, acceptis è Belgio ejus radicibus.

ALIARVM Prior Constantinopoli missa est *Aleja Susani* & *Alaja Susam* nomine, cum hac additione, *fiori belli pintati, ch' anno buono odore*, h. e. elegâter picti flores boni odoris: atque, *sa fior bianca & negra*, id est, florem fert ex albo & nigro varium: elegâtem sanè florem compertimus sed nullum gratum odorem deprehendimus. Ego, quia ex Susa, Susianæ Provincie Metropoli, primum in hortos Constantinopoli vicinos ultra Bosphorum suos illatam puto (nam id nomen indicare videtur) Susianam nuncupo. Secundum autem, Asiaticam cæruleam: hæc eum Quinta à Mag^{no} D. Davide Vngnad Constantinopoli mihi missa *Aleja Susani* appellatione, cum Priorem miri voluisssem Terna, Dalmaticæ majoris nom^{ine} retineat: Quarta, Damascenæ: Quinta, Asiaticæ purpureæ. Reliquis, pro cuiusque arbitrio nomina indipotuerunt: ego, brevitati cõsultare volens, numeros adjeci. Nam quis in tanta varietate, & collocum similitudine, singulis peculiare nomen dare queat?

Ceterum Iridis flores lupos nominati, quod lupi nictu labrisque similes sint, Philinum scribere, restus est Athenæus Deipnosopho libro xv. Græcis autem *ἰρις* dicitur: Latinis, *Iris*; Gallis, *Flambe*; Germanis, *Eilgen oder Eilwenn*; Belgis, *Witt*; Italis, *Giglio*; Hispanis, *Lirio*. Vulgarem Hispani *Lirio cardano*, Itali *Giglio celeste*, Germani *Witt Eilgen* und *Edmund* & *Eilwenn* appellant.

CHAMÆIRIS LATIFOLIA.

CAP. XLVII.

ALIVD Iridis genus humilior in Lusitaniz saxosis & marinâ aurâ afflatis locis supra Olyssipponem observabâ, cujus folia ejusdem ferè eum Lusitanicâ biflora erant latitudinis, sed breviora: radix illi similis, geniculata & obliqua. Flos mihi non conspectus, mensis enim erat November, sed siliquis sive capitâ acuminata inania in humili & vix supra terram affurgente cauliculo reperiebam, triangulata, magna, pro plantæ proportionem.

SIMILIS verò plantæ semen ad Ill. V. Ioan. de Brancion missum est à doctissimo Lobelio è Mompelio: ex quo natæ plantæ superiori ferè similes, quæ florem dederunt vel cæruleum dilutioris & quasi cælestem, ternis labris deorsum inflexis paullo saturationibus, aut candicantem omnino, aut pallentem, eumque modò dilutioris coloris & quasi exalbidi, modò saturationis & ad flavum proximi, aut purpureum sive violaceum, & scillum etiam differentem: nam unius color planè nigræ violæ, alterius prona in terram terna folia, ab ipsâ basi & exortu, ipsâq; simbria flavâ, albas & laticas laras venas ductas habebant, & variegatum limacis dorsum ferè referebant: semen in triangulis magnis capitibus, orobi magnitudine, pallidum, rugosum, ovalis formæ. Omnium verò flos inodorus Aprilis plenitudo aperitur cum sequentibus.



Chamæiris
latifolia ge-
nus 1.

Chamæiris
latifolia genus
alterum.

Nunc describendæ restant Chamæirides latifolæ prorsus *ἀκαυλὸν* sive excaules, quarum videlicet flores nullo caule sustententur, sed succulentis & infirmis duntaxat pediculis innituntur, ut Croci, Colchici, & similia. Istarum etiam duæ differentie: Vna enim majoribus larioribusque est folijs, Iridis majoris folijs latitudine vix cedentibus: Altera paulo minoribus & angustioribus, tametsi Angustifolæ Iridis, quam deinde describemus, folijs latiora sint.



HARVM igitur major brevibus est folijs, interdum tamen etiam pedalis, Iridis vulga-
 ris modo latis, & secundum radicem magna ex parte purpurascens: inter quæ multi flo-
 res è vaginulis prodeunt singulæ pediculo dodrantaliq; fultæ, vulgari paullo minores, Lu-
 sitanicæ bifloræ æmulæ, tum magnitudine, tum colore, qui saturatioris nigræ violæ est, præ-
 fertim tria folia tetram spectantia, quæ villosam fimbriam, usque ad bifida illa, quæ ligulas
 tegunt, folia, ex cæruleo purpurascens habent, sub ligulis verò, sive staminibus, luteam
 omnia autem florum folia, tam quæ sursum attolluntur, quàm quæ repanda tetram spectant,
 inferiore & sessili parte, albis quibusdam radijs variata sunt. Sunt autem ejus flores vel ali-
 quæculum odorari, vel inodori: triangula capita magna, mucronata, in quibus semen orobi
 magnitudine pallefcens, quod exsiccatum rugas contrahit & fulvescit: radix nodosa est, ut
 reliquarum Iridum, & adnatis se propagat.

ILLIVS femine nata est Boissoto Bruxellæ Chamæiridis latifoliæ majoris genus, matri *Parlatæ*.

LATIFOLIA minori, breviora angustioraq; paululum sunt folia, qualia Chamæiridis la-
 tifoliæ Hispanicæ aut Gallicæ, de quibus initio hujus capituli: flores paullo minores, capita
 triangula & mucronata etiam minora, semen minus. In floribus suis una varietas: licet fere
 omnes fimbriæ villos, supra stamina, cæruleos habeant, infra verò, ut in modò didici, luteos.
 Ex his verò paucas duntaxat adnotavimus: nam omnes, valde difficile.

Vna saturatioris purpuræ colore nitentem habet florem, interdum etiam dilutiorem, il-
 lumq; odoratum, hunc minimè: ternis folijs quæ attolluntur & inflexa quodam modo su-
 perne se inuicem contingunt, in utraq; modò orbicularis, modò longioribus & bifidis.

Altera odorato est flore, cujus interiora labra nonnihil purpurascunt, surrecta verò cæru-
 lei sunt coloris.

Tertiaz flos quidammodo rubet, interdum dilutiore & suavi quadam rubedine velutiq; *Chamæiris latifolia minor 11.*
 carneo colore prælitus est, præsertim folijs sursum erectis: villosa fimbria superior pars albi-
 car, inferior lutea est: est autem odoratus, aut inodorus. Horum omnium stamina cærulea.

In Quarta floris color pallefcens, nonnumquam exalbidus: folia sursum spectantia abip-
 so statim exortu in utroque genere purpurascens quibusdam lineis decoratur, deorsum
 verò inflexa, in pallefcote exalbida sunt, in albicare autem viridi colore perfusa: pallefcens
 item Oxyacanthæ vulg. floris odorem prorsus æmulatur: alterius etiam odorus.

Quinta solo floris colore: Quarta differt: is enim flavescit, & superiora folia purpurascens
 virgulis sive radijs exornatur, propendentia labra vel nigricante, vel dilutâ purpurâ in
 medio infecta sunt: odoratus hujus etiam est flos. Stamina porro hujus & quartæ alba sunt.

Omnium

Chamæiris latifolia minor 1111.

Natalis.

Chamæiris
latifolia mi-
nor 1111.Chamæiris
latifolia mi-
nor 1111.

Omniū verò foliola stamina & simbræ magnam partem regentia, bifida sunt, binasque pinnas sursum, ut ea quæ in Iridibus bulbosis, habent. Purpureæ præterea, albæ, & versicoloris folia secundum radicem plerumque purpurescunt.

Nascentur omnes in nudis & apertis collibus Pannoniæ & Austriæ: purpurea quidem major, rubraque diluor, in Prellenbergh Hamburgensi monti vicino: purpurea minor cum istic, tū collibus Medeling, Gumpoltkirchen, & Baden imminetibus, in quibus etiam rubra & cærulea inveniuntur: alba in Hamburgensi monte: versicolorem certè nō nisi in colle seu monte Badensis thermis imminet, qua parte *Agrostis* spectat observabam. Ceterum tam insignem varietatem ex semine deciduo sponteigni non est dubium. Nam versicoloris semina à me in hortulo terræ commissa (illius enim ob floris elegantiam periculum facere volui) & pallidas, & albas & versicolores matri similes protulerunt, & alias præterea ad eam quidem accedentes, sed levibus quibusdam notis inter se discretas, quales verbis exprimere difficultimum, vtræque de ijs illud Poëtz dici posse existimem:

facies non omnibus una,

Non diversa tamen, qualem decet esse sororum.

Atque porrò hic subiicienda est, non à me observata, sed à Siephano von Hausen (cujus supra memini, cuique acceptam fero Croci flavi Mæziaci primam cognitionem) infra Budam in Pannoniâ Mæziâ finitimâ Decembri anni M. D. CCC. XI. eruta, dum Constantinopoli Viennam rediret, & Ianuario sequente mihi ab ipso donata. Eam propter teneritatem fidei credidi, & adeò diligenter fovi, ut Maij sequentis initio florem dederit.

A latifolia autem minoribus jam descriptis nec radice differt, nec folijs, quæ circa radicem non purpurescunt: nec ejus flos illarum floribus dissimilis est, plurimum enim ad Quintum genus accedit: labra tamen propendens obsoletum colorem pallido permixtum habent, & ab eorum unâ parte usque ad extremam simbriam quæ pallida est, purpureæ excurrunt vix: pinnata terna folia quæ alba stamina tegunt, ex pallido albescent: sursum verò erecta pallida sunt, circa imum tamen obsoletè purpurescentibus radijs aspersa. Illo quidem anno *καυλός* fuit. Sequente tamen brevem admodum caulem, vix ternos digitos supra terram eminentem habuit, cui infederunt bini flores.

EAM cum reliquis ferè Iridum generibus, & selectissimis quibusque alijs stirpibus mihi penitus corrupti anni M. D. CCC. VI. asperima hiems.

CETERVM apud Belgas multò plura Chamæiridis latifoliæ genera ali intelligi, semine nata, præsertim Bruxellis. Inter ceteros autem doctissimus vir Ioannes Meitens, illius urbis medicus, diligenti culturâ summam in istâ stirpe varietatem adquisivisse perhibetur. Aliquot earum genera communicabat mihi M. D. XC. anno N. V. Ioannes Boissot: sed cum quædam perierint, an cum superius descriptis illarum aliquæ conveniant, nihil affirmare possum: duarum tamen quas conservavi, & biennio post florem dederunt, quarundam etiam aliarum, quæ in meo horto sponte natæ, eodem anno floruerunt, historiam adijciam.

Prior illarum, quas Boissot ad me mitterbat, elegantissima est: radice quidem neque folijs à reliquis differens, neque etiam floris formâ: sed color diversus, & adeò variè pictus, ut dissimile sit, cum exactè verbis exprimere: nam tria folia deorsum inflexa, varijs radijs ex pallido purpurescentibus ab imo sursum & in latera sparsis fuit distincta, per oras etiam tenui quodam cæruleo colore aspersa: simbræ medium folium ad inflexionem usque occupans multis villis constat, quâ bifido folio integuntur, flavis, reliquâ parte dilutè cæruleis: folia gibba illam & ligulam tegentia, coloris sunt ex cæruleo candicantis, qui in costâ & oris pullo saturator est: terna sefe attollentia folia ex cæruleo flavescent, ab imo angusta, & multis purpureis venis in latera & excurrentibus prædita, quæ verò in latum expanduntur, purpurescentibus maculis aspersa sunt. Flori fuscè debet longiusculum triangulare caput, quod pluvie corruerunt. Florem cū alijs Chamæiridibus Aprili dedit nulla odoris gratia cōmendabilem.

ALIQUAM affinitatem habere cum illa videtur, quæ deciduo semine mihi sponte nata, Francoforti florem cum alijs dedit Aprili M. D. XC. XI. Novem autem ut reliquæ folia habet, quorum tria deorsum inflexa & terram spectantia, longa, & præter reliquarum Iridum mo-

tem

Chamæritis latifol. minor VII.



rem aded incurva sunt, ut extremo muctone floris pediculus averſa parte amplectantur: colorem verò habet inſimâ parte flavoſcentem, deinde dilutè purpuraſcētē, ſaturatioribus tamen venis diſtinctum ab inſimâ baſi & villoſâ ſimbriâ candicante, flavoſcentibus apicibus donatâ, quam integrit biſidum foliolum exalbidi & pallescētis ex dilutè cæruleo coloris, quali etiam ſurrecta tria ſunt folia: odor ſerè florū Sambuci aut Thaliæti.

ALTERA, quam à Iacobo Plateau accepiffe ſcribebat Boifotus, radice, folijs, floris formâ, ceteris Chamæritidibus erat ſimilis. Ejus tria folia terram ſpectantia *αὐχνοειδῆς* erant coloris, ab imo ad extremâ uſque ſimbriam purpuraſcentibus tadijs aſperſi: ſub ſimbriâ verò, quâ folium ſeſe magis pandit, purpureâ maculâ etant notata radiationem in latera ſe ſpargente, orq̃ autem erant exalbidi: ſimbria ab imo ad folij inflexionem flavis villis conſtabat, ubi verò purpuream maculam attingebat, albis: biſida folia eam regentia alba erant, quemadmodum & terna folia ſeſe attollētia, ſed nervus medius in utriſque *αὐχνοειδῆς*, inſima pars ſurrectorum foliorum obſoletz purpuræ radijs diſtincta, ſuprema verò, internè paucis notis leviter purpuraſcentibus infecta: expers autē licet odoris, coloris tamen gratiâ non carebat.

Chamæritis latifolia minor
11.

Illi non diſſimilis mihi ſponte nata Francofurti, quæ eodem anno flores dedit.

ALIA præterea mihi iſtic nata non inelegans, quæ ſemipedalem cauliculum profe-

Chamæritis latifolia minor
2.

rebat, tetetem, geniculatum, ſummo faſtigio geſtantem membranaceum folliculum purpuraſcentes oras habentem, è quo emergebant bini flores non magni, novem etiam folijs conſtantes, quorum tria repanda baſi erant anguſtâ, foris purpuraſcētē, internè autem candicante, & ſaturæ purpuræ venis diſtinctâ uſque ad folij inflexionem, labra verò propendētia aded ſaturi violacei coloris, ut quodammodo nigreſcere viderentur: ſimbria villoſa flavoſcebat inſimâ parte, reliquâ purpurea erat: terna eam integritia purpurei etant coloris, veluti & terna ſurrecta folia: nullâ autem odoris ſuavitate commendabilis.

Chamæritis latifolia minor
XI.

NATA & alia non inelegans, quæ à tuberoſâ radice dodrantem aut pedem longa producebat folia, inſtar eorum quibus aliæ Chamæritides ſunt præditæ, lara videlicet & mucronata: inter quæ aſurgebat cauliculus duas aut tres uncias longus, ſuſtinentes ſummo faſtigio veluti folliculum binis membranaceis folijs conſtantem, è quo prodibat ſlos novem folijs præditus, ejuſdem formæ cum aliarum Chamæritidum flore, quorum terna verſus terram inflexa, latiora candicantiſque coloris erant, ab inſimâ ſede (quæ anguſtior) multis venis ex flavo purpuraſcentibus in latera expanſis diſtincta, uſque ad extimam ſimbriam ſive ſupercilium, iſſique deinde à ſupercilio ad extremas oras, quæ albeſcebant, craſſioribus, & coloris purpurei nitidioris: terna verò ſurrecta, quæ intet illa naſcebantur, inſimâ parte valde erant anguſta, veniſque quibuſdam furvi & luridi coloris diſtincta, poſtea in latum ſe pandebant, tenerimâque erant, & exalbidi coloris: terna reliqua, quæ breviora & in fornicem convexa, biſulcâque, erant, aliquantulum reflexis ſurſum alis, ligulam pallescentem tegebant, & ſimbriæ ſive ſupercilio trium propendēnrium & tertiam ſpectantium foliorum imminebant, colorisque erant albi, cui ſubcæruleus color nonnihil admixtus, præſertim in ipſo gibbo: odor nullus aut valde exiguus.

IRIS TRIPOLITANA.

CAP. XLVIII.

PROXIMIS his annis Tripoli adferebatur Iridis genus, mihi ante non conſpectū, quod anno demum M. D. XCIX. ſtorem prorulit ornatiffimo & perhumano viro Theodoro Coornhart, Amſtelredamēſi civi, qui ejus caulem cum ſtore & ſiliqua ad me mittebat Iunio mēſe, ut commodius deſcribere poſſem: ipſam etenim plantam biennio ante mihi communicaverat, quæ quidem etiamnum viget, ſed ſtorem nondum tulit. Illius autem li-

ſtoriam

notiam, quia post traditum Typographo meum exemplar, plantam oancisebat, in Appen-
dicem rejecerat: sed quôdquidem propter amissa mei exemplaris aliquot capita, Secun-
di Plantarum historiz libri profusionem, typographicæ operæ absolvere non potuerunt:
huc revocare libuit, & peculiare caput illi tribuere inter Irides latifolias & angustifolias.

*Iris Tripoli-
tana.*

Est verò hæc Iridis celsiorum aut altius assurgentium genere, folia habens reliquis quas
conspexerim multò longiora, bicubitalia videlicet, mediæ inter latifoliam & angustifoliam
latitudinis, unciam videlicet lata, reliquarum Iridum folijs magis vitidia, non tam è spen-
dencia, ut Xyridis: caulem habebat inter folia prodeuntem, quoque pedes longum, vel
etiam longiorem, rotundum, firmum, licet non valde crassum, nodosum, & aliquot brevio-
ribus folijs prædixum, in ejus summo bini & terni flores è vaginis prodeuotes, novem foli-
is, io ambitu quodammodo siccatis, constantes, Iridis bulbosæ flavo flore floribus formâ
non dissimiles, aurei coloris, quorum tria majora versus terram valde reflexa, & ijs iocum-
bentia tria alia minorâ alata ligulam flavam tegentia, tria reliqua è latetibus majorum pro-
deuntia, assurgebant instar illorum quæ in Iridibus bulbosis coespiciuntur, bifidumque
muctonem habebant: floribus succederunt trigona capita, in singulis lateribus geminâ co-
stâ sive nervo secundum longitudinem emineote, non dissimilia capitibus Iridis angustif-
oliz majoris, similibus etiam feminibus plena: radix digitalis crassitudinis, nigricans & no-
dosa instar radicis angustifoliarum.

IRIS ANGSTIFOLIA.

CAP. XLIX.

RESTANT nobis ex Irides persequendæ quæ angustiore sunt folio, quarum tamen tria
genera in Pannonia & Austria observaverim: unicum tamen est, mihi aliàs in reliquis,
quas adh, Provincijs non conspectum.

Iris angustifolia I.

*Iris angustif-
fol. major
p. 11.*



Natalis.

PRI MA autem, quæ & Major, multa pro-
fert folia longa, rigida, angustiora & oigtiora
quàm Tripolitana, quæ compressa vel contra-
cta, ingratum tetrùmque odorem spirant, pro-
pmodum ut Spatulæ foetide vulgo appellatæ
folia, minus tamen graveolentem: inter quæ
caules teretes, oblongi & cubitales, interdum
etiam longiores exurgunt, quaternos aut qui-
nos flores ex vaginulis lateralibus promentes,
Iridis bulbosæ verticilloribus floribus formâ novâ
admodum dissimiles, colore cæruleo satura-
tione præditos, quibus succedunt oblonga ca-
pita trigona, subruia, multo firmiora, magisq;
cartilaginosa, quàm latifoliarû iridum, ijs paria
quæ in Tripolitana, angulis etiam eminenti-
bus, & quodammodo geminis, quæ delules-
centes, semen duplici serie digestum, aliquantu-
lum compressum & angulosum, ossæque du-
ritici, subruiescente membranâ tectum ostē-
dunt: radices obliquæ, longæ, nodosæ, graci-
liores quàm in latifolia, Tripolitanz radicibus
æquales, foris oigticantes, intus candicantes aut
palescentes, sapore acri & servido, multas lon-
gæque fibras spargentes.

Eam primùm conspiciebam in Belgicis hor-
tis cultam, deinde anno M. D. LXXIII. plurimam
sponte nascētem in amplissimo quodam præ-
to, flumini Rheno vicino, viâ quæ Mogontiâ
Oppenheim ducit, observabam: aliquod
deinde post annos, herbosis quibusdam locis
juxta vias, & ad quorundam pratorum margi-
nes non procul à Mandersloer, quinq; à Vien-
na Austriæ milliari, atque etiam apud Walter-
nâ.

stocci: postremum anno M. D. LXXIX. ibi pratis quibusdam Hungariz apud Liodwa Illustris
viri D. Bamfy arcem.

ISTIVS genus invenitur, jam descripto per omniâ simile, præterquam quod in ejus fo-
lijs coosfractis nullus gravis odor percipitur.

Floret utrumque geous Maio, interdum duntaxat Junio, si asperior hiems præcesserit:
semen maturum est Augusto.

*Iris angustif-
fol. I.*

ALTERA, quæ perelegans est, nullibi mihi fuit coospecta, ante quàm in Austriam præsi-
cisceret:

Iris angustifolia 11.*Iris angustifolia* 11. *species altera.*

ciferer: habetq; cubitalia, interdum etiam longiora, folia, admodum angusta, minimi digiti sive semunciae latitudinem non excedentia, viridia, non tamen splendētia, summā parte mucronata, infimā verò, quā sub terra latent, purpurascentia, nullo ingrato odore, ut pleuraque aliarum angustifoliarum, praedita: caules habet sesquicubitales, nonnumquam bicubitales aut ampliores, rectos, teretes, firmos licet intus cavos, genicularos, virides, summo fastigio in binos aut ternos ramulos divisos, quibus insident bini aut terni flores, Iridis bulbosae verticillorū latifoliae floribus formā similes, odoratos, quorum terna folia deorsum inflexa, infimā parte, & quatenus bifido alatoq; folio ligulam occultē teguntur, furvo colore sunt, reliquā verò parte (quae in nonnullis brevior & latior est, in alijs oblongior & angustior) nunc candicante, modò purpureo, seu violaceo colore, venis saturatiore purpurā nigricantibus per folij longitudinem & latitudinem excurrentibus, & summi sive supercilii carentes: terna sursum erecta angustiora sunt, & cum bifidis illis exalbidis ligulis tegentibus, purpurei saturi sive violacei sunt coloris, breves deinde succedunt siliquae sive capita triangula, breviora quā io praecedente, neque adeò mucronata, oeq; geminā costā eminente praedita, quae per maturitatem nigricantem colorem contrahunt, & dehiscunt, semen inaequale, angulosum, nonnihil compressum & durum continens: radix nigra, teous, dura, modo sa. insit superioris, fibris duris & tenuibus praedita.

Primum illam sponte provenientem, nō procul Viennā Austriæ in pratis supra Himbergam, Eberstorf ad paludes, atque alijs Austriæ pratenfis locis reperiebam. Mittebat postea ad me illam siccam, in Sudetum montibus erutam, doctissimus vir Ludovicus Camerarius, Ioachimi senioris F. ex S. Annæ monte. Anno verò Septuagesimo nono supra millesimum & quingentesimum, frequētissimam circa Sackturniam Ill. Comitē de Zrinio arcem, alijsq; pratis uliginosis inter Muram & Dravum Hungariæ cisdanubianæ flumina, quædam modum etiam in Comitatu Saladiensi inter Lindw & Muram fluvium observabam. Floret & semen profert eodem quo superior, tempore.

Hæc commodè Pannonica angustifolia verticillorū dici poterit, non autem Byzantina, ut quidam appellant: peramēno quidem est flore, attamen Constantinopoli non advecta, sed uliginosis, ut dixi, pratis Viconensi urbi vicinis, erutam, tum ipsius capita seminibus plena Nobilibus viris Ioanni de Brancion, & Ioanni vander Dilst, atque alijs amicis primus in Belgium mittebam Viennoā Austriæ: quia verò ex ea urbe raras quasdam plantas Constantinopoli meā pecuniā redemptas iisdem amicis subinde communicabam, contigit ut nonnulli illam etiam Byzantio allatam putarent, propterea Iridem silvestrem Byzantinam appellant,

V

*Iris Clusij.**Iris angustifolia.*
fol. 113.*Iris angustifolia.*
fol. 113.*Natalis.**Nomina.**Iris angustifolia.*
fol. 113.*Iris angustifolia.*
fol. 113.*Natalis.**Nomina.*

appellarint, additâ voce peramantem, propter florum elegantiam: apud nobiles verò matronas, Iridis Clusij (quia à me missa) cognomen adquisiverint, & præ cæteris, quæ à me habuerunt, Iridis generibus, grata fuerint, quemadmodum etiam nunc est.

TERTIA, ex radice nodosa multa producit folia, firma, longiora quàm præcedēs, & Prioris folijs magis angusta, saturatque viriditate prædita, nonnulli etiam fœtida: inter quæ cubitalis affurgit caulis, firmus, aliquot flores proferens Secundæ floribus longiores, & Primæ floribus pænè similes, sed longè saturatiore purpurâ & quasi nigrâ præditos: quibus succedunt capita primæ capitibus similia, semine etiam simili plena: radix, ut dictum est, nodosa, dura, foris nigra, mimmi digiti crassitudine, internâ parte ex albo flavescentes, antrorsum & in latera progrediens, aliarum angustifoliarum Iridum instar, & tandem veluti in orbem sese spargens (quod omnibus Iridibus est commune) multis fibris donata gracilibus, duris, siccis, lentis tamen, & fractu contumacibus, quarum anteriores & novellæ crassiores, molliores, & candidæ.

QUARTA, nec foliorum nec florum formâ, nec capitibus, semineve aut caule & radice differt à Tertiâ: humilior est duntaxat, ejus etiam flores paulò minores, & angustiores, meâ quidem opinione, æque etiam dilutiores. Primæ tamen floribus saturatiore.

Nascitur utrumque hoc genus quibusdam Hispaniæ & Galliæ Narbonensis locis maritimis, veluti non procul Valentia, & monte Setio: unde in Belgium delatæ, suâ varietate hortos istuc exornarunt, non minus quàm Austriacos, meâ operâ istuc Belgio accessit: nam utroque illo genere carebant Austriaci.

ILLIS porro Iridum marinarum majoris & minoris nomina sunt imposita, quoniam non nisi locis maritimis sponte proveniunt.

QUINTA, nec foliorum formâ, nec radicibus multum differt à majore marina: nisi quod folia habere non videatur tam atrâ viriditate prædita, flores etiâ plurimum differt: nam tria folia sutrecta purpurei sunt & violacei coloris, etiâ verò reflexa, & terrâ spectantia paulò latiora sunt, & multis lacteis purpureisque venis alternatim permixtis ab ipso folij ungue exorientibus, atque secundum longitudinem & in latera se spargentibus, gracillimam varietatem efficiunt. Floret cum mannâ, serius primâ, Junio videlicet mense, semen maturitatem acquirit Septembris initio.

Istam sponte nascentem non vidi, sed in Belgicis duntaxat hortis cultam observabam.

Iris angustifolia vi.



SEXTA, omnium, quas conspexerim, minima, multa promit è radice folia, superioribus adhuc angustiora, nec adeò dura, sed mollia dilutiusque virentia. Cujus etiam duas differentias deprehendebam, nam Vna pedale interdum acquirit caulem, teretem, binisque aut ternis in eo plerumque gestat flores, quarum pænè formâ similes, sed dilutioris coloris, deinde capita oblongiuscula & turgida, valde eminentibus costis prædita: Alterius caulis vix dodrantalè superat altitudinem, & unicum, magnâ ex parte florem profert, alterius flori similè, armeniaci mali, aut pruni maturi odorem quodammodo referentè. Vtriusque radix tenuior & gracilior est superiorum radice, non minus tamen nodosa, nigro similiter cortice tecta, & antrorsum atque in lateribus serpens, ut brevi tempore magnum cespitem occupet, & cum difficultate erui queat.

Provenit utraque passim in pratis Viennæ Austriæ vicinis ad radices mœnium sitis, ut apud Medeling, Gumpstkirche, Badensium thermarum, præsertim quæ in altiore caulem affurgit, pluresque flores profert: nec differt puto (minorem saltem) ab ea quàm C. V. Dodonæus Chamæridem simpliciter, Lobelius autem, Iridem perpusillam

silvestrem angustifoliam appellant, Belgicis hortis jam dudum familiarem.

ACORVM.

CAP. L.

ANNO septuagesimo quarto supra millesimum & quingentesimum, mihi primum conspecta est Viennæ Austriæ legitimi Acori planta virens, quam deinde in hortulo alui, munete Illustrum virorum Augerij de Bousbeque Serenissimæ Elizabethæ Austriadis Franciæ Reginæ, aulæ (dum vivebat) summi Præfeti, Davidis Vngnad liberi Baronis in Sonneck, nunc bellici Consilij apud Cæsarem Rudolphum II. Prædis, atque Magnifici viri

vir Caroli Rym Gandavenfis, qui omnes Legatorum officio apud Tutcarum Imperatorem, Cæſaris nomine defuncti fuerant. Hanc porro, quum frigoris patientiffima, hiemis intemperiem non reformidet, ſed perbelle eam ferat, atque adnatis miri in modum ſe propaget, quamplurimis communicabam, adeo ut nunc apud omnes rei herbaræ cultores vulgatiffima facta ſit.

Ejus hiftoriam in Appendice ad Hiſpanicarum Plantarū obſervationes, olim dabamus, additā quidem icone, ſed cui (quum nondum tum temporis flores protuliſſet) nucamentum non fuit additum, neque in ejus hiftoria floris menſio facta. At quū anno M. D. LXXVII. & aliquot ſequentibus florentem viderim, operæ precium me faciſſimum exiſtimavi, ſi illius hiftoriam, qualem in Pannonicatum plantarum obſervationibus evulgabam, cum florentis icone, quā accuratè fieri poruit, ad vivum expreſſā, hoc capite denuo reponerem.

Acorum legitimum.

Acorum cum ſuo ſulo.



ACORO igitur ſunt folia Iridis tenuiſſulæ majoris ferè, ſed multò longiora, & gratiſſima vindictate prædita, medio nervo ſeu coſtā aliquantulum utrimque prominente, ut in Xyphij folijs, quorum formam ſatis æmulantur, & illorum aut paluſtris illius plantæ flavos flores, Iridis florum æmulos, proferentis, quam nonnulli Iridem paluſtrem, peritioris verius Butomon appellare, inſtar, alia ex alijs prodeunt, medium autem folium plerumque reliquis longius eſt: illa autem licet ſubamani ſint ſaporis, non tamen ingrati, tritæque jucundo & aromatico ſpirant odore, quem etiam reſiccata & exſucca, vel poſt multos annos retinent: ſub hiemis initium marceſcunt & ſiccantur, ineunte autem vere nova germinant, ut in Iride anguſtiſolia: porro caulem inter folia non producit ut Irides, ſed ex latere exit ſolum verius quā caulis, ejuſdem cum reliquis folijs longitudinis, videlicet bicubitalis interdum, quod à medio ad ſummum uſque planum eſt, & reliquis ſimile, inſimā verò parte craſſius, anguſtiuſq; & veluti in triangularem caulem formatū. Vbi jam exrenuati & complanari incipit, unicū nucamentum (aliquando, ſed rariſſimè, geminum) à latere promit, coryli ſulo haud majus initio, ſed prominēs & ſurrectum, lineique obliquis & tranſverſim ſeſe ſecūbus diſtinctum, ſolculis, dum ſe explicat, pallidis, muſcoſis, inodoris, quatuor foliolis conſtantibus plenum, quod paulatim deinde incrementum ſumit, donec humani ferè digiti longitudinem craſſitudinēq; adquirat, frequētibus tuberculis viridibus tam elegantī ſerie diſpoſitis exornatum, ut recentem pinaſtri conum æmulari videatur. Radix illi longa, externā parte candicans, quum ſub terra latet, ſupra terram extans, viſciſcens, internā parte candidiſſima, frequētibus geniculis inæqualibus diſtincta, firma, odorata, ſubamari & acris ſaporis, innumeris internā parte adnatis fibris craſſis & albicantibus, etiam odoratis, donata: ſerpit autem & ſummā tellure ſeſe diſtendit, è lateribus, & ſingulis ferè articulis

*Acori ſp.
ſera.*

culis seu geniculis propagines alternatim in obliquum spargēs, ut brevi tempore magnū m locum occupet.

Natalis.

Ingeni quodam lacu ad radices præcelſi montis juxta Pruſam Biſthyniæ urbem ſponte naſci intelligebam: & ſanè humidis locis gaudere, & ſecundū fluentia longè feliciter provenire, quā ſiccis, experiebat. Sed & C. V. Bernardus Paludanus Medicus Enchulſi u: & ſingularis meus amicus, quū anno M. O. LXXVI. t. ex Polonia Italiam petens, Viennæ Auſtriæ me conveniret, copioſè admodū ſupra Vilnam urbem in paludibus, extremā Lithuania Moſkoviam ſpectante inveniri referebat, & ab incolis *Tartariſky* appellari aſſerebat, quod à Tartariſ illius uſus primum ipſis eſſet demōſtratus. Circumferre enim illos plerumque hanc radicē, & aquam non bibere, quū priuſ Acori radix in ea fuerit macerata. Simile quidpiā de huius plantæ nomine etiam tradit Matthias à Michow Sarmatię lib. II. cap. XII.

Taſſenky.

Recentes verò radices ſuo cortice delibratas & diligenter repurgatas cōdire ſolent Conſtantinopoli, arque in uſum adſervare: manè enim jejuni plerumque manducare ſolent, adverſus corrupti aëris contagia, ut mihi referebat N. V. Philibertus de Bruxella, qui Cōſtantinopoli rediens, vaſculo iſs conditis pleno me donabat. Condiunt etiam nunc in Germania Nobiles aliquot matronæ in domeſticum uſum, & plerique pharmacopeci, quod nonnullos (adeò nunc vulgaris iſte eſt planta) ſingulis annis ad centenas libras cōdire intelligo, & non contemnendum ex eā quæſtum facere.

Quvum autem Acori vires ac facultates, Dioſcorides, Galenus & alij ſatis prolixè deſcripſerint, Leſſore & eos ablegamus. Prætermittere verò nequeo, quū hīc ſubijciā, quod mihi olim accidit Viennæ cū magnæ auctoritatis Medico. Recens vulgata meā de Plantis Pannonicis hiſtoria, exemplar dono mittebam, ejus nomen indicare non eſt neceſſe. Ille, lecto meo libro, magnopere ſe mirari ſcribebat, me in Acori hiſtoriā non adſcripſiſſe, ejus radicis uſum, ſterilitatem mulieribus inducere: ego reſpondebam me magis adhuc mirari, quod hæc ſcriberet, quū non ignoraret, neminem à Veterinibus hoc Acoro tribuere. Sed bonus vir adhuc in vulgari mulorum opinione verſabatur, qui exiſtimabat Butomon, cujuſ radice nonnulli magno errore pro Acoro utuntur, legitimam Acorum eſſe, quū tamen proſus diſſimiles ſint utriuſque facultates.

Butomon.

RANUNCULVS PRÆCOX.

CAP. II.

TRIA Ranunculi præcocius florentis repertiuntur genera: quorum duo priora in Pannoniā obſervabam ſponte naſcentia, tertium in Belgio, neglectū quidem, cujuſque mentionem non feciſſem, niſi ornatiffimus vir Iacobus Plateau ejus iconem miſiſſet, Batrachij Apulei appellatione.

Ranunculus præcox 1. rutæ folio.

Ranunc. præcox 1. Rutæ folio.



Natalis.

Tempus.

PRIMVS, aliquot à radice producit folia multifida, rutæ folijs non valde diſſimilia, molliora tamen & magis vitidia: flores autem habet amplos, ante ipſa folia emergentes, ſorinleus, dum initio emergunt, ad ſua rubentem colorē tendentes, internè candidos, duodenis aut pluribus folijs conſtantes, umbilicum occupante capitulo viridi, ut in reliquis Ranunculis, cincto multis albicantibus ſtaminalibus quæ flavos apices habēt, ſine odore: hos ſuſtinet cauliculus teres & nitro purpureſcens, deinde ex viridi palleſcens, quæ ambit unicum plerumque ſolum, (raro plura) exiguum, duabus aut tribus lacinijs diviſum, larā baſi cauliculum amplectens: floribus deciduis, ſuccreſcit illud capitulum, & in ſemina craſſiſſcula evadit, Thoræ Valdenſium, ſive ranunculi grumofa radice reritij, paulo poſt deſcribendi, ſemini præne ſimilia.

Naſcitur in inferioribus Sneberg jugis, & vicinis montibus, ſingulari radice craſſiſſiculā præditus, è cujus capite aliquot craſſiores fibræ dependent: in hortos autem tranſlatus, multis annis planta ſeſe propagat, multæque frequentiores fibræ ſpargi, ut ſecundo aut tertio quoque anno, unica plāta plures dare poſſit. Eam autem, ut è loco nativo recensetura, exprimi curabam. Floret verò, in hortos tranſlatus, pleiūque Aprilis, nativo autem loco, videlicet frigidiore, ſerius, ſed brevi poſt ſolutam: nix ē, quæ jugā illā inſedit.

Iſtam



Istam etiam plantam sponce nasci in monte Baldo, agro Veronenſi, poſtea intelligebam, quia in ejus montis deſcriptione, quam ornatiffimus, & perdoctus pharmacopæus Veronenſis Ioannes Pona fecit, illam ſub appellatione Ranunculi coriandri folio exhibet. Eam porro deſcriptionem, ad calcem meæ Plantarum hiſtoriæ Leſtor reperiet.

ALTERA, caulem habet pedali altitudine aſſurgentem, gracilem ex viridi rubeſcentem, in quo quaterna aut quina folia, majoris Thaliectri flore albo folijs, colore & formâ valde ſimilia, ſed minora & teneriora, amaro ſapore: ſiſtuli in ſingulis alarum ſinibus ſingulares, candidi, quinque foliolis conſtantes, ſuis petiolis innitentes: quibus decidentibus ſuccedunt bina aut terna cornicula, ſemen rotundum, ſubruffum, acconiti hiemalis vulgo appellati ſemini ſerè par: ex eadem radice, præter caulem, prodeunt bina aut terna folia ſupra deſcriptis ſimilia, ſingularibus dodrantalibuſq; pediculis, ejuſdem cum caule coloris, innixa: radix impenſè amara, multis albis fibris donata eſt, ex quarum capite alia exit nodola radícula, ſubinde ad ſingula intermodia novas fibras agens, atque hac ratione ſe propagans, ideoque perennis.

Ranunc. præcox 11. Thaliectri fol.

Ranunc. præcox 11. Thaliectri fol.

Abundè naſcebatur in ſaltu Leytenberg, Manderſtorf vicino, ultra Leytam flumè, quinto ab urbe Viennâ Auſtriacâ milliari, ubi primùm illum obſervabam, deinde quibuſdam alijs umbroſis ſilvis Viennenſi agro. Inveniebam etiam apud Zollonock III. Herois Balthariſ de Batthyani in Vngaria oppidum, inter vepres. Florebat Aprilis, ſemen interdum Maio, plerumque Junio ad maturitatem perveniebat.

Ranunc. præcox 11. Thaliectri fol.

Ranunc. præcox 11. Thaliectri fol.

TERTIO, e capite multis fibris donato, oriuntur aliquot folia, ſuperioris folijs minus lacinia, in ambitu tamen incifa, uncialibus aut longioribus pediculis prædita, & lata baſi cauliculos dodrantales binos aut ternos inter illa exeuntes amplectentia: cauliculis procumbentibus & quodammodo ſupinis, adnaſcuntur terna aut quaterna ſimilia folia, e quorum ſinu uncialis prodeunt pediculi, qui ſiſtulos ex flavo pallescentes, & quinque foliolis conſtantes ſuſtinent, quibus deciduis, apparent quina aut ſena cornicula mucronata quibuſdam tuberculis obſita, ſemen ſuperiori ſerè ſimile continentia.

Ranunc. præcox 11. Thaliectri fol.

Ranunc. præcox 11. Thaliectri fol.

Sed quoniam in Thaliectri mentionem incidimus, obſervabam in Auſtriæ inferioris, ſi-
ve infra Anifum flumen ſitz, & Pannoniæ pratis, ſilvis & montanis, varia ejus genera, omnia videlicet ea quæ in Belgicis hortis ali conſpexeram, præter Hiſpanicum, quod illis Provincijs etiam meâ operâ vulgare factum eſt. Ejuſdem autem folia, licet aliorum generum modo diviſa & incifa, Aquilegiæ ſive Aquilinæ folijs adeo reſpondent, ut ab impertitis plantæ vix diſcerni queant, ante quàm in caules aſſurgant & flores producant, qui in hoc genere

Thaliectri varia genera.

Thaliectri varia genera.

V 3 mulcoſi,

2. muscosi, ut reliquorum, sed coloris flavi sunt. Triâ genera montana, folijs inter se conve-
 3. niunt: sed unum altius excrefcit quàm reliqua duo, floréque candido, eoque valde gravis
 4. odoris, est; alterum paullo humilius, flore etiam albo, minus tamen ingrati odoris: à quo
 5. tertium differt solo floris colore qui purpurefcit. Pratenfis duo longioribus, & magis atris
 6. funt folijs, & quodam modo splendidibus: alterum pallido floris colore, elatius; alterum,
 7. candicans, idque humilius. Septimum, omnium minimum, folijs minoribus, cineracei
 coloris, pallido floris colore. Omnium radices flavæ sunt & serpunt, subinde nova germina
 producentes: sed omnium maximè Septimi.

RANUNCULVS MONTANVS.

CAP. LII.

IN utraque Pannonia & Norici parte, varia Ranunculi genera sponte nasci observabam, quæ passim in alijs etiam Provincijs crescunt. Sed aliquot alia in earum Provinciarum altissimis jugis conspiciebam, quæ à reliquis Herbariz rei Scriptonibus vix observata esse animadvertēbam: itaque omnibus aris Medicæ studiosis gratum me facturum existima- bam, si eorum historiam illis etiam communicarem.

Ranunculi montani 1. species 1.

Ranunculi montani 1. species altera.



Ranunculus
montan. 1.

Ranunculus
mont. 1. spec.
ies altera.

Notæ.

M V L T A parva, rotunda & quasi circino circumducta habebat Prior folia, aliquot cre- nis divisa, & in ambitu serrata, atrâ viriditate splendēteque (superne prædita, fatis crassa si- ve carnosa, & fervidissimo sapore: inter quæ pediculus ontur tenuis, singularis, brevis do- dranteque minor, florem album, quinque folijs constantem fultinēs, inodorum, cujus um- bilicum crocea flamina occupant: deciduo flore apparet capitulum immaturo frago simi- le, quemadmodum in alijs ranunculis, quod ex minuro semine simul congesto constat: ra- dix multis albicantibus fibris prædita est.

Ejus altæta species erat, cujus folia in tres lacinias divisa, & ille denuo aliquot incisuris donatæ, cauliculus ab altero non differens, sed ampliorem florem gerens, eumque interdum duplici foliorum serie constantem: alioqui & colore superiori parem, eodemque tempore sese explicantem: radix etiam quemadmodum in illo, supernâ parte nonnihil extuberat, & fibris donata est.

Nascitur uterque in summis Sneberg & vicinarum Alpium jugis, confragoso solo, & pe- nē in ipsijs petrarum fissuris: Junioque interdum istic florebat, aliquando serius, ut videlicet nix maturius aut serius solvitur: in hortos autem translati, maturè admodum, & ante alios ra- nunculos, Aprilis scilicet flores proferunt.


ALTERA

ALTER, quina aut sena promebat ex radice folia, magna, vitidia, dura, Ranunculi illius *Ranunculus*
glomerato siue globoso flore, quem nonnulli Trollium appellant, folijs laudabilissima, non- *mont. 11.*
nihil hirsuta, tribus scissuris ad pediculum usque pertingentibus, & alijs praterea minus pro-
fundis divisa, sapore initio dulci, postea aliquantulum amaro, pediculus crassus, firmus, & pe-
dem longis inaequantia: caulem inter illa exeuntem cubitalis longitudinis, nudum, singula-
rem, firmum, aliquatulum hirsutum, intus cavum, qui in summo fastigio trina habebat fo-
lia contigua, profundè lacinia, penè instar Anemonidum, supra què deinceps caulis divi-
debat in quatuor aut quinque oblongos & teretes pediculos, quorum singuli sustinebant
unicum florem quinis folijs satis magnis & albis constantem, mediocriter odoratum, mul-
tis flavis staminibus, capitulum occupans umbilicum, cingentibus, quod excusso flore ap-
parebat magno planoque semine onustum: radix erat veluti praemorsa, & multis nigrican-
tibus fibris praedita.

Frequens nascebatur in Sneberg, Sinealben & aliarum vicinarum pratis sublimioribus, *Natalis*
florebatque lunio, semen autem maturitatem adipisciebatur Augusto.

Ranunc montani II. species altera.

Ranunculus montanus III.



IN celsioribus tamen earundem Alpium jugis, multò humilior & magis hirsuta cresce-
bat hæc planta, pedalem altitudinem non excedens, flore paulò majore (& qui Narcissi flo-
rem album, medium calicem flavum habentem, æquare posset) eoque etiam magis odora-
to quàm prioris: ejus etiam folia majore amaritudine & acrimonia erant prædita, tamen
primo gustu quandam dulcedinem habere viderentur. Serius florebat prior: nam eam
dumtaxat florentem reperiebam, quum in inferiore jugo, alteram jam semen semimatu-
rum habentem observassem.

ILLUM proximè sequi debet pulcherrimus ille Ranunculus alpinus, quem non obser-
vavi, sed cujus iconem & descriptionem à Doctissimo viro Thoma Pennæ Londonensi
Medico habui.

Quatuor autem, quinque vel sex à radice proferebat ille folia, in quinque vel plures in-
terdum præcipuas partes Ranunculi modo divisa, parte pronà ferè cæcia, supinà verò ex ni-
gro viridia: è quorum medio unicus caulis ab radice oriebarut, lōgitudine pedem æquans,
nudus, folia in summo fere emittens oblonga, maxima ex parte in tres lacinias per extre-
mam divisa, è quorum medio pediculi tres, quatuor, vel interdum plures oriuntur duos di-
gitos trāsversos longi, unico vel duobus foliolis subinde ornati, quorum singuli florem sus-
tinent pulchrum, ex quinque folijs orbicularibus constantem, quæ inferius purpureasunt,
superius in lateribus ex albo purpurea sunt, reliqua parte albißima, multis luteis staminibus
medium

*Ranuncu-
mont. 11.
floris albi-
ss.*

*Ranuncu-
mont. 111.*

medium occupantibus, calyceque ex quinque folijs herbagei coloris confluente: femina, ut in ranunculis, compacta, ex nigro purpurea & mucronata, parum compressa, paulò quam in alijs ranunculis maiora: radix in summo fetosa, multipliciter divisa, sæpius Cruciatæ modo incisa, & in multas fibras divaricata. Tota verò planra pilosa est.

Natalis.
Tempus.

Crescit copiose in monte Iurâ, & regione urbis Genevensis. Floret Iunio, femina Augusto marura.

Ranunculus montanus 1111.

Ranunculus pleno flore albo.



Ranuncul.
mont. 1111.

Natalis.

Ranuncul.
mont. 1111.
pleno flore
Ranunculus
mont. 1111.
flore albo-
ra.

Ranunculus
mont. 1111.
altre flore
pleno.

QVARTO, magna erant folia, in quinque lacinias secta, viridia & in ambitu ferrata: infernè duriora & splendoria, dura, nervosa, quæ præmansa nullam manifestâ acrimoniam, sed amantudinem potiùs habere deprehendebantur: caulis cubitalis aut amplior, firmus, licet tenuis, lævis, nodis aut geniculis præditus, in multas alas à medio ad summum expansus, in quibus flores satis ampli, Secundi tamen floribus minores, quinque folijs conflantes, tenelli, toti lactei, aliquantulum odorati, staminibus pallentibus umbilicum occupantibus, & capituli rudimentum cingentibus, quod ex feminibus simul congestis, quemadmodum in reliquis ranunculis, constabat: radix præmorsa videbatur, instar radices Secundi, multâque longas & candicantes fibras habebat.

Abundanter provenire conspiciebam in acclivi montis Wechfel, Sneberg, & aliorum montium silvosis locis, per quæ ad eos montes patebar ascensus. Florebat illic eodem tempore quo Secundus, sed in cultis Maior: semen maturum erat Iunio.

ISTIVS generis invenitur, qui florem habet plenum & multiplici foliorum serie conflantem: alias caule, folijs & reliquis notis protus est similis Quarto jam descripto.

PORRÒ iisdem locis quibus Quartum, repenebam etiam Ranunculum illum albo flore quem C. V. Rembertus Dodonæus cap. 111. lib. 1111. Pemptadis tertix quarrum inter externos describit: sed à Quarto modo descripto differentem. Nam humilior est illo, folijsque habet læviora, & paulò magis arda, rameris similiter incisa, flores ratiore & minores, in obliquum nascentibus pediculis inhærentes: & præcocius altero florebat.

HVC autem congenerem flore pleno niveo, ut alebatur à N. V. Ioanne vander Dillst amico singulari, qui illius iconè vivis coloribus expressam mihi Viennam usque mittebat, quàmque superioribus hoc capite adungere libuit, nusquam in illis jugis observare potui. Arbitror illum adquisivisse ex ijs plantis, quæ, paulo antè quàm à Cæsare Maximiliano I I. Viennam accersirur, è Belgio discederem, Illi Viro Ioanni de Brancione ejus consanguineo, è Burgundicis moribus millæ fuerant. Similes deinde planras, & Noriberge apud C. V. Ioachimum Camerarium, & Francoforti ad Moenum frequentes conspiciebam. Vulgare autem nunc

tem nunc est utrumque genus in omnibus hortis Belgicis, habetque postremum illud humilius genus flores & ampliores & frequentiore foliorum serie præditos, quàm id quod altius assurgit.

Quintus, omnium, quos umquam conspexerim, maximus, multa à radice producebat folia valde ampla & carnosa sive densa & succulenta, ficulneis haud minora, quæque profundis incisuris divisa, in ambita nonnihil serrata, colore dilutius virente splendentia, nonnihil villosa, acria admodum & linguam vellicatâ: cubitales caules, digitalis crassitudinis, firmos, hirsutos, supremâ parte in aliquot ramos divisos, qui multos flores sustinebât quinque folijs constantes, reliquorum ranuncolorum instar, & luteo auri colore fulgentes: semen vulgare ranuncolorum semini par in capitula congestum: pro radice multas candicantes fibras habebat.

Crescebat in nemoribus & umbrosis declivibusque omnî Austriacarum, atque Sciriacarum Alpij locis, juxta rivulos è liquecente nive profluentes. In nonnullis præterea umbrosis pratis ad saltum Viennensem, & ultra Dravum, observabam. In hortis & pratis Maio florebat: in Alpibus vetò Junio aut serius.

Iosie Simlero Prior cognitus fuisse videtur, & illius meminisse Commentario de Alpibus, ab Helveticarum Alpij accolis Jegertrant; hoc est, Venatorum herbam, appellari scribens. Montani Austriacarum Alpij opiliones & venatores Jegertrant vocabant, & ad pellendas febres (onde nomen) folijs ejus contusis & carpo admotis utebantur. Secundo & Quarto ejdem venatores Jegertrant & Cussit abbeis id est, Præmoriz, & Diaboli morsus nomen indebant. Quinti nullam peculiarem appellationem intelligebam: non incommodè tamen, meâ opinione, παντόφυλλος βατράχιος, à foliorum amplitudine cognominari possit.

VNGAR: Ranunculum in genere *Bekes* vocant.

Ranunculus glomerato flore.



RANUNCULI porrò illius, quem Gesnerus in Descriptione montis fracti Trollium florem vulgo dici scribit, quique à Dodonæo Ranunculus globoso flore appellatur, & Quintus est inter externos ab ipso Pemptadis tertiz lib. III. cap. III. flore in globum collecto, descriptos, duo in Austriacarum Sciriacarumque alpij pratis observabam genera: Majus unum, ampliore flore, & quasi aureo: Alterum, humilius, flore paullo minore, & colore, ut plurimum, ex viridi pallidente: aliàs, foliorum formâ, capitulis, semine nigro, & radice inter se conveniebant. Illud etiam inter primulas veris rubro flore præditas, ex septentrionalibus Angliæ montibus erutum recenter Londini anno octuagesimo primo supra millesimâ & quingentesimâ cõspiciebam.

RANUNCULI GRUMOSA RADICE.

CAP. LIII.

Nunc de ijs Ranunculis agendum cõ: χονδροειδὴ τῆς ρίζης ἔχουσι, qui veluti grumolam, sive in grumos quoddam longos & breves congestam habent radicem, Chelidonijs minoris serè instar. Horum duo genera mihi conspecta, quæ in duo distincta capita dividenda esse existimaui. Hoc autem Priore acturus de ijs quæ natali locò (præter secundum) flores proferentia observabam. Sequente verò, quæ aliunde inuenta, vel

ipse habui, aut alij se habuisse, vel conspexisse mihi retulerunt.

Eorum ergo Ranuncolorum grumosa radice quos nativo loco observabam, Primus, quinque, sex aut plura habebat folia, circinatæ pænè rotunditatis, in ambitu serrata, per terram expansa, splendentia, & veluti tumentia bullatâque supernè, nervosa, & lanuginosa infensè, ingrati initio saporis, sed postea ferventissimi: inter folia exiliebant aliquot pediculi verius quàm cauliculi, dodrantales serè, vel breviores etiam, villosi & lanugine quadam obfisi, singuli sustinentes florem luteum, odoratum, quinis, senis, octonis interdum, aut pluribus folijs constantem, quibus vento excussis, vel sponte defluentibus, capitula, aliorum ranuncolorum capitellis aut fragi rudimèto similia apparebant, pallida: radix ex multis crassius longiusculisq; grumis sive tuberculis constabat Chelidonijs minoris lógioribus radicibus

non

Ranunculus Creticus latifolius.

Ranunculus grumosa radice III.



Pthora Valdensium, montis Baldi.



tidis esse putatur: de quo peculiaris assertio post ipsius Epistolae, operâ Casparis Wolfij edita, inserta est, ubi Cyclaminum tertium Plinij Lib. xxv. cap. ix. Naturalis Historiæ, & Limeum ejusdem Lib. xxvii. cap. xi. descripta, esse contendit.

Cyclamin.
111. P. inf.
Limeum
Pl. ej.

Natalis.

Illum ranunculum ego in Etscheri summi jugi præcipitijs & rupibus tenui terrâ leviter coopertis, atque ad meridiem obversis, mense Augusto inveniebam, deinde frequentiore & vegetiore. majorēque copiam in Sneberg, arduo illo rectoque ad secundum jugum ascensu, & alio ipsi vicino. Ejus tamen folia breviora, supernâ etiam parrelatiora & magis incisa esse deprehendebam, quàm sint Thoræ Valdensium, aut illius, quàm è monte Baldo apud Veronam erutam conspeximus, folia. Hujus præterea flos quinque folijs constabat, quum illorum quaternis dumtaxat folijs exprimeretur: ceteræ notæ satis conveniebant.

SEPT. & Quartum, qui eorum quos sponte provenientes observabam Tertius, Maio florentem eruebat in Hamburgensium monte.

Ranunc. grumosa radice
1111.
Natalis.

te, duobus supra Pofonium Hungariæ milliaribus, quâ Occasum spectat, præsertim in eorum tumulorum ambitu, qui recenter à talpis suffossi erant, propter terræ erutæ mollietatem.

Folia illius incunre vere quaterna aut quina exibant longo pediculo innixa, oblonga & multifida, candidâ densâque lanugine oblita: caulis gracilis, pedem altus, interdum cubitalis, minoribus folijs septus, & ramulis aliquot præditus, quibus flores insidebant aurei valde splendentes, ex quinque folijs compositi, inodori, interdum gemelli: radix multis brevibus & extremâ parte obtusis tuberculis sive grumis constabat, ut pznè in Chelidonio minore, quibus aliz tenues fibræ intermixtæ. Multas proles ea radix generare solet, vel marri adnascen-

1.

Ranunculus grumosa radice 1111.

Ranunc. il-
lyric.

2.

Ranuncul.
Asiatic. gru-
mosa rad. 1.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice 1.



illud ferè commune habet, quod sub caule inter medios radices grumos, crassiusculus veluti ramulus enascatur, qui obliquè per radicem interstitia se porrigens, in unum caput extuberet,

adnascentes, ut in Tripolitano, sequenti capite describendo, vel subinde tenui fibræ inhaerentes procul à se sparsas.

Similem C. V. Alphonsus Pantius Ferrariefis Medicus, in Belgium ad nos mitterebat Ranunculi Illyrici appellatione.

Alium præterea Jacobus Plateau, multò majoribus folijs, caule, & floribus, magisque incanum, tum etiam magis numerosis radicibus, ut commodè Illyricus major dici possit. Is nunc in omnibus hortis plus satis familiaris: quia latè per tenues fibras, subinde novas plantas generantes, se spargit, & magna loca brevi occupat.

RANUNCULVS ASIATICVS grumosa radice. CAP. LIII.

PEREGRINE investigatorum Ranunculorum qui grumosam radicem habent, Primus, aliquot à radice producit folia, unciam lata, duabus parvis lacinijs divisa, per oras serrata, longis pediculis nitentia, crassiuscula & succulenta, glabra, vel quàm levissimè hirsuta, venisq; ex viridi pallidulentibus prædita, subacidi & ingrati initio saporis, qui brevi in acrem & linguam mordicantem convertitur: folium, caulem inum amplectens, majus est reliquis, & in tres lacinias divisum, quarum singulæ cetera folia æquant, & tripliciter incisa, simulque in ambitu serrata. Medius inter hæc assurgit caulis, teres, viridis, non bevis, sed quadam lanugine oblitus, quem per intervalia ambiunt bina aut terna folia, minora, magisque laciniosa illo quod imo cauli adhæret, summo fastigio amplum sustinet florem, Pannonici, sive Illyrici florem magnitudine superantem, licet ejusdem quodammodo formæ, & prorsus inodorum, quinque, aut sex interdum folijs constantem, nonnunquam etiam (nam sepe viciosus fit) ternis aut quaternis dumtaxat, qui forinsecus phœnicei: sunt coloris, internè verò miniati elegantis & splendentis, medium florem occupantibus plurimis tenuibus & rubris staminibus, quorum apices crassiusculi, initio pulli, deinde cineracei coloris, extuberante inter media stamina capitello, purpuræ nigræ villis obfito, quod in uncialem aut ampliorè longitudinem tandem excrefcens, frequētis seminis rudimento quidem oblitum est, sed prorsus plani & inanis, mihi certè nunquam fertile fuit: multas habet radículas ex uno capite dependentes, breves & crassiusculas, perinde atque Pannonicus sive Illyricus, vel etiam Lusitanicus, à quorum grumosis radicibus non multum differunt (sunt enim aliæ alijs longiores) extremâ tamè parte non obtusa, sed singulæ in tenuè fibrâ paulatim desinèntes, solidæ, fusci exterioris coloris, interioris albi, ingrati initio saporis, deinde acris. Cum Pannonico porò grumosa radice ranunculo

tuberet, è quo multæ radices paullo superioribus minores pendēt, è quorum medio caulis exiit, sub quo deinde alius ramulus similiter prodit, in latus, uti superior, per radicū spatia se spargens, & novam radicū congeriem generans: quin & matri, siue primariæ radici adnascuntur contigui & quasi ipsi insidentes terni aut quaterni similia, & quasi matri æqualium grumorum globi: quæ sanè ratione satis feliciter se propagat: habet præterea albas quasdam fibras per crassiorum radicū spatia sese explicantes & spargentes.

Ranunc. Asiat. πολύκλωνος, siue grum. rad. 11. Ranunc. petegrinus grumosa radice 1.



ALTER, ab illo vix differt vel grumosa radice, vel folijs florūve formā & colore: in solo caule est differentia, qui, ut plurimum, paullo crassior & firmior est, atque etiam πολυκλώνος: ex foliorum, quæ illi adnascuntur, alis unum aut alterum proferens ramulum, qui florem primario paulo minorem sustinet: ut videre licet in subiecta iconē affabrè expressā.

Floret uterque sub Maij finem, aut Iunij initio.

ANNO octogesimo supra millesimum & quingentesimum, Constantinopoli allatæ sunt Magro viro Wolfgango ab Entzestorf, aliquot Prioris radices *Taraboles casamer lali* nomine insignitæ, quod Tripolitanum plenum florem significat: licet etiam hac appellatione quidam amici ex eodem loco postea semen acceperint, quod mihi communicatum & terræ commissum, non Ranunculi plantam, ut sperabam, sed legitimam urticam, vulganter Romanam dictam, produxit.

Subsequentibus deinde aliquot annis, Alterius radices in ferreæ ceperunt Prioris radicibus commixtæ.

SCRIBEBAT porro ad me Iacobus Plateau anno M. D. XCV. se ea æstate Insula Flandriæ urbe, conspexisse in pensilibus hortis Ioannis Bridoul, ejus urbis Medici, Ranunculi duo nova geneta, ipsi antea non visa, semine nata, accepto ex Italia præcedente anno: atque ab illo urrisi siue iconem impetrasse, quam ad me mitteret: ex qua brevem hanc descriptionem concinnabam, & huic capiti interebam, non dubitans, quin rei herbariæ studiosi gratum facerem.

EX radice multis grumis conflante, qualis est Asiatici, oriuntur Primò generi folia plana, Asiatici folijs non valde dissimilia, & inter illa caulis pedalis altitudinis, in binos graciles ramos divisus, summo fastigio sustentens singulares flores, quinque folijs constantes albis, quibus (maximè circa oras) suave rubens color permixtus esset, medium florem obtinebant multa flava stamina oblongiusculum capiculum cingentia: caulem autem, ante

X

quàm

Ranunc. A-
siat. grum-
osa rad. 11.
Ranunc. A-
siat. 11.
Tartar.

Ranunc.

Ranunc. pe-
tegrin. grum-
osa radice.

1.

quoniam in alas divideretur, amplectebantur alia folia, in ternas aut plures profundas lacinas secta.

- II. ALTERVM genus, ex simili radice planiora superioribus promebat folia: inter quæ gracilis affurgebat caulis, cujus infimam partem ambiunt folia in tres profundas lacinas, eafque in ambitu crenatas divisa: mediam autem illius partem, alia singularia, eaque nec laciniata, nec crenata: summo cauli inhaerebat flos quinque folijs, ut præcedens, præditus, similisque cum illo coloris, sed extimâ parte magis orbiculatis, & leviter crenatis: medium florem occupabat breve capitulum staminibus circumdum.

Quo tempore flores protulissent, non adscripserat: sed similia genera etiam se habere existimabat, semine Cretico nata, quorum florem nondum conspexisset.

- III. VNA tamen planta florem protulit niveum illi postea tulit, in reliquis Tripliciani flori omnino simile, ipsius tamen plantæ folia nonnihil differant, quia paulullum albescunt. Illius iconem cum altera, cujus flos radiatim mixtus rubio & flavo coloribus, hoc est, venis flavis magnâ venustate rubrum colorem fecantibus, anno M. D. XCVI. ad me mittebat, & duobus insequentibus annis, ejus qui florem album habet, radices, quæ tamen brevi postea perierunt, tametsi diligentem operam adhiberem, ut eas conservare possem. Scribebat insuper aliud Ranunculi genus ipsi natum semine etiam à Creta accepto, quod Autumnale esset, necdum tamen florem tulisset. An ipse postea florem ejus conspexerit, me latet, quia licet ad me plures ab eo tempore dederit epistolas, in eis nullam ejus Ranunculi mentionem fecit.

Et hæc quidem de Ranunculo grumosa radice, qui florem simplici foliorum serie constantem ferunt, scribenda esse existimabam. Sequente autem capite, illum qui florem plenum, & multiplici foliorum serie præditum habens; describemus.

RANUNCULVS ASIATICVS GRUMOSA RADICE pleno flore.

CAP. LV.

Ranunc. A.
fol. grumosa
radice plena
flore 1.



PEDALEM habet Primus caulem, inter quaternam aut quinam folia diluta viriditate nitentia emergentem, medietate formæ inter palustris & aliterius ranunculi echinato semine præditum foliarum quæ per caulem sparsa, minora & laciniata: summo cauli insidet magnus flos multiplici foliorum glomeratione constans, ut qui ferè in Ranunculo vulgari polyphylo flore tuberosaque radice prædito, non auri tamen, ut ille, coloris, sed coccinei valde rubentis, & quasi sanguinei: ex folijs cauli inhaerentis, ala natus ramus, sustinens similem florem, sed minorem: multa huic radices simul cõgestæ. Lusitanici ranunculi grumosis radicibus per similes, asphodeliformes, pallescentes.

Hanc descriptionem concinnabam, cum Hispanicarum stirpium Historiam publicam facerem, non ex vivâ plantâ (nondum enim videre tum cõtigerat) sed ex iconè vivis coloribus expressâ, quam Generosus Carolus Rym, p. m. defuncto quinquennali Cæsarei Legati munere munere, apud Solum Turcarum Imperatorem, Constantinopoli rediens mihi communicaverat.

Istam portò iconè tametsi ego & aliquot alij, ipsi Cæsarei Legati subsequenter annis miserimus, ut plantam quam ea pictura referebat, ad nos perferendam curarent: nunquam consequi potuimus. Sed Anemone latifolia pleno flore interdum miserrunt, negantes cum ranunculum aut unquâ sibi cõspicuum, aut istic notum esse. Certum tamen erat ex plantâ quæ in rerum naturâ est, ad vivum expressam fuisse, quod mihi testati sunt, & ipse Carolus Rym, & ejus pictor Lambertus de Vos, qui illam delinearat, atque Doctissimus vir Arnoldus Manlius Rymij tunc medicus, nunc in inclita Coloniensi academia Medicinæ professor, qui Anemones genus esse censebat, & ipsa etiam experientia postea docuit.

NAM cum anno M. D. XCI. hæc Historiam Francofurti recognoscere, ut castigatior, & audior in publicum prodiret, Viennam inferni cepisse monitus sum à Generoso Dn. do

Heusenfeld,

Heusen stain, quæ præcedente anno florentem plantam se habuisse scribebat. Illius florem resiccatum ab ea impetravi, ne dubitarem inveniri, etiam sequente Aurûno adnatam grumofam radicem, quæ, licet exilis & exsucca, Maio tamen mense M. D. XCII. florem tulit, qualem cum sua stirpe nunc deferibemus, & iconem ad vivum expressam adjiciemus in studioforum gratiam.

Ranunc. Afiat. grum. rad. pleno flo. 11.

Ranunc. Afiat. grum. rad. plen. flo. 111.



TERNA autem vel quaterna habet à radice prodeuntia folia, Asiatici, sive Tripolitani Ranunculi folijs similia, & illorum instar incisa, minora tamè, inter quæ emergit cauliculus dodranrem pedis altus, gracilior quàm Tripolitani, cui inhzrent bina folia, (interdù & tertium pusillum) quorum infimum ternis profundis lacinijs per oras serratis divisum est, alterum, quod supernum & angustius, quinque lacinijs usque ad medium nervum incisus, quarum singulæ unicam crenam habent, nonnumquam binas, aut plures, extrema verò binas tantum: summo cauli insidet caliculus quinque folijs prædictis gemmam floris amplectens, qui explicatus, multiplici foliorum serie constare conspicitur (cætum enim & triginta habuit) foris subphœnicei initio coloris, deinde miniati, interius elegantis rubri miniati ad coccineum tendentis, quorum alia latiuscula, alia angustiora, umbilicum floris occupante foliaceo quodam capitulo minus miniato: radix Asiatico simplici similis, aliquot grumis minoribus constans, & illius instar propagines ad larera (sed rarò) spargens.

Ranunc.
Asiat. grum.
rad. pleno
flore 11.

HABUIT & eodem anno XCI. Generosa Dn. Vngnadin, Ranunculi pleni Byzantio accepti radices, quarum una diversum à superiore florem dedit. Dimidiati caulis illius cū suo flore iconem suis colonibus expressam ejusdem anni Autumno cum alterius similis (ut adscribebar) radice, ad me mittebat: ruli illa quidem vere sequente terna aut quaterna folia, sed quæ frequentibus imbribus fuere corrupta, deinde etiam radix. Quæ ramen dedit folia, non valde dissimilia superioris folijs, sed minora & pluribus tenuioribusque lacinijs divisa. Radicem, simulatque accepissem, expressi qualis in subiecta tabellâ, folia autem vere, ante quàm marcescerent, reliquam stirpis iconem ex icone missâ imitatus.

Radiculæ porro quinque aut sex, suprema parte crassiusculæ, ex uno capite depedebant, superioribus paulò longiores, & quarum capite prodierunt quæ dixi folia: cauli tereti, ut ex icone missâ apparet, inhzrebant bina folia, quorum infimum in tres majores lacinias divisum, & illæ denuo in ternas, media verò in quinas minores: supernum folium in septem profundiores lacinias dissectum, singulæ deinde in ternas minores: summo cauli inhzrebant flus frequentibus & multiplici serie dispositis folijs constans, quorum alia alijs paulò latio- ra, coloris, ut pictura ostendebat (quem nescio an pictor fideliter imitatus sit) miniati: è medio flore

Ranunc.
Asiat. grum.
rad. capite
flore 111.

dio flore profiliebat pedicellus unciam altus, sustinens alium florem minorem, plenum tamen & ejusdem colons, non secus ac videre est interdum in Ranunculo illo tuberosa & magna radice, cujus flos flavus multiplici foliorum serie constans, qui sepe non modò secundum florem ex primo, sed & tertium ex secundo nonnumquam producit: ex superioris autem folij sinu natus erat ramulus duobus tenuibus foliolis præditus, cujus fastigio insidebat flosculus etiam plenus secundo ferè æqualis.

Nemina.

Quo nomine misce fuerint hæc radices Byzantio, neutra mihi indicare potuit: sed ab illis accepti addita Germanica appellatione *Turgelische Bide root* *Schmalzblum*: hoc est Turcici pleni rubri Ranunculi.

ANEMONE SILVESTRIS.

CAP. LVL.

RANUNCULOS proximè sequi debet Anemone, propter formæ & facultatum quandam cognationem. Exteras verò præcedere debere silvestres consentaneū est. Illarum duas species, licet ab alijs observatas, paulò tamen diligentius describere animus est, quia in Austria, Stiria, & Pannonia sponte nascentes à me sæpius eturæ, & earum femina collectæ.

• Anemone silvestris.

Anem. sil. 1.



Natales.

Tempus.

furto ad Mœnum pratis crescentem observabam. Floret istæ Maio, in hortis culta, etiam Aprilis: quin etiam rursus Autumno interdum. Semen Julio facillimè veoto excutitur, nisi quis maturè colligat, & sæpe negligentius observantem frustratur.

Habuit porro Ioannes Mullerus pharmacopæus Francofurtensis anno M. D. XCII. inter illas quas ante è pratis erutas in hortum transtulerat, binas, quarum hirsutum capitulū flavum apicibus cinctum, multis tenuioribus folijs, partim albis, partim purpurascensibus obtusum fuit, ut quis flore pleno esse suspicari posset.

Anem. sil. 2.

ALTERA, ex summo villosoque radice capite multa profert folia, quemadmodum in Anemonibus silvestris genus, quod vulgus Pulsatillam appellat, illius præsertim quod dilutior præciorè que est flore, folijs similia, latiores tamen, duriora, & in tres foliorum alas divisa, supinâ parte vincta, pronâ paullo candidiora & villosa, ingrati & valde acris saporis: inter quæ caulis emergit palmaris, firmus, hirsutus, quem circa summum tero, ut in Anemonibus, conjunctim amplectuntur folia, laciniata, & multis divisuris secta: flos summo canli insidens sex folijs constat, interiore parte lacteis, exteriori nonnihil purpurascens interdum, & villosus, minor quàm Pulsatilla, sed non paucioribus

PRIMA, ex unâ radice multa germinant folia, Ranunculi cujusdam in uliginosis pratis nascentis folijs pæne similia, tribus usque ad umbilicum incisuris, deinde alijs minoribus laciniata, vincta, mollia, & hirsuta, ingrati initio saporis, postea acris: caulis inter illa asurgit palmaris, interdum pedalis, nudus, satis crassus, candidâ lanugine pubescens, tria alia folia sustinens prioribus ferè similia, sed minora, & inter illa florem oblongiori pediculo insidentem, uoicum, nonnumquam (sed rarissimè) binos, initio anre quàm aperiatur, lanuginosum, deinde ubi expansus est, parte interiore lævem, lactei candoris, exteriori verò, citra ungues leviter interdum purpurascens, quinque, ut plurimum folijs, nonnumquam pluribus constantem, ijs, quæ in Pulsatilla flore, paulò minoribus, orbiculato mucrone, in cujus medio capitellum extuberat, multis croceis staminibus cinctū, quod tandem resolvitur in exiguum semen planū densâ quadam albâ lanugine involutum, quemadmodum in plerisque alijs Anemonibus generibus: radix ex uno capite multas nigricantes & capillares fibras spargit, nonnullas præterea crassiores, quæ serpentes, subinde novas ex lateribus plantas procreant, ingrati & acris saporis.

Vicinis urbi Viennæ pratis, & plerisque Austriæ, Pannoniæ superioris & inferioris, tum etiam inter amnis ultra Dravum flumē montanis locis nascitur. Sed & in vicinis Franco-

Anemone silvestris L.

paucioribus luteis staminibus præditus, quæ tandem in plumari feminis congeriem, quemadmodum in pulsatillis, transeunt: radix oblonga, minimi digiti crassitudine, paucis fibris donata, nigro foris cortice recta.

Crescit hæc in celsioribus Etscher & Deurn-
stein Stiriz jugis, inter scopulos tenui & levi ter-
ra rectos: plerumque verò in ipsis scopulorum
fissuris & commissuris adeo altè radices agit, ut
summâ difficultate, & vix unquam, nisi avulsis
ferreo instrumento scopulorum fragmentis, in-
tegras mihi eruiere licuerit. Floret autem istic
Julio, interdum etiam dumtaxat Augusto, pro-
æstatis maturius aut serius incipientis naturâ, so-
lutis videlicet nivibus: nam è primis floribus
est. Semen plerumque maturitatem acquirit
sub extremum Augustum. Difficiliter autem
vel cicurari vel miriorem aërem ferre potest,
quemadmodum etiam pleræque aliæ elegantes
plantæ in summis illarum Alpium jugis nasci,
quas aliquoties cum suo cespite in hortum intu-
limus, & commodo convenientique earum na-
turæ loco repositas, conservare studuimus: sed
frustra omnem curam & diligentiam adhibuimus.

TERTIUM quoddam & elegans genus, nec
hactenus descriptum, non ego observabam, sed
D. Thobias Roëlius medicus Medioburgensis
apud Mattiacos, dum anno M. D. C. ex Italia
Basilicam proficisceretur.

Ab radice autem (quæ non unquam mini-
mi digiti crassitudinem æquat) villosò capite, ut ille mihi significabat, multa germinabant
folia, vulgaris Pulsatillæ folijs præe similia, laciniata, & multis divisuris secta, mollia, parte
superiâ viridia, pronâ autem paululum candicante & valde hirsuta, inter quæ caulis emer-
gebat nudus, rotundus, lanugine oblitus, circa summum sustinens foliola, è quibus protu-
debat vulgari pulsatillæ similis pediculus, cui insidebat unicus flos major, ut plurimum, pul-
satillæ vulgaris flore, sex folijs constans, quæ interiore parte valde flavæ erant, exteriore au-
tem, ob lanuginem, dilutiora & pallentia: in hujus medietullo orbicularum caput emine-
bat luteis staminibus cinctum, cui villosa cæsarum succedere videbatur, quam Augusto
mense maturitatem consequi ardebat. Florebat Innio.

In Alpium planis nasci asserēbar, nusquam verò abundantius observasse, quàm circa pe-
dem montis S. Bernardi, quâ Helvetios spectat.

PRIOREM exhibere viderur Matthioli Anemones tertiz nomine, licet pictor
iconem negligentius exprefferit. Alterius iconem ponit Lobelius in Observationibus,
solâ additâ appellatione Pulsatillæ albæ: quæ licet Pulsatillæ vulgaris congener sit, ab illa
tamen differt floris formâ, qui nobis modo oon est pendulus, ut Pulsatillæ, neque etiam
mucrone reflexo. Non negaverim tamen Pulsatillam alpinam niveo flore nuncupari
posse, & inter Anemones silvestres, ut & Pulsatillam, esse referendam. Vtræque autem
Belgicorum hortorum incolæ facta est meâ operâ, missis Viennæ Austriæ ad Nobiles viros
Brancionem & Dilsium plantis & seminibus.

SECUNDÆ meminisse videtur Gesnerus in Descriptione Montis fracti, libello de
Lunariis herbis, ut hunc modum. Anemone quædam Alptia, radice nigra, capitulo se-
miosis hirsuto, & lanugine instar vitis silvestris caulicæ referto, Pulsatillæ quam Itali vo-
cant, cognata. Pastores aliqui *Stymus* appellant, quoddam, cataplasmatibus instar, venenatis mor-
sibus imposita, pecori salutaris sit.

TERTIÆ, ut dixi, historia, à nullo hactenus Scriptore prodita: atque ejus cognitio-
nem libens acceptam fero Doctissimo Roëlio, qui ejus plantam siccam ad me mittebat,
ut historiam concinnare possem.

CETERVM, Pulsatillæ vulgaris duo genera passim in Austriæ & vicinarum regionum
locis edioribus & vereo perflatis inveniri otur: unum, præcocius crassiore folio, amplio-
re & dilutioris flore, quod ab Vngaris *le kevkevurchin*, id est, equi kevkevurchin sive equi-
na Pulsatilla: alterum, non adeo præcox, folio tenuius incisio, floreque minore, & purpu-
rei coloris adeo saturi, ut niger videatur, Vngaris *lean kevkevurchin*, hoc est, virgineo kev-
kevurchin



*Pulsatilla
plena flo.*

*Silvarum
Ranunculi.
Anemone
Paeoniae
Ternstro.*

*Gergero
salvato.*

*Anem. lan-
guina per-
grina l.*

*Anem. lan-
guina per-
grina l.*

ke wetchin, sive virginea pulsatilla appellata. Invenitur autem utrumque genus interdum lacteo flore, mixtum inter alias ejus generis plantas nascens, & simul ineunte vere flores producens. Quod autem rubrum florem habet, videre numquam mihi contigit.

Inveniri etiam mihi significatum fuit Pulsatillam, quæ florē duplici foliorum serie constantem ferat, atque ex ejus semine natæ plantulæ missæ, quæ ubi adoleverūt, non duplum, ut speraveram, sed simplici sex foliorum serie præditi florē tulerunt, præcociori similem.

VULGARES etiam sunt in Pannooiæ & Austræ silvis illæ stirpes quæ toti Germaniæ, & multis alijs Provinciis communes, à nonnullis Silvarum Ranunculi nuncupantur, Anemones tenuifoliz cæruleo flore paræ folijs, & inter silvestres Anemoides proculdubio numerandæ: imò à quibusdam silvestris Anemone, Theophrasto λευκάνθη dicta, æstimatæ.

Solent autem illæ novo Vere florem proferre, eumq; aut lactei prorsus candoris, aut purpurascens, aut cui in candore leviter aspersa sit dilutior purpura, sive carneus (siccat mihi hoc vocabulo uti) color. Est etiam quæ flavum habeat: sed folijs nonnihil differt, plerumque etiam humilior est & præcocior. Quæ verò florem habent lacteum, subcæruleum, & purpureum (cujus folia duriora) Neapolitano agro sponte ctescunt, referente doctissimo viro Ferdinando Impetato, atque obradicum actimoniam, *Gergero salvato*, id est, Gingibet silvestre, vulgo appellantur.

CETERVM, præter enumerata Ranunculi nemorosi genera quæ simplici flore constant, bina alia observabam non sponte nata, sed in hortis culta: quorum uoum cum eo qui pleo. flore est, infra describendo, accipiebam.

Id ex radice longâ, terete, & in ramos se spargente instar superiorum Silvarum ranunculi, folia reliquis similia proferebat, & ab extimâ radicis parte cauliculus assurgebat do- drantalıs, tetes, ex viridi purpurascens, summo fastigio gestans terna folia longo pediculo purpurascens innitentia, quæ in tres lacinias dividebantur usque ad pediculum illas sustinentem, inter quæ crescebat triuncialis pediculus, ex viridi etiam purpurascens. florē sustinens octo aut novem brevibus mucronatisq; folijs constantem prorsus albis, quibus tamen externâ parte nonnihil suave-rubentis purpuræ erat veluti inspersum, medium florem occupante capitulo viridi, fragi rudimentum referente, quod ambiebant multa stamoula alba & teoula apicibus flavis prædita: adnascabantur interdum sub flore bina aut terna folia mediâ ex parte alba, alterâ viridia. Florebat cum alijs April.

ALTERVM, in horto ornatissimi viri Christiani Porreti. Quod neque radice, neque folijs, illi quod candidum aut purpurascens florem profert, dissimile erat: longâ enim terpetæ radice,



radice, cauliculos etiam ex viridi purpurascētes habebat, in quorum fastigio, non terna, sed septena plectumque nascebantur folia admodum virentia, in alia terna (eāq; laciniata) divisa usque ad pediculum illa sustentem, qui purpurascēbat: inter quę alius pediculus asurgebat binas uncias longus, herbacei coloris, sustinens florem octo aut novem folijs constante, quorum quatuor externa tribus lacinijs sextimā parte divisa foris circa unguē purpurascēbant, alia interna minimē, sed omnia herbacei erant coloris, & umbilicum habebant inferiore parte ex viridi albescētem, quem occupabat capitellum immaturo frago simile, viride, illud cingentibus multis exalbidis staminibus, flavis apicibus præditis. Florebat Aprili cum superiore.

Ex superiorum portō vulgarium genere, non ita pridem observatę sunt duę novę species, quę plenum florem habent à nullo (quaotum quidem intellexi) adhuc descriptę: certē demum mihi conspecti sunt earum flores sub extremū Aprilem anno M. D. XCIII. quum biconio antē missę fuissent à N. V. Ioanne Borlote, monente circa illatum cultum id esse observandum, ambas in horto veluti cancellis quibusdam cohiberi, aut concludi sētilibus debere, ut plenum florem proferant, alioqui nimia luxuriā degeerare, eāque simplicem dumtaxat dare.

Aut. Ranunc. plenus.

DODRANTALI Prior asurgit caule, tereti & rotundo, quem circa medium æquali seu ambiunt ternę, magnę ex parte foliorum alę, io ternas plerumque profundas lacinias divisę, atque illę rursus io crenas aliquot sectę, perinde ferē ut in eo qui simplici flore albo est, Silvarum ranunculo: sunt verō ea folia supernē virentia, iofernē paululum incana, at brevi lanugine pubescentia: fumus caulis desinit in terna, quaterna, aut interdum plura folia jam dictis minorā, tertiō tamen etiam profundis lacinijs divisa, & in ambitu ferrata, in quorum medio oritur flos multiplici foliorum serie constans, ut interdum tricenis quinis, quadragenis, aut pluribus foliolis præditus conspiciatur, quorum exteriora & ampliora, in tetras nonnumquam lacioas secta sunt & versicoloria, hoc est, coloris ex albo & dilutē virente mixti, interna verō, minora & angustiora, intrinsecus nivei coloris, foris etiam quidem albi, sed cui suave rubens permixtus videatur. odor florum Spinę appendicis æmulus: medium florem occupat capitulum multis staminibus præditum, quale in vulgari Silvarum ranunculo.

Aut. Ranunc. plenus.

ALTERA paulō brevior est, cauliculi tamen similes, teretes & totodi, quos etiam circa medium ambiunt ternę, quaternę, & plures nonnumquam foliorum alę, in ternas profundas, & usque ad pediculum pertingentes, lacinias divisę, & illę similiter io alias lacinias minores

Aut. Ranunc. plenus.

Ranunc. silvar. pleno flore purpurasc.



Tempi.

Virescentia
natalis.

Anemone hortensis. latif. simplo flavo flo.

Anemones
genera prima.Anemones
in sua prima
genera divisi.Anem. hor-
tensis. latif. &
simp. flore.

minores silis, eaque serratae: ipsa folia sup-
ra parte saturè virescentia, pronà paulò candi-
diora, utrimque tamē brevi lanugine pube-
scemia: summo cauli innascūtur ternae, qua-
ternae, & plures interdum foliorum alae, tri-
fariam divisae usque ad pediculum, atque illae
in ambitu crenatae, mollique lanugine, non
secus pubescentes ac majora folia, quarum
petioli saturo colore purpurascūt: inter illas
exoritur flos quadragenis aliquando aut plu-
ribus foliolis constans, quorum externa la-
tiora, quaedam etiam laciniata, interna verò,
minora, omnia autem saturè purpurascen-
tibus infimis unguibus (quibus admixtum sit
caerulei quidpiam) praedita, deinde albican-
tia, tandem dilute & eleganter purpurascen-
tia, medium etiam occupante villoso capi-
tulo, ut in superiore: idem etiam qui in illo
odor. Vtriusque radix perfoliata, longa, teres,
nodosa & ramosa, propagines fundens & ali-
quot fibris donata: denique silvestris radi-
cem per omnia referens.

Paulo serius Silvestris floret: non minus ta-
men acri atque uentis qualitate praedita,
quàm illa.

Ante aliquot annos casu repertae elegan-
tes istae & venustae plantae apud meos Belgas:
quae purpureo quidem est flore in silva, Mo-
nachorum cenobio Florival appellato, ad-
versa, binis à Lovanio miliaribus: quae autem
album illum habet, in silva Meerdael, ditto-
ne Illmi Ducis Arschotensis.

ANEMONE HORTENSIS simplici flore. CAP. LVII.

DVO Anemones genera Dioscorides &
Plinius faciūt, unum, silvestre, alterum,
in culis nascens. Cicuris autem tres esse spe-
cies colore floris differentes: aut enim phoe-
niceum esse, aut candicantem, sive lacteum,
aut purpureū: Gal. lib. 11. κατὰ τὴν γὰρ χύμα
etiam inveniri tradit.

Ego, praeter silvestres, de quibus superio-
re capite egimus, *Externarum*, quae in hortis
aluntur, duo primaria genera observabam:
Vnus enim flores simplici foliorū serie con-
stabant: Alterius autem πολεψυλλαι erant.
Vtrumque porro genus bifariam dividi pos-
se animadvertēbam: nam vel latiore erant
folio, vel renuiore & multifido. Ceterum de
illa cuius flores simplici foliorum serie con-
stant, hoc capite agemus, initium facietes ab
eius speciebus quae latiora habent folia: pro-
ximo πολεψυλλαι δὲ describemus.

LATIFOLIARVM ergo Prima, satis ampla
habet folia, circinatae ferè rotunditatis, in am-
bitu serrata, dura, firma, longòq; petiolo ful-
ta, supinà parte intensiore viriditate praedita,
pronà plerumque purpurascencia, ut Cyc-la-
minis propemodum folia, fervidissimi lapa-
ris: inter quae palmaris exit caulis, teres, sub-
hirsutus, summà parte ferens ternà laciniata
folia, deinde ex illis emergentem pediculum,
qui flo.

qui florem sustinet decem aut pluribus folijs constantem, externâ parte, flavis, internâ, aureis, umbilicem occupante capitulo multis aureis staminulis sepro: radix tuberosa est, oblongiuscula, Tormentillæ vulgaris serè æmula (talem certè eruebam) aliquot fibris prædita, foris nigricans, intus alba, solida, ingrati admodum saporis, quæque gustantem, excitatâ nausâ, quodammodo stranguet deinde suâ acrimoniâ linguam aliquantulum vellicet.

Lapidosis quibusdam Lusitanæ collibus juxta Tagum, atque etiam inter vepres cruebam Decembri anno M. D. LXIII. & insequente Ianuario, qualis videlicet in Hispanicarum Scirpium Historia expressa est: nullum enim florem tum temporis observare licuerat. Sed multos deinde post annos, semine à Lusitania delato, similem apud Hollandos natam me monebat Ioannes Moutonus, pharmacopæus doctissimus & diligentissimus, siccûmque eum caule & folijs florem à Batavia acceptum, communicabat, qualem subiectâ tabellâ exprimi curavimus.

Anem. hortens. latif. duplo flore flavo.

Anem. hortens. latif. simpl. flore 111.



ALIAM latifoliam Anemonem ad me anno M. D. XXCVIII. mittebat N. V. Ioannes Hogelandius, quæ ptima folia promebat jam dictæ serè proxima, purpurascens ex viridi coloris, deinde aliquot alia nonnihil lacinia, inter quæ palmaris unus aut alter caulis prodibat, sustinens solum magnis & profundis lacinijs divisum, è quo assurgebat pedalis interdum pediculus, cui insidebat singularis flos duplici foliorum serie constans, quorum externa sex aut septem, orbiculato erant muerone, nonnulla etiam dentato, foris pallida & tenuibus quibusdam purpurascens venulis quodammodo aspersa, interna autem decem, duodecim, aut plura paulo angustiora, foris etiam pallebant, omnia verò internâ parte flava erant: ex illo porro folio cauli summo imminente plerumque nascebatur alter ramus dodrantem pedis altus, quem medium ambiebat aliud folium minus, minoribusq; lacinijs præditum, ferens etiam in summo florem similem: medium florem occupabat capitulum multis luteis staminibus cinctum, quod maturitate in semen planum lanuginosum abibat, & levis auræ fluxu disseciebatur: radix infra minimi digiti crassitudinem, binas uncias longa, in profundum tendebat, non in latum se spargebat, unamq; aut alteram, interdum etiam plures teretes appendices lateribus promebat, & aliquot insuper fibris prædita erat. Serius alijs Anemonas generibus & germinabat & florebat, semen lunio maturum.

TERTIÆ folia ejusdem sunt amplitudinis cum superiorû folijs, sed Saniculæ foliorum penè divisurâ initio, & pronâ parte nonnihil purpurascencia, mox multifida & tenuius incisa, deinde emergit caulis nudus, lanuginosus, dodrantalis, nonnumquam etiam pedalis, tribus lacinia, tamquam involuero florem occcludens initio, ut in superiore, tandem excrefcens, florè sustinet, in duodena aut quindena folia divisum, foris quasi cinerascens coloris &

Nascent.

Anem. hortens. latif. 111.

Anem. hortens. latif. 111. simpl. flore.

loris & hirsuta, interior missa rubedine purpurâ nientia, gratissimo aspectu, mediû caput villosum nigris flaminulis circumseptum, quod excusso flore, velut primum emergentis asparagi thyrsulus intumescit, & ex plano villosq; sive lanuginoso semine conflatum, per maturitatem levissimo aurg flatu decurrit, & ejus arbitrio ferrur, perinde ac silvestris Anemones Primæ semen: radix novellarum plantarum semine nararum, exigua olivæ similis est, vetustior aurem, nodosa & articulata, foris nigra, intus alba, fibris aliquot, per quas alimentum trahit, prædita, quæ frustulatim fracta pangi & feri potest.

Natalis.

Eam quibusdani Germaniz locis secundum Rhenû, inter Moguntiam & Andernacum, inter vepres in aprico florentem Martio conspiciebam. Post annum etiam m. n. xxc. (nam, ante missam non memini) Constantinopoli caput adferri illi valde similis, si non eadem. In hortis culta, ante hiemem plerique folia producit, verno autem tempore florere, interdum etiam Autumno: semen Maio marurum, quod statim feri præstat, ut sæpe expertus sum. Similem etiam in Italia nasci arbitror: quia paucos ante annos à doctissimo viro Ferdinando Imperato Neapoli accipiebam.

Nemina.

HERBARIORVM vulgus apud Belgas Anemone stellatam sive stelligeram nunc cognominat. Miror autem nonnullos adeo remerarij esse iudicij, ut hanc pro Getanio primo ponere non sint veriti: quandoquidem legitimum Getanium primum, tuberosa radice, sit satis vulgaris notitia.

*Anem. hort.
latifol. v. v.
simplici flore.*

ALIVD genus invenitur illi valde simile, & fortè ejus semine narum, cujus radix superioris radici magnitudine & formâ respondet, quemadmodum etiam folijs (quæ profundioribus lacinijs divisa videntur & dilutius virentia) & floris formâ: colore tamen dissimili, foris enim folia exalbidis obsoleti sunt coloris, intus ex purpurâ dilutiori albicant: capitulum suis staminibus septum medium florem occupat, quod maturitate in pappum, cui semen involutum, abit. Paulo ferius priore floret.

Anem. hort. latifol. simplici flore. vi.

*Anem. hort.
latifol. v. v.
simplici flore.*



*Anem. hort.
latifol. v. v.
simplici flore.*

*Anem. hort.
latifol. v. v.
simplici flore.*

ETIAM antè hiemem sua proferit folia Quintum genus, Tertiz folijs parè familia, inter quæ caulis, ut in reliquis, exoritur palmaris, nudus lanugine pubescens, tribus folijs (vel quàm levissimè, vel non, incis, florem (quod in Anemones generibus vulgare est) occultantibus, in summo præditus, qui tamen ad binas uncias sive binos pollices, vel etiam altius excrefcens supra illa foliola, in octona plerumque, raro plura, folia, dilutiore rubro, & ad carneum quasi tendente colore interior nitentia, albicantibus ungubus, foris autem obsoletè rubentia & lanugine pubescentia explicatur, multis in umbilico violaceis staminibus hirsutum capitulum ambiens: radix tuberosa & nodosa est tenuibus aliquot fibris donata, foris nigricans, internè verò candida.

ALIVD Anemones latifolij simplici carneo flore genus habuit Generosa Domina de Heutenstain Byzantio allatum, quod Aprili & Maio anni m. n. xxc. (111). ipsi primum flores protulit, foliorum formâ, colore, radice, à superiore parum differens: flores etiam simplices, sed decem aut duodecim latiusculorum foliorum numero constabat, purpurei ferè coloris, & ad Tertiz florum colorem valde accedentis, non carnei, ungubus albicantibus, multisque nigricantibus staminibus cingentibus medium hirsutum capitulum, quod etiam maturitate in tometosam lanuginem planum semen continentem, resolvebatur.

QUINTO nō valde abimile Septimum genus, Constantinopoli anno m. n. xxcviii. entum, quinquennio post demum florem tulit Francosurti ad Mœnum, cum reliquis generibus sub Maji initium. Habuit autem planta, quæ mihi unica hujus generis erat, radicem tuberosam, foris nigram, è qua prodibant duo aut tres (ut is annus nonagesimus secundus supra millesimum & quingentesimum fuit admodum ferax in Anemomum & multarum aliarum bulbacearum (stripium floribus proferendis) cauliculi pedales, teretes, ex viridi purpurascētes, & tenui quadam lanugine, ut ceterarum, obducti, quos circa summum cingebant terna laciniata folia, quorū summæ orz pluribus crenis erant divisa, quàm præcedentium, ex quibus emergebant unciales aut ampliores petioli purpurascētes, sustinentes flores, sim-

res, simplici octo foliorum serie cōstantes, tenuiter odoratos, quorum color foris saturatus ex purpureo rubebat, intus verò ulque ad ungues, saturà purpurà (cui admixta rubedo quædam) nirebat & quasi kermesina erat, foliotum orz quodammodo coccineæ, in quas tamen spargebantur purpureascentes radij, & videretur peculiaris quidam color ex utriusque confusus, perquam elegans (sanè, ungues foliorum magni, albi: medium florem occupabat villosum capitellum nigrum, multis staminulis sanguinei coloris cinctum, quoru in apices ex cæruleo nigricantes, quod maturitate in lanuginem resolutum, & illi implicatū nigrum semen habens, ut in alijs latifoliz Anemonis generibus, levissimo aura statu dispersum fuisset, nisi colligendi tempus diligenter observassem.

2. H v i c persimilis videbatur (modò eadem non sit) quam anno M. D. C. apud N. V. A. vander Duyn in culcissimo ejus horto conspicebatur. Ea sanè meà longè vegetior erat, & multo plures caules suis floribus onustos proferebat.

3. N e c ei valde ab similis erat, quæ semine nata, honestissimo viro Christiano Porteto, anno eodem M. D. C. florem tulit, paullo tamen (ut mihi quidem videbatur) dilutiorem, cujus etiam staminula villosum capitellum ambiencia, violacei quodammodo erant coloris, & apices nigri: tria illa similiter folia summum caulem amplectētia erant mucronata, unico dumtaxat in tres lacinas diviso. Florebat dumtaxat Maji initio, quia valde serotinus fuit annus.

CETERVM semine Anemonidum terræ commisso, vel sponte decido, multo plura tam latifoliarum, quàm earum quæ folia multo fissa & tenuiter incisà habent, genera cōspiciuntur in eorum, qui rei herbariz studio se oblectant, hortis, quàm ea, quorum histotiam ante aliquot annos vulgavi: & quotidie nova nascuntur.

Erenim inter latifolias quæ purpureum florem habent, mittebat ad me N. V. Ioannes Boisot anno M. D. XCVIII. genus quoddam ipsi semine natum, cujus flos ipso referentē elegans esset, sed mihi dumtaxat biennio post florem dedit.

I L L V D autem ex radice nodosà tuberosaque & fœtis nigrà, qualis superioris & omnium quæ lato sunt folio (præter eam quæ flavum florē fert) multa promebat folia, illis quæ purpureum, & coccineum, atque carnei coloris proferunt florem valde similia, adeò ut, non confecto flore, plantæ distingui nequirent: atque inter illa caules aliquot teretes, pedalis interdum longitudinis, virides, tenui quadam lanugine obitos, quibus insidebant terna folia mucronata, unciam longæ, quorum medio exilhebat pediculus gracilis, tres uncias longus, tenui similiter lanugine oblitus, sustinens florem elegantissimum octo folijs constantem, coloris purpurei saturi, exterius splendentis, interius minimè, quorum ungues magni, albi que, infimā verò parte, quâ pediculo a thæzebant, purpurei, e minento in medio flore capitello villosi & nigricantes, plurimis subcæruleis staminulis, quorum apices cærulei, cincti: odor florum spinæ appendicis.

Anem. hort.
latifol. v. sim.
simplex flore

Florebat cum alijs Anemonum generibus extremo Aprili & Maio.

NONVM genus etiam communicabat idem Boisot, ipsi similiter semine natum assensens, & istic, ad aliarum differentiam, violaceo flore appellari scribens. Habebat autem folia superiori, aut latifoliz Tertiz non multum dissimilia, quina, septena, aut plura, inter quæ proliant singulares, bini, aut terni cauliculi, teretes, firmi, ex viridi purpureascentes, tenui quadam lanugine pubescentes, pedalis longitudinis, quos circa fastigium ambebant terna folia, ut in præcedentibus, initio florem occultantia, ex quorum deinde medio prosilhebat pediculus, binas aut ternas, interdum etiam plures uncias, longus, sustinens florem octo, vel etiam pluribus interdum, folijs constantem, exteruā parte subpurpureis & splendentibus, internā verò, ex purpurâ violaceis, quorum ungues tubescētes albicante orbe erant cincti, spinæ appendicis florum o. florem quodammodo referentem: umbilicam occupabat capitulum nigris staminulis cinctum, quorum apices ex cæruleo nigrescebant: radix aliarum latifoliarum, radiceis instar tuberosa, fons nigra, & quæ fragmentis, ut ceterarum, pangi potest. Florebat cum alijs Aprili.

Anem. hort.
latifol. v. sim.
pluriflora.

DECIMUM quoddam genus observabam, quod licet totā quodammodo facie Nono simile esset, & floris folia coloris essent etiam violacei: internā tamē parte notis quibusdam erant discreta, nam albis maculis erant insignita. Et certè initio, plantam illam vitium aliquod contraxisse existimabam cujus causa maculæ illæ in flore apparerent. Sed quum radicem incorruptam offendifsem, & sequente anno flores similibus maculis notati conspicerentur, diversum genus esse censeui.

Anem. hort.
latifol. v. sim.
pluriflora.

ALIUD præterea genus habebam cujus flores essent violacei paullo saturationis coloris, non cedens elegantia ei quod à Boisoto accipiebam, & quorum ungues majores magisque candidi erant, propius quodammodo accedentes ad Odavi generis flores. Illud Constantinopoli allatum mihi communicabat Illustris Viri Davidis Vignad uxore anno ante quædam Viennā excederem, ut Francofurtum me conferrem.

Anem. hort.
latifol. v. sim.
pluriflora.

H v i c Anemonidi non valde dissimilis erat ea quæ semine nata Porteto, primum florem tulit anno sexcentesimo supra millesimum, etiam elegans, nec folijs, cauliculis, atque etiam radice distincta à superiore: flos etiam illius flori similis, octonis folijs constanti, exteruā parte

Anem. hort.
latifol. v. sim.
pluriflora.

parte dilutè purpurascensibus & splendentibus, internâ autem violaceis, quorum unguis valde magni, & profus atgentei coloris, etiam eorum infimâ sede, tenui tamè odore & vix sensibili præditus; cujus umbilicum occupabat villosum nigricans capitulum, multisstaminibus nigricantibus cinctum, quorum apices nigri. Florebat Maij initio.

CETERVM eidem Potreto semine nata est alia Anemone latifolia, quæ etiam primum proculit anno M.D.C.

Anem. herb.
latifolia 1111.
simpliciflora.

Ea autem ex tuberosâ & nigrâ radice, qualis superiorum, multa producebat folia, superiorum folijs similia, inter quæ prodibat singularis caulis crassior & firmior, ex viridi purpurascens, & brevi lanugine leptus, in cujus summo fastigio nascebatur tria folia, superiorum folijs paullo ampliora & longiora, omniâque laciniata, è quorum medio affurgebat pediculus crassior quàm in superioribus, ex viridi purpurascens, & brevi lanugine obitus, veluti etiam terna superna illa folia, sustinens ampliorè florem quàm superiorum, duodenis item folijs constantem, foris ex purpureo albescens & splendentibus, internè ex violaceo purpureis & etiam splendentibus, quorum unguis albi quidem, verùm non adeò ampli ut in præcedente, umbilicum floris occupante villoso capitulo nigro, quod ambiebat subfusca staminula, subcæruleis apicibus prædita. Florebat Maio.

Anem. herb.
latifolia 1111.
simpliciflora.

ISTIS adiciemus eas latifolias quæ flores quidem purpureo colore præditos habent, sed multo dilutiore & veluti carneo. Omnes autem, radices & foliorum formâ non sunt dissimiles superioribus, præsertim Tertiæ, caules etiam habet teretes & brevi lanugine obitos, atque ex viridi purpurascens, ut illius, ad quorum fastigium nascuntur uncialis longitudinis folia, quorum unum, ut plurimum, paucis lacinijs sectum, inter quæ exilis triuncialis pediculus, ex viridi etiâ purpurascens, sustinens florem octo plerique folijs constantem, quorum externa pars nonnihil purpurascit, interna coloris est ferè carnei, ejusque vel saturationis vel dilutionis, unguibus item vel amplioribus, vel minoribus, omnium tamen albis, & capitellum medium obinentibus nigrum & villosum, quod ambiunt multa albicantia stamina apicibus cæruleis prædita. Flores autem sunt vel majores vel minores pro terræ ratione & ubertate.

Florent omnes eodem tempore quo superiores, aut interdum paullo serius, pro loci, in quo repositæ, situ. Quædam florem habent nonnihil odoratum, aliz minimè.

Anem. herb.
latifolia 1111.
simpliciflora.

EST & altera Anemone latifolia, quam habui muncere N. V. Ioannis Boïot, cuique Decimumquintum locum dabimus. Ea autem habet radicem nodosam & tuberosam instar radicis præcedentium atque feris nigram, è quâ prodeunt multa folia, ut in præcedentibus, sed majora & crassiora atque in majores lacinias divisa, inter quæ singulares aut plures exoriantur caules satis firmi, virides, vel ex viridi purpurascens, brevique lanugine obducti, desinentes in terna æqualiter nascensia folia, aliarum latifoliarum instar, longiora tamen, ut quæ binas uncias superent, & quadam lanugine pubescentia, è quorum umbilico prodit pediculus tres aut quatuor uncias longus, ex viridi purpureus, sustinens florem octo nris magna ex parte, interdum etiam novem folijs constantem. coloris exteri carnei, & unguibus saturatè purpurascens, internè verò carnei valde diluti, illum, qui incarnati hispanici nomen obtinuit, prorsus refertentis, & à nonnullis orangeus dicitur, suave rubens enim color flavo dilutiore vel pallido suffusus esse videtur: medium florem occupat capitellum villosum ad violaceum colorem tendens, cinctum staminibus ejusdem coloris, quorum apices saturè purpurei & quasi nigri: maturitate in pappum diffusit illud capitulum, cui implicatum planum semen nigrum, ut in præcedentibus.

2. Aliud ejus genus etiam mittebat, jam descripto per omnia minus, cum folijs, tum caulibus & flore, cujus color licet ferè idem, mihi tamen paullo dilutior videtur, in utroque tamen nulla odoris gratia.

Tempus.

Floret utrumque genus cum superioribus: & pro foli, in quo repositæ, ubertate, ampliores vel minores flores proferunt. Non dubium est, quin plantæ earum semine natæ, etiam interdum varient, & flores proferant vel saturationis, vel dilutionis coloris.

Anem. herb.
latifolia 1111.
simpliciflora.

SIMILEM quidem habebat Anemone Decima sexta cum Latifolia pleno flore (de qua sequente capite) radicem, sed ejus folia, quæ etiam multa ex illa oriuntur, non erant adeò ampla & crassa ut illius, neque adeò dilutè virebant, sed ferè erant ijs similia quæ in latifolia purpureo flore, sive Tertia (quæ omnium prima Belgio cognita) nascuntur, inter quæ affurgebat caulis dodrantalis vel etiam pedalis, satis gracilis, viridis, in cujus fastigio nascebantur terna folia uncialis longitudinis, quorum unum paullo latius extimas oras laciniatas habebat, alia duo mucronata erant, interdum etiam alterum illorum nonnihil crenatum: inter quæ affurgebat triuncialis aut amplior pediculus, teres, viridis, aliquando summâ parte ex viridi purpurascens, brevi lanugine obitus, cui insidebat flos octo plerumque folijs constans uncialis longitudinis, interdum bre vioribus, nonnumquam longioribus, ut ejus, cui Pavonis majoris nomen dederunt, florem simpliciter foliorum serie constantem æquare possit, pro foli in quo planta alitur, videlicet ratione: floris color idem qui in plenè latifoliz flore, hoc est, elegantissimo coccineo internâ parte nitens, similes etiam unguis pallescens orbe illos ambiente, externâ autem, quadam lanugine pubescentis: medium

Anem. hortens. latifol. simpl. flore xvi.

Anem. hort. latifol. simpl. flore xvii.



medium florem occupabat capitellum villosum cinctum staminibus purpurascens, quorum apices nigrescant.

DECIMUM septimum Anemones simplici flore latioréque folio genus habuit Constantinopoli allatum Generosa Dn. de Heusenstain, quod anno M. D. XXXVII. mense Aprilis in ejus horto floribus onustum conspiciebam, cujus fragmentum sequente Julio mihi donabatur, ego deinde amicis in Belgio communicabam. Id autem similibus superiori erat folijs, paullo tamen rudioribus, præterea parte velut ærugine infectis supinâ valde viridibus & quasi atris, quorum ea quæ tenuius incisâ, nigris maculis interdum aspersa erat. Vegeta porro erat hæc planta, caulique inter folia promebat firmos, crassiusculos, tribus etiam foliis superne septos, è quibus exilibat pediculus duas uncias longus, florem sustinens amplum, octo folijs constantem latiusculis, elegantissimo coccineo colore internè fulgentibus, in quibus nulli apparebant ungues, externe dilutioribus & lanuginosis: stamina caputulum cingentia sanguinei erant coloris, eorum apices ex flavo & viridi coloribus cõmixtis ad nigredinem quodammodo tendebant initio, at obversi, subærulei ad cineraceum tendentes erant coloris: delapso flore augebatur villosum nigrum capitulum, quod maturitate in lanuginem tomentosam resolvebatur, cui implicatum erat semen planum, nigrum, quale in prædictis, quod etiam ilico farum, ante hiemem germinare solet: radix crassa, nodosa, foris nigra intus alba, multas fibras spargens.

Anem. hort.
latifol. xvii.
simpl. flore.

CETERVM anno sexcentesimo supra millesimum observabam apud N. V. A. vander Duyn elegans Anemonidis latifoliz genus, cui Decimum octavum locum dabimus. Habebat id tuberosam & nigram radicem instar aliarum latifoliarum quas enumeravimus, è qua prodibant folia præter orbiculata, in tres partes usque ad umbilicum divisa, & in ambitu crenata, deinde alia minus orbicularia in tres etiam partes usque ad umbilicum ea sustentem secta, quæ in longas lacinias erant divisa, inter quæ assurgebant pedalis longitudinis caules crassiusculi, rotundi, ex viridi purpurascens, ternis lariusculis folijs in fastigio præditi, è quorum umbilico exibat pediculus duas aut tres uncias longus purpurascens colore, & brevi quadam lanugine obductus, quemadmodum & ipsi caules, ut in reliquis latifoliarum Anemonidum generibus, sustinens satis amplum florem octo folijs constantem, odoris expertem, coloris ex coccineo phœnicei, qualis ferè in papavere rhœade conspicitur, unguibus parvis subpallidis, occupante medium florem capitulo villosi, nigro, cincto multis staminibus ex atro purpurascens, quorum apices initio nigri & splendentes, deinde ex atro flavescens.

Anem. hort.
latifol.
xviii.
simpl. flore.

Florebat dumtaxat Maio, quia is aonus valde serotinus fuit, propter præcedentem asperitatem.

Anem. hort. latif. simpl. fl. xlviii.

Summa cele-
sta virtutum
in Anemoni-
da semine
ta flos.

Anem. hortens. tenuif. simpl. flore 1.

Anem. hort.
tenuif. 1.
simpl. flore.

Natalis.

Ferrariæ Ducis Medico, ejus radicibus Illustri Viro Ioanni de Brancion, qui reliquis deinde communicavit.

rimam hiemem, qualis totis triginta quinque annis in his regionibus non fuerat conspecta.

HABEBAT etiam alias semine natas, quarum folia erant latifolia. Tertiz folijs non valde dissimilia, sed quæ flores haberent quibusdam notis, ab ijs quæ semine nate erant, discretos: ut Natura non minus præ ludat in coloribus florum hujus plantæ, quàm in Tulipis, & Iridibus. Id quod etiam observabam in illis quas nobiles viri Carolus de Bentynck, & Ioannes Hogelandus, atque ornatissimus vir Christianus Porretus semine adquisiverant: nam nonnulli flores habuerunt colorem vel saturatiorē vel dilutiorem, quidam etiam ferē albicantem, alij sanguineum, variantibus etiam mirum in modum eorum ungibus. Imò ipse Hogelandus inter innumeras plantas tum latifolia, tum angustifolia quas semine adquisivit, habuit latifolia quæ hoc anno sexcentesimo supra millesimum, primum florem tulerit, in quarum floribus plusquam triginta coloris aut unguis discrimina observavi, tum etiam in foliorum numero: quas differentias ipse scripto tradidit.

ABSOLVTA latifoliarum Anemonarū simplici flore præditarum histona, ut ad Angustifolias transeat semio consensaneum est. Earum etiā variz sunt species, & illæ quidem folijs & radice inter se differentes: major tamen in florum colore & eorum ungibus conspicitur differentia.

PRÆTER, multa habet folia, novo vere, quæ prodire incipiunt, purpurascens, deinde ex viridi pallens, multihda, Coriandri, vel Limonis potius Anemonidis folijs similia, trigemina plerumque simul pediculis cōnexa, hirsuta, & in terram, ut Diolcorides recte ait, inclinantia: inter quæ caulis exilis nudus quidem, sed quem terna foliola, trifatiam profundius incisa, mediâ parte amplectuntur, quæ aliquamdiu florem occultat, donec Solis calore ex ijs (sepe explicans, & emergens, expandatur in quatuordecim aut quindocim foliola mucronata, minora quàm in latifoliarum generibus, coloris vel cærulei, vel albi, vel utroque mixti. hoc est, externâ parte subcærulei, internâ albi, staminibus albis, quorum apices pallidi, medium florem occupantibus: deculso flore, apparet capitellum præne Ranunculi, conflatū ex feminibus ejus semini etiam similibus, non romentosum ut in Latifolia Anemonide: radix digrals plerumque longitudinis & crassitudinis, in aliquot ramos divisa, & tuberculis obfita, fibras quasdam hac illac spargens, foris nigra, intus alba, quæ similiter fragmentis leri & pangi potest.

Hanc primum ex Italia habuerunt Belgici horti, missis ab Alphonso Pantio, Serenissimi

Flores

Floret novo vere cum Anemonidis latifoliz generibus : ejus semen etiam cum illo maturefcit, aut paullo ferius.

Anem. hort. tenuifol. simpl. flore II.



Anem. hort.
tenuifol. II.
simplici flore.

ALTERIUS folia aote hiemem prodeunt quina aut fena, multo minoribus & crebrioribus incisuris divisa, quàm Prioris Angustifoliz, Bulbocastani, sive Oenantes primæ folijs non valde dissimilia, magis tamen cariosa, & densiora, dilutiusque virentia : caulis inter ea pedalis aut major, unicus ut plurimum, nudus, hoc est, nullis folijs septus, quadam laougioc pubescens instar caulis latifoliarum, quem circa fastigium ambiunt terna minora & multifida folia, ad tempus florem occultantia, quibus explicatis, apparet flos summo cauli insidens, qui caloribus apertus, majore quàm superior amplitudine præditus conspicitur, & sex dumtaxat folijs constare, licet interdum septena aut octo adquirat, purpurei & quasi violacei coloris, externâ parte lanuginosis, cujus umbilicum occupant flamina nigricantibus apicibus prædita, capitellum villolum nigrumque ambientia, quod nullum umquam semen proferre animadverti, licet totis triginta annis vel etiam pluribus in horto aluerim : radix nodosa est, multos in obliquum quaquaversum spargens tenues fragileque ramos, foris nigricantes, intus albos.

Hæc etiam in Belgicâ primum missâ à Pantio : postea aliquoties allata est Constantinopoli Viennam Austriæ. Floret Aprilis, & interdum denuo Autumno, radice mirum in modum propagatur : nam vel tenuissima ejus fragmenta facile comprehendunt & repullulât, etiam abjecta & nullâ terrâ tecta.

Natales.

2. Hæc non dissimilis nec folijs, nec radice nec floris formâ Constantinopoli cum ea quæ violaceo est flore, advecta, in floris colore dumtaxat est differentia, qui non est violaceus, sed ex purpurâ rubens.

IN Hispanicarum stirpium historia dictum est, ex Italiâ missam fuisse Ill. V. Ioanni de Brancion Anemonem, similem radice & folijs Secundæ tenuifoliz, quam caruleum florem multiplici foliorum textura constantem ferre dicebant, quem conspicerem mihi non licuisset. Deinde in Plantarum per Pannoniam & vicinas Provincias observatarum Historia, Constantinopoli Viennam esse allatas Gen. Du. de Heusenstain solidas & recentes minimeque rugosas Anemonidis radices ejus tenuifoliz quæ multorum foliorum sanguineo est flore radicibus persimiles, quas, qui mittebat *Binzæ* ante vocari, & caruleum plenum florem gestare scribebat : quæ licet Bulbocastani folijs similia folia produxissent, florem tamen dedissent non plenum, nec caruleum sed simplicem & alterius coloris. Hoc etiam nomine, vel *Binizate*, omnium autem frequentissimè *Binzæ* de appellatione Constantinopoli postea missæ fuot & illi & Generosæ Du. Vngoadin, atque alijs, Anemonidis radices, quæ tametsi multifida habuerint folia, instar foliorum Bulbocastani, floris tamen colore variant. Singulas porò ordioe describemus.

PRIMA igitur hoc nomine missâ, Tertia autem in classe earum quæ tenuiore folio sunt & multifido, foliorum quidem formâ cum Secundæ folijs respondebat, commodè tamen tenuifolia dici non poterat, singularum eorum foliorum alæ, licet ternæ numero ut in illâ, minoribus frequentibus, latioribusque lacinijs divise erant, Ranunculorû quorundam folijs quantenus respondentes : quæ tamen postremo germinabant folia, latioribus Anemonæ tenuifoliz Polyphylo flore folijs valde dissimilia non erant : inter quæ prodibant singulares caules summo fastigio terna ut in alijs folia sustinentes, latioribus tamè lacinijs divisa quàm in ceteris Binizate speciebus ; è quorum medio proficiens pediculus binas uncias longus sustinebat florem simplici sex foliorum texturâ coæstantem, elegantissimi & flori coccinei coloris, quorû uogues satis magni, ex pallido, fusco & albo coloribus mixtis tincti erant, paucis staminibus capitellum cingentibus & floris umbilicum occupantibus.

Id geous mihi & alijs communicatum, præmatuè ante hiemem gemmas protrudere solebat, quas proximè subsequens gelu corrumpebat : at egregiè cum alijs flores dedit anno M. D. XXXVI. Verùm & hæc Anemonidem, & reliquarum maximam partem nobis corrumpebat

Anem. hort.
tenuifol. III.
simplici flore.

pebat asperitatem subsequens hiemis inclementia, quæ maximam calamitatem omnibus propè Germaniæ hortus adferebat.

Anem. hort. tenuifol. simpl. flore lil. r.

Anem. hort. tenuifol. simpl. flore v. r.



Anem. hort.
tenuifol. lil. r.
simpl. flore.

ALTERA, quæ tenuifoliarum Quarta, similima jam dictæ habebat folia, inter quæ assurgens firmus caulis, terna folia laciniata sustinens, unde proficiebat fescuncialis pediculus, firmus, florem sustinens amplum, octonis (præter istius generis Anemonidum morem) folijs constantem, coloris interiore parte coccinei elegantissimi, unguibus albis, exteriori quidem etiam coccineis, sed tenui lanugine pubescentibus & splendentibus: umbilicum occupante villoso nigricante capite, multis staminibus cincto, quorum apices ex nigro purpureascebant: semen observare non potui, nam florem quem uocum habebat, carpebam, ut rudi minerva delinearem & describerem: sed si quod dedisset, illi, quod subsequentes Anemonides protulerunt, par esse puto.

Anem. hort.
tenuifol. v. r.
simpl. flore.

TERTIA, quæ Tenuifoliarum Quinta est, multa ante hiemem promebat folia, tenuifolia polyphylla sanguineo flore folijs non dissimilia, paullo tamen saturatiora & paullo tenuius incisa: inter quæ caules exibant terni aut quaterni, interdum, ut in illâ, singulares, pedem longi, firmi, putrescentes, & lanugine pubescentes, tribus folijs valde dissectis & laciniatis, florem inito occultatis, Anemonidis tenuifoliae plenæ & ceterarum more prædicti, qui deinde ad tertium unciatum altitudinem aut majorem, supra illa excrecentes, unicum singuli sustinebant florem, magnum, illi qui violaceus est, præ intermedium æqualem, simplici sex foliorum ferie constantem, quæ elegantissimo coccineo colore intus nitebant, foris lanugine pubescebant, quorum ungues albi, & umbilicus, à multis purpureo violaceis staminibus medium caput cingentibus, occupatus: radix tuberosa & nodosa ut superiores aut Tenuifoliae pleno flore. Hæc una ex illis Anemonidibus Binizade appellatione insignitis est, quæ cæruleum plenum florem gestare debebant.

Anem. hort.
tenuifol. v. r.
simpl. flore.

QUARTA Binizade, sive Tenuifolia Sexta, folijs à Tertia nihil differebat, pedalisq; longitudo caulem habebat, circa fastigium tria folia sustinebat, aliarum instar, latioribus lacinijs divisa, deinde supra illa palmari longitudine affurgentem, & florem sustinentem amplum admodum, teliquis ejus generis majorem, simplici similiter sex foliorum texturâ constantem, non orbiculato mucrone, ut superioris, sed in cuspide in ferè desinente, coloris sanguinei elegantissimi, unguibus albis magnis, villoso capite umbilicum floris occupante, & multis sanguineis staminibus obfuso, quibus infidebant apices ex cæruleo purpureascentes: radix superiori similis.

Anem. hort.
tenuifol. v. r.
simpl. flore.

BINIZADE Quintæ, sive Tenuifoliae Septimæ folia ante hiemem prodibant, humilissimæ spargebantur, ut in superioribus, & paullo majoribus lacinijs divisa videbantur: inter quæ

Martio

Anem. hort. tenuif. simpl. flore vii.

Anem. hort. tenuif. simpl. flore ix.



Martio exibat caulis dodrantalis, tenuis, teres, purpurascens & brevi lanugine pubescens, ad cujus fastigium nascebantur petinde ac in alijs genetibus tria minora laciniataque folia, florem regnna, minus tamen incila quam in Terna Binizade, ex quorum medio prodibat pediculus binas aut tres uncias longus, subpurpurascens, cui insidebat flos minor alijs, & coccineo quidem colore præditus, sed nonnihil ad sanguineum tendente splendens, qualis in quarundam Tulipatum floribus conspicitur, sex, ut plurimum, nonnunquam quinque dumtaxat, sed interdum etiam septem folijs constans, eorum unguibus magnis, exalbidis, qui putperei venis distincti erant: umbilicum floris occupabat nigricans capitellum, tenuibus purpurascensibusque staminibus cinctum, quorum apices nigricantes: id maturitate in tomentum resolvebatur cui implicatum planum, ut in cæteris, semen.

2. Hujus flos interdum variat: nam licet sex folijs constet & coccineus sit, ad costâ tamen lateris colorem accedit, nec splendens est. Variat. Vtriusque autem radix Tenuifoliae pleno flore radicem non minus refert quam prædictæ.

Non erat dissimilis superiori cum radice tum folijs, quæ Sexta Binizade nomine missa, sive Tenuifolia Octava, frequentèq; ex radice promit caules pedem altos, virides, summo fastigio ex viridi purpurascens, & tria etiam folia minora tenuiter incila sustinentes, inter quæ exurgit palmaris pediculus ex viridi purpurascens, & brevis lanugine pubescens, cui insidet flos major superiore, sex folijs constans externâ parte lanugine quadam obductis & coloris sanguinei saturatioris & splendentis, internâ autem sanguinei coccineo permixti, quorum ungues ejusdem ferè sunt coloris, sed splendentis aliquantulum, quâque pediculo adherent quodammodo pallentis, umbilicum floris occupante nigricante capitello purpurascensibus staminibus cincto, quorum apices ex cæruleo fusci. Abit tandem illud capitellum in albicans tomentum, cui implicatum semen planum ut in præcedente. Floret April, interdum denuo sub extremum Autumnum.

Tenuifolia Septimæ similis erat radice & folijs Septima Binizade appellatione missa, sive Tenuifolia Nona. Ejus autem flos senis folijs non constabat, ut reliquarum maxima pars, sed quatuordecim & plunibus, ijs ferè similibus, quæ interiori parte floris Tenuifoliae plenè conspiciuntur, diluti tamen admodum purpurei coloris, & quasi carnei, nullis unguum vestigijs: medium autem capitulum ambiebant multa purpurea stamina, quorum apices cærulei.

Maior florebat apud Gen. Dr^{am} Vngnadin anno M. D. XXXVIII. Autumno præcedente ipsi cum alijs plenisque singulatibus Byzancio allata. An ferat semen, mihi incertum: nam quæ unicam ejus plantam haberet, eamque uno dumtaxat flore præditam, illum ut præ-

scinderem permittebat, quo commodius de scribere & delineare possem An portò infrequen-
te anno similem florē tulerit, & semen dederit, ignoro: nam nūc ipso anno Viennā discessi.

Anem. hort. tenuif. simpl. flore x. & x1.

Anem. hort.
tenuif. x.
simpl. flo.



Anem. hort.
tenuif. x1.
simpl. flore.

Ranice atque folijs Tenuifoliz Quintæ pro-
xima ferè erat Binizade Oclava, vel Tenuifolia
Decima, licet folia paullo crassiora & magis luc-
culenta habere videretur, atque pronâ parte
splenderent: inrer quæ nascebatur caulis pedem
longus, firmus, viridi lanugine obsitus, terna fo-
lia sustinens, non adeò frequentibus lacinijs divi-
sa quàm superiorum, quibus flos initio obvolve-
batur: è quorum umbilico crescebat pediculus
tres circiter uncias longus, amplè gestans florem,
eo qui violacei coloris est æqualè, sex folijs con-
stantem, ut ceterorum maxima pars, exalbidi vi-
rescentis primum coloris, deinde nōnihil ad car-
neum tendentis & circa ungues virescentis ex-
ternâ parte, internâ verò albi. plutimis in umbli-
co tenuibus staminibus carnei coloris, quorum
apices nigri, hirsutum carnei quæ panè coloris ca-
pirulum cingētibz. Ista etiam missa fuerat Gen.
Dn^e de Heufenstain pro ea quæ florem car-
neum plenum ferret.

FOLIIS, caulibus, radice, jam dictæ responde-
bat Nona Binizade, aut Tenuifolia Vndecima
Anemone: cujus flos pediculo infidebat è tribus
laciniatis folijs emergenti, satis magnus, brevior
tamen superiore, sex ut plurimum folijs præditus
(interdum etiam oclonis aut pluribus) coloris ex-
ternâ parte carnei albo mixti, internâ verò pro-
fus ferè albi, unguibus & venis ex albo paululum
virescentibus: medium florem etiam occupabat
hirsutum capirulum albis staminibus cinctum,
quorum apices subcærelei. Matura utriusque ca-

pita in tomentosam lanuginem platum semen continentem resolvebantur, & à levissima
aura dispergebantur.

Vtramque hanc Anemonidem tenuifoliam exalbido flore Decimam videlicet & Vn-
decimam in eadem tabellâ exprimi curabam, alterius tamen dumraxat florem, quum ce-
teris nonis conveniant.

Et hæc quidem omnes Anemonides sunt, quæ Binizade appellatione missæ. Ceterum
istam varietatem satione fieri credibile est: nam in alijs quibusdam etiam plantis idem
contingere observabamus.

CETERVM aliam Anemonidem tenuifoliam albo flore conspiciebam apud N. V. Ioan-
nem Hogelandum, quam alter utriusque istarum semine natam non dubito.

Anem. hort.
tenuif. x11.
simpl. flo.

Multa autem promebat ex radice folia multifida instar aliarum Anemoniarum tenuifo-
liarum, vinda, non splendentia: inter quæ exibant bini aut plures caules dodrantes vel
etiam pedem longi, rotundi, firmi, in quorum fastigio terna nascebatur folia multipliciter
divisa, ut in reliquis Anemonibus multifido folio præditis, è quorum media sede exibit pe-
diculus, binas, ternas, aut plures uncias longus, gracilis, purpurascens ex viridi coloris, su-
stinens amplum florem, sex folijs prorsus candidis constantem, exceptis foliorum unguibus,
qui externâ parte nonnihil virescebant: medium florem occupabat capitulum nigrum, plu-
rimis staminibus albis cinctum, quorum apices nigri magnam venustatem candido flori
adebant: radix erat tuberosa, crassiuscula, instar radices superiorum, aut illius Anemonidis
tenuifoliz, quæ plenum sanguineum florem profert.

Anem. hort.
tenuif. x111.
simpl. flore.

ANNO portò M. D. XXXVI. Constantinopoli missas novo vere accepit Generosi viri Davi-
dis uxor exsuccas Anemonidum radices, quæ statim telluri creditæ, subsequente Maio &
Iunij initio flores protulerunt non unius generis. Nam licet omnes multifida instar Bulbo-
castani haberent folia, & crescendi formâ atque radice Tenuifoliam polyphyllâ flore ru-
bro sive sanguineo referrent: quarundam tamen flos simplici sex foliorum serie constans
prorsus niveus fuit præter foliorum ungues, qui carnei quiddam coloris mixtum habebat
capitulum hirsutum, floris umbilicum occupans, sepebant multa candidâ stamina, api-
cibus ex obscurâ purpurâ nigricantibus prædita: Aliarum flos fuit coloris sanguinei, & ple-
nus. Singularum radices similes crasse & nodosæ. Omnes autem missæ Galipoli lale nomi-
ne, & subsequenti hiemis inclementiâ corruptæ.

CETERVM

CETERVM insequente anno accipiebam Byzantio aliquot Anemonidis radices, istic in foro redemptas meo ære, cum quibuldam alijs peregrinis plantis, quarum res inter eas quæ tenuiore fuerunt folio, florem habuerunt à jam delictis coloris nonnihil variantem.

Anem. hort. tenuifol. simpl. flore. XIII.



VNA protulit multifida & tenuit incisa folia, reliquarum Anemonarū Bulbocastani folijs præditarum modo: inter quæ dodræcales aut ampliores caules, nudi, firmi, subhirsuti vel brevi quadā lanugine pubescentes, cetera minora folia aliquot lacinijs diuisa circa summum fastigium habentes, deinde summo fastigio, quod supra rerna illa folia ad aliquot uncias exercebat, florē sustinentes sex foliorum fene constantem, externā parte carnei coloris præfuit, præter albicantes oras, internā verò exalbida, venis ramen carnei coloris ab imo ungue usque ad medium folium sparsis, umbilicum occupante villoso capitulo, multis leviter purpurascens staminibus nigricante apice præditis obfuso: hujus verò radix à superiorū radice valde differebat, & Tenuifoliz Secundæ, quæ violaceū fert florem, radici proxima erat: nam medium quidem radicis caput, è quo folia & caulis emergebāt, extuberabat & crassius erat, ut in illā, deinde tenues fragilesq; ramos foris nigrescentes, intus albos, illius instar quaque verſum in latera spargebat. Hæc insequente Vere flores dedit.

Anem. hort. tenuif. XIII. simpl. flore.

ALTERI, singulis quidem annis folia emergunt Priori non dissimilia: sed quadriennio post dumtaxat ejus florem mihi conspicere licuit, qui singulari caulī tereti innitebatur ternas aut quaternas uncias supra minora illa folia tenuibus lacinijs diuisa assurgenti, sex similiter folijs præditus, & pænè prioris flori similis, candidior tamen, nec valde à Decimæ tertiz flore diversus, multis

Anem. hort. tenuif. xv. simpl. flore.

staminibus albis subæruleo apice præditis, & hirsutum capitulum cingentibus, ejus umbilicum occupantibus. Hujus radix à Prioris radice longè diversa, nam nullos nigricantes ramos in latera spargebat, illius instar, verum in tuber cōtracta, Tenuifoliz quæ plenum florem fert, radicem, forma, magnitudine & colore valde referebat, vel etiam magis albescebat: breviter non valde dissimilis XIII.

TERTIA, neque folijs, neque radice ab hac differebat, floris etiam forma similis (sex enim folijs constabat) amplior tamen, & foliorum magis orbiculato mucrone erat, color etiam diversus, nempe tuber seu porius sanguineus adeo saturatus & elegans, ut cum illo, qui in sericeo panno villoso rubro saturo, & ad nigredinem quodammodo tendente, elucet, contendere posse videretur: ungues adhuc magis saturi, albicantibus tamen quibusdam venis distincti: umbilicum occupabat hirsutum fuscum capitulum, quod ambabant multa stamina ex purpurā rubentia nigricantibus apicibus prædita.

Anem. hort. tenuif. xvi. simpl. flore.

Florem etiam hæc dedit quarto demum anno post quā illam accepissem.

NON minùs elegans, nec etiam ei valde similis erat, quam Lugduni Baravnum observabam. Ea etenim ex radice similiter tuberosa & crassa ut superiorum, multa producebat folia multifida instar præcedentium, & inter illa caules ternos aut plures pedalis longitudinis, interdum majores, quorum fastigio insidebant terna folia minora multipliciter incisa, & supra illa assurgebat crassior pediculus, quaternas uncias lōgus, ex vindi purpurascens, sustinens florem valde amplum, non cedentem magnitudine flori Secundæ Tenuifoliz, sex folijs constantem, coloris sanguinei ex arro rubentis & quasi sericei panni villosi kermesino colore præditi æmuli, quorum in fima pars circa ungues splendebat, floris verò umbilicum necpabat capitellum nigrum villosum, exhibitis staminibus ejusdem cum folijs pænè coloris, paulo ramen dilutioris septum, quorum apices nigri. Florebat Aprili.

Anem. hort. tenuif. xviii. simpl. flore.

ALIAM præterea valde elegantem conspiciebā in Illustrissimæ Ducis Arschotenſis hortō florentem Lugduni apud Baravos, quā à me accepisse dicebat.

Habebat aurem illa, multa & tenuiter incisa folia humi sparsa instar aliarum Tenuifoliarum, saturatiore tamen (ut mihi quidem videbatur) viriditate prædita, pediculus ex vindi purpurascens innixa, inter quæ prodibant bini, terni, aut plures caules purpurascens, tenui brevique lanugine obducti, utin præcedentibus generibus, summo fastigio sustinentes

Anem. hort. tenuif. xix. simpl. flore.

terna

terna folia, instar eorum quæ in alijs Anemonibus tenuifolijs multifida & xqualiter nascentia, è quorum medio exibat pediculus ejusdem cum caulis coloris, unciam unam aut alteram longus, aut paullo major, cui iosidibatur flos sex folijs constans, brevi tenuique lanugine exteriori parte pubescentibus, coloris dilute rubescentis, interiore verò coccinei valde diluti, quorum ungues ampli erant & albi, umbilicum obidebat fuscum capituli multissanguinei coloris staminibus cinctum, quorum apices nigri: radix ferè ei sin.ilis quæ renifoliaz pleno flore. Cum alijs generibus Aprili florentem, qui odoris exerts, proferebat.

*Anem. hort.
tenuif. xx.
simp. flore.*

Eodem similiter tempore Aliam observabam florentem, quæ ex tuberosâ crassâ radice instar superioris, multa producebat folia multifida, ejus tenuifoliaz quæ plenum flutem habet folijs similia, inter quæ etiam exoriebantur bini aut terni, interdum plures, pro plantæ magnitudine, caules, pedalis longitudinis, virides, brevi lanugine pubescentes, ferentes summo fastigio terna minora folia, sed valde etiam dissecta, inter quæ exillebat pediculus tres aut quatuor uncias longus, ex viridi purpurascens, & brevi tenuique lanugine obsitus, sustentens florem sex uocibus folijs constantem elegantis coloris, veluti ex sanguineo & coccineo medij, non saturi tamen sed diluti, eique protus similis quem vulgus cochinnileum appellat, eximâ parte orbicularis, non autem muctonatis, quorum ungues magni, albi, & quasi argentei, umbilico floris occupato à nigro villosio capitulo, quod ambibant multa tenuia staminula ejusdem cum flore coloris, & oigris apicibus prædita.

*Anem. hort.
tenuif. xx.
simp. flore.*

Cum ea conveniebat Altera, tam radice quàm foliorum formâ: caulis tamen & folia in hac magis dilute virelcentes videbantur, quemadmodum & terna illa quæ in summo caule nascuntur, cum pediculus cui flos iosidebat, qui etiam crassiores & firmiores erant quàm in superiore: flus item major, licet fenis duntaxat folijs, ut ille, constans, sanguineo tamen colore quodammodo præditis, vel inter coccineum & cochinnileum medio, albicantibus unguibus ijsq; minoribus quàm in superiore: capitulo in floris umbilico sito, staminibusque illud ambientibus cum suis apicibus, nil protus differebat à superiore.

Hæc sunt quæ de Anemonide tenuifoliâ florem simplici foliorum serie gerentem observabam: non dubito autem quin plura genera repetiantur, & multo adhuc plura quotièdi exortura cõsidimus, vel foliorum numero, vel colore, vel alijs notis flores discretos habitura, in ijs plantis quæ superiorum semine vel natæ sunt, vel nascentur.

*Anemonides,
ut plurimâ,
caulis singu-
lari non ra-
tione habiti.*

Cæterum, Omnia Anemonidum genera, singulares caules, interdum duos, aut tres, vel etiam plures, prout magnæ & amplæ vel vetustæ sunt radices, proferre solent, & nullis ramis præditos: noo candidè igitur agunt, qui eas multifido & ramoso caule expressas nobis proponunt. Noo tamen inficias eo, quin interdum Naturæ luxuriantis lusu cõtingere possit, ut unus ramulus, interdum & alter, inter superna illa folia summum caulem amplectentia enascatur, ut mihi accidit in Tenuifolia hortensi simplici sex foliorum coccineo flore anno M. D. XCXC, & latifolia hortensi simplici flore Tertia, anno M. D. XCII. atque etiam alijs Tenuifoliæ generibus anno M. D. XCIII. & Hogelando in eâ Tenuifolia albo flore, quam semine adquisierat: verum id rarissimè, & præter ipsius plantæ naturam: nisi forte Latifoliæ Secûdæ quæ peculiare esse censeat, ut caule in binas alas divisum gerat.

*Anemone
Angulata.*

REFERT diligentissimus Anguillata, se in altis montibus observasse Anemonidis genus multifido & lanuginoso folio, cujus flos quatuor duntaxat folijs constaret Papaveris florum instar, qui vel rubri coloris esset, aut albi, aut cærulei. & in Apulia genus illud inveniri, quod Galenus luteo esse colore scribit: quod quum non facie, sed solo colore à reliquis generibus differe asserat, plurimum dubito, an latifoliæ genus illud sit, quod secundo loco descripsi.

Nemina.

DICTUM autem Græcis ἀνεμών, Plinio Anemona & Phenion, Gaza Fremium (nisi mendosus sit ejus codex & Phenion cum Plinio scripserit) novâ & inusitatâ voce venit: nullum vulgare oomen novi. Ruellius tamen *Coguelourdes*, Cocles, & *Passe fleurs* à Gallis appellari asserit. Scio postremo duo nomina Papaveri erratico nonnullis Gallicis tribus: vox *Coguelourdes* Pulsatillæ fortè convenire possit, quæ silvestris Anemonæ genus est. Non desunt tamen, qui simili appellatione Pseudonarcissum pallido flore donent.

Coronariam autem plantam apud Veteres fuisse, ex Athenaei Deipnosoph. Hist. libro xv. apparet.

Nicander enim lib. II. Georgicorum flores coronarios apud eum recensens Anemonidis meminit, his verbis,

*Et Anemonides fulgentes ipsæ, antea quàm contractentur,
Splendore procul colore allicientes.*

Et Cratinus in Effeminatis, apud eundem,

*Chamamelis omnigenis ornatur mihi caput,
Lilijs, rosis, scirjis, cosmosandalis, violis, sifymbrijs,
Anemonarum vernis calicibus, serpillis, croco, hyacinthis, &c.*

OMISSIS porro Neotericorum varijs de Anemonide sententijs, ejus vis acris est, & proximè ad Raouunculi facultates accedere videtur.

ANEMONE HORTENSIS pleno flore.

CAP. LVIII.

Sed longe omnium elegantissima sunt duo illa Anemonidis genera, quorum Polyphyllum, sive multiplex serie constantem habent florem: quarum historia in Appēdice ad Plantarum in Hispanijs observatarum descriptionem data est, & in Pannonicis Placitarum observationibus auctor reddita: nunc verò quia circa illarum alteram, latifoliam videlicet, quasdam notas diligentius observare mihi licuit, ejus historiam de iotegro retexere placuit. Ejus verò plures observabam species.

*Anem. plena
flore duodecim
petala*

Anem. hort. latif. pleo flo. versic. radix.



ILLARVM enim Prior, multa habebat folia, lata initio, & latifolia simplici flore Primæ folijs pæne similia, deinde Saniculæ aut Tertiz latifolia foliorum æmula, majora tamen, magis dura nervosaque, & in tres lacinias altius divisa, insuper in ambitu serrata, supinâ parte viridia admodum & quasi oigrigantia, pronâ candidiora, fervidissimi saporis & illico linguam urentis, ante hiemem etiam germinantia. Novo jam Vere, unus aut alter caulis inter folia prodibat dodrantalis, interdum etiam pedalis longitudinis, crassiusculus, nudus, brevi lanugine septus, circa fastigium tria exigua folia, aut nullis, aut rarissimis lacinijs divisa ab eodem fere exortu prodeuntia & simul tandem caulem amplectentia proferens, deinde binis uncijis supra jam dicta folia emergens, magnum ac latè expansum florem sustinebat, numerosis folijs constantem, quorum exterosa & majora dena aut duodecim, colore viridi, ut plurimum, prædita erant, eorum mucronibus coccineo colore leviter & virgatim infectis, interna verò minora, & angustiora dilutior ex rubro purpurâ nitebant, & quæ medium florem occupabant ejusdem etiam coloris, ad umbilicum reflexa, & veluti glomerata erant.

*Anem. hort.
latifol. plena
flore 11.*

HABUIT porro Generosa Dn. de Heusenstain anno octogesimo quarto supra millesimum & quingentesimum ex hujus fragmento, quod aliquot ante annis ipsi communicaveram, florem modò descripo similem, qui ex

Faciat.

alio simplici octo latiorum foliorum partim viridium, partim coccineorum flore, truncatili caule supra terna minora folia inoerente emergebat, quem sustinebat uncialis pediculus purpurascens, elegante sanè spectaculo.

ALTERAM speciem habuit illo ipso anno eadem Generosa Dn. quæ amplissimum gestabat florem, insidentem pediculo duarum aut trium unciarum supra terna illa minora folia emergeoti, initio quidem virentem, deinde coccineum colorem paulatim contrahentem, octonis tamen aut pluribus folijs latioribus & externis reliqua amplectentibus, aliquam viriditatem retinentibus, interiora verò coccinei prorsus erant coloris, eorumque ungues superiore parte ex pallido flavescabant, infimâ, quæ capiti in hærebant, coccinei radiatim in pallido desinentes erat coloris: floribus autem umbilicum non occupabant glomerata & reflexa folia ut in præcedente, sed villosos capitellum nigricans, multis nigris staminibus cinctum, quorum apices initio ex viridi pallidebant, deinde, ubi obversis, ad subæruleum colorem tendebant. Ejus floris diameter erat tribus uncijis Romanis, sive quadrante Romani pedis amplior.

*Anem. hort.
latifol. plena
flore 11.*

SIMILEM nunc aliorum omnes rei herbarie cultores Belgici in suis hortis, in quâ tamen duplex discrimen animadvertēbam.

VNA eorum caules inter folia producebat dodrantem aut pedem longos crassiusculos & firmos, virides, sustinentes summo fastigio quaterna plerumque, nonnunquam etiam quina oncialis longitudinis folia, quorum unum latiusculum & extimâ parte in lacinias divisum, reliqua mucronata, viridia, interdum tamen uno aut altero, rubro colore confuso: pediculus deinde inter illa assurgebat, tres, quatuor, aut plures nonnunquam uncias longus, crassus, firmus, viridis, pubescens, cui insidebat flos unicus, vicenis, tricenis aut pluribus folijs constans uncialis vel etiam amplioris longitudinis, eleganti saturatiore splendentesque coccineo colore præditis, quorum ungues sanguineos ambibat magnus orbis pallidus, qui ma-

*Anem. hort.
latifol. plena
flore 11.*

Anem. hort. latifol. plen. flor. versicolor.

Anem. hort. latif. pleno flore coccineo.



qui magnum decorem flori addebat : floris umbilicum occupante capitello villosa nigro staminibus sanguineis subcartuleos apices habentibus cincto.

Anem. hort.
latifol. Pavo
major III.

ALTERA flores minus plenos proferit, & interdum simplici octo, novem aut decem foliorum duntaxat serie constantem; alioqui, nec folijs nec floris amplitudine, nec colore ab ahâ differt.

Singularum radix crassa, & in aliquot capita extuberans, Latifoliae Tertiae simplici flore radiceis instar, foris nigra & scabra, intus alba, solida, ingrati saporis & fauces coarctans, multisque tenuibus fibris prædita.

Tempus.

Aprili vel paullo etiam serius florem istæ expandunt. Sed Prioris flos rarissime in Germania ad frugem pervenit, frequentissime enim, ante quàm sese explicet, vitium contrahit. Certè licet multis annis aluerim, ultra ternos aut quaternos ejus flores explicatos videre non memini. Cassellis autem in cultissimo horto Illustrissimi Principis Wilhelmi Landgravij Hassiæ &c. maximum & amœnissimum protulerat anno M. D. XXXI. quem vivis coloribus ipsius jussu expressum, dum sequente Octobri ipsius Celsitudinem convenirem, mihi conspiciendum præbebat.

Nomina.

PRIOR istarum Constantinopoli semper allata fuit *Ginl* vel *Gul catamer* appellatione, quâ (ut ante diximus) roseos præne omnes flores & multiplici foliorum serie constantes donant. Vulgus autem Herbariorum apud Belgas & Chalcædonicam, & quia ejus flos plerumque vitiosus est, & in caput multis vindibus folijs constans degenerat, vitidis Anemonidis cognomen illi tribuit. Alteram autem quæ perfectum coccineum florem gestat, Pavonem majorem appellant, quod ejus flos, orbem illum, qui in extremis caudæ pavonum plumis conficitur, quodammodo imitetur, tametsi diversis coloribus præditus.

Harum radices, perinde ac Latifoliarum simplici flore, præsertim quæ crassæ & globosæ sunt, temporis diuturnitate plerumque cariosæ fiunt, & vitio deinde ad extremos nodos serpente, tandem penitus corrumpuntur, nisi æternis ad minimum annis, in fragmenta divisæ, tellurique commissæ pangantur.

Anem. hort.
tenuif. pleno
flore.

CETERVM Alterius, quæ pleno flore est, folia, numero quina, fena, aut plura sunt, multifida, Bulbocastani, aut Tenuifoliae secundæ, simplici sex foliorum serie florem gerentis folijs similia, paullo tamen dilutius virentia, seu verius ijs quæ reliquæ tenuifoliae, florem coccineum simplici sex foliorum serie constantem gestantes crassioresque radice præditæ

Anem. hort. tenuifol. pleno flore.



ditz, habent: caulis etiam illarum cauli similis, quem circa summum tria minora tenuiter incisa folia ambiunt, florem, ante quam aperiat, occultantia, qui summo cauli ad binas, ternas, aut plures uncias supra minora illa folia succrescenti insidens, in dena, aut plura externâ parte pubescentia, longâque & latiuscula atque etiam majuscula folia explicatur & oeci modo rubetia, internâ verò parte coccineo saturatiore nitentia, quæ numerosa tenuiaq; foliola sanguineo colore prædita amplectuntur. Hujus radix nodosa quidem est, sed paullo longior alterâ, & licet foris nigricans, nitidior tamen, & palliditate colore quasi perfusa, breviter earum radici similis, quarum flores sanguineo coccineosq; colore sunt præditi, intus alba, ejusdemque cum aliarum radice saporis, & tenuibus fibris, ut illæ donata, & fragmentis pangi potest.

Hæc porro multo liberalior esse solet in proferendis floribus quam reliquæ, rarissime vitium faciens: imò, si mitior sit acris tepeties, Autumnus flores denuo gestans, sed magis dilutos, & intermis folijs (caloris defectu) aliquâ viriditatem retinentibus. At in ijs qui Aprilis aperiantur, ego & alij aliquando eam amplitudinem habuimus, ut Germanici talleri orbem æquaret, & trium aut quatuor simul cõjunctorum crassitudinem superaret, hoc est, ut duas uncias lati essent, & unam densi. Hoc etiam ego & alij experti sumus, in integristadibus & earum fragmentis, ut charta dumtaxat involutz, & sine terrâ sicco

loco per totum Autumnum totâque hiemem reservatz, deinde ineunte Vere terræ creditæ, Maio mense folia protulerint & insequente Junio flores. Idem periculum in aliarum Anemonidum radicibus fecimus, & successit experientia, verum in nullâ felicius quam in Tenuifoliâ polyphyllâ flore.

M H I primum ejus radices communicarunt Constantinopoli missas vel allatas Illustris Vir David Vagnad, & Gen. Carolus Rym, ejusque affinis Philibertus de Bruxella: quæ deinde meâ operâ Belgicis hortis communes factæ, missis Viennâ Austriæ ad amicos earundem radicibus. Illam autem paucis annis ante quam, ad Cæsarem Maximilianum evocatus, Viennam proficisceretur, Byzantio etiam delatam acceperat Ill. Vir Ioannes de Brancion, amicus fratris loco à me semper habitus, consanguinei ipsius operâ a scibo de Codenhoven, qui binas ejus radices Viennæ rede merat cum paucis aliquot Tulipis recens à Curfore quodam Constantinopoli allatis. Postea verò dum Viennæ vixi, & hæc & superior Nobilibus viris & matronis, quibus peregrinæ plantæ & elegantes flores in delicijs erant, Byzantio Viennam sunt allatz: latifolia quidem *Gul catamer*, ut dixi, appellatione: hæc verò plerumque *Lali Benzede*, & *Gulpoli lali*.

Quod si autem Anemonidis aliquod genus, ad Adonidis florem, Ovidio libro Decimo Metamorph. descriptum, referendum est, nullum hæcenus conspicere memini, quod ejus descriptioni proprius accedat, quàm hoc: etenim sanguini concolorem habet florem. Licet etiam quæ præcedere capite descripx sunt florem simplici foliorum serie constantem habentes coccinei aut sanguinei coloris, pro eo sumi possint.

CETERVM de Anemonide quæ missa fuit pro eâ quæ cæruleum plenum florem habere deberet, jam ante diximas. Similem certè florem nondum videre mihi contigit, quemadmodum nec illam, quam albo pleno flore inveniri aunt.

CYCLAMENVS.

CAP. LIX.

CYCLAMENVS sub Æstatis finem aut Autumni initium suos flores producentis, deinde de folijs, quæ postquam tota hieme perstiterunt, sub Apatlis finem, aut Maio amittentis, duas differentias in Pannoniâ & Austriâ observabam.

VNA enim ex globulari radice, tenuibus nigricantibusque fibris prædita, multa circumtaxa propemodum rotunditatis profert folia, Alari folijs ferè respondentia, non adeo tamen crassa, superne virentia, inferne purpureascentia, humi expansa, flores in longis pediculis nutantes, unico folio sed in quinque profundas lacinias diviso, sic ut pluta videantur, constantes, quæ

Fide primâ
statâ.

Nominâ.

Adonidis
flos.Cyclamen
adonidis flos.

Cyclaminus odorato purpureo flore.

Cyclam. odo-
rato flore li.Cyclam. odo-
rato flore li.

Rhizoma.

Cyclam. odo-
rato flore li.Cyclamin.
Byzantin.Cyclamin.
Byzantin.
Rhizoma.
Cyclam. Bal-
gic. hederaceo
flore.

tes, quæ sese explicare incipientes sursum re-
flectuntur, coloris vel dilutius vel saturatus
purpurascens, odoris suavissimi: ij matre-
scentes integri decidunt, capitulumque suble-
quitur, cum pediculo cui insidet in multas spi-
ras se convolvens, donec terram attigerit, cui
ineumbens paulatim augetur, donec violæ
martiz seminarium vasculum magnitudine
æquet, quod maturitate ab extremo mucrone
aperitur, seménque ostendit inæquale, ex fu-
sco fulvescens, quod terræ commissum, in ger-
men non abit, sed in tuberculum aut radicu-
lam convertitur, præter reliquorum seminum
naturam, unde postea foliola promit.

ALTERA illi planè similis est: pauciora ta-
men semper folia proferre conspicitur, cæque
non purpurascens sed albi-
cantis quodammodo, aut pallidæ, cui viri-
dis mistus, ut in Afari aversis folijs.

Nulli sunt illarum Provinciarum silvosi mon-
tes, nulli saltus, aut interdum in montium ac-
clivitatibus uda prata, quæ ijs non abundant,
ubi varæ magnitudinis radices erunt, tan-
tæ interdum, ut manum implere queant, quæ
plerumque magis scabro sunt corrice, quam
juniores aut mediocres, & habent interdum va-
rios quasi cauliculos unde folia & flores sin-
gulis annis emergunt, qui etiam confracti &
terræ reconditi, in globularem radicem effor-
mantur & transeunt, singulis etiam annis fo-
lia & flores producentes. In saxosis autè mon-
tibus, aut rupibus quæ Pinaflorum silvas alunt, nõ sine difficultate eruere memini, quæ di-
gitalem crassitudinem non superarent, sed in cubitalem nonnumquam longitudinem ex-
eressissent, subinde in nodos (ubi scilicet paulò laxiores petrarum fissuras nascæ erant) ex-
tuberantes.

Rhizotomæ mulierculæ, quæ multas Cyclamini radices eunt varijs alijs plantis Viennam
in forum venales ad ferre solent, Sambas appellat, hoc est, porcinum panem, quidam etiam
rustici Erdi offe- sid est, terræ malum, Vngari autem Dicen re- pa, porcinum rapum.

CETERVM duas alias Cyclamini species se habere ad me scribebat Nobilis vir Ioannes
ab Hoghelande, ab ipsius fratre Theobaldo in montibus quibusdam erutas dum ex Italiâ
rediret. Illas verò non Autumni initio flores proferre, sed ipso Solstitio æstivo florere inci-
pere, perseverareque ad autumnale usque Equinoctium: ejus item semine natas plantas
idem ortus sui tempus nbservare: eam ob causam æstivum Cyclaminum potius dicendum,
quàm autumnalem. Priorem habere folia albis maculis obscurè notata, aversâ parte ru-
bentia, aliquantulum angulosa, flores saturatius purpurascens: Alteram folia promere
aversâ parte virentia, adversâ maculis albis, ijsq; valde conspicuis aspersâ, rotundiora supe-
rioribus, & flores dilutiores, utrosque autem suavissimi odoris, nares etiam procul ferientis.
Utique hoc peculiare, quod vetera folia retineat, donec nova nascantur.

ANNI porro M.D.XXI. autumno, missæ sunt Constantinopoli Gen. Dn. de Heusenstain
cum varij generis bulbis, aliquot Cyclamini radices, orbiculares, quas castaneæ magnitudi-
nem non superasse, & valde tersum expositumq; corticem habuisse aiebat, quæ flatim arte
hiemem folia produxisset, Cyclamini ineunte vere primum emergentis & florentis folijs
ferè similia, pronâ parte pulcherrimè purpurascens, & suprà candicantibus maculis insi-
gnita, paucioribus tamen angulis prædita: Martio sequente flores tulit, quos subsequens gelu
corrupt: itaque verum esse omnino putabam. At postquam subsequenti bus annis folia
ante hiemem semper proferre animadverti, atque nonnumquam, initio e præsertim autâ,
etiam flores, plurimum hesi, & an autumnali Cyclamino, an vernali attribuerem, dubitavi.
Qui venales habebat Turca, ei qui illas emit, libenter obtulisset pro Viola martia flore
rubro, tamen Cyclamini esse agnosceret.

Binis subsequenti bus annis multo majores & plani omnino bulbi Cyclamini missi sunt
Byzantio Subur meueni, & Dehum appellatione. Quadriennio verò post magnum, & palma-
ris latitudinis tuber inde accipiebam nullo nomine insignitum, cujus folia genus illud quod
Belgicis hortis familiare esse solebat hederaceo folio, prorsus referunt, sed subus vident:
id anno

Cyclaminus inodoro purpurea flore.

Cyclaminus verno tempore flor. cell.



id anno x.c. supra millesimum & quingentesimum, plures viginti flores tulit, ijs qui in Belgico nascebantur non dissimiles, etiam inodoros: xci. autem, plures quinquagenis: sequente bis centenis.

BELGICVM illud genus in quadam silva non procul urbe Tornaco primus observaverat Ioannes Mouronus, cuius librales radices dum Machliniæ viverem, & magno rapo æquales, ab ipso nobis missas memin: Illius folia ut plurimum subtus virecebant, flos dilute tubelcens, carnei erat coloris, & interdum albicabat, inodorus. Cuius semine natas aliquando habui planas fimbres planè flores proferentes, folia etiam hederacea: sed quæ aut matris folia omnino referebant, hoc est, subtus viridi misto colore pallecebant, aur purpureaiebant Byzantini Cyclamini foliorum instar, eaq; supernè albis frequenribus maculis aspersa erant, etiam nonnulla ad umbilicum alba macula insignita, alia minimè. Tam hoc verò, quàm Byzantinum magis ferotinum supra enumeratis, & Octobri ut plurimum duntaxat florere incipiens in Novembrem usque. Byzantini semen duntaxat semel observare porui, licet aliquot capitula diu retineret quæ ad frugem perventura videntur, hiems tamen semper corrupebat, illud autem erat duplo majus eo quod Belgicus profererebat. Belgico autem hederaceo folio similis è Britannia Gallæ postea inferri cepit.

HABVI etiam aliquando Cyclamini verno tempore florentis paucas plantas, semine ex Belgicâ mihi misso natas, quæ tertio à satù anno flores proferre cæperunt, odoratissimos fanè, & vulgari saturatiores, paulòque graciliores: folia alijs minora, in ambitu ferè crispâ, & foliorum hederæ formam imitantia, teneriora tamen, supinâ parte candicansibus maculis aspersa, angulorum etiam niucronibus albicantibus, pronâ omnino purpurea scètia. Primus inter Belgas eam plantam habuit Ioan. de Brancion munere Alphonfi Pantij, cuius deinde semine natæ plantæ in aliorum potestatem venerūt. Sed N. V. Ioan. Boissot aliud genus ale- solebat oblongiore folio, ut mihi, cùm ante aliquot annos illius semen mitteret, per litteras significabat. Is etiam M. D. xci. anno aliquot bulbos verni misit: qui sequente Aprili flores tulerunt.

At quem noster Lobelius apud insubres luteo flore observasse scribit, videre nondû mihi contigit. Quemadmodum nec eum de quo mihi relatum est parva radice avellanæ magnitudine, ætate florem vulgari majorem proferentè, & in declivitate montis nascentem, qua iter faciendum est ijs qui Româ Florentiam proficiscuntur, ultra pontem Milvium secundum nivum aquæ traversæ dictum: qui fortè Hoghelandij alter esse possit.

TERTIA Novëbris anni M. D. xc. scribebat ad me è Candîâ Cretæ insulæ urbe diligentis IoIephus de Casa bona Belga & Serenissimæ Thuscæ Ducis Horti Medici præfectus, in eam insulam

*Cyclam. albe
flore.*


fulam observandarum stirpiū gratiā suo Principe ablegatus, se inter reliquas plantas quas Novembri florentes istuc invenisset, Cyclaminum albo flore observasse. Sexennio verò post adferebat Gallus quidam thuzotomus Galliam, Italiam, Germaniam peragrate folitus, in Bataviam, rariores quasdam stirpes, inter quas Cyclamini radices, quem albo flore præditum esse referebat.

DENTALI.

Dens caninus purpurascēte flore.

CAP. IX.

Dens caninus albo flore.



*Dens caninus
purpurea
flore.*

VT Superius Autumni initio, plurimum suos flores producit, & statim folia: sic huic plantæ ineunte vere bina plerumque folia (raro terna) prodeunt, mutuo se amplectentia, & florem occultentia, liliacis proxima, breviora tamē & laeviora, ad Allij urini formam valde accedentia, crassiora & magis carnosa, multis magnis maculis ex atro purpurascētib; aspersa, basi angustā, paulatimq; in latum exrensā, deinde in mucronem desinentia: explicatis folijs, conspiciendum sese præbet flos, dodrantali pediculo enodi & vacuo putrescentiq; innitens, sex oblongiusculis folijs constans deorsum inflexus & spectans, qui aëris (Solis radijs excalefacti) tepore sese explicat, foliaq; sursum reflexit Cyclamini instar, elegantis & dilutioris purpurei coloris, senis intus staminibus purpureis, & candido trifulco stilo, nulla odoris gratiā placens, sed foliā elegantia commendabilis: flori succedit trigonū capitulum, cōtinens aliquot semina Leucoij bulbosi præcocius alterius seminibus fere respondentia, sed longiora gracilioraq; flavescētis coloris: radix longa, infimā sede crassior, multiq; candidis fibris stipata, & plana quadam appendice, unicā aut pluribus, donata, quæ velut radicem superioris anni & præcedentium aliquot vestigia sunt, parte autem superiore paulatim gracilefcens, unde caulis emetgit, summā tellure bina folia proferens. Quamdiu nullum florem dat hæc planta, unico duntaxat exit folio.

Copiosè nascitur ad quorundā montium radices herbido & udo solo, nō procul Grätzio Stiriac provinciae metropoli, & Serⁿⁱ Archiducis Austriacæ Catoli regiā. Similis plane coloris in Allobrogum montibus erutam & in Belgicā à Waletando Donrez nobis aliquando missam memini: Sed & circa Baionam nasci, vicinis Cantabrorum montibus, mihi referebat C. V. idēque Medicus Regius Ioannes de la Riviere. Floret Aprilī, interdum etiam matutius, in hortis præsertim culta.

*Dens caninus
albo
flore.*

Aliud verò genus crescit in Apennino & Euganeis montibus, cujus folia longiora, maculas albas diutius retinentia, inro dum exeunt, florem etiam amplectentia, qui superiore major plerumque est, vel lactei omnino candoris, vel mistis purpurascēte alboque coloribus con-

bus constans, flaminibus albis, apicibus nigricantibus, huic succedit trigonum caput femina alteri paria continens radix etiam longa, & superiore crassior. Hanc aliquando accepimus à C. V. Vlyſſe Aldrovando, totius Naturæ miraculotum scrutatore diligentissimo, & Medico excellentissimo, tum ab amplissimo viro Iacobo Antonio Cortuso Patricio Patavino, & à C. V. Achille Cromero, Medico, cum Patavij viveret: Verùm similes etiam radices ad me Francofurtum mittebat anno M. D. XC. I. Illi Vir Ioan. Vincent. Pinellus.

Vltimo à Sciriz Medicis & Pharmacopæis Dentali, à nonnullis verò rusticis *Θεσπερτζη* Nomina appellatur Prior: ex Allobrogibus autè missa, Satyrj erythronij nomine, quæ etiam appellatione usus Lobelius in Adversarijs & Observanonibus. Altera Pseudohetmodactyli & Dentis canini nomine ex Italia missa. Vtraque frigoris patientissima.

Sciriacas mulietculas radices exsiccatæ pollinem puerorum inſpergere solere, ad enecandas eiſciendisque ventris tinea, mihi relatum est. Ex vino autem haustum mirificè coli dolores mitigare expertus est doctissimus vir Thomas Hauſtain, Serms Archiducis Caroli primarius medicus (qui multos ejus bulbos Viennam usque non semel mihi misit) inſuper corporis vires reficere & nutrire, ex aquâ verò pueros epilepticos juvare.

ORCHIDES.

CAP. LXI.

VIENNENSIS agro & vicinis Provincijs frequentia sunt Orchidum varia genera, quæ in Belgicâ etiam videre memini, quarum historiam, cum ab alijs descriptæ sint, minime repetendam esse duximus. Quæ verò numquam antea mihi conspectæ fuerunt, quæſque à nemine observatas suspicor, earum porro historiam hoc capite cōscribemus, initium ab omnium, quas unquam viderim, maximâ, facientes.

BINA habet hæc Orchis folia, Ellebori albi folijs amplitudine non cedentia, aliquot venis à pediculo ad extremum usque folium productis similiter insignita, superne viridia, inferne dilutiora, prorsus tamen splendētia: caulem cubitalem, paucis foliolis sive involucris præditum, pentagonum: flores in summo spicatum coherentes, cujus autè coloris, cujûsve formæ, ignoro, cum, antequam aperirentur, plantam dumtaxat observaverim: radices binas, crassas, & parvi nâpi modo oblongas, supra quas infimo cauli inhzrent aliquot fibræ satis crassæ.

Solum mihi conspecta est hæc Orchis Maio mense anni M. D. LXXIX. in declivitate montis in quo extructa est arx Ill. V. Baltharis de Bathyan p. m. Grebén nuncupata, inter Dravum & Savum amnes, binis ultra Waraldinum miliaribus.

Orchis latifolia altera.



Illius genus haud dubiè erit, quod non modò in silvis Nemethwywar oppidi vicinis, sed etiâ in Levano saltu supra Manderstorf observabam, folijs quidem magnis & latis, sed infra superiorum amplitudinem, caule penè cubitali, magnis floribus spicatum congestis, ejusdè cum aliarum orchidû floribus formæ, purpureis maculis aspersis, exalbida galeâ flores singulos tegente, radicibus geminis, crassis, superiore tamen brevioribus.

PLURA sunt Alteri folia, angustiora, caulis gracilius, pedalis, flores rubri pulcherrimi, quales ferè in Belgico illo Orchidis genere videre memini, quod è pratis Lovanio vicinis eruebatur.

Crescit in eodem jugo Grebén pone atcem, & plerisque gramineis locis, inter flumina Muram & Dravum, tum apud Sackturnya Ill. Comitris de Zrinio arcem.

TERTIUM genus elegantissimum, binis crassissimis bulbis præditum, uno succi pleno, altero flaccidiore, quod in Orchidibus vulgare est, folijs longis, angustis: caule interdum pedali, spicâ florum eleganter, odoratâ, quorum galeola obscurâ purpurâ niret, hiatus cum propendente labro candicant, purpureisquæ maculis insigniuntur.

Invenitur in pratis Nemethwywar Dn. de Bathyan vicinis, supra Rabam, & inter flumina Muram & Dravum.

QUINA aut sena sunt Quartæ folia, caulis palmaris aut amplior, aliquot minoribus folijs cinctis.

Quæ spicâ elegantium pusillorum florum purputascente galeâ tectorum, prominulo labro



& in quatuor barbularum diviso, albo, purpureis punctis distincto, parvo calcaris à tergo prominente, tenuis odoris, sub quo, ut in reliquis Orchidibus torolum & conortu est capitulum, exiguum semen scobis inlar continens: geminas radices habet testienlotu modo efformatas, unam plenam, alteram marcidam, supra quas ex uno caule ortæ fibræ expanduntur.

Natalis

Nascitur ad montis Glesensfeld imminetis radices, binis supra Neapolim Austræ miliaribus, abundantius tamen in montium renui gramine testorum declivitatibus, supra Radaun, Medeling, Baden, & plerisque alijs editioribus siccioribusq; locis Viennæ vicinis.

Illi similem erubam montibus Greben proximis, sed longè ampliorem, crassiorēque & longiore spicâ præditam.

Orchisv.

QVINIA quatuor aut plura habet folia, summâ tellure jacentia, Belgicæ orchidis quæ passim in pratis marurè purpureum florem fert, similia, sed nullis maculis aspersa: caulem palmarem, aliquot minoribus folijs seprum, cujus summum, multi flores, ex qua galeâ duobus foliolis constante, tribusq; alijs foliolis galeam ambientibus, latiore barbâ ptopendente, & obrufiore calcaris præditi, spicatisq; nascentes exornant, coloris aut purpurei saturationis, aut dilutionis, aut ferè carnei, atque etiâ omnino albi, barbâ tamè plerumque veleniguis, vel majoribus maculis saturè purpureis aspersâ, interdum etiam prius nullis, præsertim in lacteis floribus: semen ut in reliquis contortis vasculis continetur: geminas radices, unam superioris anni flaccidiorē, alteram recentiorē, succulentam, tegunt multæ candidæ crassiusculæ fibræ.

Natalis.

Inveniuntur passim in pratis Viennæ vicinis. Similem etiam observat anno M. D. XCX. in pratis urbi Londiniensi in Angliâ proximis ubi & aliam erubam grandiorē paulò florum purpureorum spicâ, tenerimi fectoris.

Orchisv.

INGRATI etiam odoris est, quam non ineptè Tragochin minorem nuncupari posse censet Ioan. Hoghelandius, cujus iconem & binos bulbos ad me misit ante bienniu. Dodrantali assurgit caule, quem terna aut quaterna ambiunt angusta folia: summus caulis sustinet breviorē spicam florum elegantis interius rubri coloris, internè verò paulò diluvioris, trifido labro propendente.

Natalis.

Rara inventu erecit in marinis aggeribus, interdum etiam reperitur circa Hagam Hollandiæ. In hortos autem translata, latius explicat florum formam, in metæ quali formam desinentem.

Tenues.

Omnes autem Maio mensē florere solent, præter primum genus quod paulò serius flores promit.

T A I A

Orchis Batavica VI.

Orchis Pannonica VIII.



TRIA plerumque habet. Septimum geous angusta folia, alioqui reliquis Orchidibus si. Orchis VII.
milia, viridia, cauliculum palmarem, spica flosculorum ex herbaceo pallidi coloris, tribus
apiculis constatium, & moschi odorem refereotium, exornatum: unicam radicem, rotun-
dam pisi magnitudinc, supra quam longæ propagines exportiguntur, quæ novas subinde
plantas generant.

Exit copiose in colle monasterio Neuberg vicino, & Iuio floret.

Natalis.

Ex hæc quidem de Orchidibus orbiculatas radices habentibus Quæ verò sequuntur, ge-
minis licet radicibus sint præditæ, in orbem tornatæ non sunt, sed in aliquot appendices de-
finiunt, & quasi palmas imitantur.

L I L I I primùm enascentia folia tria aut quatuor habet Octava, dilutioris & quasi pal. Orchis VIII.
lentis viriditatis, nullique macularum aspergine notatis, ingrati saporis: palmarem caulem
amplectuntur aliquot foliola, in ejus summo fastigio flores spicati digesti nascuntur ex
albidi & quasi pallescentis coloris, nullis puodis distincti, antenus monionum hiantibus
cucullis similes, utrinque auriti, & latiusculo pallido labro propendente, posteriore verò
parte corniculum habentes, ut consolida regalis, aut Linaria, sed latius & obtusum, gravi-
ter odorati, florum sambuci odorem referentes: ad horum exortum siogula foliola nascun-
tur pallentia, & floribus colore respondentia: radices geminæ, veluti palmæ, in biosos,
ternos, aut plures digitos distributæ sunt, quarum vetustior fungosa, nigrior, & flacci-
dior est, altera candida, vegetior ac solida, paucis supra earum exortum nascentibus fibris.

Aliud genus est formâ, magnitudine, ceterisque notis illi par: sola varietas in floribus, qui
in hoc purpurei sunt, foliola sub floribus nascentia etiam purpurascunt.

Natalis.

Invenitur utrumque genus non modò in Leyrano saltu supra Manderstorf, alijque Au-
strix inferioris silvis: sed etiam editioribus quibusdam ptatis Viennensi saltu proximis.
Floret autem Aprili, noonumquam etiam Maio, pro mitiore videlicet aut rigidiore verna-
lis aëris constitutione.

CETERVM non incommodè forsitan Pseudorchis appellari possit elegans plantula, quam
ex Italia rediit observabat anno M. O. XCIII. eruditus vir Gulielmus de Mera, Batavus Me- Pseud-
orchis anti-
quæ.
dicus, & mihi Fraocofurti commuoicabat, paulò ante meum ex eâ urbe discessum.

HABET verò illa unicum folium, ex membranaceo quodam involuacro prodians, semun-
ciali laticudinis, duarum unciam aut amplioris lōgitudinis, multis venis secundum lon-
gitudinem excurrentibus, & medio nervo præditum, valdeque tenue, dum resiccatum est:

Z 3

ex eodem

ex eodem involucrio prodiit & cauliculus semipedalis aut minor, gracilis, à medio ad summum fastigium, flosculis quibusdam onustus, quorum forma mihi ignota, quia sicca plantam duntaxat videre contigit, in qua inhærebāt adhuc flosculorum petioli, & bina aut ternæ capitella, instar capitulorum Orchidis: radix bulbosa est, aliquot membranaceis involucriis tecta, præter Orchidum naturam, sub qua multæ tenues fibræ exeunt, ut in Alij generibus, cum quibus affinitatem quandam habere videtur, radice ratione, cui plerumque adhuc inhæret superioris anni jam exsucca, & cauliculum retinens. Cum porro mediâ quandam naturam habeat hæc planta, & peculiare caput non videretur requirere, Orchidibus subiiciendam esse existimaui. Per me tamen semper licebit alijs, quo velint loco reponere, & nomen illi imponere.

LEIMODARON.

CAP. LXII.

ORCHITIDIS quodammodo cognatum λειμόδαρον sive αἰμώδ' ὄσπερ, Theophrasti, vel ὀροβάνη Diofcoridis, & Cynomotion Plinij, cujus varia genera inveniuntur multis Provincijs communia.

Pseudo-leimodaron.

Orobanche 1.



Pseudo-leimodaron.



At congenerem illi plantam, quippe quæ superna parte ipsum æmuletur, in motanis supra Badenses thermas observabam, quæ nusquam antea, quod meminim, mihi fuit conspecta. Pedali assurgit illa caule, frequentibus secundum radicem foliolis, tamquæ vaginulis, involuto, spicam gestans florum quatuor folijs còstantium, superiore in corniculum desinente, & promulcide quadam inter media folia prominente, cui adnatæ sunt duæ tenues barbulae: floribus striata & longa subsunt capitula, semine exili & orchidii simili plena: subrotundam radicem non habet, qualem suo haimodoro tribuit Theop. lib. viii. Hist. plant. cap. viii. sed crassas, longas, & obliquas fibras habet, quemadmodum ea planta quæ vulgo Helleborines nomen obtinuit. Tota stirps saturo purpuræ & planè violacco colore prædita est. Floret Iunio.

Similem ferè, sed multò dilutioris coloris olim observare memini non modò in silvâ illâ agri Mompelliani, in quâ cœnobium Gramont dictum, sub Illicis arboribus, sed alijs plorisque silvis.

Orobanchæ abentivæ Lobelij.
Coagulum terræ Plinij.
aiμώδ' ὄσπερ
varietas.

Non dubium est quin his adnumeranda sit, ea quam Lobelius Orchidem abortivam, Germani *Wergamburgen* Belgæ *Dogel-nist* appellant, quàmque nonnulli Coagulum terræ Plinij esse ariolantur, cujus meminit lib. xxvii. cap. viii.

Porro Orobanches illius legitimæ Diofcoridis, sive αἰμώδ' ὄσπερ Theophrasti, varietates sunt species. Aliæ enim elatiores, aliæ humiles, aliæ exalbidi coloris, aliæ flavescentis, aliæ fusci, aliæ

Orobanche 111. *πρωλάκωνος*.

Radix cava maior.



alix subcærulei: nonnullæ aliarum stirpium radicibus adnascuntur, plurimæ per se subsistunt, & solæ inter alias plantas & gramina nascuntur: pleræque autem omnes unico simplici caule sunt præditæ, interdum ramosum & multifidum illum habent. Omnium vix maxima passim in omnibus Europæ silvis nascitur, ut existimo: certè nullas adj., quin ipsam non repererim: eam quia apud Belgas sæpius Genistæ vulgaris radicibus innascitur, Hepariorum turba Rapum Genistæ appellat, Belgæ *Dam ræpi* Vngari, quia recta assurgit & firma est, *Mist gertibá*, missilem candelam sive cereum appellat. Quæ subcæruleo est flore, cardui vulgaris inter segetes nascentis radicibus inhaerentem olim eruere memini, cum Mompellij viverem. *πρωλάκωνος* autem aliquoties observabam in siccioribus quibusdam pratis, & nuper admodum ad me mittebat eum aliquor alijs siccis stirpibus Amplis. vir Iacobus Ant. Cortusius, de qua nonnullos suspicari aiebat, Papaver spumæ esse, solæ ea ratione nixos, quod recens nata rota mollicella fuisset & lactei ferè candoris: sed infirma est hæc ratio. Ceterum Orobanches majoris, Rapum genistæ nuncupatæ, rescicatæ & triæ pulverem ex tepido vino haustum, præfens ad coli dolores remedium esse, Belgæ prædicant.

Orobanche 1.

Orobanche 11.

Orobanche 111. *πρωλάκωνος*.

Orobanches / minor.

FREQVENS est etiam in Leytenberg, atque alijs silvosis montibus urbi Viennæ vicinis, tum multis Pannoniæ locis, vel circa sepes, vel ad silvarum margines inter vepres ea planta, quam ab orbiculatâ radice, & subrus nonnihil exevatâ vulgo Radicem cavam nominant: quæ florem habet aut carnei rubrivæ dilutioris coloris, magnâ ex parte, vel omnino albi, aut egregiè & saturè rubentis, qui rarè conspicitur. At minorem illam Germanicis & Belgicis offeinis apprimè notam, quæque passim in Germaniâ & Belgicâ inter vepres & frutices nascitur, nusquam in Austriâ vicinisque Provincijs videre memini. Ceterum major illa ex carneis rubente flore, & albo, frequens circa Francofurtum, etiam in hortis fructiferis arboribus confictis, intra urbis moenia.

Radix cava major.

Radix cava minor.

ELLEBORINE RECENTIORVM.

CAP. LXIII.

SPURIIS Orchidibus cognata est ea planta quæ à Recentioribus nonnullis Ellebortine cognominatur, à foliorum eum Ellebori albi folijs potius similitudine, quàm ab effectu. Ejus autem aliquot observabam genera foliorum amplitudine, & floris colore variâ.

PRIMÆ & omnium elegantissimæ caulis est singularis, pedalis aut majoris longitudinis, firmus, aliquannulum lanuginosus, quem quæræna aut quina ambiunt folia, venosa, Ellebori albi folijs similia, alternatim ut in illo disposita, subhirsuta, & amaricantis saporis: ex folioli

Elleborus 1.



folioli quod extremo cauli insidet, nonnumquam & ex proximi, linu, prodris flos unicus, longo pediculo nixus, quatuor foliolis crucis forma decussatis, oblongis & mucronatis constans, coloris ex purpura nigricans, quorum superum & inferum majuscula sunt, lateralia verò, ad modum angusta, & interiore parte lanuginosa: ex horum umbilico emergit & protuberat membranaceus quidam, tumens, concavusque urticulus, columbinum ovum serè æquans magnitudine, superiore parte secundum umbilicum nonnihil apertus & hians, instar calceoli parvi oris, cui color aut luteus, aut pallidus, internè nonnihil villosus, infernè autem purpureis quibusdam venis secundum longitudinem distinctus: hiatum tegit duplex anula, quarum superior alba, tenerior, purpureisque maculis confersa, inferior verò densa herbidi coloris, & veluti cancerorum ocellis in lateribus habens: ipse flos non penitus odoris expers: capitulum illi succedens oblongum, minuti digiti crassitudinem æquans, triangulum, tenue & velut pulverem semen continens, instar Orchidum: radix nigra, non valde crassa, in longitudinem & latitudinem oblique summà tellure se se spargens, multisque fibris donata, superiorum annorum caulis impressa vestigia retinens, qualia in pseudocottalio serè conspiciuntur, extremitatibus semper in novum germen exuberantibus, amariusculi gustus.

Silvosis quibusdam Leytenberg locis supra Bruterstorf, demonstrante Ill. V. Augerio de Bousbeque primùm observabam: deinde apud Closterneburg pratorum quodam declivi sub coryli fruticibus, & in silvis Entzestorf vicinis eruebam: omnium autem abundantissimè nascitur in Pannonià quadam silvâ, magno miliari ab atce munitissimâ Nemethwyar Ill. V. Bathararis de Bathyan. Deinde rhizomatæ mulierculæ in Viennense forum inferre cœperunt, postea quàm à nobilibus matronis expeti intelllexerunt. Ab amicis etiam intellexi in Herciniâ silvâ, præterea citra Fuldam alijsque Germaniæ silvosis locis copiosè nasci.

Varietas.

Sunt qui albo flore inveniri dicant, quam sanè nondum vidi, nec eam quam in ænipontinis montibus observasse ait doctissimus & diligentissimus Matthias de Lobel, purpureo urticulo: nam plures quàm mille stirpes vidi diversis locis erutas, omnes autem urticulum habuerunt flavum. Cujus etiam coloris erat quam Ill. Bathyanus è postremis Pannoniæ limitibus Daciz proximis ante aliquot annos mihi adferebat, cum ex eâ professione tederet. Pannoniæ etiam similis quæ & in Herciniâ & reliquis Germaniæ silvis nascitur.

Nomen.

GERMANI *Wiesen schweb* & *Psaffen schweb* appellant, Vngari *Exerthgyro fia*, id est, mil-lebonam herbam, quasi *radix virens* dicas: quibusdam Elleborine ferruginea est.

Generum.

C. V. Gesnerus in Epistolarum lib. 111. frequentem apud Helvetios inveniri scribit, luteumque florem illi tribuit. Cosinofandalos Pausaniz forte fuerit, inquit, nam & sandalij formam refert flos, & punctis seu liris quibusdam notatur, etsi Pausanias Hyacinthum esse conjicit, sed huic cum sandalio nihil. Quidam vir doctus Lonchitum primam esse putat: ego ad Ellebotines vulgo nuncupatz, species refero. Nostri *Düster swanen schweb* appellant, hoc est, calceolos Virginis, à forma floris. Hæcenus Gesnerus.

Similes.

Iosias item Simlerus ad calcem Commentarij de Alpihus, illius in hæc verba meminit. *Androscholen* cubitum ferè æquat, folio Plantaginis aut Ellebori albi, terna aut quaterna per caulem folia habet, ex quibus erumpit ut in perforatâ, in summo unus flos, rarò duo, is luteus est, oblongus, luteum ovi exprimens, concavus, quem ambiunt apices, seu folia potius ignita rutiantia: morionum habitus procul contuentibus refert, aut demonum larvas, cadente flore semen in siliquâ continetur. Damafonij aliqua species.

Elleborini.

PEDALEM habet Altera caulem aut amplorem, firmum, quem per intervalia involvunt inordinata folia sèna aut septena, nervosa, Ellebori albi folijs similia, sed angustiora, ingrati & amari gustus: flores in summo caule denos aut duodenos, spicati congestos, albos, quinis folijs constantes, & in medio veluti parvam galeam compedentes, subflavo labro, non multum ab orchidis generibus distantes, inodotos: angulosa etiam, striata & contorta

contorta habet (ut ille) capita, minimam semen & scobis instar continentia: radices crassiusculas, fibrosas, ex uno veluti capite proleutes, & sparsas, subrescens coloris.

Provenit in opacis Galliz, Germaniz, Austriæ, Vngariæ locis, etiam in Pannonia inter-amni, inter Dravum & Savum flumina. Hæc duo genera præcociora sunt reliquis, & Maio plerumque florere solent.

Natalis.

Elleborine recentior VII.

Elleborine recentior VI.



PARTE est Tertia magnitudine, paulo latioribus folijs, minoribus floribus, qui etiam quinquè folijs constant, & galeolam cum prominente labro amplectuntur, colorisque sunt herbacei, inrerius nonnihil candicantis, nullius odoris, quibus torosa contorta que capita subsunt: radix secundæ similis.

Elleborine
VII.

Invenitur in quibusdam Austriæ & Pannoniæ stecioribus pratis, & in Noribergenfi silva urbi vicina, ad Latomias.

Natalis.

QUARTO generi minor est altitudo, similia interdum folia, nonnumquam multo latiora: flores aut omnino purpurascens, aut propè carnei, secundi generis floribus procul similes: nec radix differt.

Elleborine
VIII.

Crescit in montanis pratis & caeduis silvis Austriæ.

Natalis.

CVBITALEM altitudinem superat Quinra, & amplissima omnium sunt illi folia atque oblonga purpurascens florum spica.

Elleborine
IX.

Nalcitur in multis Pannoniæ & Austriæ silvis, & ad montanorum pratorum margines: sed nusquam frequenrius, quàm in eâ silvâ, in qua Prima abundat.

Natalis.

Sed in eadem silva, alijsq; Zollnoock vicinis, Sextum genus cubitali caule, tenui, rotundo, geniculari, quem in singulis geniculis alternatim ambiunt angusta folia. Secundi generis folijs non dissimilia, erucæ memini: cujus summus caulis desinebat in spicam sex, octo, aut plurimum interdum florum, quinis folijs elegantissimi dilutiq; purpure coloris constantem, inrer quæ latebat quædam veluti galeola, muscarum proboscidi similis, labrâ inferiore parte adnexam habens, æqualis ferè cum folijs longitudinis, candicans, intus striatum, sustinebatur ij flores anguloso, tortili, hirsutisq; nonnihil capitulo: radix illi fibrosa, Secundæ similis.

Elleborine
X.

Florent hæc quatuor genera Iunio, nonnumquam etiam Iulio.

Tempus.

Næc inelegans est Elleborines Recentiorum illud tenellum genus, quod Gulielmus de Meira, Medicus, ex Italia rediens, observabat, & mihi etiam Francofurti donabat. Erat verò illud

Elleborine
XI.

Veteratum nigrum II. Dodon.



Polygonatum latifolium. I.

liquis notis: folia tamen paullo attriora quàm in præcedente mihi videntur: deinde florum, qui herbacei etiam sunt coloris, scæque folijs constant, & rinctinnabulorum instar concavi propendent, ore præsertim trium interiorum, ex purpurâ nigricant: medium autem florem occupant bina aut terna cornicula, numerosis staminibus cincta, ut in præcedente genere.

Perenne non est hoc genus, ut nec præcedens: sed productio semine plerumque perire solet.

POLYGONATVM. CAP. LXIII.

MAGNA etiam in Polygonato varietas. *Polyg. nati-
milia ge-
nera.* Nā præter vulgare illud Latifolium, quod in omnibus, quas unquā adij, Provinciis familiare est: & Angustifolium, sive minus Herbariorum, quod plerisque Germaniæ locis nascitur, aliquot alia genera in Pannoniâ, & Austriâ observabam, nulli (ut in Pannonicarum stirpium Historiâ dictum) adhuc, quod sciam, descripta: tamen secundum Cordus lib. I. Historiæ de Plantis, angulosi Polygonati nomine fortè insigniat, Quartum latifolium Marthulo notum fuisse videatur. Nos porro omnia genera, in duo primaria distinguemus, nempe Latifolium & Angustifolium.

PRIMUM Latifolium, formâ simile, pæne *Polygonat.
latifol. 1.* vulgari, in duplo majorem tamè altitudinem excelsit, ampliora habet folia, longè plures flores, majores baccas, crassiores caules, & radices.

Sponte nascitur, vulgari permixtum, in quibuldam Austriæ & Pannoniæ umbrosis locis.

ALTER Latifolio, pedales sunt caules, striati, firmi, non valde inflexi, sed recti ferme, folia vulgari similia, eodémq; modo, hoc est, alternatim, circa caulem disposita, brevioribus tamen quàm in illo spatij, minora etiam, firmiora, iograti gustus: ex singulis alarum sinibus, duo aut tres exeunt flores, brevibus, magnaq; ex parte singularibus petiolis inhzerentes, vulgari, cum formâ, tum colore, similes, verum majores, & odore (qui in vulgari nullus est) floris spinæ Appendicis, sive Oxycanthæ vulgo creditæ: baccæ deinde virides initio, & sphericæ, quemadmodum in vulgari, majores tamen, postea nigricantes, semen continentes osseum, durum: radix longa, obliqua, geniculata, candida initio dum recens eruta, deinde pallescens, nonnunquam etiam purpurascens, præsertim circa getmina, vulgaris radici ferè par, tamen etiam aliquantulum tenuior inveniat, interdum verò amplior, ubi videlicet pinguis & benè subactum solû nascita est.

Frequens est in nemorosis illis montibus, *Natalis.* vulgo Leytenberg nûcupatis, supra Mandelsdorf, Bruterstorf, & in plerisque alijs Pannoniæ montibus transdanubianis inter Saxa, atque etiam ultra Dravum in Pannoniæ interamnibus montibus, præsertim ad arcem Greben. *Natalis.*
Sed nuper admodum abundè nascens reperiebam in silvâ quercubus consita ad lævâ Mœni fluvij,



Sed nuper admodum abundè nascens reperiebam in silvâ quercubus consita ad lævâ Mœni fluvij,



ni fluvij, paullo infra urbem Imperialem Francofurtum, in quâ & Fraxinella, & Cocorum Matthioli crescit.

Tempus.

Floret Maio: bæcæ maturæ sunt Augusto: interdum etiam multâ hieme, atque ipsâ pænè ævâ, è caule pendentes conspiciuntur.

*Polygonat.
latifolium
folio.*

TERTIUM, superiori similem habet caulem, ejusdemque vel majoris etiam altitudinis, non adeo tamen rectum, sed magis inflexum: folia duplo ampliora quàm reliquorû, ad El-
bori albi foliorum amplitudinem nonnunquam accedentia dura, nervosa, lævia, dilutius
virentia, neque subæus incana, ut superiorum, nonnihil acidi gustus initio, deinde paululum
acris: flores alteti similes, inodoros tamen, neque ex singularibus petiolis singulos, sed bi-
nos aut plures ex oblongiore pediculo dependentes, ut in vulgari, cui etiam similem fructum
habet: radicem albam, longam, obliquam, geniculatam, superiori magnitudine parem.

Notitia.

Tempus.

Crescit hoc copiosè umbrosis locis inter Brunnam & Weyspach, alijsque vicinis monta-
nis silvis supra Viennam Austriæ. Floret cum superiore.

*Polygonat.
latifolium
folio.*

QUARTI latifolij caulis, pedalis est, nonnunquam cubitalis aut amplior, rotundus, incur-
vus vulgaris instar, in unum aut alterum, interdum etiam tertium ramum divisus, quem al-
ternatim, Perfoliatæ vulgaris ferè instar, amplectuntur: folia Polygonati folijs similia, mol-
liora, subæus aliquantulum incana, saporis initio dulcis, deinde salivam cientis, & nonnihil
actis: ad singulorum foliorum exortum, sub ipsis folijs, atque adeo ad illorum latus, eadem
serie exeunt singulares petioli, longi, exiles, incurvi, ex quibus flores propendunt singulares,
concavi, Oenanthes, sive Liliij convallium floribus per similes, sed magis hiâtes, atque in sex
laciniâ extrorsum reflexas divisi, interiore parte nigricantibus quibusdam maculis aspersi,
odorati: fructus Polygonati angustifolij fructui similis, trigonus, initio viridis, per maturita-
tem paullo oblongior & rubescens, parvæque cornu interdum æquans, in quo multa albi-
cantia grana congesta sunt: tadix à vulgaris Polygonati radice differt: nam neque crassa est,
neque adeo candida, sed exilis & nodosa, sive in frequentes nodos extuberâs, plurimis cras-
sis fibris constat, ut Thaliætri quædam genera, quemadmodum pictor scitè admodum ex-
presserat, sed sculptor suâ negligentia corruptit.

Natalis.

Florentem unam aut alteram ejus generis plantâ in umbrosis montis Wechfel silvis, de-
inde in Durrenstein inter saxa & frutices mēsisbus Junio & Julio anni M. D. LXXVI. invenie-
bam, quæ in hortum translata, fructum ad maturitatem perduxerit: frequentiore biennio
post magnamque, & in multas alas divisam, umbrosis quibusdam scrobibus inter fileis
stirpes, in descensu Durrenstein, paulo supra mapalia à mœcanis pastoribus habitata æstivis
menibus,

Polygonatum v. five angustifol. L.

Polygonatum v. five angustifol. II.



menſibus florentem Auguſto. Rami verò cum fructu nobis ex Sileſia uſque (ubi frequen-
tem naſci audio) prius communicabantur à Doctiſſimo viro Fridetico Sebizio, Ducis Bri-
genſis Medico: deinde etiam aliquor radices illine tranſmiſſæ. Perſiſtu in hortis, umbroſo
loco repoſita, floræque & ſemina ſuo tempore profert.

ANGUSTIFOLIUM porro Primum, ab Herbariorum vulgo minus nuncupatum, quod no-
bis ordine Quinrum erit, cuiusque tenuia folia Rubiæ modo caulè per intervalla ambiunt,
fructu inino verſicolore, qualis eſt Graminis Parnafi quorundam, ſive Vniſolij fructus, de-
inde per maturitatem rubro: in montanis quibuſſà Stinæ prati, circa frutices & in umbrâ
abundè naſcens obſervabam. Ejus hiſtoriam, cum ab alijs ſit deſcripta, non retexemus, ima-
ginem tamen ſubiiciemus, ut diſcrimen, inter illius, & ſequentis Polygonati anguſtafolij,
plantas commodius conſpici poſſit.

Polygonat.
v. Anguſta-
fol. L.

HABET Alterum Polygonatum anguſtafolium, nobis ordine Sextum, caulè cubitale,
anguſtoſum, in multas tenues alas diſiſum, quæ æqualiter ex ſingulis angulis exoritur, &
quaternæ interdum, nonnunquam & quinæ, pro angulorum, qui in caule, numero: ramuli
tenues longis & anguſtis folijs obſiti ſunt, binis, ternis, aut quaternis, æqualiter in circuitu
prodeuntibus, in quibus flores Quinto ſimiles, paulò ramen minores, brevi periolo depen-
dentes inter foliorum alas ſparſi ſunt: quibus ſuccedit fructus rotundus, ruber, pulpâ plenus,
aliquot offea grana continens: radix vulgari ſimilis eſt, candida, nodôſa, propagines ad late-
ra fundens, & candicantibus fibris obſita.

Polygonat.
v. Anguſta-
fol. II.

Mihi anno M.D.LXXX. communicatum elegantiffimè hoc Polygonati genus à Doctiſſi-
mo viro Achille Cromero Sileſio, nunc Brunnenſi apud Moravos Poliastro, quod iſdem,
quibus ſaxatilem Rubum, locis eruiſſe aſſerebat.

Natalis.

NULLVM nomen vulgare iſtarum plantarum novimus, niſi quod tres priores, rhizotomæ
muliercalæ, quæ in forum Viennenſe earum radices interdum venales adferunt, eodè cum
vulgari Polygonato nomine *Πενταφυλλον* appellant: Vngari ſimiliter, ut vulgare, *Salomon pã-
chei*, id eſt, Salomonis ſigillum, dicunt. Quarta tam illis, quàm montanis paſtoribus & ve-
narioribus, proſuſus ignota eſt. Eam adumbrare videtur Matthiolus Lauti Alexandrinæ ap-
pellatione: verùm neque effigies ſatis ſcitè expreſſa, neque ejus hiſtoria tradita. Sive verò
eam intelligit, quam nos hîc damus, ſive aliam, nulla ratione ad Laurum Alexandtinam reſ-
ferri poteſt, quam Dioſcorides non inter folia fructum forte dicit, ſed *ἐν μέσσοις*, in medijs fo-
lijs. Theophrastus autem expreſſius *ἐνφυλλίαναντον* appellat lib. I. cap. XVI. & lib. III.

Nomen.

cap. XVII.

cap. xvii. *Hist. Plant.* ubi eam *Omyrūnes* sive *Rufci* modo *fructum ferre* ait, *ἐπι-
φύλλωκαρπὸν ἔστιν ἁπλῶς καὶ ἡ κορυμμορμήν: ἀμφότεραι γὰρ τὸν καρπὸν ἔχουσιν ἐκ τῆς μέσης
τοῦ φύλλου.*

Commodius itaque, meo iudicio, *Polygonati* generibus adscribetur, quàm *Lauro Alexandrina*. Nisi quis fortè ad *Idzam* radicem *Dioscoridis* referendam putet: sed cùm valde mutila sit ejus descriptio, difficile esse existimo, certi quidpiam posse statuere.

*Hypoglossum
Rufci.
Diosc. ima-
culat.*

CETERVM mirari subit, quid Auctorem magnæ illius Plantarum Historiæ moverit, ut hoc *Polygonatum* (sive *Laurum Alexandrinum* *Matthioli*, meam enim iconem vidisse, aut historiam legisse vix puto) *Hypoglossum Dioscoridis* esse velit, cujus textum sic emendandum censet: *ἐπὶ τῷ λωσόν θυμαίσκος ἐστὶ μυρσίνη ἀγρία καὶ λεπτὴ (melius λευκὴ) τὰ φύλλα ἁμείως. κόμην δὲ ἀκατάσθαι ἢ ἔχει ἐν ἄκρῳ, καὶ ὁ σπέρμα ἐπὶ τῷ λωσόν ἰδὲς παραφύσεις μικραὶ ἐν τοῖς φύλλοις.* Gal. item libro viii. *Simplicium ἐπὶ τῷ λωσόν ἐστὶν ὡς καὶ μὴ αὐτὸς, οὗτοι παραφύσεις ἐπὶ ἄκρῳ τοῖς κόρυμβοις ποιεῖται γλωσσάριον*, id est, *Hypoglossum* sic nominatum est, quia pro-pagines parvarum linguarum sub summis corymbis producit: ex quibus verbis intelligere licet, *γλωσσάριον* sive *γλωσσάριον*, ligulas, non folia in medijs folijs nascencia. Hæc ille.

*Polygonum.
Sist. last.
fol. ovatis
Hypoglossum.*

Non inficias quidem imus, *Hypoglossum*, à nonnullis *Laurum Alexandrinum* creditam, habere *γλωσσάριον* potius quàm folia in medijs folijs, quanquam & folia sint, sed minora, ex cujus (ubi majori folio plantæ inhaerent) sinu nascuntur, ut in *Rusco*, flores bini interdum, deinde fructus orbicularis, instar corallij ruber, osseum nucleum continens. Sed hanc stirpem, quampro *Polygonato* Quarto latifolio exhibebimus, *Hypoglossum* esse posse negamus multis de causis: primò, quod neque pungentia sint illi, neque dura folia, sed valde tenera & mollia: deinde, quod ligulas non producat sub corymbis, sed singulares, ut dixi baccæ, ex singulis petiolis ad foliorum exortum dependant: postremò, quod frutex non sit semper virens, instar *Lauri Alexandrinæ*, sed totus caulis ad radicem usque pereat singulis annis, perinde ac in reliquis *Polygonati* generibus.

Laurus Alexandrina Theophr. ii.

*Laurus Alex-
andrina.*

VERAM potèd *Laurum Alexandrinum*, nunquam vidisse ingenuè fatebor, si ab ea quæ vulgo *Bilingua* dicitur, & *Hypoglossum Dioscoridis* esse censetur, diversa sit. Theophr. enim nusquam *Hypoglossi* meminit, sed *Lauri Alexandrinæ* duntaxat, locis jam notatis: & lib. i. cap. xvi. *Hist. Plant.* expressè eam recenset inter καρποφόρα μετατὸν χειμῶνα τὰ καρπὸν, hoc est, fructiferas quæ habent fructum quasi circumvolutum, & interceptum.

Præterea *Plinius* lib. xv. cap. ultimo *Natur. Hist.* *Laurum Alexandrinum* ab aliquibus *Idzam* vocari tradit, ab alijs *Hippoglossum*, & *Carpophyllum*, atque inter folia semen rubrum ferre. Ipse verò & *Dioscorides* eam in montibus nasci tradunt, *Hypoglossi* autem natales subiecerunt. Certè *Bilingua*, quam *Vicennenses* mulierculæ *aussintæ* appellant, in montibus nascitur, & abundanter quidem, in monte imminente oppidulo cui nomen *Divi Georgij*, in trans Danubiana Pannonia, tribus ab urbe *Pannoniensi* miliaribus, invenitur: unde *Rbizotomi* plurimam adferunt *Viennam*, & ejus urbis mulierculis vendit: nam magno illis est in usu, præcipuè autem ad uxæ procidentiam. Non minus copiosam deinde observabam anno m. d. lxxix. in montibus non procul à *Zollonock* Ill. Dn. de *Bathyan* oppido distitis.

Hanc *Dalechampius* *Laurum Taxam*, cujus *Plinius* *Natur. Hist.* lib. xv. cap. xxx. inter alia

Lauri genera meminit, esse scribit, eandemque *Dioscor.* *Chamaedaphnem* facit.

Ejus autem *Laurus Alexandrina*, quam baccis in medio foliorum impressis, nec ulla epiglotide reclusis, exhibet, valde mihi suspecta est: an ipse similem viderit, me lateat, mihi certe nunquam confecta.

At anno supra millesimum & quingentesimum nonagesimo sexto, mittebat ad me vir eruditissimus *Simon de Tovar* *Hispalensis* Medicus, speciminis gratiâ *Vere* *Lauri Alexandrinæ*

*Laurus Alex-
andrina
Pictum.*

Bilingua.

*Laurus Ta-
xa Plin.*

*Chamae-
daphne Diosc.*



drinx folia cum suis baccis, ad Theophrasti descriptionem paullo supra memoratam ad amulsum congruentia: nam illa Hypoglossi quidem folijs magnitudine & formâ res-
pondebant, verum glossarijs sive ligulis carebant, tametsi e medio nervo solum secante baccæ
rubræ tenuibus petiolis propenderent, minores quàm in Hypoglossio, sed ostium etiam nu-
cleum continentes, nonnunquam geminum: atque postea ab ijs qui ex Italiâ redierunt,
istic in quibuldam hortis satis frequentem eam plantam inveniri admonitus sum.

PÆONIA.

CAP. LXV.

PÆONIA historiam plerique dederunt: eam hic repetere non est operæpretium. Ve-
rùm quas præter illas observabam, vel semine natas, vel aliundè acceptas, prætermitten-
das esse non duxi, sed peculiare caput illis tribuendum.

Pæonia Byzantina 1.



ELEGANS potèrè est Prior, foliâque habet
Pzoniz vulgaris feminæ, aut ejus quæ *Pæonia by-
zantina* est folijs non dissimilia, paullo
tamen crassiora: caules illi similes, aut am-
pliores: florem summo fastigio sustinentes
unicum, simplici octo, decem, aut plurium
interdum foliorum textura constare, non
purpureorum ut *αυτοφυλλανθης*, sed ruben-
tium & elegantissimorum: radicem multis
nodis oblongis sive asphodelinis bulbis præ-
ditam, Pzoniz feminæ instar.

Duorum autè est generum: Nam Vnius *Prim.*
germina, cum ineunte Vere prodire inci-
piunt, caules etiam, & foliorum pediculi,
initio rubent, paulatim deinde per ætatem
remittente se colore: folia ex atro virescen-
tia, & ptonâ supinâque parte splendentia sunt:
flos saturè rubet, binaque, terna, aut quare-
na longa in medio habet capita, multis fla-
minibus purpurascens (quorum apices
aurei) cincta, quæ matura dehiscunt, semē-
que ostendit longiusculum, nigrum, splen-
dens, vulgaris Pzoniz modo. Altius hæc af-
surgit, crassioresque habet caules. Alte-
rius verò germina recens prodeuntia nõ ru-
bent, sed ex albo virescunt, ut etiam caules
& foliorum pediculi, folia superiore dilu-
tius virentia, læviaque, supernè & infernè
non minùs quàm superioris splendent: flos
etiam paulò major, dilutius magisque flo-
ridi colore præditus est: ejusdem siliquæ,
brèves, semina rotundiora, minus nigra

& splendentia. Hæc non aded liberalis est in
ta semine Byzantio misso *Scaevola* nomine. Floret Maio cum alijs Pzoniz generibus, aut
cum illis florere desinunt.

Itarum semine mihi natæ sunt aliquot plantæ anno M. D. XXXVIII. quarum nonnullæ
maritæ folijs referunt, binæ verò multo ampliora rarioribusque lacinijs divisa habent fo-
lia: quæ triennio post flores dederūt secundo generi similes, breves etiam crassasque, siliquas.

TENIVIS dissoluta & laciniosa habet Altera folia, magis mucronata, aversâ parte brevi la-
nugine pubescentia & candicantia, adversâ verò virentia nec splendentia, multis venis
medio nervo in latera foliorum excurrentibus, ut in reliquis Pzoniz generibus: caules gra-
ciles, & dilutius virentes, singulos sustinentes unicum florem, aliorum generum floribus
paulo minorem, simplici octo foliorum serie constantem, purpureum, hoc est, minus ru-
bentem quàm qui plenus est, sed non minus odoratū, multis staminibus candidis, quorum
apices flavi, bina cornicula media cingentibus præditum, quæ maturitate dehiscuntia se-
men continere conspiciuntur vulgaris Pzoniz, initio subcæruleum, seminis Tini instar: ra-
dix superiori similis, minus tamen crassius, sed gracilioribus bulbis constans.

Nata mihi erat semine ex Hispania misso, tertioque à situ anno primum florem dedit
Maio mense cum alijs.

Paeonia 1112. ELEGANS etiam est Tertia, primum à me conspecta anno M. D. XXXIX. in horto Ioannis Myler pharmacopœi diligentissimi, ad aurei capitis symbolum, Francofurti ad Mœnum. Folia autem Pæoniæ feminæ, paulò dilutius virentia quàm in *ῥοδονέλλαις*, splendentia, per oras nonnihil crispata, infernè cineracei coloris: flos simplici sex foliorum serie constat, ut vulgaris, coloris carni dilutioris, in quo flavescent tenuiter elucere videatur, breviter cum colore referentis, quem Viennenses matronæ *Pomeraniæ* cognominant, & qualem medix quædam Tulipæ obtinent: cornicula viridia medianm florem occupant, & multis albis staminibus cinguntur, quorum apices aurei: semen in corniculis nigrum: radix bulbaceis asphodelinisque tuberibus constat, ut Plena, & femina vulgaris. Floret Maio.

Pæonia 1113. Aquilina fol. QVARTAM præterea habeo munere Io. ab Hoghelande, cuius flos nondum conspectus (nam superiore duntaxat vere illam accipiebam) sed eodem Hogelandio referente, Pæoniæ maris esse debet: caulis illi satis firmus, folia in ternas alas divisa, quæ totidem folia gerunt breviora & magis angustata quàm aliarum, atque in aliquot lacinias scissa, supernè dilutius virentia, infernè pubescentia & canescentia, adeoq; similia Aquilinæ folijs, ut primo intruit pro illis accipi possint, atque si inter eas reponatur hæc stirps, primum emerges, eos etiam qui medicoriter in plantarum cognitione versati sunt, fallere queat: radicem habet multis bulbis longis præditam ut Pæonia femina.

Pæonia 9. Idem scribebat Pæoniam apud Batavos inveniri, ejus flores interdum essent carni coloris, nonnunquā omnino rubri, aliquādo etiam folijs vel mediâ ex parte rubris, aliâ carni coloris, vel utroque colore radiatim distinctis, quam mihi postea videre contigit apud Sionæm Lucium Danissam Lugduni Batavorum, nisi artificio eum colorem induxerit.

Pæonia pleno flore albescens minor.

*Pæonia VI.
five, Exaltida plena minor.*



Pæonia exaltida plena flore major.

CETERVM, quæ pro album plenum profertente florè mihi donata est, humilior est illâ quæ amplum ex rubro purpurascens plenumque habet florem, caulis item quàm illi gracilior, folia quidem multis lacinijs ut alteri divisa, sed angustioribus: flores etiâ minores neque adeo pleni, utpote qui sexagenum aut septuagenum foliorum numerum raro superet, cum in vulgaris plenæ flore aliquando quater centena observare meminerim. Hujus color initio dilutè purpurascens, & quodammodo carneus, deinde paulatim clangescens, exalbidus fit, tandem rotus ferè niveus, exceptâ foliorum basî & infimâ parte, quæ carneum quodammodo colorem retinet: bina aut ternâ, ut plena vulgaris, habet in medio flore cornicula, minora tamen, quæ an interdum, ut in alterâ, semina præbeant, mihi nondum observare licuit. Peculiarem etiam habet ejus flos notam, ut illi folia non facillè desiliant, sed diutissimè hæreant, imò donec temporis diuturnitate nigrescant, macescant, & siccitate contrahantur, cum vulgaris plena, floris folia raro ultra osthiduum retineat, sed illa abijciat: radices etiam habet hæc, minores & graciliores, quàm vulgaris.

ALIVD Pæoniæ pleno carneo flore porrò genus in Belgicâ inveniri intelligebam anno M. D. XCVII. longè ampliore flore quàm modò descriptum, ut qui Purpureæ plenæ flori non cedat magnitudine, ejusdem tamè cum illo naturæ, diutissimè nimirum folia retinens, temporis successu etiam albescens. Illam florentè viderunt in horto Dominge Tisæni Præsidis viduæ anno supra millesimum & quingentesimum nonagesimo sexto Bruxellis, non modò Illustrissimus Comes Arebergius, sed ipse etiam Ioannes Boisor Præsidis viduæ frater, cum plenisque alijs, scribens ad me in hæc verba: ut oporteat te credere testibus oculatis omni (ut puto) exceptione majoribus.

Pæonia plena rubra flore minor.

PÆONIÆ autem pleno flore saturi rubri coloris aliud genus invenitur, cuius folia aliterius folijs non abfimilia, supernè viridia & splendentia, infernè cælij quodammodo coloris, & lanuginis expertia: flos alterius flore minor, nec adeo plenus, illi pæne qui carpei coloris

plenus

plenus est, par, non minus tamen saturi rubri coloris quàm maioris, sed cujus folia interiora venis quibuidam nigrescentibus aspersa conspiciuntur: mediū florem occupant cornicula nullis staminibus obsita.

Vulgaris porò plenæ genus extare intelligo, cujus interdum flores albas habeant oras quod an illi plantæ peculiare sit, ignoro: hoc verò in illo flore observabam, ut vetustate singula folia per oras languidioris hant coloris & quodam modo exalbescant.

Hic insuper adijciendum putavi, vulgaris quæ plenum fert florem femine mihi natas plantas, caule, folijs, radice matrem planè referentes, quarum Una tertio anno florem dedit matris flori quidem concolorem, sed simplici sex foliorum serie constantem: Altera autem Byzantinæ prioris florem imitantem, hoc est, simplicem octo foliorum seriem habentem, colorem tamen magis rubrum & saturum, & ad nigredinem quodammodo tendentem: Tertia florem plenum tulit matri concolorem, vel etiam majorem, & singulis annis cornicula sive nuces quarum aliquæ femine prægnantes fuere.

Paeonia fronde plena nuda variatur.

PAONIAM etiam inventam in Regni Navaræ montibus, quæ florem ferat omnino niveum, sed simplici foliorum serie constantem, vulgari minorem, radices illa minores etiam habentem, ex Bosio litteris non ita pridem intellegebam.

Paeonia simpliciter alba flore.

CYDONIA Cretæ scribebat ad me Cl. V. Honorius Bellus anno M. D. XCIII. istuc in cellissimorum montium convallibus provenire abundè Pzoniam albam, promiscuæ naturæ, hoc est, quæ neque mas, neque femina esset: neutram enim illarum, totâ insulâ (quæ diligenter ab eo perlustrata est) vidisse, quemadmodum neque rubri coloris, licet non satis constanter similem inveniri rusticis quidam illi assererent. Pzoniam autem Cretensibus, ipso teste, *γίπαζον* vocatur.

Paeonia Cretæ.

FINIS LIBRI SECUNDI.

23

CAROLI



CAROLI CLVSI RARIORVM PLANTARVM HISTORIÆ

LIBER TERTIVS.

BVLBACEIS atque tuberosis stirpibus eleganti flore prae-
ditis, succedere debent reliqua coronaria, & illis congeneres:
adijcienda praeterea aliquos planta, non contemnenda florum
pulchritudine donata, & alia grato odore commendata. Ha-
rum omnium historiam tertio hoc libro describemus, à Caryophylleis flo-
ribus, qui primum inter coronarias locum merito sibi vendicant, ini-
tium facientes.

CARYOPHYLLEI FLORES.

CAP. I.

NON carent altissimi montes præruptique scopuli suis etiam delicijs: sed diversi gene-
ris flocculis elegantissimis odoratissimisque laxissimè exornantur. Porro Caryophyl-
lei vulgo Herbariorum vocati, ob miram colorum varietatem, subeunnum ea juga oculis
maximè rectant. Eorum verò, præter vulgo cognita, istic multa genera observavam.

Caryophylleus silvestris L.

Caryophyll.



Karolus.

Caryophyll.
11.

PRIORI dodrantes sunt cauliculi, te-
retes, geniculati: folia in singulis geniculis
bina inter se opposita, oblonga, angusta, dura,
mucronata, colore quasi caesio: flos è caliculo
rubente emergens, singulis cauliculis unicus
plerumque insidet, (interdum bini) quinque
folijs constans lentè fimbriatis, coloris in di-
luta purpurâ rubentis, circa umbilicum hir-
sutus, & saturatione purpurâ nitès atque odo-
rus, ex cujus medio umbilico duo brevia fla-
minula prominent: semen in caliculis palca-
cum, fuscum: radix longa, tenues fibras spar-
gès, è cujus capite plures cauliculi latè in am-
bitu & confertim sese diffundunt, fibrisque
subinde agunt.

Invenitur in Hamburgensi monte, duobus
supra Posonium, infra Viciniam autem, octo
milibus. Floret istic Maio: in hortos verò
translatum, etiam Aprili.

ALTERIVS, breves etiam sunt cauliculi,
tres uncias raro excedentes, geniculati: folia
in singulis geniculis bina, superioribus bre-
viora, molliora, viridia, deorsum reflexa, splen-
dentia, in novellis autem germinibus, satis
copiosè ex eadem radice nascentibus, majus-
cula, latioraque: flos è nigricante & crassiore
caliculo emergès, summis cauliculis insidet,
unicus, superioribus major, quinque etià fo-
lijs còstans, paulò saturatior priore, circa um-
bilicum longioribus villis hirsutus, & ele-
gantè ex saturâ purpurâ albo mistâ, varietato

gratus, inodorus tamen: semen in longis vasculis quæ maturare hiantia, paleaceum, fu-
scum, aliorum Caryophylleorum modo continent, radix superiori similis est.

Frequen-



Frequentissimum est in Sneberg, monte, ob perpetuo insidentes illi nives, sic appellato, & *Hagales* alijs Austriacarum Stiriacarumq; alpium jugis. Floret autem illic sub Iunii finem, & Julio: sed in mitiora loca delatum, cum superiore flores profert, semen verò Iunio.

2. Illi per omnia ferè simile crescit in altissimo jugo Etcher vocato, nisi paulò longioribus *Caryophyl.* *II. spec. 12.* esset folijs & cauliculis, flore plerūque majore, nec eo unico, sed gemino, aut triplice: præterea sub villis umbilicis a ambiennibus, inæqualem quandam, & in frequentes meandros excurrentem lineam habet, humani cranij (suratam referentem, colore rubro saturatiore præditam, ut prioris est.

3. In eodem jugo, paucas hujus generis, in Sneberg verò secūdi aliquot plātas inveniebam, quæ ab illis duntaxat floribus varietate differrent: nam licet forma dispar non esset, color tamen albus erat, umbilici ambitus purpurascens villis hirsutus. Florebant illic primum Augusto, & maturum semen interdum præbebant: sed in hortos translatæ (eas enim cum suo cespite adferebamur) cum superioribus flores produxerunt.

TERCIO, cauliculi paulò majores crassioresque, pedali plerumque altitudine assurgunt, *Caryophyl.* *III.* geniculati, singula genicula ambiētibus binis folijs, primo genere longioribus & latioribus, æruginei quodāmodo coloris: ex summis alis bini, terni, singulatim autem nascentes flores, priori non multū absimiles, quinque folijs per oras laciniatis, atque circa umbilicū carnē lanugine pubescentibus, constantes, rubri coloris, nullis corniculis inflexis præditi, odorati, qui e caliculis primū emergentes, candidi futuri videntur: floribus succedunt cotinacula satis crassa, semen nigrum, planum, ut ceteri Caryophyllei, continentia: radix oblonga, fibrosa, à capite plures furculos in orbem diffundit, qui plerumque fibras agentes, adeò se propagant, ut brevi totas areas occupent.

Vnde primū illatus, ignoro: sed in omnibus Austriacis, Vngaricis, Bohemicis, etiam Germanicis plerisque hortis colitur, & Maio mense cum reliquis floret.

CRASSIVSCVLAM habet radicem Quartum genus, nigro cortice testam, satis fibro- *Caryophyl.* *IIII.* sam, (supernè in aliquot ramos divisam, qui summa tellure multa capita gignūt, è tenuibus, gramineis, videntibusq; foliolis conflata: inter quæ profluunt aliquot ténues cauliculi, geniculati, palmares, & ad singulos nodos bina exigua foliola: calices in singulis cauliculis singulares, majusculi, è quibus flos ruber dilutior, quinque folijs nonnihil per ambitum crenatis constans, è cujus umbilico bina interdum albescens cornicula (sunt etiam qui illis careant) cum aliquot staminibus prodeunt: semen, ut in ceteris, nigrum, paleaceum.

Crescit in Tauto Carinthiæ monte. Floret Iulio, semen Augusto maturum est. *Nardus.*

QUINTO,

Caryophyll.
v.

QVINTO, crassa & nigra radix est, dura, lignosa, multos ramulos humi sparsos fundens, nigros item illos lentosque, & subinde fibras agentes, ex ijs cauliculi exeunt dodrantes, geniculati, infima parte gramineis quibusdam, brevibus, angustis, colore ca sijs folijs, binis semper ex aduerso intrer se oppositis, deinde secundum genicula aut nodos alijs rarioribus quilibet extremis cauliculis inuidentur longi calices ut in alijs Caryophylleis silvestribus, florem continentem album, odoratum, quinque folijs valde lacioiatis consistantem, quodrum umbilico bina emergunt stamina longiuscula, corniculorum papilionis instar inflexa: semen deinde in longioribus capirulis planum, quale reliquorum Caryophylleorum.

Natalis.

Provenit sponte in Haugburgensi monte iuxta saxa, quâ Austriam & Septentrionem spectat. Floret Maio.

Caryophylli sil. v. species alteta.

Caryophyll. sil. vi.

Caryophyll.
v. spec. 11.

2. Istius etiam genus ibidem invenitur, longioribus cauliculis, & plures flores proferens, superiori quidem forma & candore similes, sed inflexorum corniculorum experies, atque eorum loco decem staminula ipsius floris superficiem paululum exuperantia habentes: capitula etiam, in quibus semen continetur, longiora.

Varietas

Eit & in hoc genere, quod flores circa umbilicum purpurascente lanugine hirsutos proferat.

Caryophyll.
v. spec. 111.

3. Aliud tertium paulò majus inveniebamus ad radices montis oppido Medeling imminens, rectius fere à Vienna miliar: firmiteribus tamen & longioribus est cauliculis, majore etiam flore, licet non minus profundè per oras laciniam, nec odorato, aut lacte candoris omnino, aut dilutius rubentis & quodammodo carnei coloris, brevibus villis purpureis umbilici circumferentiam in utraque specie occupantibus, nullis similiter corniculis, sed decem staminibus, ut in superiore promineantibus: alioqui folijs, radice, & florendi tempore conveniunt.

Caryophyll.
vi.

SEXTVM plures ab una radice prodeuntes habet caules, cubitales, teretes, multis geniculis prædiros: & in his bina semper folia caulem amplectentia, graminea, mucronata, reliquorum Caryophylleorum folijs fere similia, viridia tamen, non incana aut exsiccata: flores in summo caulis fastigio multos, longioribus caliculis inclusos, quinque folijs prædiros, in tenuissimas longisque lacinias dissectos, aut candidos, aut purpurascences, suavissimi odoris, & è longinquo nares ferientis, umbilico virescente, & purpurascente lanugine hirsuto, è quo aliquot staminula prominent: in oblongis deinde corniculis semen ferr paleaceum, planum, nigrum, reliquorum Caryophylleorum more: radix fibrosa est. Habent autem novelli

velli furculi, ante quàm in caules abeant, latiora paulò folia, Armeriorum folijs proxima, angustiora tamen, nec adeo virentia.

Spon te nascitur in humidioribus Viennensis agri pratis, atque etiam ad cœduarum fil-
varum, pratis vicinarum, declives margines, plerique Austris locis: serius reliquis floret,
nempe Iulio, & toto Augusto, interdum etiam serius.

Caryophyll. fil. VII.

Caryophyll. fil. VII.



SVPINVM est Septimum genus, & humi se spargens tenuibus cauliculis, quibus multa,
utrimque & ex aduerso semper bina, adnascuntur tenuia, brevia, graminea, viridique fo-
liola: in extremis ramusculorum fastigijs nascuntur flores simplici quinque foliorum serie
præditi, rubri, sed argentei veluti scintillis aspersi: semen non observavi: radix tenuibus fi-
bris constans, & in lateribus se pangens.

Crescere audio in monte illo non procul à Nielsburg Moraviz diffuso. Umbrosos locis
delectatur. Ejus iconem hic subjecimus.

Illius elegans genus reperitur, per omnia ferè simile, tenuioribus paulò folijs, utrimque
etiam ex aduerso tenuissimos cauliculos vestientibus, qui summo ramulorum similiter fa-
stigio sustinent flores duplici foliorum ordine constantes, æstatis initio, rubri coloris, in quo
argenteæ quædam veluti micæ elucent: evadunt illi temporis successu (nam rota æstatis
planta hæc floret) adeo pleni, ut rumpantur, mediòsque alios flosculos ostendant tenuibus
foliolis præditos, coloris quidem rubri, sed paulo dilutioris. Summâ tellure adeo sese di-
fundit hoc genus, ut brevi vicinos in ambitu cespites occupet, totâque hieme vireat: nam
frigoris patiens est.

Hoc non sponte natum vidi, sed cultum in hortis Ill^{mi} Principis Cattorum Wilhelmi, &
C.V. Ioachimi Camerarii, Medici Noribergensis.

OCTAVVM, crassiuscula & succulenta habet folia, illius plantæ quæ vulgo apud Bel-
gas Gramen marinum vocatur, folijs fere similia, frequentissima & confertissima, amari-
sculi saporis: inter quæ petioli verius quàm cauliculi emicant, uncæ semissem, vel etiam
unciam longi, geniculati, binis folijs inter se ad nodos oppositis cauliculis insident pregran-
des (pro stirpis proportionem) & laxi calices, lanuginosi, ex viridi purpurascetes, in quinque
crenas divisi, unde singulatas emergunt flores, quinque folijs constantes, & rubro dilutiori
colore præditi, inodon: semen observare non licuit: radix satis crassa est, subsulca, aliquot
fibris donata, verùm circa caput summa tellure expandens sese, & in plures ramos dividens,
subinde novas fibras agit.

Provenit iisdem quibus Quartum genus locis, nempe Tauro monte Carinthiæ, solo
tenui

tenui & arena splendente referto.

Floret sub finem Iulij & Augusto.

Caryophyll.
12. **N.**
Noni, folium est minutissimum, gramineumque & quasi pungens, viride: aded autem se propagat, ut magnos interdum cespites tegat; nō secus atque muscus quidam totos illos oblidens: flosculi in singulis propaginibus inter folia emergentes quinque bifidis folijs constantes coloris rubri dilutionis sive carnei, tenuibus & vix transversum digitum altis pedunculis insidere conspiciuntur singuli, gratissimo spectaculo: semē in capitellis sulcus, & splendens, renis forma (qua nota à reliquis Caryophylleis differt, & ad Lychnidum classe accedere videtur) sexiguum, subrufum: radix longa, nigricans, & multas propagines lumen à tellure producents.

Natalis. Summis Austriacatum & Striacatum alpium jugis invenitur nudo petrosq; solo. Floret Iunio, semen Augusto plerumque maturitatem adipiscitur. At in hortos translati hic Caryophylles, etiam sub Aprilis finem floret: nonnunquam etiam secundo, sub Septembris initium.

Pariter. 2. Colore floris variat qui in Iudenberg celsissimo Stiriz monte interdum nascitur, qui totus niveus est: alijs reliquis notis cum illo conveniens.

Urbis. **CARYOPHYLLEI** nomen invenit hæc planta apud Herbariorum vulgus (præfertim autem domesticum ejus genus) quia illius flores aromatici caryophylli odorem plerumque æmulantur. Sunt qui Vetoniam appellare malint: nec desunt qui ad Plinij Cantabricam referendam putent. Incolæ quinque priora genera, *Widmugli*, *Zeig neglin*, & *Etelmuglin* indifferenter appellant, hoc est, silvestres, montanos, & petros caryophylleos. Sextū genus Austricæ mulieres, quibus ob odoris fragrantiam in delicijs est, peculiariter *Xetdel naglin* ad est, laciniatum sive dissectum caryophylleum nuncupant. Anguillara libro Opinionum xii. Theophrastus δὲ ἀνθρῶν facere videtur. Nonum genus, Gesneri in epistolis Muscus alpinus fortē erit. Gallis autem omnia ista genera *Oeillets* & *Gyrosfles saunager* dici poterūt. Caryophylles verò flos in genere Vngaris vulgo *Zek fin* dicitur: montanus autem laciniato & odorato flore *mezzy zek fin*. Hispani domesticos caryophylleos *clavelinas* simpliciter nominant, silvestres autem *clavelinas montesinas*.

Caryophylli silvestres alijs diversis generis.
Passim in pratis, silvis, agrorum marginibus, alijsque herbosis Hungariz, Bohemiz, Austriz Stirizq; locis, sponte nascuntur aliquot alia Caryophyllei silvestris, sive Armerij floris genera. Sed quia in omnibus Germaniz, Galliz, Hispaniz provincijs, atque etiam, ut puto, Italiz obvia sunt, peculiarem illorum descriptionem hoc loco dare operæ precium non videtur.

Caryophyll. pleno flo. Silesiac. miniat.

Non prætermittenda tamen ea domesticæ Caryophyllei pleno flore species, quæ Viennæ Austriz miliprimum conspecta, & ex Silesia usque missa.

Ea autem neque geniculatis caulibus, neque foliorum forma aut situ ab alijs domesticis Caryophylleis differt, sed floris color diversus, ad illud, quo lychnis silvestris byzantina prædita est, quodammodo accedit, minus tamen tutulus & flammeus, & ad carneum potius tendens, qualis fere in quibuldam sericeis pannis conspicitur, quibus Germani *pomerantzsch* nomen dederunt: floret cum reliquis, semen etiam illis simile est nigrum, planum, quod satum satis feliciter provenit, non omnes tamen plantæ ex eo natæ matris colorem referunt, sed aliz album, aliz rubrum habent, aliz nativum retinent, eumq; saturatiorem aut dilutiorem: nonnullarum item flores simplici quinque foliorum serie duntaxat constant, in quovis colorum genere.

Ceterum Caryophylleorū facultates (quibus haud dubie præditi nonnulli ex ijs quorum historiam hoc cap. de scripsi) diligentissimè persequutus est celeberrimus Matthiolus amplissimis in Dioscoridem commentarijs.

ARMERIVS FLOS.

CAP. II.

CARYOPHYLLEIS floribus congener est *Armerius*, è gallica appellatione nomen apud recentiores herbariz rei scriptores mutuatus, qui summo caulis & ramulorū fastigio multos flores



Caryophyll.
pleno flo. Silesiac.

ros flores confertos, & veluti in umbellam five caput congestos habet, foliis Caryophylleorum sextro genen similia.

Eius porro duo sunt genera: Vnum simplici quinque foliorum serie præditos habet flores: Alterius duplici, triplici five foliorum texturâ constant.

*Armeria
ru. du. gene-
ra.*

Armerius simplici flore Pannonic,

Armerius pleno flore.



Quod simplici est flore, suas etiam habet differentias: nam una eleganti est flore, eoque aut planè rubro, aut lactei candoris maculis asperso, aut niveo, cuius oræ carnei coloris: altera, quæ rarior est, omnino niveo: tertia pauciores ut plurimum habet flores dilutius rubentes & carnei quodammodo coloris: quartæ flos purpurascens est, singulis tamè ejus folijs per oras albis. Hujus semine quinta mihi nata, cuius flores primo & secundo quo aperti sunt die, lactei protus candoris, sequentibus paulatim evanescente albedine, tandem omnino purpurascunt, sic ut in eadem umbella conspici licet hos flores lacteos, illos exalbidos & media ex parte purpurascens, alios omnino purpureos, istâ collocum varietate oculos valde recreantes: breviter, magna etiam in hoc flore varietas.

Illius quod plenum habet florem duas duntaxat differentias conspexi: unam, quæ vulgariore est, cubro & eleganti admodum flore: alteram, quæ rarior, albo. Omnium verò, tam quæ simplicem habent florem quàm quæ plenum, semen planum, nigrum, Caryophylleorum seminis instar in vasculis continetur.

SIMPLICIS prior species ab Vngaris *Isten nyla*, id est, Dei sagitta nuncupatur, frequensque sponte nascitur in quibusdam pratis Nemerh- wywar III. Balthaf. de Barthyan vicinis quâ Occidentem spectat. Ceteros Galli *Armeries*, Belgæ *Repts* vernacula lingua appellant, eoque in hortis duntaxat cultos vidi.

H v c proculdubio referendæ sunt duæ illæ plantæ, quæ à rei herbariæ studiosis Belgis Graminis marini majoris & minoris nomine vocantur: tamen plerique alijs locis procul à mari diffusis etiam sponte proveniant. Nam quod majus vocant, in lummis herbois quæ Austriacarum Suriacarumque alpij jugis frequenter inventum eruebam: memini etiam colligere in regio illo vivario Madritiana silva vulgo nuncupatur, secundo ab urbe Lutetiâ miliarî, unde erutum amicis in Belgicam mittebam: nusquam verò maritimis locis mihi conspectum. Quod autem minus vocant, non modò in Angliæ & Belgicæ maritimis provenit: sed in Moraviæ collibus copiosè nascitur, atque non procul Praga, itinere Viennensi: Saxoniz etiam quibusdam herbis locis, præsertim agro Witebergeni videre & colligere memini, ante multos annos.

*Armeria
maritima
maior.*

minor.

Neutrius

Neutrius verò descriptio hîc à me expectanda est, cum à Claris. Viris Dodonæo & Lobelio eum suis iconibus edita sit: à Dodonæo quidem, minor graminis marini nomine: utraque à Lobelio Caryophylli marini & monrani appellatione. Ab illis ergo requirere poterunt rei herbaræ studiosi. Non desunt qui Plinij Staticen esse censeant.

LYCHNIS SILVESTRIS.

CAP. III.

*Lychnis fil.
var. genicul.*

LYCHNIS silvestris magna etiam est varietas: Nam præter vulgares, tam quæ simpliciter quinque foliorum est flore, quàm quæ multiplici, Claris. Dodonæo & alijs descriptis, aliquot alix in meis peregrinationibus sese obtulerunt, quarum historiam operæpretium duxi hoc capite describere.

Lychnis silvestris i.



Lychnis silvestris ii.



Lychnis fil.

PRIOR, crassiusculus habet caules, rotundos, geniculatos, in multas alas divisos, quæ lento quodam liquore obsitæ sunt, cui plerumque inhaerent eulices & minuta huiusmodi insecta: folia ad singula genicula semper bina, ordine disposita, & ex adverso respondentia, è viridi candicantia & quasi cæsia, laris ampla: flores multos in umbella congestos, pulchros, rubros, quinque foliis non bifidis constantes: semen in tenellis vasculis parvum, rotundum, papaveris rhædis instar, cineracei coloris, continetur: radix crassa est & fibrosa, quam ubi planta floruit, subsequens hiems corrumpere solet.

*Lychnis fil.
ii.*

ALTERI, caulis est geniculatus, paucioribus ramis donatus: folia etiam bina ex singulis geniculis prodeuntia, superioribus magis vitidia, & firmiota: flores in singulis ramulis superiori ferè similes, majores, obsoletius rubentes, quorumque folia bifida sunt: calix crassus membranaceâ tunica durâ & valde striatâ tegitur, in quo semen cineraceum, crassiusculum: radice nititur singulari, non admodum fibrosâ, quæ etiam ingruente hieme perit.

*Lychnis fil.
iii.*

Ex singulis geniculis pedales ramos profert Tertia, geniculatos, & in multas alas divisos: folia jam dictæ angustiora, saturâ viriditate ferè nigricantia: flores quinis etiam foliolis constantes, rubentes: semen in calicibus, superioribus simile, minus tamen, & fuscum: radix crassa, primæ par, quam subsequens hiems non minus corrumpit quàm superiores.

*Lychnis fil.
iiii.*

VNICVS initio Quartæ est caulis, pedalis, interdum amplior, geniculatus, ex viridi purpurascens, bina ex singulis geniculis sibi invicem opposita proferens folia, longa, acuminata, firma, crassiuscula, viridia, à medijs ad summum ferè, multis floribus ex alarum

sinu in

Lychnis silvestr. 111.

Lychnis silvestr. 1111.



Lychnis silvestr. v.



sinu in oblongis pediculis prodeuntibus ornatus, qui quinis extremo divisus, sed in rotundum bifidis folijs constant, & elegantissimo colore rubro ad purpuram tendente rutilant, elatiore dilutioreque coronula medium umbilicum occupante, nullo tamen odore præditis: his succedunt membranacea, at tamen duriuscula capira, circa pediculum angustiora, & crassiore mucrone, quæ per maturitatem dehiscent, & semen ostendunt inclusum, minutum admodum, ex rufo nigricans: radix crassiuscula, nigra, multas fibras spargit, & singulis annis novos, eosque numerosiores caules producit.

MULTOS caules ex unâ radice profert *Lychnis fl. f.* Quinta, rotundos, longiusculos, ceteris infirmiores, in terram procumbentes, geniculatos: folia in singulis geniculis bina, longa, mollia, & lanugine quadam canescens, inter quæ flores alternatim secundum ramulorum longitudinem enascuntur superioribus formâ similes, sed majores, & dilutiore colore rubescentes, vel, ut ita dicam, incarnatis semen in vasculis superioribus par, subrufum: radix crassa & fibrosa, quæ tamen plerumque alterum annum non superat.

SEXTA, omnium minima, cauliculo *Lychnis fl. f.* affurgit circiter palmum alto, geniculato, tenui, lanuginoso: ad quorum singula internodia, bina tenuia, longiuscula, lanuginosa folia nascuntur: flores inordinati, alternatim ex singulis geniculis prodeunt, parvi, purpurei coloris

lia nascuntur: flores inordinati, alternatim ex singulis geniculis prodeunt, parvi, purpurei coloris

Lychnis filvest. vi.

Lychnis filvest. viii.

Lychnis fil.
vii. Cremona.

coloris pulcherrimo rubeo misti, longo lanuginosoque caliculo inclusi: radix tenuis est.

HYMILIS etiam est Lychnis filvestris Septima, Cretico semine, Ocymoidis appellatio-
ne missa, nata: etenim statim à radice in multis ramulos palmares, vel etiam minores divi-
ditur, teretes, tenues, geniculatos: folia ad singulos nodos enascuntur bina contrario exor-
tu, exigua, crassiuscula, vallis quodammodo recta: singuli ramuli sustinent membranaceum
caliculum, striatum, lanugine oblitum, infimâ parte angustiore, superiâ laxiorem, è quo
exilit flos quinque folijs cõstans, in summo bifidus, coloris initio rubelli, deinde leviter can-
dicantis, in quo staminula aliquot flavescens apicibus prædita: flori succedunt capitula
semen continens, simile Lychnidis hortensis semini: radix tenuis, in varios ramos divan-
cata, non vivax tamen. Florebat Julio M. D. XCIII. & sequente semine deciduo nata.

Lychnis fil.
viii.

GENICULATOS etiam habet caules Octava, tenues, in plures alas divisos, pedales aut ma-
jores: folia in singulis geniculis bina, ternâve, interdû plura, angustiora quàm reliquarum,
viridis candido perfusi & quasi cæsi coloris: flores in summis ramulis nascentes, quinque foli-
is bifido mucrone præditi constantes internâ parte candidos, externâ aliquantulum pur-
purascentes, & antea quàm omnino tabescant, sese contrahentes & circumvolventes: cali-
ces admodum duros, breves, subrotundos, semen parvum, rotundum, Papaveris rhiza-
dis cineracei coloris continentes: radicem satis crassam, albam, multifidam, altero an-
no pereuntem.

Lychnis fil.
ix.

MULTA secundum radicem habet Nona folia, digitalis longitudinis, sensim in latitudi-
nem sese explicantia, sub extremum mucronata, viridia, nonnihil villosa, ad Lychnidis fil-
vestris flore albo, quæ in omnibus Provinciis vulgaris est, folia quodammodo accedentia,
longè tamen angustiora, acidiusculi gustus: caules deinde pedales, interdum cubitales, no-
ditos & geniculatos: singula genicula latiore pediculo amplectuntur bina folia ex adverso
sita, alijs breviora, circa summum caulem adhuc minora, & mucronata: summis alijs innati
longiusculi ramuli, ternos plerumque vel etiam plures flores sustinent, quinque bifidis, &
usque ad umbilicum divisos, binâque mucronatas appendiculas circa eundem umbilicum
habentibus, folijs constantes, albos, quinque staminulis medium umbilicum occupantibus:
floribus qui marcescentes contrahuntur, & interiore parte convolvuntur, ut in præceden-
te, succedunt crassiuscula & mucronata vascula, semine exiguo, rotundo, cinetaceo plena:
radix fibrosa & perennis, singulis annis novos ex radice numerosioresque caules profert, qui
secundum radicem fibras agentes facillime pangi possunt.

Lychnis fil. x.

DECIMA, singulis annis ex eadem radice novi prodeunt cauliculi, per terram sparsi, &
subinde



subinde circa internodia radices agentes, deinde sursum denuo sese erigentes palmari altitudine, graciles, geniculati, bina folia in singulis geniculis ex adverso opposita ferētes, longiuscula, angusta, obtuso mucrone, viridia, prominulo dorso: flores in summis cauliculis & lateralibus ramulis elegantes. candidi, quinque laciniatis foliolis cōstantes, inodori, quibus succedunt obtusa vascula, exigua, nigricante, planoque semine (qua nota quandam affinitatem cum Armerijs floribus habere videtur) refecta: fibrosam habet radicem, quam facile pangere licet.

2. Aliud ejus genus multo minoribus & angustioribus folijs, minore etiam flore, ceteris notis non dispar, invenitur in scopuloso illo præruptoque jugo Durtestain nuncupato, secundo supra Gamingam miliari.

Omnes, ubi adoleverunt, lento quodam & glutinoso humore, superiore parte, illitæ videntur ut prior (at tertia & quarta maximè) cui plerumque & culices, parvæque muscæ & formicæ tamquam visco capræ inhærent, aliæque quisquilæ.

Sponte nascuntur tres priores cum seprimâ in arvis & inter segetes pingui solo, plerisque Castellæ veteris locis: in hortis cultæ, florent eodem quo satæ sunt anno, à Maio mense usque in Autumnum, septima tamen difficiliter eicurari voluit: prima autem & tertia, sponte seruntur & ante hiemem prodeunt. Quarta in omnibus ferè Pannoniæ & Austriæ inferioris montanis silvis, editisque & herbidis locis invenitur, atque etiam silvis Francofurti ad Mœnum vicinis. Floret Maio, semen Junio maturum est. Quintam, in marginibus quorundam Castellæ agrorum: Sextam, non nisi in collibus Salmantiæ vicinis inter saxa provenientem observabam, atque utramque Maio florentem. Octava, non modò in castris silvis, sed etiam ad refectibulum agrorum margines, nascitur per universam Austriam infra Anisum, Moraviam, Bohemiam, Pannoniam, ultraque Muram & Dravum, abundè etiam silvis Francofurti vicinis. Memini & in Belgicâ videre Lutzelburgensi ducatu. Nona, provenit ad Striacarum Alpium & Snealben supra cœnobium Neuberg radices: abundantius tamen in Erschero sæpius commemorato.

PRIOREM & SEPTIMAM Salmaticenses *Behen* appellabant, rubrum videlicet & album: *Nomina.* Alteram *Ocimoides*. Sed ad *Lychnidis silvestris*, cui perquam similes sunt, omnibûsque ferè notis conveniunt, genera, comodus referentur. Sunt qui primam & tertiam inter *Armerios* flores reserte cuperent: semen tamen *Lychnidi* simile, aliæque notæ, eorum sententiam convellunt. Nec desunt qui primam *Odontitidem* Plinij esse vellent, quorum sententiæ *Odontitis* historia planè refragatur. Vngari *Quartam* & *Octavam*, & reliquas quæ apud
 b 2 cos na-

eos nascuntur vulgares *Lychnides silvestres*, *Nyctag. sil.* id est, silvestrem *Caryophylleorum* herbam appellant. noouuli autem quartam *Nyctag. sil.* hoc est, lepons *Caryophylleam* herbam vocant. Septima vulgo *Salmanticensium* *Celtis* dicitur.

Quibus facultatibus sint præditæ, compertum non habeo: omnes verò degustatæ submani gustus deprehenduntur, præter Octavam, quæ, ut diximus, acidiusculi est saporis.

Lychnis Byzantina minio flo. re.

Odontitis Plinij simplici flo. re.



Lychnis Byzantina minio flo. re.

Lychnis silvestris flo. re.

Lychnis silvestris Platan.

Lychnis silvestris Platan.

Odontitis Plinij simp. *Odontitis* Plinij simp.

Odontitis Plinij simp.

A d. *Lychnides silvestres* haud dubiè referenda est ea planta, quæ à vulgo *Hetbariorum* Constantinopolitanus flos dicitur, Doctissimus Fuchsius *Struthion* esse credebatur. Ejus historia ex recentioribus *Florantologia* petenda: iconem tamen hic adijciendam esse putavi.

Illius verò genus habui Viennæ, semine è Belgica misso natum, tenerius paulò, nec adeò numerosos flores in umbellâ ferens, qui miniat non erant, sed omnino albi: ceteris notis vulgari, quæ miniato est flore, conueniebat: sed ætate non mihi firmam redditur ipsa planta, quàm alterius.

Tertium item ejus genus in Bruxellæ hortis ali, scribebat ad me N. V. Joannes Boissier, huic jam dicto simile, sed floris colore diversum, qui initio quidem miniatum est, deinde paulatim evanescens albescit, tandem totus ferè niveus evadit, sic ut, p. florum ætate, tres colorum differentie eodem tempore in eadem umbella coexistere possint, videlicet miniatum, nigrum candore misto perfusi, & albi. Semine tamen ab illo misso nata Francosutti plantæ quædam, inter reliquas, florem non ita variantem tulerunt, sed dilutior rubro colore, & quasi ex rubro & albo commixto præditum, siue jacinthis colore imitatem, averfa autem parte candicantem.

Seco & *Lychnis silvestris* genus est, cujus delineationem & præparatum Iacobus Plantæ ad me mittebat Belen alterius nomine: cujus verò esset coloris, minimè indicabat.

Porro, præter jam dictas, passim etiam in Austria, Serbia, & Pannonia occurrunt cum in silvis, tum montanis pratis vulgares *Lychnides silvestres*, flore albo, rubro, dilutius rubente, & subvirescente, quæque flos cuculi vulgo appellatur. Doctorum verò quorundam judicio Plinij *Odontitis* est, angulosum certè caulem habet, geniculatū, ex nigro viridique purpurascens, in geniculis folia, purpureum florem, atque in pratis nascitur. Ejus genus Nobilibus quibusdam matronis Viennam missum me mini à Iosepho de Casis bona, Sereni Ducis Hetruriz Simplicita, cujus flos multiplici foliorum serie cõstabat rubri coloris elegantis: verum illæ plantas eadem ætate amiserunt, dum me monentem, ne meridiani solis ardoribus exponerent (tenellæ enim adhuc erant) sed in umbra potius adiectarent, spernūt.

Similem his proximis annis repertam in pratis, ea Flandiæ parte, quæ inter Gandavum & Antuerpiam sita, *Clambr van Ware* vulgo appellatur, ouper ad me scribebat Joannes Boissier, cujus

Odontitis Plinij pleno flore.

Melandryum Plinij quorundam.



cujus crebra in his meis observationibus fit mentio. Quam habeo ejus munere plantam, elegantem florem plenum dedit, carnei coloris, anno M. D. XCII. cujus iconem affabre exprimi curavi, hic reponendam.

Nascitur etiam prædictis jam locis illa planta, quæ nunc *Ocymastri*, modò *Ocymoidis*, *Polemonij*, *Papaverisque* spumei nomen à varijs scriptoribus recentioribus adeptæ sunt, *Lobelius* quandam affinitatem cum *Melandryo*, quod *Plinius* Nat. Hist. lib. xxvi cap. vii. *jocinori* mederi scribit, habere putat. Sed cum brevem admodum & mutilam ejus historiam tradat: an huic plantæ quadrare queat, difficile quæquam judicare posse existimo. Quid si potius *Melandryum* Plinij sit *Lychnis* illa fil. albo flore odorato: cujus genus flore pleno in cultis invenitur? Omnino autem ad *Lychnidum* silvestrium classem pertinere arbitror, cum eas formæ pulcherrimè referat. Duorum verò generum esse observabam. Vnum enim in montanis nascens, altius adolescit, crassiores habet caules, qui cum laxis folliculis florem amplectentibus ex viridi purpurascunt: Alterius autè quod in omnibus etiam Germaniæ præcis obvium est, dilutiores & quasi albicantes sunt.

Ceterum novum & elegans ejus genus ante paucos annos, semine ex Italia misso *Ocymoidis* arboris semper virentis appellatione, natum, cui multi ab eadem radice prodeunt rami palmares, crassiusculi, lignosique quidem, sed fragiles, in quibus nascuntur bina semper ad versa inrer se folia, bellidis folijs non majora, ab imo paulatim in larum expansa, sed summo mucronata, viridia admodum & splendens: à summis aliquot ramis alij enascuntur dodrantales, aut pedales interdum ramuli, geniculati, graciles, binis inrer se oppositis angustioribus folijs ad singula geocula donati, & summo in alas còrrario situ utrinque nascentes divisi, quibus insident membranaceis pinguibus caliculis inclusi flores, quinque bifidis folijs constantes, coloris quodammodo carnei, è quorum medio terna gracilia incurvæ prodeunt stamina: radix candicat, paucisque fibris prædita est, perennis tamen. Florer Junio.

Nec minus elegans *Lychnidis* silvestris genus describit N. V. *Fabius Columna* in *Plantarum novarum Historia* quod *ocymoiden Lychnitio* appellat, quem consulendum censeo.

Sed & tria alia *Lychnidis* silvestris genera semine nata observabam anno M. D. XCV. Primum altius excrefcens, cubitali videlicet aut ampliore caule, nodoso, bina folia alternatim ad singula geocula semper ex adverso proferente, oblongiuscula, extremo mucronata, ex quorum alis exeunt tenues ramuli, lento quodam rore, ut ex tritimo caulis, obstri, veluti in plerisque *Lychnidibus* silvestribus, sustinentes tenues, longiusculos, striatòsque, caliculos, è

Melandryum
Plinij quorundam.

Lychnis fil.
semper virens, sive
Ocymoides
f. n.

Lychnis fil.
Columna.

Lychnidis fil.
alia semine
nata.

b 3 quibus

Melandryum Plinij genuinum.

Lychnis silvestris latifolia.



quibus emergunt elegantes flosculi, proterus nivei, quinque folijs, à summo mucrone orbiculari ad mediū usque per longitudinem sectis, contantes, in quibus decē stamina alba, tenuia, quorū quina, flore sese explicante, statim conspicua sunt, & albicantibus apicibus prædita, alia demum exeunt contrahente se milvinotum unguis instar flute: duriora capitula floribus succedunt, in quibus semen quale in reliquis Lychnidibus silvestribus: radix multicaulis est, & quæ ramuli enascuntur purpurascens, ferentes aduersa inter se folia, quadam brevi lanugine asperia, quæ faciliè propagari & pangi possunt. Semen ex Italia misit

Muscipula.

11.

Alteri brevior est caulis, & cubito minor, rotundus, multis nodis cinctus, è viridi purpurascens, ad cuius singula gemcula, seu nodos, bina inter se opposita nascuntur folia, paullo maiora quàm in superiore, non minus tamen lanugine obsita: ex quorum alis exeunt, ut in præcedente, ramuli, lento (quemadmodum & extremus caulis) humore obducti, cuius culices & alia exilia in secta, tanquam visco irretita nonnunquam inharrent: ex radice secundū caulis latera nascuntur alij rami frequentibus folijs præditi, æqualibus ferè am descriptæ folijs, omnino purpurascens, qui non minus quàm superiores pangi possunt: summo cauli, & extremis ramulis, qui valde purpurascunt, insident striati ex atro purpurascētes caliculi, è quibus emergunt flosculi quinque foliolis angustis per medium in longitudinem sectis constantes, foris ex fuligine purpurascens, internè albi, cum quinque longis staminibus ex trimâ parte crassiusculis & purpurascētib; & totidem brevioribus, in candidos apices desinentibus: flaccescentes autem isti flores, non minus quàm superiores contrahuntur: ipsi succedunt valcula ut in superiore, simi i semine plena. Viridices sunt istæ duæ.

111.

Annua est Tertia, hoc est, prolato flore & semine (si ad frugem pervenit) perire solet. Ex una radice tenui, aliquot proferit ramulos, tenues, nodosos, quadam lanugine pubescentes, quibus ex aduerso semper inharrent bina lanuginosa folia: summis ramulis alternatim inter folia innascuntur caliculi tumidiusculi, striati, & pubescētes, è quibus emergūt flosculi coloris ex albo purpurascens, sive carnei, quinque foliolis constantes, in quibus exha staminula: semen per aduersam valetudinem, quæ me subinde affligit, observare non licuit.

Lychnis silvestris.
latifolia.

1.

PLANTA CUIUS ICONEM AD ME MITTEBAT IACOBUS PLATEAU, QUAMQ; HAC TABELLA EXPRESSAM DAMUS, RADICES FIBROSAS, PRIMULARUM VERIS INSTAT, & QUARUM CAPITE FOLIA PROMEBAT LATUS AMPLA, AURICULÆ URSI VULGO APPELLATÆ FLAVO FLORE FOLIJS NON VALDE DIFFIMILIA, CANDIDIORA TAMÈ & LANUGINE PUBESCENTIA, ETIAM ILLIS CRASSIORA, DENSIORA, & SUCCO ABUNDANTIA: ALTERO DEMUM À

fatione

fatione anno caulem producebat duorum aut trium cubitorum altitudine, firmum, rotundum, succo quodam lento & glutinoso oblitum, quo muscæ & alia minuta insecta insidentia detinebatur magno numero. In summis ramis plurimos proferebat flores veluti in umbellam congestos, etiam ad centesimum interdum numerum, satis tamē exiguos pro plantæ magnitudine, quinque folijs bifidis constantes, coloris ex viridi flavescentis.

Illius semen ad nos missum memini ex Italia, à Iosepho de casa bona Serenissimi Ducis Florentiæ, quum ex Cretâ redux esset, Muscipulæ Auriculæ urli facie cognomine, cum plurimis alijs feminibus ex eâ peregrinatione relatis.

SESAMOIDES MAIUS QUORVNDAM.

Sesamoides magnum Salmantic.

CAP. IIII.

Sesamoides parvum Salmantic.



AD Lychnidis silvestris etiam genetæ non ineptè referri posse puto cam plantam, quam nonnulli Salmanticæ Sesamoides magnū nuncupabant, aliquor cauliculis pedibus, interdū cubitalibus ex una radice prodeuntibus, rotundis, geniculatis: folijs ferè oleæ ad singula genicula ex adverso nascentibus, cæsi coloris. floribus in extremo caule & ramulis spicatum aut racematim cõgestis, exiguis, ex herbido pallescentibus: semen in caliculis subrotundis Lychnidi simile, cineracei coloris: radix satis crassa, candida, perennis, summâ tellure multa folia, longiora, & mucrone latiora spargens: summus caulis & extremi tamuli lenito quodam & viscido humore oblitum sunt, quemadmodum Lychnides silvestres superiote capite descriptæ. Tota amara est.

Sesamoides mag. Salmanticæ.

Nascitur lapidoso & arido solo circa Salmanticam, & Narbonensi agro: magna verò copia Austriz salebrosi collibus, alijsque desertis locis. Ali etiam solebat in Belgicis hortis. Eodem autem semine plerumque duæ divetæ species enascuntur, non illæ quidem formâ dissimiles, sed quarum una florem cūque majusculum duntaxat profert, stentilq; est: altera seminifera minorem florem habet, Tota æstate florent.

Narbolet.

Parisiæ.

Ea, ut dixi, Salmanticensis magnum Sesamoides appellabatur: alij ad Papaver spinosum meum referre volebant.

Namini.

Non dubito quin illius genus sit, præsertim seminiferi, cujus iconem nudam nec ullis coloribus infectam ad me mittebat Iacobus Plateau Behen flore parvo appellatione, aded, quam descripsi, omnibus ferè notis æmulatur: de floribus autem colore, vel seminis formâ nihil adferre possum, quandoquidem nihil præter nudum nomen iconi erat additum.

Ejus genus.

Tamen sequentium duarum stirpium facies non respondet cum superiore: quia tamen utraque Sesamoidis nomine Salmanticæ insigne batur, omnes eodem capite comprehendendas existimaui.

DODRAN.

Sesamoides
Salmantice
parvum l.

DODRANTALES autem tres aut quatuor ab una radice producit Prima virgulas, teretes, circa quas folia lini, exigua, crassa, inordinata: & io summis plurimos stocculos, spicz, aut racemi instar confertos, ex herbaceo purpurelcentes inirio, deinde tenuibus capillamentis ex albo pallefcentibus ornatos, in quorum medio veluti quatuor grana vindia conspiciuntur, quæ excusso flore, in vascula excrefcunt, exili nigricante semine pleoa: radix crassifotcula, candida, dura, vivax, subinde etiam ante hiemem repullular.

Natalis.

Io collibus Salmantice proximis lapidoso solo provenit, ubi Maio florebat, deinde semen proferebat.

ISTIC Sesamoides parvum appellabant, tamen si cum ejus descriptione minimè cooveniat. Ingrati & amariusculi est gustus.

Sesamoides
Salmantice
arvum l.

ALTERA item Sesamoides parvum istic occupabatur, crefcens declivibus locis, cui dodrantes virgæ, multa folia lini foliorum æmula, majora, & incana: flos copiosus, albus: radix etiam candida, sed non valde crassa. Floret hæc etiam planta eodè quo superior tempore: vivax etiam videtur, à Sesamoide tamen non minus aliena, quàm superior.

HESPERIS.

CAP. V.

Hesperis cur
dicta.

HESPERIDI nomen inditum, auctore Theophrasto lib. vi. de caosis Plant. cap. xxv. quòd nocte plus redoleat, quàm interdiu. Cui suffragatur Plinius Natur. Hist. lib. xx. cap. vii. Ad quam verò earum plantarum, quæ hodie nobis sunt cognitæ, potissimum referri debeat, plenique adhuc dubitant, cum oillas alias notas reliquerint Veteres, quibus dignosci queat.

Cocumunis tamen opinio obtinuit, ut ea quam nonnulli Matronalèm violam vocant, & inter Leucoij genera referri debere viderur, Hesperidis oumeo sibi propium adicilicet: quoniam ejus flos, sub vesperam præsertim, gratò odore nares feriat, interdiu, aut oulum, aut levissimum spiret.

Nos ergo, vulgarem Herbariorum opinioem sequuti, Hesperidè appellamus, quæ Matronalis viola alio nomine dicitur, quòd Matronis atque virginibus sit in delicijs. Ejus verò duo geocera alia, minimè ab alijs hæctenus observata, in medium proferemus.

Hesperis 1.

Hesperis l.



Natalis.

Varietas.

CVBITALI Prior excrefcit altitudine, multisque ramis prædita est, quos confuso ordine ambiunt folia, Matronali violæ similia, paullo tamen latiora & crassiora, acidiuscule primum gustu, postea acti & salivam ciète: extremis ramis io oblongis pediculis insident flores Leucoij aut Violæ matrocalis floribus forma similes, quatuor foliolis, ut illi, constantes, non explicati tamen, sed se contorquentes, coloris admodum inelegantis & obsoleti, hoc est, pallidi & furvi, infinitis venulis ex atro purpureis singula foliola intercurrentibus, odore interdiu nullo, aut adeò tenui, ut vix naribus percipi possit, sub vesperam autem gratissimo & suavissimo: flori succedunt longa, toroliæque ut in vulgari cornicula, ferè tameo quadrangula, in quibus duplici serie continetur semen vulgari Hesperidi simile, subruffum: radix fibrosa, quæ ut plurimum biennium non superat, sed postquam defloruit & semen tulit, perire solet: si tamen præcis caulis ad frugem pervenire non sinatur, nova germina interdum producit.

Sponte nascitæm & semine prægnantè primum inveniebam in Prellnberg Hamburgensis monti vicino, Vngariæ quæ extremo, quæ Austriam spectat, meosè Junio anni M. D. LXXVI. Ejus deinde semen terræ comissum sub sequente vere, plantæ mihi protulit, quæ altero anno duntaxat floruerunt Maio, & sequente hieme perierunt.

Solent verò quæ semine nascuntur plantæ, floris colore multum variare, nonnullis maternum colorem retineantibus, alijs aut dilutius pallefcentibus, aut magis obsoletum adquirentibus, omnia tamè folia crebris venis ex atro purpureiscentibus distincta habentibus.


IN Sy-

IN Sytix maritimus aliud Hesperidis genus crescit, cujus semen in Italiam allatum, deinde Viennam missum, plantas produxit jam descripta multò vegetiores, ampliora habentes folia, crassiores caules, majoresque flores, quatuor tamen folijs etiam constantes, ejusdem planè cum superiore coloris, sub noctem valde odoratos, interdum odoris expertes: quibus multo crassiora cornicula successerunt, alioqui superioris corniculis plurimò respondentia, semen etiam simile continens, sed paulò crassius, quod maturefcere non potuit, quia seris floruerunt plantæ. Altero etiam anno perire solet ejus radix, non multum prioribus affinis.

Hesperis Sytix 11.

Hesperis ttt.

Viola latifolia, Lunatia odorata.



TERTIA vulgari Mattonali violæ adeò similis est, ut ex utriusque collatione vix discrimen conspici possit: etenim folia habet secundum radicem non minùs ampla quàm illa, subhirsuta, viridia, in ambitu serrata: caulem cubitalem, multis alis concavum, ad quas alia breviora, & nonnihil ad pediculum laciniata nascuntur folia: flores in extremis ramis copiosos, quatuor folijs constantes, exalbidos, qui ætatis successu purpurascunt: cornicula, semina, radix etiam ipsa cum vulgari omnino conveniunt: solo floris odore, cujus in hac nullam gratiam percipere potui, differunt. Solet etiam hæc, altero plerumque à geminatione anno, & à maturo semine, perire.

Hesperis fl. 111.

Crescit passim Viennensibus agro ad montium radices, & vinetorum in collibus sitorum margines. Floret cum vulgari, nempe Maio & Junio.

Natalis.

PRIOREM appellare licebit Hesperidem montanam: alteram, Hesperidem Syriacam tertiam verò Hesperidem silvestrem.

Nomina.

MATRONALEM autem violam, tussis, convulsis, & difficultat spirantibus mederi tradunt: urinas insuper & sudores propellere, incidere, abstergere & digerere.

Facilitates.

CETERVM quæ à nonnullis Viola latifolia, à florum cum Hesperidis & Leucoij floribus similitudine, vocatur: ab alijs autem Lunaria græca & odorata, quia filiquæ semine excusso, & abjecto tegumento, splendide sunt, & ejus flores Leucoij aut Hesperidis florum odorem referant, in montanis silvis Austriæ & Stetiz, vicinarumque alpium silvosis locis, atque etiam in Pannoniâ inter amni sponte magnâ copîa provenit. Quæ cum à plerisque alijs descripta sit, ejus historiam hic retexere non est necesse.

Viola latifolia.

LEUCOIVM

ISTVS plantæ duo genera eũm in Hispanijs, tum in Narbonensĩ Gallia observabamus, unum majus & magis luxurians, alterum minus & exile.

Leucoium marinum majus.



Leucoium marinum minus.



*Leucoiũ ma-
rinũ majus.*

MAJORI, caulis est pedalis, interdum major, ramosus admodum, & humi procumbens: folia longa, crassa, molli, canentia, & quodammodo lanuginosa, Cichorij aut Erucæ modo divisa & velut præmorsa: flores secundum ramulos odorati, quatuor folijs ut reliquorum Leucoiorum flores præditi, dilutioris purpuræ colore, sed ad rubri vini feces quodammodo tendentis: siliquæ longæ, crassiusculæ, plantæ tamen ut vulgaris Leucoij, duplici planorum & subruforum seminum ordinem, intereurrente membrana contineri: radix multida, sed non perennis, postea quàm enim planæ florem & semē protulit (quod altero plerumque à fatu anno, interdum & tertio fieri solet) perit. Æstare floret.

*Leucoiũ ma-
rinũ minus.*

MINORI, dodrantales, teretes, sed satis firmos habet cauliculos, in plures ramulos divisos: folia priori similia, mollia item & ineana, minora tamen, tenuiorque & minus divisa: flores in ramulis superiore minores, quatuor foliolis constantes, coloris pulcherrimè rubetis, & dum marcescere incipiunt, magis saturi, quales Leucoij rubri vulgaris flores, & odorari quidem illi, verum minus quàm superioris: cornicula succedunt oblonga, teretia, exili & rufa femine plena. Floret Iulio & Augusto, eodem quo fatum est anno, deinde perit.

Notæ.

Nascitur utrumque Mediterranei maris littoribus in Hispaniâ & Galliâ Narbonensĩ: sed minus multo frequentius.

Nomina.

LEYCOIUM marini nomen indidimus, quod sponte in maritimis nascatur, unde ad Belgas delatum, in hortiscoli cepit: alui etiã majus aliquot annis Viennæ, semine ex Belgicâ misso natum. Minus ob coloris in flore mutationem, nonnulli, eũm Mompellij viverem, Tripoliũ vocare solebant: tametsi ipsi locis natum Tripoliũ legitimũ observare potuissent.

Tripernanth.

Utrumque calido gustu est: sed minus suã acrimoniã vehementius linguam vellicat.

*Leucoiũ ma-
rinũ Gre-
cum.*

IOSEPHVS porrò Casabonus ex peregrinatione Cretica redux, semen ad nos mittebat Leucoij marini appellatione, è quo tres diversæ plantæ ortæ.

EARVM Maxima & Prima, caules habuit procumbentes, rotundos, duriusculos, multis ramis donatos, in quibus strobili quatuor folijs constantes, initio rubenes, deinde ex cæruleo purpureascentes, extremo bifidis, & cordis, ut vulgo pingitur, effigiem propemodum referentibus, quasi ex umbellâ, Inonis vulgaris instar, sensim prodeuntes, qui (ubi floris folia conjungebantur, radiantem imitabantur flavam stellam: floribus succederunt duarum ferè unciarum

unciarum filiquæ sive cornicula teretia, in quibus semen oblongiusculum castanei coloris. Ipſius verò plantæ folia longiuscula fuerunt, à Thlaſpi folijs non valde differentia, nullis (in caule præſertim) evidentibus crenis donata, craſſiuscula, & aliquantulum amara.

ALTERA priori ſimilis erat, niſi ſtoſculos habuiſſet dimidio minores, & initio prorfus albos, deinde tamen paulatim purpureum quidpiam contrahentes, ſed nihilominus magis ad albedinem inclinantes. Floruit utraque Iulio, medio Vere, hoc eſt Aprili, ſata.

TERTIA promebat initio præcedentibus duabus longiora folia, evidentibus & cõſpicuis crenis ſecundùm otas donata, Leucoij Dioſcoridis Lobeliani inſtar, è quorum medio exiit canaliculus reſectus palmari altitudine minor, quum florere incipit, nempe Auguſto: à latere verò plures fundebat ramulos, in quibus flores, ſecundo generi amplitudine pares, colore tamen differentes. nam propius accedebant ad Leucoij marini Lobeliani latifolij colorem, magiſque purpureſcentes erant, quàm in primo genere.

LEUCOIVM SILVESTRE.

CAP. VII.

Leucoium spinofum Creticum.



MULTA ſecundùm radicem habet folia, Leucoij, quod luteo eſt flore, folijs ſimilia, anguſtiora tamen, viridia, amaricantis guſtus, inter quæ unicuique interdum plures aſurgunt caules, pedales aut ampliores, ſtriati, carinatis folijs obſiti, multos ſuſtinentes flores quatuor folijs conſtantes, flavos, Leucoij lutei ſtotum æmulos, ſed minores, miniſq; odoratos: Floribus ſuccedunt oblonga cornicula ut in ſarivo, plano ſemine plena: radix longa eſt, candidans & multis tenuibus fibris prædita. An ſemine ad maturitatem perducto pereat, obſervare non potui: nam natali loco florentem, ſuaq; cornicula nondum matura ferentem hanc plantam obſervabam: Biennalem tamen eſſe puto, quia in nullis ſtirpibus, caulis præcedentis anni ulla veſtigia conſpicebam.

Invenitur in montibus illis ſupra Badenſes thermas, & in Leytenberg, ſalebriſis præſertim & meridiei obverſis locis. Floret Maio.

COMMON Leucoium ſilveſtre appellari poſſe cenſeo: Rhizotomæ etiam mulierculæ *Nemina* *Wido githrepi* vocant. Sativum autem Leucoium luteum, Vngari *Sarga viola* nuncupant, hoc eſt, luteam violam.

Quo nomine appellem hanc plantam dubius ſum. Nata autem eſt etiam Jacobo Plateau, ſemine peregrè accepto. Illam certè naſcentem non vidi, ſed iconem ipſius manu delineatam ad me mittebat cum brevi deſcriptione idem Plateau. Eam videlicet creſcere, ad cubitalem aut majorem altitudinem, & in multos ramos duros & lignoſos ſpargi, quos cinerent folia conſertim naſcentia, incani & cineracei coloris, per oras nonnihil dentata: & ſparſim

Leucoi spin.
ſ. hultera.

Hippophastium sparsim in ramis multos flores nasci flavos, quinque folijs constantes: eos autem ramulos initio satis tenellos esse, paulò post tamen, duros & spinulos evadere. Quale sem-en ejus esse, non ascribebat, sed dumtaxat sciscitabatur an Hippophastium Dioscoridis esse posset. Sed cum Dioscorides suum Hippophastium, humilem herbam esse asserat, sine caule, sine flore, iuanibus tantum capitulis, folijsque spinosis, radículas habere molles & crassas, è quibus, folijs etiam & capitulo, succus exprimeretur, & in usum adlervetur, non video quàm ratione hæc planta ejus descriptioni accommodari queat.

QUONIAM portò folia, Leucioij marini folijs non valde dissimilia habuisse videbatur, Leucioij spinosi appellationem obtinere posse arbitror, donec aliud magis aptum, & ipsi plantæ conveniens repetat, tamen si flores ejus pluribus folijs quàm Leucioiorum flores præditi sunt.

PRIMULA VERIS.

CAP. VIII.

Primula veris vulgaris montana loca abita.

TAM ET SI in Austria, Sciria, Pannoniaque ptatis, & herbosis montanisq; locis, atque silvis nascantur aliquot, ejus plantæ (quæ vulgo Herbariorum in *Primula veris* & *Herba paralytica* vocatur) genera, qualia sunt elatior utraque flore luteo & pallido, atque humilis pallido flore, illæque simplici foliorum texturâ: peculiare tamen quoddam genus aliud nonnulla præta uliginosa, binis, ternis & quatuor miliaribus à Viennensi urbe distantia, quod ob florum elegantiam & venustatem hoc capite describemus.

Primula veris rubro flore.

Primula veris albo flore.



Primula veris rub. flore.

GERMINAT autem ineunte vere folijs denis aut duodenis, initio quasi in globum contractis, quæ successe temporis sese explicant, & humi sparguntur, suntque exteriore parte incana & veluti farinâ quadam aspersa, internâ verò ex viridi pallentia, aliquantulum crispâ & densiuscula. Herba paralytica vulgaris ferè similia, sed minora, angustiora, & minus rugosa, acris saporis: ex horum medio unus aut plures assurgunt cauliculi dodrantes, interdum pedales, nudi, graciles, summo fastigio incani, qui sustinent ex uno veluti capite, & in umbella nascentes flores, octonos, denos, aut plures, *Primula veris* floribus forma similes, quinque bifidis folijs constantes, magnâque ex parte eleganti diluoreque purâ nitentes, aut carnei coloris, interdum saturatius rubentes, nonnumquam (sed rarò) omnino candidos, & etiam exalbidos, omnes autem citra umbilicum luteolos & aliquidulum odoratos: semen deinde in oblongis vasculis admodum exile, fulvescens còtinetur. Illud autem in hoc flore observabâ, ut qui intensius rubet, stilum prominente in sive pistillum habeat, quæ modum non-

Primula veris alb. flore.

dum nonnullarum Primularum flores: qui verò dilatiores sunt ruboris, nullum. Radices sunt candicantes, fibrosæ, ad quarum caput aliæ novæ plantulæ secundum matrem subinde germinant.

Primula veris flavo flore clatior.



Primula veris pallido flore clatior.



Sponte magnâ copiâ provenit in uliginosis & vicinis, ut ante retuli, Viennæsi urbi pratis, *Natalis.* ad Humberg, Walterstorf, Ehrestorf, Magⁱ V. Hieronymi Beck à Leopoldstorf, arcem, Botenstorf, & supra Badenfes thermas versus Neapolim Austriæ. Floret verò sub finem Aprilis, & toto ferè Maio. Habui ex ijs quas in hortum transtuleram, plantam, quæ ex media florum umbella, cauliculus uncialem & ampliorem, aliam umbellam elegantissimis floribus onustam sustententem produceret.

Hanc etiam siccam ad me misit C. V. Ioach. Camerarius è Saltzburgenfi agro erutam, ubi, quemadmodum & in Tyrolensi comitatu, abundanter nasci scribebat.

Anno verò M. D. XXXI. dum Londini essem, de C. V. Thoma Pennæ Medico intelligebam copiosè admodum nasci in Angliæ Septentrionalibus pratis humidis & pascuis, quæ adeò causa fuit, ut Doctissimus & humanissimus vir Richardus Garth Cancellarius Londinensis Primicerius, in meam gratiam ex Hexatcharu Derby, & Wybsey nò procul Halyfure *vicinis An. 1740.* urbe, aliquot ejus plantas suis floribus adhuc onustas ante meum Londinio discessum adferri curaret, quibus etiam adjunctæ fuerûnt, aliquot Pinguiculæ (de quâ postea) stirpes, cum Trollio flore: quas Antuerpiam ad amicos misi.

Quantum ex gustu deprehendere licet, ijs silem facultatibus esse præditam apparet, quibus aliæ Primulæ veris pollent.

Eandem omnino esse puto, quam Iosias Simlerus cōmentario de Alpibus, ex C. V. Conrad Giesneri collectaneis describit in hunc modum. *Receptum.* herba pusilla, albicans, Bellidis *Receptum.* minimæ forma, in summo plurimos confertos flores purpureos habet, tota herba candicat, & attrita manu pulverem exiit, aspectu elegans. Cæsar inter herbas, aut Regulus.

A rusticis mulierculis quæ flores ejus manipulatim colligatos Viennam in forum deferere *Nomina.* bant, ijsque vendebant, quæ ferta & corollas nectere solent, *Receptum.* nuncupabatur, eo quoddam Maio mense, circa id tempus quod vulgari germanicâ lingua *Receptum.* (ex sunt Rogationes) dicitur, plerumque floreat. Postea *Receptum.* non rotasisset humani nominari cœpit à rhizotomis mulierculis, quæ illius stirpes radicatas in foro venales proponere inceperunt, eam animadverterant Viennenses matronas elegantibus floribus delectari. A rusticis Angliis, apud quos nascitur, *Birdiein*, hoc est, avium oculi nuncupatur, teste Pennæ: verum eodem etiam nomine apud illos insignitur Cardamine illa pratensis floribus albis, quam Doctissimus Fuchsius Iberidem esse censebat.

Primula veris pallido flore humilis.

*Monita Primula veris
in garr.*



Auricula urli.



*Auricula
urli.*

VARIA autem apud rei Herbariz studiofos obtinuit nomina *Primula veris* vulgò dicta Belgis. Nam sunt qui *φλογιδης* Dioscoridis esse putant, Fuchsius verbalcula vertit. Alij Dodecatheon herbam, quâ Plinius Nat. Hist. lib. xxv. cap. rtti. describit folijs septenis, laetucis simillimis, è radice lutea exeuntibus. Vulgus Herbam paralyſim, Clavem S. Petri, Itali Lactucam ſilveſtrem, Germani bimelſchluſt ſit / & Schluſſelblumen. Angli Primuſen & Come ſeype. Vngari humilem & *καυλος* maximâ copiâ ubique in ſilvis cædis apud eos naſcentem, *Kacha verag* hoc eſt, pulvis ex panico aut milio confectæ (quam illi *Kacha* vocant) floctem, quia pulvis illius quæ pallida eſt, colorem imitatur. Hanc ego, cum in Angliâ eſſem, ubi etiam in cædis ſilvis abundè provenit, lactei candoris flore conſpicebam, & aliquot ſurpes amicis in Belgicâ inde mittebam. Sed & ab Anglis primû accepertunt Belgæ tam humilem quam elatiorem, quæ florem habent multiplici foliorum ſerie conſtantem, & omnes ferè reliquas cotonarinas plantas, quatum flores *ωδωρδωδω*.

Primulam autè *Veris* vulgò vocatam, *Nobilis* idemquæ *Cl. V. Fab. Columna* in ſuo *quæſtione* *Alſimatis* alterum genus apud Plinium eſſe cenſet: quemadmodum & cap. ſequente deſcripſit *Auriculas* ad *Alisma* ſive *Damaſonium* Dioscoridis teſtè: cujus ſententiæ valde acquieſco.

AVRICULA VRSL. CAP. IX.

NON dubium eſt, quin ad *Primularum* claſſem referenda ſit venuſta hæc planta, adeo ſimiles ſunt & forma & temperamento.

Ejus verò multa genera obſervabam in alpinis Aultrix & Sinæ jugis, quæ, certâ quadam ſerie, hoc capite deſcribemus, à vulgariore quidem, ſed omnium odoratiſſimâ initium facientes.

ILLIUS folia, *Primulæ veris* folijs ſerè reſpondent, rugoſa tamen non ſunt, ſed craſſa, fabariz foliorum inſtar, eoque aut farinæ quali polline conſperſa & proſus incana, aut leviter tantum caneſcentia, interdum omnino vitidia & lævia, rurius omnia vel per amburum ſerrata, vel nullis denticulis prædita, interdum novella dūtaxat denteata, vetuſta minimè, omnia autem guſtu amara. Ex horum medio, aut è lateribus prædeunt cauliculi dodran-ales, aut minores, nudi, veluti quadam farinâ teſperſi, qui denos, vicenos, tricenſque, interdum etiam plures (preſertim ſi in hortis colatur, ubi admodum luxuriat) flores ſuſtinent, ex uno veluti capite æqualiter prodeuntes, & petiolis (quos tamquam ſquamulæ quædam incanz ab invicem ſegregant) brevibusquæ caliculis inhzrentes, *Primulæ veris* ſimiles, quinis aut

ſenis diviſuris conſtantes, dulcem & mellicum quandam odorem ſpirantes, coloris aut lutei, aut pallentis, atque vel majores & ampliores, vel minores, omnes autem interius circa umbilicem albo circulo inſignitos, ſtilo inter ſtamina nonnumquam prominente, interdum nullo

dum nullo: semen deinde fuscum, inæquale, bullatis vasculis inclusum, quale Primularum veris: radix crassa est, & multis candidis oblongisque fibris prædita, ex qua, in cultis si pangar, plures plantæ enasci solent.

Crescit in Sneberg, Neuberg, Erschet, & alijs vicinis Austriæ & Stiriz alpihus, montæque Gleyenfeld imminenti: deinde multo lætior em & vegetiorem abundanter invenimus in scopulo, Medeling oppido (quod duobus aut paulo amplius militatibus ab urbe Viennâ distat) imminenti, quâ Septentrionem spectat, unde rhizotomæ mulierculæ cum florum marcupulos, tum ipsas stirpes, quas sciunt à plerisque expeti, adferant.

Auriculari urfi it.



ALTERIVS folia breviora sunt, extremâ parte latoria plerumque, & initio quasi rotunda, quæ temporis successu angustiora circa radicem fiut, crassa quidem illa, sed minus quàm superioris, in ambitu serrata, superne viridia & lævia, inferne ex viridi pallescentia: inter quæ vel ad quorum latus exeunt nudi, duas uncias longi, aut paulò amphiores cauliculi, quibus infidet (seni, octoni, aut plures flores, simul in caput aut umbellam congesti ut in superiore, illisque formâ similes, sed majores, rubro colore nitentes, obscuriore tamen initio, quasi motorum succo infecti essent, deinde eleganti & dilucidâ tubâque purpura gratissimi, intus circa umbilicum pallentes & exalbidi, odorari quidem illi, sed minus superioribus: semen in capirulis longè minoribus parvum, nigrum, inæquale: radix priori similis.

Hanc frustra per Austriacorum Stiriacorumque montium altissima juga quævisi: primum autem mihi conspecta est in cultissimo horto C. V. Ioan. Aicholzij Medici & Professoris Viennensis, mei amici veteris, & hospitis, dum illic vixi, charissimi, quam à nobili quadâ matronâ ante acceperat, ignari tamen unde illi primum communicata fuisset. In Oenipontinis autem & vicinis alpihus abundè nasci postea intelligebam.

TERTIUS generis folia, quàm superioris minorâ, teneriorâ, minus crassa, subirsuta, per ambitum undique serrata, inter quæ nascitur cauliculus superiori similis, flores in umbella

pariter ferens, & rubros, exalbidis tamen maculis asperfos, cujus radix similiter fibrosa, novâque è lateribus propagines fundens.

In Tyrolensibus jugis, præsertim in Kitzspil inveniri intelligo. Sed eam primum mihi ostendebat cum multis alijs raris stirpibus quas in exculco suo horto alebat C. V. Ioach. Camerarius in clytæ Reip. Noribergensis primarius medicus, floris expertem, quam tamè eodem cum alijs tempore florere mihi dicebat. Anno autem M. D. XXXI. ex Anglia Viennam revertenti paucas adnatæ plantulas communicabat, sed quæ in itinere tabescentes deinde perierunt.

QUARTA, minoribus est quàm Secunda folijs, carnosis, mucronatis, in ambitu non serratis, superne lævibus & splendens, inferne ex viridi pallentibus & venosis, minotæque acrimoniâ & amaritudine præditis quàm aliarum folia: flores illi secundo generi similes, profundioribus lacinijs secti, colore dilutius rubente, intus circa umbilicum incana quadam lanugine villosi, stilo prominente, bini, terni, aut ad summum quaterni, fummo vicalis, tarò longioris cauliculi fastigio nascentes: semen in parvis vasculis reliquis maius & fuscum: radix minor & nigricans, atque adeo numerosa lobole interdum se propagans, ut latissimos cespites occupet.

Invenitur in Sneberg, reliquisque vicinis jugis & Stiriz alpihus frequentissima. Paulò ante meum Viennâ discessum rhizotomæ mulierculæ singulis annis in forum Viennense venalem inferre conerunt.

TYROLENSI non valde absumilis erat Quinta, quam in cultissimo horto Ill^{mi} Principis Cattorum Wilhelmi Cassellis florentem conspicebam anno M. D. XIC. ejus enim folia circinatæ ferè rotunditatis, longiuscula tamen & in ambitu serrata, longè minorâ secundæ folijs, & minus viridia, sed aliquantulum canescentia: inter quæ tenuis & sexunciam longus



Auricula ursi vi.

Auric. V.
1117.Auric. V.
1117.

1117.

1117.



cauliculus exiliebat, binos, ternos aut plures flores sustinens superiore minores, quinque bifidis folijs etiam cōstantes, medijs inter 11. & 1117. coloris: semen nō observabam, nam Aprilī dumtaxat florentem videbam: radix fibrosa est, ut reliquarum.

MINOR etiam est Secundo genere, Sexta Auricula, cujus unicam plantam conspiciēbā in exculto horto ornatis. viri Ph. Steph. Sprenger anno M. D. XCI. Maio mense quaterna aut quina ferentem folia, crassiuscula, dilutē virentia, nullis crenis in ambitu donata, inter quæ prodire aiebat (nā caule & flore orbata erat) caulem ē vindi candicārem, tres uncias aut amplius longum, summo fastigio ferentem quinos aut plures flores, flavæ formæ æquales, sed candidos: radix superioribus respondēs, aliquot fibris, ut illæ, donata erat. Ejus iconem quam hic subjecimus, postea ad me mittebat.

SEPTIMA crassiusculā radice nititur, Quartæ haud dissimili, multis cādicantibus fibris capillatā: ex qua angusta folia quina aut sena, succulenta, & pingua, Quartæ folijs multo angustiora, à medio ad extremum usque mucronem in ambitu serrata, amaræque gustus prodeunt: cauliculus inter ea nascitur tres uncias longus, nudus, lavis, sustinens capitulum ē foliolis compactum, undē quaterni aut quini flores elegantissimi, dilutius rubentes, quinque folijs bifidis ut reliqui con-

qui constantes neque hujus semen observare licuit, capitula tamen quartæ proxima in illa conspiciebant, semen etiam simile habere verisimile est.

Crescit hæc in quibusdam alpinis Carinthiæ & Stiria superioris, præsertim verò Taurò monte, & Iudenberg jugis. Floret sub finem Julij, hoc est, in nivibus illis jugis hinc quiescentibus. Rara hæc, quia ex procul distans montibus delata, in unius Aichholtzj orto paucos annos perduravit, omnem cultum ita respiciens, ut nunquam ad frugem pervenire, imò ne florem quidem deinceps proferre voluerit.

Auricula urši VIII. minima.



OCTAVA folia unguem magnitudinis æquant, infernè circa sedem angustiora, supernè & in extremo latiora tenatæque, viridia, nervosa, superioribus minus densa, amari gustus: pedicellus inter folia extulit vix digitum transversum altus, unicum, interdum alterum florem ferens dilutius rubentis, sive carnei coloris, è fimbriato caliculo obtusiflore prodeuntem, inodorum, intus etiam circa umbilicum candidè lanugine pubescentem, nullo prominente stilo: neque hujus semen observare licuit, cum non quovis tempore jurgū in quo nascitur propter difficultates conscendere poterim, nec in hortum cum suo cespice translata ad frugem unquam pervenerit, reliquarum tamen semini respondere arboris: ad ovis mirum in

Auric. Pr.
VIII.

pr.
VIII.

modum se propagat, & interdum magnos cespites occupat, candicantes fibras è singulis propaginibus demittens.

In summo Sneberg jugo primus istam observabam anno M. D. LXXVIII. neque ullo alio vicino jugo postea mihi sese obrulit. In Taurò tamen & Iudenberg etiam invenitur, & cum illa rarum aliud genus per omnia quidem simile, sed cujus folia magis pallefcunt, flores laetè sunt candoris.

Natalis.
Varietas.

Florent omnes natali loco, Junio, interdum Julio & Augusto duntaxat, videlicet statim post solutas in ijs jugis, ubi crescunt, nives, nonnèquam etiam sub ipsa quasi nive, & conca-meratà nivis indurata crustà, reliquæ, quæ subrus erat, Solis radiorum rupes ferientium repercussione soluti. In hortos verò translatae Aprili florent, & aliquando iterum Autumno, si aura sit temperatio, illis exceptis quæ vel contabuerunt, vel nullà, ut dixi, diligentia aut cultura ad florem ferendum induci poterunt.

Tempus.

OMNIA ista genera præter tertium, quintum, sextum & septimum, primus omnium Belgicè communicabam, missis Viennà, ad Ill. V. Joannem de Brancion, fratris loco mihi quæ chianissimum, & post ejus obitum ad Magnific. V. Joannem vander Dillst. ejus agnatum, complurè quæ alios amicos, eorum plantis, primullà veris rubro flore, & rarissimis alijs alpinis stirpibus. Prior autem quæ flavo est flore, jam antea Belgicè inquilina facta fuerat liberaritatè C. V. Alphonfi Pantij.

Iosias Simlerus commentariis de Alpinis, aliquot ejus genera recenset, ex Gesneri collectione, ut ipse refert, desumpta: nempe quæ haberet florem, aut luteum, aut pallidum, aut purpurascens, vel rubescens sanguinis modo, vel cinereum, & atrum: quos postremos duos colores nunquam mihi conspectos esse in simili planta, ingenue fateor, nisi per cinereum intelligat quædam genus, cujus flos marcescens, præsertim pluvia corruptus, veluti cineraceum colorem contrahit, & per atrum, secundi generis florem primum sese explicantem, quem initio obscuriore, saturum, & veluti mororum succo infectum esse dixi.

Quo nomine veteribus dicta sit hæc planta, me fugit, nisi sit (ut Fabius Columna, quem admodum diximus, censet) Dioscoridis Alisma. Recentiores autem varia illi indiderunt nomina. Matthiolus enim inter Saniculæ genera recenset, & Herbarij Auriculam urši vocari tradit. Gesnerus libello de Lunarijs herbis Lunariam arthriticā appellare maluit. Alij Paralyticam alpinam nuncuparunt: magis tamen vulgare apud rei Herbariæ studiosos nomen est Auricula urši. Helvetijs sub nomine hoc est rupium flosculus dicitur. Auliacarū Stiriacrum quæ alpinis incolis, prior Crastum vob Styrinbellum ab effectu dicitur (commendant enim ejus radicis usum, ad roborandū caput, ne vertigine in præcipitijs tentetur, cujus rei causā, caprearum & ibicū venatoribus non minus familiaris quam Doronici radix) Medlingenses, apud quos copiosè nasci dixi, molinierum Obeliscus Numen/id est, odoratam primulam appellat: secunda & tertia vob Obeliscus Numen ab incolis vocatur: quarta Styrinbellum hoc est, petra rosula ob venustatem & roseum colorem, tum quod in scopulis nascatur, à montanis pastionibus nuncupatur: septima apud Stiria superioris incolas montanos Obeliscus nomen invenit, quasi dicas equinam nardum, ad differentiam Nardi sive spicæ Celticæ, quæ abundanter in eodem Iudenberg jugo nascitur, ut in ejus historiā dicemus.

Nomina.

GESNARIUS lib. de Lunarijs herbis, prioris radicem, vinum suo odore commendare scribit, manducaram verò, dentium dolores, præsertim à frigida defluxione obortos juvare, capiti

Familias.

frigido & partibus nervosis prodesse, putrida ulcera emédare, scissuras in cute hiantes, ventorum, frigoris aut alia quapiam iniuriâ, succum ejus instillatum brevissime sanare.

Matthioli ad enterocelas & thoracis vulnera, si quotidie in poru sumatur, utilem esse, quin & alia vulnera tam intus sumptam, quam exterius ilitam.

Istic ubi nascitur, soli, ut dixi, montani venatores ejus radice utuntur: à reliquis negligunt, præterquam à mulierculis, quæ ex ejus floribus feta & corollas conficiunt. Deinde cum nobiles, tum aliz Viennenses matronæ quæ coronarijs stirpibus delectantur, in suos hortos cum quarto genere inferre ceperunt.


SANICULA MONTANA.

CAP. X.

TEMPERAMENTI, facultatum, aliarumque quarundam ratione, proximum ab Auriculari locum, quantum quidem mihi videtur, obtinere debet elegans hæc planta.

Sanicula montana.

Sanicula
montana.



MULTA folia promit, novo vere, satis crasso pediculo nitentia, ad eò sese per oras initio contrahentia, pronâ parte, ut orbiculata videantur, admodum nervosa & rugosa, supinâ verò parte tumetia, crispæque ut Lusitanici ranunculi, aut Lacuæ capitatæ folia, deinde ubi sese explicarunt, in ambitu non modò serrata, sed etiam in text aut plures laciniâs divisa, omnino virentia, superne quodammodo splendens, inferne nequaquam, fervido gustu: inter quæ palmaris exit cauliculus, firmus, erectus, nudus & sine folijs, subpurpureus, qui in summo Primularum & Auricularum instar è medio quorundam foliorum capite, octo, novè, aut plures producit strobilos còcavos, còpamulæ modo peniles, & deorsum spectantes, quinque crenis divisos, elegantissimo rubro colore saturi, & ad purpuram tédente, fundo interiore albo, in quinque angulos desinente. prodeuntibus ex imo quinque staminibus luteis albi fundum non superantibus, & mediù oblongum stilum complectentibus, suavis odoris, ut ferè Auriculæ: utriusque sive secundæ flores: quibus desuventibus, succedunt surrecta capitula, tenue, fuscum, ut illa, semen còtincta: radix numerosis, lógis, tenuibus, & nigricantibus fibris ex uno capite prodeuntibus constat, singulis annis ad latera augescens, &

incrementum sumens, ut temporis successu veluti Auriculæ & Primulæ aliarque similes, in plures stirpes dividi & pangi possint. Tota planta hirsutior lanugine pubescit.

Matthioli.

Promiscuè nascitur cum proximo capite describenda, & interdum, cum adhuc tenella est, altera pro altera eruitur: eodem etiam tempore cum illa flores, licet in hortis hæc paulo maturius, videlicet Maij initio.

ILLAM esse omnino existimabam, quam C. V. Matthioli ab amplissimo Cortusio acceptam Caryophyllatis subiecit, & Cortusiam nùcupavit: verum cum neque facie, neque temperamento ullam affinitatem cum ijs habere videatur, commodius meo iudicio Auricularis, ut dixi, coniungeretur, quibus non dissimiles habet facultates. Eam autem florum varietatem, quam ipse in Cortusâ inveniri scribit, in hac nostra non deprehendi. Sed illud observabam, peculiare quoddam exiguæ erucæ virentis atque tumidæ genus in ipsa gigni uberrimè.

CETERVM ANHOM. D. XXX. Amplis. Vit. Sac. Ant. Cortusius binas Cortusæ succas stirpes ad me misit, quibus hæc erant adscriptæ.

Cortusis.

Diligenter contulimus Cortusæ stirpem cum Saniculâ, quam in Pannonicis observationibus describis, & Cortusam esse censet: sed illam nihil commune cum Cortusâ habere deprehendimus, tantum abest ut sic illa ipsa: Cortusæ binas plantas mixto cum suis folijs, floribus & radicibus, atque addo, Cortusam grato suavique odore præditam instar favi mellis aut odoratæ alterius rei cuiuspiam, imò subtilem quandam odorem spirat, qui odorantis cerebrum permeat atque reficit: teneriora item folia recens vultu & in ore recentia, sensim calorem excitant, tamquam manducato pyrethro, qui tamen subito evanescit, nullamque no-



Sanicula montana 17.

que noxam adfert: tectentia integræque, non trita, mulierum aut delicatiorum malis imposita, & paulo post adæpra, gratum tubotem sine noxâ inducunt, tamquâ nobilissimo aliquo fūco infectæ fuissent, quo evanescente, nullum vestigiū aut macula relinquitur, præterea non splendent, neque aversa parte punctis instar polypodij distincta: flores non propendent, sed omnes, vel eorum maxima pars, surrecti sunt, cœlumque spectant, non minus etiam odorati quàm folia, imò majore suavitæ præditi, præsertim dum sunt tectentes: radices candidæ sunt, non nigricantes, Hæcenus Cortusæ.

Quantum porro ex siccis quas misit plantis coniecere licet, in eâ hæreo opinione, Cortusam, cum Sanicula alpina modò descripta (nisi eadem sit) magnam affinitatem habere: nam folia, flores, radices, ipsum etiam tēptamentum conveniunt, an verò ea præstare possit quæ Cortusæ attribuantur, nullum feci periculum. Fateor quidem Saniculæ iconem non mihi satisfacere, pictorēmq; nimium sibi indulxisse, dum rugas & hirsutiorem illam lanuginem exprimere voluit, quæ res Cortusum fefellit, dum folia aversa parte punctis distincta putat: nam si ulla habuissent, in ejus stirpis historiâ non subiciuissem.

SANICULA MONTANA ALTERA.

CAP. XL.

NATALIVM communio facit, ut hanc elegantem plantam Saniculæ jam descriptæ subiciam, tametis temperamento & facie differant.

MULTA habet illa folia, circinata særè rotunditatis, Saxifragæ aureæ foliorum æmula, longis pediculis inharrentia, per ambitum incisa, supernè vinda, infetnè aliquantulum exalbida, & valde hirsuta, adstringentis gustus: caules deinde promit pedales, aut interdum ampliores, virides, hirsutos, & in his folia superioribus respondentia: summi caules in plutes alas dividuntur, & singulis tamis insident terni aut quaterni flusculi, spinæ appendicis Plinij, quæ à plevisque Oxyacantha censetur, florum odorem referentes, quinque foliolis albiseçitantes, quæ veluti sanguineis punctis intenote parte notata sunt: bisda vascula cū decem staminibus medium florem occupant, Saxifragæ albæ vulgo appellatæ capitulis valde similia, quæ matura, exilis & minutum admodum, nigrumque semen continent: radix quodammodo squamata superne, & crassiuscula, multis candicantibus fibris prædita est, & à lateribus propagines agit.

Crescit in omnibus Austriæ & Stirię alpinis umbrato loco, hoc est, ubi plerumquæ silvæ in alium jugis desinere incipiunt, cū Ranunculo platyphyllo, Geranio pullo florid, & similibus stirpibus, quæ umbrâ quàm Sole magis gaudent. Floret. Junio, interdum Tempus.



etiam serius: in hortos verò translata, multo maturius.

SMILE

*Sanic. mont.
alerau p.
v. 11.*

SIMILE ferè genus invenitur in Snealben, vicinisque alpinis, sed minus, angustiore folio, & per extremum serrato, huiusmodi etiam & adstringentis gustus, coloris ex herbaceo pallidioris: è medio foliorum prodeunt cauliculi triunciales, nudi, qui circa summum fastigium in plures ramulos dividuntur, candidis flosculis superiori similibus onustis, verum nullis sanguineis guttis, ut illi, asperlos: bisida succedunt capitula ut in superiore, exiguum nigricans semen continentia. Floret etiam Iunio, in hortis autem Maio, aut maturius.

Montan.

MIN: Prior aliquando missa fuit Ferrariâ Machliniæ à C. V. Alphonso Pantio, Sanicula guttata nomine, quia ejus flores, ut dixi, sanguineis veluti maculis aspersi sunt. Dubito an ea sit quam Lobelius in Adversarijs Geum alpinum vocat: quem alius quispian sequutus est, deinde pro Cotyledone tertia exhibuit. Montani pastores & venatores *Sanicula* appellant, apud quos nullum, quod sciam vulgare nomen Altera obtrahit: sed cum plerisque alijs negligitur.

*Sanic. vulg.
Eileb. nig.
D. d. Doka.
v. 11.
Aulumbia.
Sanicula
alba.*

ABUNDANT etiam Pannoniæ utriusque & vicinarum Provinciarum prata, umbrosæ silvæ & montes, Sanicula vulgari, Diapensia vulgo appellata, Sanicula femina Fochsij, sive Eileboro nigro Dioscoridis asertore Dodonæo (utramque Vngari *Sanicor* vocant) Alchimilla, & congeneribus plantis: ad montium autem radices, locisque alijs humidis & umbrosis Saxifraga aurea cognominata: aperti verò gramine consiti colles, Saxifragam albam ruberosâ radice alunt, cui, quas modo descripsi, congeneres videntur. Saniculam porro vulgarem Fab. Columna Sideritidem tertiâ esse censet.

SOLDANELLA ALPINA.

CAP. XII.

FLORIS venustas facit, ut Saniculis hanc elegantissimam plantam, & aliquot alias non contempnentem venustatis subjungam.

Soldanella alpina major.

*Soldanella
alpina.*



Natalis.

*Veneris.
Tempus.*

HABET verò sena aut octoâ folia, crassa, in orbem ferè circumata, Bradiæ marinæ, quam vulgo Soldanellam vocant, æmula, sed duriora, superne viridia, inferne dilutiore viriditate splendens, gustu primum exsiccante, deinde acri & ingrato: flores gerit in lævi, nudo, gracili, subrubro, palmarique cauliculo, binos, ternos, aut plures, purpure vel saturæ, vel dilutæ colore, inodoros, campanulæ modo efformatos, deorsum spectantes, & propendentes, unico folio in quinque profundas crenas, (quæ aliquantulum latiniatæ sunt) & totidem alias singulares diviso, constantes è medio protuberante veluti quodam umbone in longum stilum desinente, qui in vasculum, vel corniculatum potius evadit, oblongum, durum, membranaceum, mucronatum, parvum, durum, virens, simul congestum semen continens: radices fibrosæ, candicantes, ex uno veluti capite dependent, quod adnatis se propagat.

Copiosè nascitur in Austria & Stiria alpinis perpetuâ nive obstitis: nusquam verò letiorem, aut uberiorem conspiciebam, quam in jugo Wechsel nuncupato, supra Alchpang Magnifici vini Erasmiâ Khunigperg p. m. liberi Baronis: ubi anno M. D. LXXVI. unicam plantam lætè proflus candoris flore inveniebam. Floret istuc Iunio, interdum Iulio, & Augusto, nivium maturius aut ferius liquefactum ratione. In hortos autem translata, etiam Aprilis vel cum Primulâ veris rubet: si difficile autem cicutari potest.

2. Est & aliud genus minore folio, neque circa pediculum, qui brevior graciliorque est, adeo circumata, sed sensim ab ipso in latitudinem excrecente.

3. Inveniebam etiam anno M. D. LXXVIII. in ascensu montis Herrenalben (unde postea iter est ad cellissimum jugum & scopulum Dornstein, duobus supra Garingam miliaribus), umbrosis locis, quodâ genus amplius folijs, sed tenellis admodum, quæ inferiore parte non virebant, verum non minus rubescebant quam Cyclaminodoro flore folia.

SOLDANEL.

Soldanella alpina minor.



Viola montana L.



SOLDANELLA nomen inditum, quod ejus folia Soldanellæ marinæ folijs sunt admodum similia: lunariam minorem cæruleam appellant nonnulli: vulgare nullum nomen ediscere potui ab alpinis pastotibus & venatoribus.

Sed neque ullas ipsius facultates notas habent. Nosset verò Lobelius, Empiricum quandam folijs usum ad aquas in ascite educcendas, vulneribusque cicatricem obducendam, asserit.

VIOLÆ MONTANÆ.
CAP. XIII.

DVO Violæ rara, nec antea mihi conspecta genera in Aultriaci & Stiriaci alpinibus inveniēbā, quæ propter vecoustatem studiosi rei herbariæ nota facere non dubitavi.

FOLIA habet Prior nigræ violæ ferè similia, minora tamen, breviora & è viridi colore pallescentia, calido gustu: angulosos cauliculos, in quibus bini aut terni flores, ex alarum sinu prodeuntes, viola minores, flavi, inodori, quinque folijs constantes, quorum in finem majusculum est, & quinque radiois sive nervis nigris interiore parte distinctis, reliqua verò, exteriore parte: semen in triangulari capitulis, quæ maturitate dehiscunt, exiguum, nigricans, a his violis simile, præsertim tricolor: radix alba, crassiuscula, multas propagines è lateribus procreat, candidisque & longis fibris hirsuta est.

Abundanter nascitur in omnibus Aultriæ & Stiriaci alpinibus: lunio atque Iulio florens, in cultis autem April. In Borealis etiam Angliæ montibus inveniri intellegebam.

Exit Altera in summi Sneberg jugi vertice, perquam exiguis folijs, & quali circinate rotunditatis, in ambitu leviter serratis, crassiusculis, longiusculo pediculo in hæretibus: cauliculus assurgit è medio foliorū, duas uncias longus, unicum florem sustinens purpureum, vulgari similem, sed lōgè majorem & inodorum: cui succedit triangulari siliqua: radix nonnihil serpit, & aliquot fibris donata est. Floret sub finem Junij.

Hanc nonnulli Melanium montanum appellare videntur.

FREQVENS in earundem Provinciarum nemoribus occurrat elatior illa Viola matia, firmioribus & erectis cauliculis, quam cur Matthiolus arborecentem cognominavit, nullam causam video.

NEC prætermittendum elegans Violæ genus, quod à Doctissimo Viro Gulielmo de Mera Medico in itinere observatum, dum ex Italia rediret, & mihi Francofurti communicatum M.D.XCIII. sed desiccatum, & (quod doleo) nullum retinens florem.

PROMESBAT autè à radice crassiusculā, digitum longā, & frequentibus fibris donatā quina aut sena folia longis pediculis innixa, non orbiculata, aut hederæ foliorum formā refertentia, ut alia Violarum genera, sed multipliciter incisa, & ad Ranunculi, sive Anemones latifoliz tenuiora folia, verius accedentia, erant enim in octonas aut plures profundas lacinias divisa, quæ an lanugine pubescant, nec ne, in sicca placet observare non licuit: sed inter folia enati erant pediculi, qui florem sustinuerant, trigona capita, instar eorum quæ in vulgari violā conspiciuntur, sed inania, adhuc retioeotes.

CETERVM

Viola montana III. sive tricolor.

Viola mont.
tricolor L.

Pinguicula.

Habitat.

Viola mont.
tricolor L.

Pinguicula.

Habitat.

CETERVM non potui elegantissimi hujus floris, nec ante aonium M.D.LXXIX. mihi conspecti descriptionem hoc loco nõ inferere: licet io Pannoniã non sũr mihi observauis, sed ejus cognitionem acceptam feram C.V. Ioachimo Camerario, in cujus orto alebatur.

PLVNTIMOS porrõ ex una radice proferebat caules pedales, angulosos, valde ramosos, quos per intervalla ambiebãt folia tricoloris violæ solijs ferè similia, lãgiora, crassiora, succi plena, leviter & rarius dentata, apophysis ad latera obliquis, & profuodè laciniatis, amariusculi gustus & nonnihil acris: ex summis alis longi oriebantur pediculi, triangulares, tenelli, singuli sustinentes florem omnĩ quos in hoc genere viderim maximum, quinque folijs, ut vulgaris, constanrem, quorum duo superiora extremis oris ex cæruleo purpurascebant, circa umbilicum pallidi erant coloris, bioa illa in latera expansa, illis minora, lutei coloris, maculis ex cæruleo purpurascensibus repleti, trinisq; purpureis radijs ex umbilico emicãtib; insigniti: inferius solum reliquis latius erat, aurei ferè coloris, septenis radijs purpureis ab umbilico intercurstantibus, maculaq; ex cæruleo purpurascente infimo labro notatum, odor suavissimus: crassiuscula capitula, quæ io ternas partes dehiscencia, semen ostendebant alijs simile, pusillum, rotundum, maturitate fuscũ, tricoloris violæ semini proximum: radix fibrosa, & durabilis, quæ facili etiam ramulis pangi possit.

Sponte in Helveticis montibus nasci ferũr, vnde Ill^{us} Princeps à Castello erutam acceperat, ipsiq; Camerario communicabat. Floret penè tota æstate.

ALIVD autem genus per omnia illi simile, floris colore excepto, postea Cassellis observabã in cultissimo orto Ill^{us} Principis Cætorum Wilhelmi: nam qui io superiore varius est color, in hoc omnino flavus, purpurascens radijs ex umbilico emicãtib; qui magnam gratiam flori adferunt: aliquantulum etiam odotatior videbatur. Audio & totum purpureum reperiri: quam varietatem semini accidere puto.

PINGVICULA. CAP. XIII.

VENVSTA & elegans etiã hæc est planta, quaternæque aut quina habet foliola, Gentianellæ ferè similia, circa radicem latiuscula, deinde in mucronẽ desinentia, satis densa, pinguis, succulentæque, tenella tamen, & dilutè virentia, amaricantis gustus: ex horum medullio unicus aut plures exoriantur cauliculi, nudi, ferè palmates, tenelli & exiles, quibus insident singulares flores vel albi, aut purpurei, cauda sive calcar prominente, quemadmodum io Consolidæ regalis vulgo dictæ, sive Cyrbalanæ flore:ijs succedunt rotunda capitula mucronato apice prædita, minutum, longum, nigricans semen continet: radices tenues sunt, fibrosæ & candicantes.

Quæ

Quæ albo est flore, sponte provenit non modò in Sneberg, Durtenstain, aliarumque al-
pium jugis, in locis à solutà recens nive adhuc madentibus: sed etiam illi quæ purpureo est
flore permixta in omnibus fere pratis uliginosis, in quibus crescit Primula rubro flore: ubi
Maio floret, & Junio semen profert: in Alpibus vetò serius.

QVO nomine dicenda esset hæc plantula diu ambegimus: placuit tandem id illi relin-
quere, quo à Conrado Gesnero in descriprinne montis fracti non procul à Lucernâ celebri
Helvetiorum urbe sita, donata est, donec commodius aliquod reperiamus.

PINGVICULA, inquit, ut ficto à nobis nomine appellatur, florem cæruleum ut viola mar-
tia profert, inodorum; folia humida, mollia, lævia, absque nervo (ni fallor) ut lingulaca vel
ophioglossus: nascitur in palustribus. Hæc ille.

Quid si verò Lingua, vel Lingulaca Plinij sit, quam lib. xxiii. cap. xix. & lib. xxv. cap. *Lingulaca*
xl. circa fontes nasci tradit? Verùm nos nihil hîc asserimus, sed inquirendi duntaxat causâ *Ping.*
hæc scribimus. Nonnulli cucullaram appellare malunt, & quibusdam *Kpaz Apuleij* puta-
tur. Nullum vulgare nomen à montanis pastoribus, neque à Viennensis agri incolis, quòd
intellexerim, obtinuit. Ex haud scio, an apud illos medico aliquo in usu sit.

Referebat mihi anno m. d. xxi. C. V. Pennæus Londinensis Medicus, hanc plantulam
tam quæ flore cæruleo est, quàm quæ albo, plerisque Angliæ locis inveniri (ut ipsa experien-
tia verum esse postea me edocuit, quemadmodum Octavo hujus libri capite annotavi) & à
Borealisibus, apud quos Primulæ veris rubro flore permixta crescit, *Dunmont* id est, Buryi
radicem à pinguedine butyro simili, quâ fissuras in vaccarum uberibus sanare solêt, appeli-
lati: à meridionalibus verò Anglis (apud quos etiam nascitur) *Wht not vncari*, quia oves
interficir, si ob eibi penitiam illâ vescantur.

GENTIANA.

CAP. XV.



MULTA Gentianæ genera alunt Panno-
niei & Norici montes: in his tamen ma-
gnam illam luteo flore Veteribus descriptam,
& plerisque alpinis nascentem cõspicere, mi-
hi non contigit. Ex illarum autè numero quæ
in Pannoniæ montibus & Noricis alpinis (No-
ticas veterum Geographorum more appello,
cas alpes quæ Pannoniam & Austriam inferio-
rem attingunt, imò ejusdè montana quædam,
atque Stein partem comprehendunt) prove-
niunt, quædam sunt alijs etiam provincijs com-
munia, alia verò in illis, ut arbitror, peculiana.
Earum historiam, quandoquidem à Recentio-
ribus descriptas non inveniam, hoc capite da-
bimus.

PREDICTARVM autem alpinum maxima, à
vulgari illâ majore quæ luteo est flore nihil
formâ differt: etenim ampla habet folia, Elle-
bori albi folijs haud multum abissimilia, sed te-
nenora, & saturatiore viriditate splendent:
caules digitali aut pollicati interdum crassitu-
dine præditos, rotundos, cubitales, nonnum-
quam bicubitales, geniculatos, quos ambiunt
similia folia, aliquantulum tamen angustiora,
ex adverso sibi opposita: extremos caules am-
biunt binæ aut ternæ confertorum florum co-
ronæ, qui non sunt lutei aut stellati, ut in vul-
gari majore, sed purpurei: majores, concavi, in
senas aut plures lacinias obtusas extremis oris
secti, & purpureis quibusdam punctis inferio-
re & interiore parte, quæ candidiores & dilu-
tiores sunt, distincti, odoris expertes, toridem, quot sunt lacinie, flaminibus longum & bi-
fidum vaseculum internè ambientibus, in quo continetur copiosum semen, planum, palea-
ceum, minus quàm in illâ flavâ majore stellato flore, subrufum: radix crassa, lãga, foris ple-
rumque flava, intus alba, impensè amara, digitalibus fibris subinde prædita est, singulis an-
nis nova germina (quemadmodum major flava) proferens, & multos caules ex eodem capi-
te producentes, præsertim cum adolevit, sed qui alternis duntaxat annis, ut plurimum floriferi
esse soleant, inter quæsciente nimirum uno anno à partu matre.

Exit sponte in Pannonicarum Noricarumque alpinum jugis abundè. Floret Augusto: se-
ptembris maturescit, novâ nive in ea juga cadere incipiente.

Flores

Gentiana major purpurea flore.

Gentiana II. caerulea flore.

Gentiana
major al.
in flore.

Floris potest colere mirum in modum variat: nam Stiria superioris alpinis, veluti in Fudenberg, & Tauro Salisburgensi Provinciae vicino aliud ejus genus invenitur, nihil quidem à superiore aut formâ, aut magnitudine differens, sed cujus flores, qui in illo sunt purpurei, in hoc omnino lactei coloris conspiciuntur.

Verum neque hoc genus, neque illud purpureo flore cicurate unquâ potuimus, aut ullâ diligentia & culturâ efficere, ut in hortis permanere vellent, nedum flores proferre.

Gentiana
major pal-
lida flor. pur-
purea distille.

In Silesia verò montibus, eruit doctissimus Medicus Achilles Ceomerus Nissenfis, magnitudine & formâ planè similem, cujus tamè flores, paulò (ut ex sicca quam ad me mittebat plantâ deprehendere licuit) minores, colorem habet pallidum, sive, ut idem ad me scribebat, obsolescere luteum, quam plurimis nigris maculis intus & foris aspersum. Addebat, ab eo qui ipsum in montana illa loca deduxisset, sibi relatum, in alio quodam præalto monte, aliam formâ non dispari reperiri, quæ caeruleo flore esset.

Gentiana
major cae-
lea flore.
Gentiana II.
Aclepias
flore.

ALTERA, cubitalibus constat ramis, pluribus ab una radice exeuntibus, duris firmisque, in quibus multa folia, bina semper inter se opposita, mollia, tribus nervis secundum longitudinem excurrentibus insignita, mucronata, ad Aclepiadis vulgo creditæ folia nonnihil accedentia, dilutius virentis coloris: à medio ferè caule ad fastigium usque, ex alarum sinu, singulantes ex adverso sibi exiliunt flores, interdum bini aut plures, oblongi, concavi, in quinque angulos acutos deinentes, & veluti se complicantes, quemadmodum convolvuli flores ferè, & multarum Gentianarum aliarum, colore nunc purpureo & saturatiore caeruleo, modo dilutiore & velut cineraceo, quinque pallidis staminibus umbilicum occupantibus: vasculum sublequitur bicorne, quo per maturitatem hiant, semè conspicitur planum, paleaceum, cineracei coloris, superiore minus: radix lutea, digitalis crassitudinis, multas oblongas fibras ejusdem coloris in latè spargit, singulis annis augetur, & nova germina proferens, valde amari gustus. Fertilior hæc est superiore, nec ut illa in æterno quiescit, sed singulis annis, vetustior videlicet, multos caules floribus onustos producit.

Varietas.

Natalis.

Copiosè in Pannoniâ, Stiria, Austria inferiore provenit, ad montium radices, umbrosis collibus, nusquam verò in summis & apertis jugis. Anno etiam M.D.XC.II. siccam ad me mittebat doctiss. vir Rudolphus Schlickius Kaufburenfis medicus è Rhetici montibus erutam cum plerisque alijs selectis stirpibus, ijs similibus quas in Pannonicis & Stiriacis alpinis observaveram. Floret Augusto: semen, ut in superiore, maturefcit mense Septembri.

Pertinax quidem hæc est, & ferè mitiora loca respuit: interdum tamen curâ & diligentia effecimus, ut in hortis comprehenderet, & singulis annis repullularet & flores ferret: attamen qua,

men quasi nativo aëre & pabulo privata, atque tamquam compedibus vinclā, lugere videbatur, ac pristini vigoris & elegantie plerumque amittere.

Vtraque hæc Gēnēro nota fuisse videtur, à quo Tragus se accepisse fatetur. Majorem in descriptione Montisfracti *Herp. Enpus* vocat, alteram *grosse bitter wurz*/hoc est, maiorem amarā radicem. Slavonici rustici in transdanubianā Pannoniā non procul Cassioviā, *swetetsa* appellant, quo vocabulo iidem candelam expriment, nimirum quia ejus radices flavæ, longæ & tenues, ceteris candelis (quæ in globum aut spiras convolvi solent) similes sint. Ejus autem radicis decoctū feliciter calculosis propinari, experimento se compertum habere affirmant: non minus quā polygoni genus illud, Herniaria vulgo Herbariorum appellatum, quod exsiccatum & in pulverem tritum, boum, equorū vulneribus atque necibus inspergere solent, ad vermes in ijs natos abigendos & enecandos: nos præter facultatem qua calculosis prodest, ad versus hernias etiam utilem esse scimus, à quibus nomen adquisivit.

Iosias Simleus etiam, *grosse bitter wurz* vocari secundam hanc Gentianam, tradit, eaque pastores uti ad ubera vaccarum, si à muribus araneis, aut alijs venenatis bestijs lædantur, curanda.

Gentiana 111. Cruciata.

Gentianæ 1111. species.



TERTIA est, quæ vulgo Cruciata vocatur: à Germanis *Kreuzwurz*/vñd modèget; Vngaris verò *Zeni Lacle kiraly* sive, id est, S. Ladislai regis herba, propter causam in Nomenclatore pannonico adscriptam. Hujus hystoriam, cum à Trago atque alijs sit tradita, hic repetere non est necesse.

ILLIUS tamen duas differentias observasse video: unam ramis humi procumbentibus & minorem: alteram firmis & erectis caulibus, eamque majorem. flores ite altetius magis cærulei spectantur, atque illarum altera radicem in foramina sectam minimè habet.

Nalcuntur verò eæ per universam Pannoniam, cū in collibus montibusque apertis & graminis, tum siccioribus pratis, & herbosis, secundum publicas vias, locis.

SECUNDÆ altitudinem nonnumquam Quarta æquat, caulēmq; habet ut illa satis flexibilem, tenuem, geniculatū: folia in singulis nodis inter se opposita, longa & angusta proferentem, tñ nervia ut sunt omnium Gentianarum: circa summum caulem aliquot ex foliorum alis prodeunt ramuli, elegantes, cæruleos, in quinque lacinias extremā parte divisos flores, & aliorum modo concavos proferentes: radix crassiuscula, circa summum caput in aliquot longas, lentasque & flavescentes fibras dividitur, secundo generi ferè similes, sed minores.

Crescit in pratis ad montium radices sitis, nō procul à Scharemburg arce Generosi D. de Heusenstain, apud Badenses thermas, & in uliginosorum pratotum marginibus post arcem Ebre.

Gentiana
111. Cru-
ciata.

Varietas.

Natalis.

Gentiana
1111.

Natalis.

cem Ebelstorffam *Dissem. Magi* Domini Hieronymi Beck à Leopoldstorf. Floret Augusto.

Ejus proculdubio genus est, quæ à Claris. Dodonæo Scirp. *Hist. Pemptade 11. lib. 1. cap. 11.* Campanulam autumnalem nominat, & quod Augusto floreat arque Autumno, à Ruellio Calathiana viola appellata est, à Cordo Pneumonanthe: humentibus ericetis secundo ab urbe Brugenſi mihi, inter Maldeghem & Malam, frequentissima, ubi eam (niveo etiam flore variantem aliquando conspexi) cum Pseudosaphodelo luteo, folio Xiphi, Roræque Solis duorum generum eruiere memini.

Vt postremæ altera species Autumno duntaxat floret: ita subsequens verno tempore suos flores proferre solet.

Gentiana v. Gentianella major verna.

Gentiana v.
sive Gentia-
nella major
verna.



Natalis.

verò finem & Augusto semen maturitatem adipiscitur: at mitioribus locis, in quibus rarus invenitur, atque in hortos translata, Aprili & Maio.

Natalis.

Illius meminit Gesnerus in descriptione Montis fracti, & *Wittenberg* appellat: meminit & Tragus capite de Gétiana, ejusque quarta species est: describit etiam illam noster Lobelius in adversariis, & lingua flandricâ expressâ Scirpium historici, tametî minus feliciter delineatâ iconè.

Gentiana v.
sive Gentia-
nella verna
minor.

Sexta etiam verna, singulari affurgit cauliculo, gracili, aut subpurpureo, aut viridi, in quo fœna aut plura pauciorave foliola trinervia, bina semper inter se ex adverso respondenti: caliculum summum fastigio fert è quo flos longus, inodorus, exilit, extrema parte in quina veluti foliola divisus, cærulei coloris adeo elegantis & viridi, ut ipsum cæruleum, quod imitatur, provocare videatur: singulæ floris plucæ aut foliola, ad latus lineam candicantem habent, & alia quina tamquam mucronata foliola sive apophyles lacinias floribus ab invicem sejungentes, pallescentia staminula medium florem occupant: floribus succedit longiusculum vasculum mucronatum, exile, durum, rotundum semen continens. Ex eadem radice, quæ flavescent & fibrosa est, & quodammodo summa tellure spargitur, plures aliz plantulæ assurgunt, quarum nonnullæ in cauliculum attolluntur, & similem flosculum proferunt, aliz duntaxat producunt folia humi strata, & veluti in orbem disposita.

Natalis.

In Cantabris & Pytenais hanc primum observabam, ad angustias illius perfossi montis, quem Hispanorum vulgus D. Adriani potum nuncupat, initio Maii florentem: deinde abundè provenerentem in celsissimis Sneberg, Snealben, Etscher, & Durrenstein jugis herbido solo, ubi sub Iunii finem floret: at in mitioribus vicinis collibus & siccioribus pratis, Maio, seminemque sub extremum Iunium profert. Minus hæc hortum ferre potest, quàm superior, & omnem culturam respuere videtur.

VIRIQUE

Gentiana vi. Gentianell. minor verna.



VTRIQUE Gentianellæ vernæ nomen dedimus, quod matutus reliquis floreant: & illam quidem maiorem, hanc minorem appellavi.

Istam foliis Simlerus in Commentario de Alpbibus, *Stemmsstengel* nominare videtur, à colore, ni fallor, celesti elegantissimo, nisi fortè Vndecimam, quæ postea describetur, eo nomine intelligat, quæ cæruleo etiâ colore prædita est. Crescit & in Rheticiis alijsq; Alpbibus.

CETERVM omnes illæ vivæ & perenni radice sunt, hoc est, prolatæ flore & semine interire non solent, sed vivaces suar, singulisq; annis ex eadem radice nova germina & caules producant. At quarum modo descriptionem dabimus, non sunt durabiles: verum emarcescendo flore, dispersoque semine semine, ingruente brumâ, prorsus perire solent, & è deceduo semine renasci. Earum autè plures species observabamus, quas sigillatim & serie quadam disponemus, initium à maxima facientes.

CVBITALEM habet Primæcaulem, firmum, geniculatum, per quem ad singulos nodos sparsa sunt bina semper folia, sibi ex adverso opposita, trinervia, lata sedè & sine pediculo cauli inherencia, sensimque in longum mucronem desinentia: ab imo ferè caule ex foliorum alis nascuntur dorales & palmares ramuli, tenues, minoribus folijs septi, quinos, septenos, aut plures flores, folijs cinctos proferentes, in quinque mucronatas lacinias divisos, exiguos pro plantæ magnitudine, purpureiscentis ex cæruleo coloris: his succedunt longa & angusta vascula tenui semine plena: radix singularis est, exigua paucissimis fibris prædita.

Nascitur in pratis herbidisque locis ad montium radices litis, montiumque clavis, Julio & Augusto flores proferens.

ALTERA secundum radicem multa, longa, trinervia, humi fusa, & in orbem disposita, habet folia, è quorum medio caulis excrevit pedalis, quadrangulus, ab imo ad summum in singulis internodijs, binis ex adverso nascentibus ramulis præditus, qui binis geniculis intercepti, ternos aut plures singuli ferunt flores calathi aut campanulæ formâ, quarto generi ferè pares, in quinque etiam lacinias divisos, dilutioris tamen purpurei coloris, singulis lacinijs infima internâ parte purpureâ lanugine pubescèribus: floribus succedunt longa cornicula, exili rotundâque semine prædita: folia caulem & ramulos in singulis geniculis vestientia, minora & angustiora sunt, magisque mucronata: radix exilis est, ex albicante colore pallescens, rarissime fibris donata.

Provenit iisdem quibus proximè descripta locis, eodem etiam tempore floret.

Illius unicam stirpem lactei coloris flore variantem inveniebam in nemoroso quodam monte apud Zolonock III. D. de Batthyán, anno M. D. C. C. C. Septembris mense.

PARI ferè Tertia excrevit altitudine, nec minus frequentibus ramis est prædita: caulibus etiam quadrangulis, terni aut plures in singulis ramis flores superiori similes, sed brevioribus, amplioresque, virescentis initio coloris, dein de subcærulei: quibus longa cornicula seu mucronata membranacea vascula semine plena ut in superiore succedunt: folia in singulis nodis multo latiora, mucronata, trinervia, ex adverso inter se sita, viridis saruri & quodammodo nigricantis coloris: radix superiori similis.

Obvia hæc est in omnibus pratis in sublimi sitis & montium jugis, florèque serius, Augustu videlicet.

QUARTA dodrantem non superat, cauliculis & ramulis exilibus, minoribus etiam folijs, Cætaurij minoris flori penè paribus: flores minores habet, licet formâ superioribus non abissimiles, qui aut dilute purpurei sunt, aut cærulei coloris elegantissimi sunt, cornicula subflavo exili semine plena sunt: radix licet tenuior, à duabus præcedentibus non valde differt.

Crescit iisdem quibus altera locis: meminì & in Britannia observare, non procul Dovera, mense Septembris, partim dilutione colore florentem, partim semine prægnantem. Ei similis videtur, quam Lobelius Gentianæ minimæ nomine describit.

SEPTIMA Quinta longè exilior, vix trium unciarum altitudinem æquat, licet multis alis prædita: foliola Cætaurij minoris in singulis geniculis, aliarum more sita habet flores minoris Gentianellæ vernæ perissimiles venustissimo cæruleo colore præditos: cornicula quæ superior, admodum exili & nigro semine plena: radicem quàm in superioribus minorem, sed frequentioribus fibris donatam. Floret in Erscheti jugis Augusti initio.

Ea fortitan est, quam foliis Simlerus, ut dixi, Commentario de Alpbibus *Stemmsstengel* appellat, quemadmodum Octavam *Krisstengel*. Omnes verò impensè amaræ sunt.

d 2

MINIME

Gentiana
punctata.
Fronh.Gentiana
XI. minima.

Hatalus.

MINIME verò prætermittendum fuit elegantissimum Gentianæ genus, quod à me quidem in nullis jugis observacū, sed ejus iconem, cum Londini essem anno M.D. XXXI. atque descriptionem C. V. Thomas Pennæus Londanensis medicus, pro nostrâ amicitia liberaliter communicabat à punctorum, quibus flores obfci sunt, frequentia, punctatam Gentianam cognominant.

Caulem autem habet geniculatum, cubitalem, supra radicem aliquantulum rubentem, folia Gentianæ similia, ex intervallis bina, sed multo minora, venosa, quorū inferiora majora sunt & longiora, pediculos rubentes habentia, superiora verò cauli sine pediculis adhaerent, eūque ferè amplectuntur: à medio parè caule è foliorum cavis oriuntur flores pentaphylli, striati, utrinque tres, rarius bini, nisi circa summum caule, quinque subæruleis constantes, nigricantibusque punctis elegantissimè notati (unde nomen) quinque staminibus, quorum apices lutes, præditi floribus succedunt vascula cum feminibus Gentianæ similia, sed minora: radix parva, multis fibris prædita, ex fusco lutea.

Provenit eopiose in Bockemuro Sustensium monte, & floret Augusto. Amari gustus est, cui acrimonia quædam subtilis conjuncta.

ANNUVS sive biennialibus fugacibusque subjeçi, quod ex radice conjecturam faciam (quannum quidem ex picturâ deprehendere licet) semine maturo planè perire, eoque deciduo renasci: alioqui quinto loco reponenda fuisset, & forsitan etiam quarto.

LINUM SILVESTRE.

CAP. XVI.

MIRAM etiam in Lino silvestri conspici varietatem, satis ex meâ Hispanicarum Pannonicarumque stirpium historiâ parete arbitror: cum verò Linum silvestre dico, Linnariam non intelligo, quæ aliquibus etiam hoc nomine appellatur, sed plantam floribus Lini similibus eodemque modo fugacibus, nonnumquam etiam Lini folia habentem. Nos singulorum generum histotiam, concinniore quæ poterimus serîe, hoc capite dabimus.

Linum fl.
lensel.

PRIMUM ex eadem radice, quæ crassiuscula est & candicans, unicum, interdum plures profert caules, modò pedali, nonnumquam etiam majore altitudine assurgentes, crassos, firmos, hirsutos, superiore parte in plures ramulos divisos: folia quæ eos ambiunt reliquis generibus majora, venosa, hirsuta, minimum digitum lara, gummoso gustu, deinde amaricante: ramuli ab infimo ad summum floribus quinque foliis constantibus onusti omnium maximis, Malvæ vulgaris ferè æmulis, cærulei coloris aut vegetioris, aut dilutionis, cū quin-

Linum silvestre l. latifolium.

Linum silvestre III. latifolium.



que internis staminibus apicem habentibus : quibus succedunt capitula dura, mucronata, quinque foliis sive apophyibus compreheſa & quaſi involuta, quæ maturitate hiant, ſemenque continent ſativo lino ſimile, latum, nigricans, ſplendens : radix perennis eſt & vivax, ſingulis annis repullulans, cauliculôſque etiam ante hiemem proferens tenellos, folijs multâ lanugine hiſſutis onuſtos. Floret Junio & Julio: ſemen maturum Auguſto.

Frequens eſt multis Pannoniæ ſuperioris & Auſtriæ inferioris locis editioribus & ſiccioribus, graminibus tamen, ut apud Poſonium, Petronellam, quæ Veterum Carnuntum creditur, Altenburgum Danubio vicinum, item non procul à ſilvâ qua ex Leyteſtorf ad Entzeſtorf, à longâ valle cognominatum, iter eſt, tum etiam ſupra Manderſtorf, & pagum Lachn cum tertio, quarto, quintoque generibus.

Tempus.
Natalis.

ALTERVM pedales, graciles, lanuginôſos, ramos aut quaternos ab una radice promit caules, in quibus Lini latiſcula folia, trinervia, ad Alcyri formam ſetè accedentia, nec multum à Prioris folijs diſcrepantia, lanuginôſa: extemi cauliculi in binos aut ternos ramulos diviſi, & Heliotropij majoris quodammodo inſtar circumflexi, pleni ſunt floribus qui ab imo appetiti incipiunt, Lini ſlorum diviſurâ, ſed majoribus, ſuperiori æqualibus, candidis, quos multæ purpureæ venæ interſcindunt: ſemen & capitula Lini ſimilia: radix perennis eſt, craſſiſcula, longa, candicans, ſatis fibris ſecta.

Linum ſili-
cuſol. III.

Apud Colibriam Luſitaniz urbem, vulgo Coymbra dictam, celebri academiâ claram, cam ſurpem duntaxat obſervare memini, ad deſertum quoddam & ſolitarium templum, meoſe Novembri repullulantem, & in illius anni cauliculis ſemen collectum in Belgicam attuli, quo terræ commiſſo, unica nobis planta oſta eſt cubitalem excedens altitudinem, & latioribus quàm natali ſolo folijs, quæ ſingulis annis ſub æſtatis finem quidem floruit, ſed oſulum ſemen præbuit.

Natalis.

MYRTOS ex unâ etiam radice Tertium fert caules, primo generi ſetè ſimiles, plerumque tamen breviores, Hyperico non valde diſſimiles, aliquantulum rubentes, ſtremos, majusculis folijs, latiſcuſculiſque & craſſiſcuſculis, priori ſetè paribus, non hiſſutis tamen, ſed durioribus ſeptos, perquam amari ſaporis flores in ſummis caulibus copioſos, magnos, quinque etiam folijs conſtantes, petelegantis flavi coloris, quinque ſtaminibus è medio prorumpentibus, & totidem gracilioribus brevioribuſque villis: ſemen in compreſſioribus capitulis paulô minus reliquos, nigricans quidem, ſed non ſplendens ut illorum: radix ſatis craſſa, contorta, albicans, aliquot fibris donata, ſingulis annis repullulans, novôſque caules producens.

Linum ſili-
cuſol. III.

Exit abundè in monte Badeoſibus Auſtriæ thermis imminenti, locis graminibus, ſecundum

Natalis.

d 3 ſpecies,

sepes, & plerisque alijs in montium illâ serie ad Danubium usque excurrente, locis: ad silvulam item, Lachn pago vicinam, cum aliquot alijs generibus. Floret & semen profert cum Primo.

Linum filvestre t. t. angustifol. 1.

Linum filvestre v. angustifol. 11.



Linum fil.
v. ang.
Rifolium.

COMPLEVES sunt Quarto cauliculi teretes, firmi, pedalis longitudinis, virides, frequentibus foliis Lini sativi similibus, ex viridi subcaeruleis onusti, summo fastigio in aliquot ramulos divisi, quibus insident flores intense caerulei, quinque foliolis constantes, sativi lini floribus similes, quinque in medio staminula, totidemque apices separatos continentes, semen in capitulis crassioribus, rotundis, lino sativo non minoribus, nigrum, oblongum, planum, sativi semini ferè par: radix candicans est, perennis, aliquantulum fibrosa (desiderabam in icone majorem pictoris diligentiam) amariulculi gustus, deinde suavis acrimoniae particeps.

Natalis.

Varijs circa Viennam Austriæ locis sponte nascitur, præsertim in gramineis acclivitatibus, & juxta vias. Floret Maio & Junio, interdum etiam tota æstate: semen verò maturum est Julio.

Linum fil. v.
angustifol.

DODRANTALES, nonnumquam etiam pedales habet, Quintum genus, cauliculos, graciles, firmos, rectos; folia sativi lini, angustiora, dura, mucronata, virentia, amaricantia: flores in summis cauliculis multos, magnos, quinque folijs albis præditos, circa umbilicum quinque purpureis lineis distinctos, totidem staminibus, & quinque separatis apicibus ex medio umbilico prodeuntibus, odoratos: semen in rotundis vasculis planum, nigricans, splendens, sativo lino simile: radicem candicantem, duram, aliquot fibris donatam, perennem, & singulis annis novos cauliculos profertentem.

Natalis.

Magna copia nascitur toto Viennensi agro, plerisque alijs Austriæ & Pannoniæ editioribus locis, atque secundum publicas vias, etiam apud Lachn cum aliquot superioribus generibus. Floret Junio: semen perficit Julio & Augusto.

Variet.

In Austriacis alpebus præsertim verò Sneberg, aliud genus invenitur huic omnino simile cauliculorum & foliorum gracilitate, tenuitate, florumque formâ & radice: in florum duntaxat colore est differentia, qui nivei non sunt, sed caerulei in candidum languescenres, & quasi cineracei: capitula etiam floribus succedentia longè ampliora, nec minora quàm in sativo. Florebat verò istic sub fine Junij, semen extremo Julio & Augusto maturum.

Linum fil.
v. angustifol.

Sexto, binæ aut ternæ sunt virgulæ dodrantes, firmæ, licet valde graciles, quas foliola lino multo angustiora & minora ambiunt: summis virgulis terni aut quarterni, nonnumquam plures insident flores superiori formâ, & colore ferè similes, sed minores, sativi Lini florem

florem non multum excedentes: quibus succedunt capitula & semen lini, sed minora, radix exilis, candicans, perennis tamen.

Primum mihi hoc genus observatum in anteriore Madritiaor silvæ parte, quæ secundo ab urbe Lutetiâ lapide distat, inter gramina loco aperto, & nullis arboribus obdito, floreat Julio, maturum semen profertens Augusto: deinde agro Viennensi aridioribus graminis locis.

FRUTICOSVM est Septimum genus, atque dodrantalibus pedilibusque ferme ramulis semper virentibus præditum est, quos numerosa folia exoroant, mediæ inter thymi & psyllij magnitudinis, subalbida, flores deinde superiori paulò majores, quinque folijs ut illi constantes, omnino nivei, fumis ramulis insident, quibus succedunt capitula semine plena: radix dura & lignosa est.

Exit desertis quibusdam Hispaniæ locis, sole illustratis: floret Junio & Julio, atque subinde semen profert. In Belgio satum, tertio duntaxat à satu anno fertius floruit, nec semen tulit.

Omnium porro in Hispaniis, Galliâ, Austriâ & Pannoniâ observatorum non modò semina adferebam, aut Ill^{us} V. Ioan. de Brancion, ipsique & reliquis io Belgicâ amicis anno M. D. LXXIII. Austriacorum & Pannonicorum mittebam: sed siccas etiam stirpes eum aliquot alijs elegantibus & suis floribus onustis, petendas curabam, ut illarum formam statim videre posset, neque expectare cogere, donec semine nasceretur: incertus enim admodum est plurimarum stirpium è faciooe proventus: ille insuper admodum valetudinarius erat, sic, ut subsequens Februarius illum nobis maximo cum nostro dolore abstulerit. Ex illis autem quædam icones imitatæ fuere, non è Galliâ Narbonensi petitis.

Linum silvestre VIII. Chamælinum.



EX ILI, rotundo, dodrantalique aut paulò majore assurgit Octavum cauliculo, quem adverso situ, ut in Hyperico, bina semper amplectuntur foliola, Lini sativi folijs ferè paria: supremus cauliculus io aliquot ramulos dividitur qui in oblongis pediculis exiguos strobilos quinque foliolis albis constantes proferunt, luteis intus staminiolis: strobili succedunt parva capitula, lini vasculis non ab similia, miocora tamen, in quibus semen: radix tenuis, aliquot exilibus fibris donata est, sed an perennis & rediviva, ignoro.

Provenit io herbosis collibus & montanis Austriæ atque Pannoniæ: floret Junio, & Julio. Similem aliquando ad nos Machliniam, è Tornacensi urbe, Ioannem Moutonum doctissimum & diligentissimum Pharmacopœum mittere memini.

PRIORA tria genera Lini silvestris latifolij oomine appellare licebit: reliqua mihi erunt Linum silvestre angustifolium sive tenuifolium: Octavum *χαρακίνορον* nuncupari poterit.

LINARIA ODORATA.

CAP. XVII.

SINGULARI hæc est caule, eoque oonnumquam cubitali, in aliquot tenues ramulos superiote parte diviso, quos oblonga folia Lini iostat sepiunt: quæ tamen juxta radicem suot humi sparsa, longè majora latioraque, Bellidis folijs similia, sed per ambitum ferrata, pleraque etiam per caulem sparsa altius iocisa: flos exiguus, copiosus, cæruleus, lavendulæ pænè floribus concolor, aliquantulum odoratus, extrema parte hamuli modo incurvus (quem pictor non satis exactè expressit) virgulas seu ramulos spicati obidet, ijs succedunt valvulæ Linariæ similes, sed minores, semen pusillum, rufum continentes. Radice est singulari, candicante, miocimi ioterdum digiti crassitudinem æquante.

Sponste provenit montosis Castellæ locis lapidolo & arido solo, ubi Aprilis florentem, Maio luoióque semen profertentem legebam. Io Belgica satà, Junio Iulioque florebat, semen Augusto maturiscebatur: rarò supra annum spatium adservabatur, sed prolatò flore & semine plerumque perire solebat.

LINARIAM

Linaria odorata.

Nemosa.

Linaria hispanica var. rufa.

Linaria hispanica 1.

Natalis.

Linaria hispanica 111.

Natalis.

Linaria hispanica 111.



Linaria Hispanica 1.



Tertium genus, cui multi graciles pedalesque caules à radice proveniunt, hos frequentia ambiunt

LINARIAM odoratam quidam vocant, quia ejus flos Linariæ purpureæ florem nonnihil æmulat: is calidis regionibus aliquantulum odoratus est, in Belgicis hortis natæ flos inodorus. Sefamoides majus Salmanticensibus etiam dicebatur, cum perinde ejus descriptioni conveniat, atque illorum Sefamoides ante descriptum.

Nullas ejus facultates exploratas habeo: sed gustata, amaritudinis particeps esse deprehenditur.

LINARIA HISPANICA.
CAP. XVII.

PRÆTER vulgarem & jam descriptam Linariam, varia alia ejus genera in Hispanijs nascuntur: quorum omnium (quæ quidem à nobis vel istuc sunt observata, vel semine inde misso alibi nata nobis conspecta sunt) historiam hoc capite trademus.

PRIMUM genus multo ubetius & crassius est vulgari, ternos quaternosque caules ab una radice profertens singulares, pedales, interdum ampliores, quos ambiunt Centaurij minoris folia, infimâ parte juxta terram plerumque terno ordine disposita, supernâ verò, temerè nulloque servato ordine sparsa: extremi rami luteorum florum veluti spicâ occupantur Linariæ vulgari similibus, quibus tamen tiellus lanuginosus est, cauda sive calcar purpurascens coloris: hos sequuntur capitula exiguâ loculis similia, semen videre mihi non contigit: radice est singulari, albâ, quam hieme perire puto.

Circa Valentiam Hispaniæ in pratis & locis umbrosis, Martio florētem observabam, dum ex eâ urbe ad litus marinum, comite D. Ioanne Plaça deambulatam prodixissem.

TENUIORVS, frequentibusque ex eadem radice assurgit cauliculis Alterum elegans genus, ijsque imbecillibus & plerumque procumbentibus, quos vestiunt frequentia, tenuiaque admodum & mollia foliola, æruginei quodammodo coloris: summis ramulis & ex ulculis insident aliquot flores, Linariæ vulgari formâ similes, sed paulò minores, elegantes, coloris ex purpurâ fere nigricantis, circa ridum flavescentes, tenui odore præditi: floribus succedunt rotunda capitula, cineraceum planumque semen continentia: radix candida est, tenuibus quibusdam fibris & quasi villis donata, quam Viennæ semine mihi natam subsequens hiems semper corrumpit. Tota planta tenella est, floret æstate, semen Augusto maturitatem consequitur: interdum etiam diutius floret.

Sponte nascētem hanc Linariam in Hispanijs non observavi: sed semine inde misso apud Belgas nata quibusdam amicis, qui nobis illud communicarunt, quo mihi plantæ aliquoties Viennæ natæ.

SEMINE ex Hispaniâ misso natum etiam

ambiant folia, angusta, longa, ex viridi canescentia, ejus ferè coloris qui in lavendulæ folijs conspicuus est, amati autem saporis: circa summum caulenti multi nascuntur flores utcumque odorati, spicæ in modum conferti, formâ superiori similes, quorum subrectum bifidum foliolum externâ parte exalbidi coloris est, interna purpurei, nictus deinde ἀγρίωνος; sive albicans ex flavo coloris, hirsuto & purpureo labro, propendētibz tribus latiusculis purpureiscentibus barbulis: flori succedunt vascula, sed plerumque inania, præsertim Francofurti; ubi primam florentem videbam in orto Joannis Muleri pharmacopæi, cui semen communicaveram. Florēt æstate: vivax est, & radice singulis annis novos profert caules.

MYRTOS infimos, graciles fundit **Quartum** etiam genus cauliculos, quos ambiunt frequentia, carnosa, tenuia, molliâque foliola, cineracei quodammodo coloris: extremis cauliculis infidēti quorū superiores minores, coloris carulei dilutioris ad cineraceum tendentis, quorum nictus flavus: illos sequuntur vascula, maturitate hiantia & cineraceum planum exiguum semen continentia: radix alba, tenuibus villis prædita, annua.

Hoc mihi primum videre contigit anno M.D.XC. in cultissimo orto Ill^{mi} Principis Cat. Natalis, torum Wilhelmi: semine peregrè misso natum Castellis Augusto mense suo flore onustum, & maturum semen in vasculis continens. Semine inde accepto mihi nata sequente anno, tota æstate & autumnō floruit & maturum semen tulit.

Linaria hispanica v.



PALMARIBZ exit **Quintum** genus virgulis, frequentibus, humi sparsis, quas vestiant folia vulgaris folijs similia: extremos ramulos occupant multi flores flavi, vulgari minores, veluti in spicam congesti, quibus succedunt capitula minora quàm in vulgari, exiguo femine nigro plena: radix tenuis est & candida, vulgaris modo serpens.

Salmanticensi agro, aridis locis hoc genus pumilum inveniebam, ubi tota ferè æstate florēt.

LINARIA nomen primo generi indidi, non à foliorum similitudine, quæ non conveniunt, sed quia ejus flores vulgari forma similes, & ejusdem ferè temperamenti sunt: nam commaducata manifestam acrimoniam cum quadam amaritudine conjunctam exerit ipsa planta. Postrema etiam valde amara est, & quia plerumque cum Chamæpity nascens reperitur, adeoque pumila sit, Salmanticensis Chamæpityos genus esse censuam.

LINARIA PANNONICA ET VICINARVM REGIONVM.

CAP. XIX.

ALIQVOT etiam habent Pannoniæ & vicinæ regiones, Linariæ differētiâs (præter vulgo notam, & omnibus ferè provinciis familiarem) quas in alijs à me peragratis regionibus observare non memini.

BICVITALI interdum excrefcit Prima magnitudine, rectum ferens caulem, liz-

vem, viridem, multis folijs sativo lino similibus circumseptum, qui superiore parte in stultos tenues brevēsq; ramulos divisus est, ferentes raros flores, Linariæ quidem vulgaris floribus respondentes, sed minores & pallidiores, nictu nonnihil villosa & aureo: semen in vasculis Linariæ vulgari similibus exile, nigrum: radix longiuscula, candicans, multis tenuibus & majusculis fibris in latera expansis nixa, perennis, summo capite singulis annis novos caules profert quidem: sed ex lateralibus fibris non germinat ut vulgaris. Tota amariorcula est.

Crescit in montium declivibus secundum publicas vias, & gramine nudis locis, supra Pofonium ad Danubium, Gumpoltkirchen, Leytenberg, atque etiam in Motaviâ. Florēt Junio & Julio, interdum etiam Augusto, & subinde semen.

LONGE minoribus virgis est Altera, viridibus, gracilibus, quas ambiunt frequentia fo-



liola, teretia, carnosa tamen & succulenta, coloris ad ærugineum tendētis: flores extremis ramis insident omnium modis, forma tamen reliquis similes, flavi, circa rictum aurei, quibus succedunt laxiora vascula semen exile nigrum continentia: radix alba, tenuis.

Natalis.

Nascitur plerisque Moraviz locis in collium acclivitatibus: unde semen delatum in hortis Viennæ consecvimus, quod ulla difficultate crevit, eoque sponte deciduo semper renata est: quam ob causam annuam esse censendum est. Floret quasi tota æstate, etiam in Autumnum usque.

*Linaria 111.
Scitica.*

RAMULIS palmaribus & humifusis est Tertia, quos ambiunt folia vulgaris Linariz quodammodo æmula, minora tamen, crassa, succulenta, coloris ex herbaceo candicantis, & veluti cæsi, non temerè per ramulos sparsa, sed setie quadam, aut terna, aut quaterna eos amplectentia: flores vulgari sunt similes, sed elegantissimo colore præditi, ex violaceo quodammodo purpurascete, labro inferiore, ubi hiat, aut diducto rictu aperitur, planè auresco, amari gustus: Succedunt deinde vascula crassiuscula, quæ maturitate deliscentia, duas cellulas ostendunt semine plano, compresso, nigro, plenas: radix tenuis, alba, multos ex uno capite ramulos profert, atque etiam summâ tellure serpit. Perennis hæc est, & subinde in extremum usque Autumnum flores profert.


Natalis.

Eam primum in præcipitio Snealben, quæ ad monasterium Neuherg descendit, inveniebam salsobroso loco florentem extremo Junio, quæ deinde in horto reposita loco umbroso & tenui, benèque subactò solo, bonum semen eo adhuc anno protulit. Raram neque ubique obviam inchocebam elegantem hanc plantulam: attamen satis copiosam postea repeti inter saxa & præcipitia, dum anni M. D. xxci. Augusto mense celissimum jugum Prayneralben nuncupatum conscenderem.

Ex Gelneti etiam epistolis liquet ooo ignotam illi fuisse, sed in Helveticis atque Reticis alpebus crescere.

*Linaria 111.
Scitica
11.*

TENUES & humi diffusos habet etiam Quarta cauliculos valde frequentibus, angustioribus, sine ordine dispositis, crassiusculis, & coloris cæsi soliolis obfatis, in plures alas nonnumquam divisos, quarum fastigium occupant multi, spicæ instar confertim nascentes, flosculi, colore superiori ferè similes, sed multò minores: quibus succedunt parva capitula semine plena, de cuius formâ & colore nihil asserere possum, quandoquidem in flore-tem &



tem & capitulorum rudimenta duntaxat præbentem in Moravia collibis inveniebatur. Secundâ, anno M. D. XXCV: radix multis fibris latè sparsis constat, & perennem esse apparet.

HABVM nullum vulgare nomen intelligere potui, non incommodè tamen eadem appellatione nuncupari poterunt, qua vulgaris & ubique nota Linaria. Eam Germanicè thizotomæ mulierculæ *unser Junc* hæc dicunt, hoc est, D. Virginis linum. Vngari autem *Fadlen*, id est, silvestre linum.

LINARIA CRETICA.

CAP. XX.

SEMINÈ Cretâ accepto, nata sunt duo alia Linariæ genera non inegitâ: unum quidem latifolium, Fracosurti in horto Ioannis Mulleri pharmacopæi: alterum tenuifolium, Lugduni apud Batavos in horto Ioannis Hogelandi: utriusque historiam hoc capite describemus.

HABET autem Primum genus, sive Latifolium, cubitalem aut amplio rem caulem, rotundum, firmum, crassiusculum, infimâ parte subrubentem, supernâ viridem, & in multos ramos divisum: quem ambiunt, modò bina, interdum terna folia, adversis intet se petiolis ordine nascentia, aliquando incondita, & nullum ordinem servantia, latiora quàm in ullo genere Linariæ viderim, ut quæ uncialem latitudinem interdum habeant, canescētia, gustu,

si mandantur, amariüsculo: summum caulis fastigium, extremique rami, frequentibus floribus satis odoratis sunt onusti. Linariæ vulgaris flori forma similibus, sed coloris, supernâ parte, sive bisulâ calicis, & ipsi etiam barbulis, pallescentis, infra rictum (qui lanugine pubescent) aurei, calcan albi, interdum subcæruleo vel etiam purpureo: floribus succedunt vascula, ut in alijs Linariæ generibus, nigrum semen continentia: radix digitalis longitudinis, alba, dura, tenuibus aliquot filis cincta, summâ parte, ex quâ videlicet caules exoriuntur, extruberat, deinde gracilescit.

Florebat sub finem Iulij & Iulio, semen maturum fuit Augusto.

ALTERVM genus, sive Tenuifolium, virgas in initio profert ex una radice satis copiosas, rotundas, læves, lesciquipedalis vel pedalis longitudinis, quos binis, aut ad summum ternis intervallis, quarema simul ambiunt folia, vulgaris Linariæ folijs duplo angustiora, deinde alia singularia nullo servato ordine: virgis innascuntur frequentes ramuli, folijs valde tenuibus donati, qui velut ex umbellâ exigua (cujus forma paulatim evanescit) flores protrudit valde exiles, qui quinque foliolis constare videntur, binis videlicet erectis supra cassidem albicantem vel cineraceam, binis latera occupantibus, & uno propendente, caudâ insuper, sive calcani sub illis conspicuo, antrorsum reflexo: semen in pentacarpis, seu vasculis Lino ferè similibus, cineraceum & planum, quod, deciduo flore, brevi maturescit, etiam herbâ adhuc virente. Florebat sub finem Iulij.

ANONYMOS LINI FOLIO.

CAP. XXI.

LINI foliorum similitudo facit, ut hanc & aliquot subsequentes, Linarijs subijungam: tamen si quo nomine istam appellare debeam, incertus adhuc sum. Malui igitur a *relinquo* relinquere, quàm nomine non satis apto donare: illius ramen descriptionem negligere nolui, quandoquidem à nemine, quod sciam, ante me observatam existimem.

Pedales habet ramulos, duros, ex viridi pallescentes, & in his multa folia temerè sparsa, nullèque ordine disposita, dura, angusta, longiuscula, lini foliorum æmula, ejusdem cum ramulis coloris, aut qualis in rutâ montanâ elucet, hoc est, ex viridi pallescente, gustu nonnulli acido primum, deinde amaricâte: extremi cauliculi in multos ramulos sive pedicellos dividuntur, qui hofculos albicantes sustinent, quinque folioli stellari decussatis, constantes, cum aliquot interioribus staminibus, qui tandem in singularia semina efformantur pentagona,

Nata in.

An Sclamo-
de agrosPolygala
vulgare
vulgare

Polygala vulgaris major 1.

Polygala
vulgare
major 2.

Nata in.



pentagona, duro corio sive putamine medullam albam continentia; radix candicis, multifida, perennis & vivax, annuatim novos ramulos sive virgulas producens: nonnunquam etiam serpens. L. manz repens inftar.

Copiose nascitur editioribus herbosisq; locis agri Viennensis: tum etiam herbosis collibus Polonio vicinis, in achivirate Hamburgensis montis qua Altenburgum spectat, alijsque præterea plurimis Aulnz & Pannoniz montibus, etiam interamnibus ultra Dravum. Floret Maio. Memini & Madritanâ silvâ, secundo ab urbe Lutetiâ militari, cum Lino silvestri, Hyacinthoq; autumnali minore colligere: sed longè exiliorem.

Quid si cum Scâmoide affinitatem aliquam habere deprehendatur?

POLYGALA VULGARIS.

CAP. XXII.

POLYGALÆ appellationem apud ple-rosque Recetiorum etiam obtinuit plantula quædam (valde tamen dissimilis illi de qua priore libro inrer suffrutices) ubique serè in ticcioribus pratis obvia, folijs lini aut hyssopi vulgaris, quæ vel cæruleo flore, vel purpureo diluore, vel rubello, aut interdù etiam albo variare conspicitur. Gesnerus in epistolis Amarellam ab amaritudine nuncupavit. Tragus Dioscoridis πολυγάλην & γλαυκὰν esse existimat. De eâ, cum à recentioribus, præsertim à Trago descripta sit, vulgòque satis nota, nihil hic agemus: sed de alio ejus genere majore & elegantissimo, quod in Austriâ & superiore Pannoniâ observabam, tametù & vulgaris, tot florum colonibus discreta, passim etiam in ijdem Provincijs nascatur.

Ex eadem interdum radice prodeunt quinque aut sex virgulæ duriusculæ, pedales, graciles, lentæ & obliquosæ, folijs nullo ordine dispositis obstitæ, angustis, foris tinctorijs, aut vulgaris Hyssopi angustifolij & minoris, quod ab Hispanis *T. opido* vocatur, foliorum æmulis: flores conferti & spicatum nascentes, summas virgulas occupât, fumitæ floribus non multum abfimiles, longiores tamen, & dilutioris purpurei coloris elegantissimi, sive dilutioris rubore pulcherrimo nitentes: his succedunt penduli loculi plani, Burzæ pastoris valvulæ serè similes, quos mēbranacæ quædam veluti alq; inregunt, semina bina plerumque continentes, nigricantia, hirsuta, longiuscula, quæ aperiētib; sese ad latera maturitate burstulis, decidunt: radix etasiuscula, brevis, dura, lignosa, vivax, aliquot fibris donata est: & tota planta amariçat.

Frequens est admodum in Leytenberg supra Manderstorf, circa Medeling, toraq; illâ montium serie, quæ à Calemberg Danubio supra Viennam imminenti, ad Austriacas usque alpes excurrit. Nusquam non occurrat similiter per Pannoniam, etiam interamnem, ultra

Polygala vulg. major 11.



Osyris austriaca.



ultra Dravum flumen. Floret Maio & Junio. Aliquoties illam ob florum venustatem in hortum transtuli, & cicurare volui: sed operam lusi.

Variat etiam quibusdam umbrosis & humidioribus locis, floris colore aut cæruleo, aut albo, non secus ac minor vulgaris, & perinde affurgit ut modo descripta, sed minus venusta præcedente.

Polygala vulgaris major 11.

OSYRIS AVSTRIACA.

CAP. XXIII.

CVBITALIBUS, aut amplioribus interdum, affurgit ex uoâ radice virgis, gracilibus, duris, oïgantibus, lentis, & fractu contumacibus: quas non quina aut lena (ut Dioscorides suæ tribuit) sed numerosa ambiunt foliola, longiuscula, angusta, lino similia, dura, mucronata, sacra viriditate nitentia, amari gustus: extremæ virgæ in multis tenues ramulos desinunt, quibus insident singularia foliosa capitula, florem luteum, ex multis stolis quinque radiolis decussatis, stiloque in medio prominente constantibus compactum, amplectentia: deinde semen oïgricans, longiusculum, quale sere in Hieraciorum generibus, superne villosum pappi instar, quod levissimo vento excussum, ejus arbitrio fertur: radix dura est, lignosa, nigra, aliquot fibris donata, singulis annis germinans, novæque virgæ proferens.

Osyris Austriaca.

Exit non procul Phasianorum horto circiter miliare infra Viennam, editori quodam & sicciore prato cum Lini silvestris generibus, Cytiso primo, & alijs stirpibus, sed humilior: secundum verò sepes atque inter frutices, major & uberior. Inveniebam multis item Pannoniæ locis, etiam Interamni supra Dravum flumen. Floret Augustus: semen maturum est Septembri.

Natalis.

VIENNENSES Osyridem appellabant. Sed an cum Dioscoridis Osyride cooveciat, alijs judicandum relinquo. Tragus, apud quem latino exemplari perbellè depicta est, Linariam terciâ facit, & Lintrâ à formâ, prope *Xyrtamni* à floribus oncupat, atque ad Dioscoridis Heliochrysum refert. Nonnulli Chrysocomeo Dioscoridis, & Chrysin Aristotelis esse arbitrantur.

Nomina.

ELICHRYSON. CAP. XXIII.

PEDALIS, nonnumquam cubitalis altitudinis est planta Elichryson, fruticosa, & in multas alas subinde divisa: ei oumerosa folia, Abrotono similia, candicantia, & cum gravitate odorata: flores in summis ramis umbellatim congesti, lutei, Agerati floribus formâ & odore per similes, verum majusculi: radix dura, lignosa, minimi digiti interdum crassitudinem æquans, quæ singulis tamen annis perit, nec vivax est.

Elichryson.

c

Læto

Elichryson.

Natalis.

Natalis.

Facultates.

Chrysocome.

Chrysocome 1. vulgaris.

Chrysocome
altera per-
grina 1.

Natalis.

Chrysocome
tertia per-
grina 1.

Natalis.

Læto solo provenit, & copiosè circa Madritium itinere Complutensi, alijsque Hispaniæ locis, in agris, ubi Septembri & Octobri florentem videbam.

DIO SCORIDES *ελιχρυσον*, nonnulli, eo referre, *χρυσανθου*, & *αμαλγανος* appellant. Theophrastus *ελιχρυσον*, quem securus est Plinius. Gaza Aureham venit. Hispani *Stobædonda*, id est, Scopam foetidam ab ejus usu & odore gravitate nuncuparunt.

Verùm cum tota hæc planta sit amara, facile eas facultates obtrineat, quas illi veteres tribuunt. Hispanis aurem nullo est in usu, oisi quod Madritiano agro mundatorias scopas ad ædes purgandas ex ea faciunt: & quibudam alijs locis, illà in fasciculos congestà & colligatà, formaceos, ut Pliniaou verbo utar, parietes (quos Hispani *sapias* vocant) inregunt adversus imbrum injuriam.

CHRYSOCOME ALTERA.

CAP. XXV.

PER Chrysocomen intelligo, quam vulgus Stœchadem citrinà appellat, multis Provincijs communem. De eà autem hoc capere noo sum acturus (à plerisq. enim diversis nominibus est descripta) hec icoem oculis subiiciendam operæ precium esse duxerim, ut quam stirpem intelligam, Lectoris agnoscant: sed de alijs quibudam, quas vel in Hispaniis aliquando observare memini, vel prius etiam in Gallia Narbonensi, tum quam semine peregrè accepto naram habui.

CYBATALES plerumque habet *Prima* virgas, quando adolevit, graciles, incanas, & veluti tomento quodam obfusas, quas inconditâ serie disposita ambiunt folia, longa, gracilia, Libanotidis coronanz folijs similia, vel ijs etiam angustiora, superne nonnihil virentia, inferne incana, ex quorum sinu nascuntur tomento si ramuli minoribus folijs præditi: per summas verò virgas rariora sparsa sunt folia, quarum fastigijs multi insideor (quamati flores, vulgaris Chrysocomes folijs minores, aurci vel flavi coloris, qui marcescentes fuscum colorem contrahunt, & semine exile cootioent pappo involutum: radix lignosa, dura, in aliquot ramos divisa. Cum quadam non insuavi graveolentia odorata est, gustuque calidiusculo.

Salmanticensi agro frequens est (memini & Mompelliano videre) ubi tota æstate subinde novos flores producit, totaque hieme comam retinet, ut etiam in Belgicam translata.

PEDALISVS, interdum etiam cubitalibus assurgit *Alter* ramis, caudicibus & lanuginosis, quos Olex familia tolia, longa, mollia, cana lanugine tecta per intervalla ambiunt: flores autem extremis ramulis pallescentes, squamosi, ut Agerati ferè, insideor: radices suot nigricantes.

Abondè nascitur aridis locis, atque etiam in vetustis muris, per Lusitaniam, Beticam, Granatensè regnum, in quo Martio, Valentino autem,

in pappum cui semen involutum abie: tadix minimi digiti crassitudine æquat ferè, nigra, fibris donata, summa tellure in latera se spargens, novòque singulis annis caules proferens, qui primùm emergentes, nihil nisi tomentum esse videntur. Tora æstate flores producit.

Natalis.

Hujus tadicis ex Anglia mihi missæ sub finem anni M. D. xxviii. ab optimo viro Iacobo Gareto juniore, nullâ additâ appellatione, quas ex America accepisse scribebat.

depropolis.

Si eadem stirps non est, quam ex novo orbe delatam Gnaphalij Americani nomine, mihi quæ anno octogesimo supra millesimum & quingentesimum missam, à Doctissimo humanissimòq; viro V. Richardo Garth Londinienfis Cancellariæ Primicerio, in Pannonicarum Observationum lib. iiii. descripti, & *alpyropachys* nuncupari posse dixi: cerè illi valde affinis.

Suptema enim caulis, quam tum accipiebam, pars, cum tamulis qui flores sustinebant, multo tomento obfusi erant, quemadmodum legitimum illud Gnaphalium, quod in mediterraneis maris litoribus nascitur. longiuscula & angusta folia, Cbrytocomes folijs proxima, superne viridia, pronâ parte incana & tomento obducta: singuli tamuli veluti comam florum ex singularibus pediculis dependentium gestabant, qui, cum nondum explicati essent, nihil aliud videbantur quàm capirula numerosis argenteis foliolis sibi invicem incumbentibus constantia, sicca admodum, quæ digitis reclusa, in medio tenuem quandam subflavescentem lanuginem sive pappum continebant, levissimo flatu avolantem.

GNAPHALIVM.

CAP. XXVII.

Gnaphalij
variegata.

G NAPHALII multa sunt genera, quorum aliquot ab alijs descripta. Nos eorum, quæ hæcenus minimè observata esse putamus, historiam dabimus, & ab eleganti alpino auspiciabimur, quod in Pannonicis descripsimus, illique duas alias icones subijciemus à Iacobo Plateau missas, nudas tamen, & quibus Gnaphalij aliterius nomen duntaxat additum: cum verd ipsas stirpes olim observare meminerim, qualemcunque descriptionem etiam adjiciemus.

Gnaphalium alpinum.

Gnaphalium
alpinum.



Natalis.

DODRANTALIS autem est alpini Gnaphalij plantula, plerumque etiâ minor, folijs, quæ humi fusa, Pilosellæ minoris Fuchsiæ ferè, internâ parte hirsuta, exteriore vetò, omnino incanis & tomentosis gustu exsiccante & amaro: cauliculi ipsi & ea quæ illos ambiunt folia multo etiam tomento obfusa: summo autem fastigio, cauliculi sustinent quina, sena, aut plura foliola latiora & expansa, ad eò tomentosa, ut nihil nisi tomentum sint: ex horû medio emergunt quaternæ, quina, aut plura capitella gnaphalio similia pallescentibus strobilus constantia, quos intercurant nigri quidam villi, foraminum vestigia quodam modo e mentientes: radix satis crassa est, nigra, & fuscis aliquot fibris capillata.

Provenit in scopulis summorum Sneberg, Durrenstein, & Eischerberg jugorum. Floret Julio & Augusto.

Ego aliquoties natali solo erutam cum suo cespite in meum hortulum, quem Viennæ habebam, transtuli, & propter elegantiam curare volui, sed inanem operam iussi: permansit quidem interdum in alterum annum, valde autem immutabatur, imò planè aliam esse celsissem, nisi ipse collegissem & in hortulum intulissem.

Leontopodium
Martian.

22. Nullus
mim.

Leontopodium
L. alij.

AFFINIS videtur illi plantæ, nisi eadem sit, quam Matthiolus pto vero Diosc. Leontopodio exhibet. Sed sine dubio Gnaphalij duntaxat genus est.

IOSIAS Simlerus commentario de Alpibus ejus eminit his verbis. Nullum flos odoratus est, folio Pilosellæ, circa supremum cauliculum folia multa imparia, candicante, lanuginosa, medio orbe quinque vel sex flores: inter quos medius plerumque aridus: ex singulis lutei apices emicant: radix arida parva, summo cespite hærens. Tomenti speciem arbitror. Hæc ille.

Leontopodium autem illud nigricantes ex fusco violaceo gestans flores, quod Lobelius in atduis Germaniæ, Italiæq; alpinis, & Baldo Veronenfis inventi tradit, videre non meminî, quippe qui Italiam numquam sim ingressus.

PALMA.



Gnaphalium legitimum.



PALMARES, vel etiam majores habet Primum à Plateau missum Gnaphalium cauliculos, quorum alij surrecti, alij secundum terram inflexi, teretes, villosi, quos indigesto ordine, mollia, incana, latiore infimâ parte amplectuntur folia, extremo mucronata: multa summo cauliculorum fastigio insident capitella candicantia, flavescente lanugine plena: radix crassiuscula est, subfusca, fibris aliquot prædita, quæ an vivax sit, asserere nequeo. Aliquid autem affinitatis habere videtur cum Filagine maiore Dodonzi.

Vnico assurgit aliud genus cauliculo, aliquot ramulis in diversa se contorquentibus prædito, quos hinc inde sepiunt latiuscula, mollia & incana folia: ad ramulorum internodia nascuntur, inter foliorum cogeniem, quina sena, aut plura capitella simul congesta, ex flavo canescètia, multa lanugine plena: radix inutilis, sed deciduo semine, novæ plantæ singulis annis renascuntur.

Priorem plantam desertis quibudam & siccioribus colliculis nascentem aliquando observabam. Alteram etiam in siccioribus (quarum memoria succurrit) agris, præsertim demessis segenibus.

GNAPHALII sive Centunculi generibus quidem adscribi possunt hæc plantæ: sed legitimum censeri nequeunt. Id autem circa

Calpen, Malacam, & Valentino regno, Mediterranei maris litore frequens observabam, dum eas regiones perlustrabam, & multis annis ante, cum Mompelij agerem, toto illo ma-

Euphonia.

Pseudoleontopodium.

Pilosella minor varietas.

Stratiotes lutea flore.

Ratonia.



Stratiotes millefolia flavo flore.



rino littore à Continente, stagnis diffundito, quod ab oppido Aigues mortes vulgo nūcupato, ad Setiū usque procurrit: unde iconem meā manu delinearam, & ipsam plantam siccam cum plerisque alijs elegantibus stirpibus ad meos Belgas deferebam, ipsam etiam iconem C. V. Dodonæo communicabam, cum illius de Stirpibus Commentarios vernaculā Linguā conscriptos, ante quadraginta annos Gallicos facerem. Ea in vernaculam alteram editionem (quæ correctior & audior postea evulgata) fuit illata, deinde in Pétrades: operæ pretium aurem esse duxi illam hīc inferere, ut ejus, à jam descriptis, differentia facilius animadverti possit.)

ΓΝΑΦΑΛΙΟΥ porro apud Diof. brevis est descriptio, cujus folijs albis mollibusq; aliqui, inquit, pro tomento utuntur, & efficaciter illa bibuntur in vino austero ad dysenterias. Quam certè facultatem, aut illi proximam, alias stirpes hoc capite descriptas habere non est dubium.

CETERVM varijs eandem alpium locis invenitur id Gnaphalii genus pedali aut ampliore caule, floribus à medio ad summū usque fastigium inter longiuscula, mollia, incanaque folia nascentibus, quod à Marthiolo Pseudoleontopodium, à Generali verò illa plantarum Histoia, Chrysocome lanuginosa nominatur. Quemadmodū & tritoribus Hūgariz, Stiriz, Austriaz, Moraviz, Bohemiz montanis & collibus berbosis, duo aut tria ejus stirpis, quæ à plerisque alijs & à Fuchsio Pilosella minor appellatur, genera, flore videlicet aut omnino albo, aut purpureo, aut ex albo purpurascente, sive carneo: quæque omnibus editionibus cædis & apertis per Germaniam silvis, atque arenosis tumulis ferè est obvia.

STRATIOTES MILLEFOLIA LUTEO FLO.

CAP. XXVIII.

PALMARI est hæc Stratiotes amplitudine, duobus tribùve ab eadem radice cauliculis, infimā parte sessilibus & fibras subinde agentibus, quibus aliterius Stratiotis & Chamaemeli modo serpunt, ceteroqui radice unica est & dura: cauliculos autem ambiunt folia vulgaris Stratiotis folijs similia, multo molliora, candidiora, & renuius incita: flores summis cauliculis insident in umbellam digesti, aliterius floribus non dissimiles, pauld tamen minores & coloris larei, rām discus quàm foliola in ambitu nascentia.

Crescit Murtiano regno, ubi flores observare nō porui, quippe qui Martio mense istac iter fecerim: sed similem multis ante annis florentem eruam edito loco, & lapidato sterilibus solo secundum cæduam quandam silvulam, cum Avenione Nemausum proficiscerer, Mompelium rediturus, lunio mense, & ex plantis, quæ jam florem abjecerant, æstimare possim etiam Maio florere.

Similis

Similis semine ex Hispaniâ missô mihi nata Viennæ Austriæ anno M. D. XXXV. sed longe elatior & pluribus cauliculis prædita, qui humi diffusi, præter medium qui assurgebat, bras agebant, & folia proferebant non minus incana & tenuiter incisa, quàm modo descriptæ stupis folia, cujus etiam semen ad maturitatem pervenit. Sed subsequenter anni aspera lumen matrem cum prolihus semine natis corruptit.

Istam etiam habebat in cultissimo suo horto, Ill^{mo} Princeps Cattorum Wilhelmus, cum sequentis anni Autumno apud ipsum Castellis esset: ex semine istie collecto, etiam mihi natæ plantæ, quæ anno M. D. XXXVIII. & florem dederunt, & semen, quod deinde Francofurti terræ commissum (nam illo ipso anno Viennæ cōveni) mihi quidem non est natum, sed alij, quibus communicaveram, aliquot stirpes habuerunt.

Dicitur porro Græcis *σπατιαρις* ὁ *χρυσανθελος*, Latinis Militaris: nullum vulgare nomen scio. Poterat etiam ad *αχιλλαιο* Dioscuridis referri, quod luteo flore inveniri scribitur. Verum parum refert, utrum Achilleam, an Stratiotem appellaveris, cum utriusque facultates sint similes, & ad vulnera, ulcera, profluentemque sanguinem ambæ commendentur.

Nomina.

MILLEFOLIUM ALPINUM.

CAP. XXIX.

ELEGANS est etiam hæc plantula, dodrantalem sive palmarem altitudinem non excedens, multis folijs circa radicem statis, tenuissimè incisiss, & veluti è multis minutissimis alatis foliolis constantibus, nonnihil ineanis: candicantes cauliculi, satis crassi, hujusmodi folijs, ipsique minoribus, & tenuissimè incisiss oblit: umbella flosculorum densissima, qualis in vulgari Millefolio, sed dilutiore rubro colore sive carneo nitentium: radix vix à vulgari differt, fibrosa admodum, & summâ tellure serpens.

Millefolium alpinum.

Sponæ provenit in ludenberg & Spital, Stiriz alpihus, atque flores profert Augusto: natalis causa sine istius varietatis, an cultura, nescio.

Natalis

Ab hoc tamen differe visum est, quod in hortis alebamus, cum in Belgicâ viverem, si- mili propemodum flore. Sed & vulgarem circa publicas vias & semitas nascentem sæpissimè flores variantem observavi, ut plurimæ plantæ flore omnino niveo præter discum medium, qui ferè cineræci coloris est, conspiciebat, alix suave rubicundem ferrent, alix medi inter utrumque coloris.

Millefolij in flore varietas

Millefolium rubro colore.

ANNO autem M. D. XCI. multæ Millefolij plâre, quas in suo horto severat præcedente Aurumno Ioannes Myletus Francofurtensis Pharmacopæus, natæ, folijs vulgari tenuioribus, quæ flores dederunt, nō quales expectabat, vid: licet flavos (nam eo loco flavi floris semen terræ commissum mihi referebat) sed rubri coloris, dum primum aperti erant, elegantissimi, qui paulatim senescēte flore elanguescebat, & tandem carni quodammodo coloris evadebat. Hallucinetur sit necne in ferendo, mihi nun liquet. Sin minus, mira sanè metamorphosis.

Millefolium rubro flore.

CHRYSANthemum VALENTINUM.

CAP. XXX.

VNICO plerumque assurgit Chrysanthemum valentinum caule, pedali, rarò ampliore, ramoso: folijs secundum radicem numerosis, deinde temetè & sine ordine per caulem sparsis, multifidis, Stratiotis paulò antè descriptæ folijs pænè similibus, lanuginosis & incanis, quæ degustata salivam cient, & acicula sunt: flos in singulis ramulis unicus, luteus, vel potius auri splendore fulgens, qui que resiccat, multis annis nativum colorem etiam retinet, medio Anthemidis disco sive umbilico major, & sine radiatis in ambitu nascentibus foliolis, odoris nō injucundi: radix unica, candicans, firma, crassiuscula.

Chrysanthemum valentinum.



Valentino tegno ad arborum margines, juxta semitas repertum eruebam, nusquam alibi mihi observatum. Florebat istic Martio.

Natalis.

CHRYSAN-



Nomen.

CHRYSANTHEMVM vocabant Valentinae urbis petitores, longè tamen à Dioscoridis *χρυσάνθεμον* diuetsum, & ad Bupthalmi genera, meo iudicio, potius referendum, nisi quis *αρχάνθου* speciem esse malit. Matthioli tamen Chrysanthemum esse nego, licet id sentiat, qui magnam illam Plantarum historiam, Lugduni expressam, concinnauit: sed ipsum valde falli deprehender, quisquis diligentius utriusque historiam contulerit. Et sanè, magis solidum iudicium in illo viro interdum desidero.

Bupthalmum
Nomenclatura

Ceterùm hæc planta (ne quis fallatur) plurimum à Buphthalmo Narbonensis Provincie, mihi sanè non ignoto, differt: nam id obferuare & eruere memini apud oppidum illud vulgo Aque mortuæ nuncupatum, nonnulli Fossam Marianam (quam aprè, nescio) appellant. Habet autem id Bupthalmum radiatos flores Anthemidi vulgan similes, maiores, medium orbem luteum cingentibus luteis folijs, plerumque subeus nonnulli purpurascensibus aut subrubentibus. Chrysanthemum Valentinum nulla radiata in orbis ambitu habet folia, sed ijs caret non secus ac Chamæmelum illud Chrysanthemum odoratum: tamen tamen valentinum maioribus capitibus sit præditum, non tamen adeo protuberantibus, ut animadvertere poterunt, qui ejus descriptionem minus oscitanter legent, & iconem affabre ad vivum expressam à peritissimo pictore, cum illa exactius conferent. Præterea Chrysanthemum valentinum recto assurgit caule, tenuioraque habet folia: Buphthalmo autem Narbonensi, ramuli plerumque humi fusi, & crassiora sunt folia.

Bupthalmum
Nomenclatura

Quia porro in Bupthalmi mentionem incidimus, vulgare illud Bupthalmum cubitalibus & amplioribus virgis, alatis folijs, flore Chamæmelino majore, auri instar fulgente, frequentissimum est per universam Pannoniam, etiam illam quæ ultra Dravum flumen est, atque totâ Austrâ: me mini & in agris, & secundum vias passim nascens Moguntiaci agro obferuare, cum Viennam, à Cæsare Maximiliano accersurus, proficiscerer: anno autem M. D. LXXIX. in Belgicam negotiorum quorundam causâ ablegatus, in ea Moravia, Bohemique parte quâ mihi iter faciendum fuit, & Noribergensi agro etiam conspiciebam.

Nomen.

Rhizotomæ Austraciæ, mulierculæ (Eubæstetum vocant: Vngari *éké zóm*: Croatæ (quorum uxores eam stirpem triticam utiliter vulneribus imponere asseruntur) *kacchi yscach*, hoc est, serpentis herbam appellant.

Bupthalmum
Nomenclatura
Pannonia
Matthioli

Næc minus vulgare est omnibus apricis collibus, & ficioribus utriusque Pannoniæ & Austriæ graminis campis, Bupthalmum Dodonzi, sive Pseudocellborum Matth. reli. folijs fœ-

Buphtal. Dodon. Pseudoelieb. niger.



Chrysanthemum alpinum 1.

lijis ferniculaceis, floréque Anthemidis, majore, auri fulgore splendente, cujus radices, in-
gras etiam plantas rhizotomi in foro Viennen-
si venales habere solebant, & pro nigro Ellebo-
ro proponebant magno errore, cum iofia duo-
decimum, imò etiam feptimum ab urbe milia-
re (ut superiore libro dixi) legimù Elleborum
nigrum abundè nascatur, & inde còmodè mi-
nimisq; fumtibus inferre potuiffent. Sed cum
ante meum in eam regionem adventum, illis
effet ignotum (oam primus, ut ante dictum est,
illius cognitionem ipsis dedi) nihil mirum fi
receptà confuetudine uterètur: perpauci enim
pharmacopæi hortum alebaor, sed à rhizoto-
mis necessarias in quotidianum ufum stirpes
redimebant. Deinceps tamen, me mooitore,
legitimo Elleboro nigro in pharmacopæorum
officinis uti cceptum est.

CHRYSANTHEMVM ALPINVM.

CAP. XXXI.

ALIA porro Chrysanthemi genera, dum Chrysanthemum alpinum.
Viennæ vixi, in varijs Auftriacarum Stri-
acarumque Alpium jugis observabam, qui-
bus peculiare caput tribuendum esse duxi.

HORVM Primum, multa habet secundum
radicem longiuscula folia, Abfinchio umbelli-
fero, quod infra describetur, similia, crassa, pol-
licari lógitudine, in lactoris aliquot divisa, viri-
dia (in novellis tamen quoddã canices conspi-
citur) amari faporis: caules aliquot palmares,
rarioribus & tenuibus dissectis folijs ornatos,
striatos, in quibus veluti umbellæ denum aut
duodenum luteorum florum, Iacobææ vulga-
ris floris non multum abfimilium, & ejus-
dem odoris: radix crassiuscula est, multiq; can-
dicantibus fibris capillara.

Proveoit in Iudenberg, Spiral, & alijs qui-
busdam Striæ jugis, cum Leucanthemo mox
describendo: eodem etiam re. n. p. ore florens.

ALTERI numerosa proximè radicè nascun-
tur folia, Abrotoni maris folijs respondentia,
dilutiorè vinctatè nitentia, & odore, si teran-
tur, haud ingraro, sapore verò amaricacè & mi-
nimè grato: ex his caules exeunt pedales, mi-
noribus folijs onusti, in aliquot interdum ra-
mosos divisi, qui singulos aut geminos sustinet
flores Chamæmelo vulgari majores, inodoros,
omnino flavos, hoc est, mediù orbem luteum
cingentibus etiam luteis folijs, faris latis: radix
fibrosa & nigricans est, pluresq; à latere spar-
git ramos.

Invenitur in Etſcher, Snealben, Veyzalben,
& celsis alijs Alpium Striæ jugis. Floret Au-
gusto.

CYRTALES Tertio sunt caules, firmi,
leves, ex purpurâ virentes, superiore parte in
aliquor ramos divisi: folia longa, renuiter ad-
modum incisa, Achilleæ Matthioli, sive Abro-
toni maris foliorum æmula, longiora ramen,
crassiora & viridiora, quæ nullum grarum odo-
rem spirant, gustatæque, ingrati faporis prehendantur & amariuscula: flores in extremis
ramis umbellacim dispositi, lutei, Iacobææ floribus fermè similes, sed mioores & inodori:
radices



rem spirant, gustatæque, ingrati faporis prehendantur & amariuscula: flores in extremis
ramis umbellacim dispositi, lutei, Iacobææ floribus fermè similes, sed mioores & inodori:
radices

Chrysanthemum alpinum 11.

Chrysanthemum segetum.



radices sunt fibrosæ candicantes, novôsq; caules è lateribus proferunt singulis annis, qui sum mâ tellure plerumque fibras agunt.

Natalis.

Crescit in Sneberg, & reliquis jugis in quibus Alterum genus invenitur: in hortos translatum feliciter provenit: florêtque lunio, illic autem Augusto.

Chrysanthemum segetum 11.

A d prædictarum autem Alpium radices, in atvis, quemadmodum etiam per univêrsæ Austriæ, Stiriz, Vngariæ, Moraviæ, Bohemiæ agros, quâ quidem me iter facere contigit, inter segetes nô minus frequens est Chrysanthemû illud, Germanicæque Belgicæ vulgare, inter segetes nascens, quod eam ob causam Chrysanthemum segetum à nonnullis cognominatur, folijs Bellidem majorem quodammodo æmulantibus, sed mollioribus & dilutius vitentibus, flore similitet Bellidis majoris, sed omnino flavo, ejus iconem hic adjecimus.

Nomen.

Nô n inceptè ad $\chi\rho\upsilon\sigma\alpha\theta\epsilon\mu\iota$ Chrysanthemî genera referri posse has stirpes aibitor. Nihil tamen statuo, sed has, ut & plerasque alias, rei herbariz studiosis duntaxat propono, ut eorum exquisitam judicium.

CHRYSANTHEMUM CRETICVM.

CAP. XXXII.

Chrysanthemum Creticum 11.

SEd & semine Cretâ misso, nobis nata duo alia elegantia Chrysanthemî genera à nemine hæcenus descripta: quæ cum annua sint, & deciduo semine sponte renascantur, facile suum genus conservant.

Chrysanthemum Creticum 11.

HABET autem Primum cubitales aut ampliores caules, satis crassos, striatos, intus fungosos, in multas alas divisos, & frequentibus folijs brevi petiolo inæqualiter nascentibus ornatos, quæ in varias & profundas lacinias divisa, eas denovo valde dissectas habent: extremis cauli & ramis innascuntur ampliores flores è squamoso capite prodeuntes, duodenis aut pluribus folijs constantes satis latis, flavi coloris, & latiusculum discum ambientibus: flori utcumque odorato succedunt capita è multis inæqualibus longiusculisque seminibus compacta.

Chrysanthemum Creticum 11.

Nô n minus fruticosum minûsve altum est Alterum genus: minus tamen crassos habet caules, fungosos & striatos etiam illos, quos ambiunt folia non adeò dissecta, sed in minores lacinias & rarius incisâ divisa, propius ad Chrysanthemum segetum accedentia: sustinent

Chrysanthemum Creticum.



Leucanthemum alpinum.

sustinent extimus caulis & rami squamata & quasi imbricata capita, è quibus nascuntur flavi flores, totidem quot in primo folijs constantes, angustioribus tamen & medium orbem aureum cingentibus: quibus etiam succedit semen simile, sed aliquantum minus.

Hic non valde dissimilis fuisse videtur ea planta, cujus iconem ab ipso adumbratam mihi mittebat honestissimus vir, idemque diligentissimus stirpium observator, Iacobus Plateau, cum varijs alijs iconibus, quarum potissimam partem in hac mea Stirpium Historia inveni.

LEUCANTHEMVM ALPINVM.

CAP. XXXIII.

HABENT etiam Alpes suas Anthemides: verum à vulgaribus diversas, ut superiore capite xxxi. partim demonstravi, partim etiam ex hoc capite apparebit.

LEUCANTHEMVS porro Alpini folia, prioris Chrysanthemi alpini, paulo ante descripti, folijs non multum dissimilia sunt, nisi paulò magis incisa essent, crassa & succulenta (uti sunt multarum alpinarum stirpium folia, quemadmodum & marinarum) amarissimi saporis, & nullius grati odoris: cauliculi dodrantes, infemi, in quibus singulares flores, chamæmelo majores, luteum orbem ambientibus vicinis aut pluribus albis folijs. Latè se spargit hæc planta Anthemidis modo, & fibrosas radices habet.

Leucanthemum alpinum.

Crescit in Iudenberg, Spital, & alijs quibusdam Provinciæ Stiriac jugis, ubi Julio & Augusto floret.

Natalis.

MULTVM accedere videtur ad eam plantam, quam penitissimus Anguilara describit Leucanthemi Phniani nomine, undecimâ opinione: licet ille suum Leucanthemum odoratum faciat, ego verò in hoc nullum manifestum odorem deprehenditum.

Leucanthemum Phnianum Anguilare.



FLOS ADONIS VVLGO.

CAP. XXXIIII.

HVVS Stirpis non meminisse, quandoquidem & Floris Adonidis, & Eranthemi nomine ab alijs est descripta, nisi viderem illos qui minus scrupulose observant, duas plantas, ejusdem quidem generis, sed colore floris variantes, in unam contrahere.

NAM quam Belgæ describunt, illa ipsa est, quæ in hortis inter coronarias alitur, caulem proferens striatum, in frequentes alas divisum: folia anthemidis ferè, viridia, hinc inde per ramos nullo ordine sparsa: flores in extremis ramis, non magnos, octonis aut pluribus folijs constantes, saturè rubentes & quasi nigricantes instar humani sanguinis. resiccati, multis nigris staminibus aut villis umbilicis cum occu-

Flos Adonis.

Flos Adonis vulgo.



Flos Adonis.

Natalis.

Parthenium alpinum.



Anemone Mompeliensis.

Parthenium alpinum.

cum occupantibus, qui marcescere incipiente flore intumescit & in caput extubescat oblongiusculum, collectum ex multis seminibus rotundis extremâ parte acuminatis, initio virentibus, deinde, ubi maturefcere incipiunt, subfuscis, & facile à summo (primùm) capite defluentibus: radix candida, & raris fibris donata est, nec hiemem superat, sed deciduo semine singulis annis renascitur. Ipsa verò plâta Maio mense florere incipiens, subinde novos ramos proferendo, in Autumnum usque flores producere non desinit.

Hujus iconem Dodonæus & Lobelius in suis Plantarum historijs exhibuerunt, ego etiam eandem hic subjeci. Sed illam nusquam sponte nascentem observavi, verùm in hortis duntaxat cultam.

ALTERA verò similes quidem habet caules & folia, sed dilutius virent, caules etiam rarioribus alijs præditi, folia paulo molliora, nec adeo multifida: flores longioribus folijs constant, & coloris sunt phœnicei, dilutioris etiam quàm sint Anagallidis flores, villis nigris similiter umbilicum occupantibus, in quo statim, vix etiam aperto flore, caput extubescit, in majorem deinde longitudinem excrefcens quàm superioris, illôq; gracilius, semine tamen constans adeo simili, ut neutrû ab altero discerni queat: radix superiori fere similis, quodammodo flavescent in stat radicis summi terræ, sed fugacior alterâ, quemadmodum & tota planta.

Sponte frequentissima nascitur inter segetes, non modò in Gallia Narbonensi, sed etiam per universam Hispaniam: in Italiâ etiam nasci apparet ex Matthæoli Commentarijs, qui ejus quidem iconem exhibet minus scitè expressam, nullam autem descriptionem addit, sed nudam duntaxat Adonis appellationem. Postea non minus frequentem observabam inter segetes etiam in Austria & Moravia, atque sæpius Viennâ semen ejus ad amicos in Belgiâ misi, quod, an illis sit natum, me fugit. Superiore item anno qui fuit nonagesimus primus supra millesimum & quingentesimum, non procul Wormaciâ in agris frumento confitis, Rheno flumini vicinis, Maio florentem conspiciebam.

CVM Mompelij vivetem pro Anemone à studiosis habebatur, & hoc etiam nomine, nosset Lobelius in Adversarijs posuit.

PARTHENIUM ALPINUM.

CAP. XXXV.

MULTIS ex fibrosa radice, Chamæmeli modo, fructicat tamulis, pedalis, viti-dibus, quos ambiunt folia Anthemidi prorsus similia, multiplici incisione divisa, Corulæ, aut Matricaræ fere odore, gustu calido, atamen ingrato: extremis cauliculis multi flores insident umbellatim congesti, Abinthij alpini, quod postea describemus, floribus proximè accedentes, hoc est, exigua capitella ex albo & pallido

pallido commixta, ambiētibus ea senis aut oclonis latiusculis albis folijs, ejusdem enim ipsa herbā odoris: rami sive cauliculi humi procumbunt, & ex unā, uti dixi, radice prodeunt, subinde fibras agunt, & nova germina procreant.

Invenitur in Sneberg, Snealben, & Durrenstein jugis, magnā copiā: florētque duntaxat *Natalis.* Augusto: nam cum in acclivitatibus & circa scrobes nascatur, quas diutius insidere solet nix, serius illud florere necesse est.

Hanc plantam montani venatores *Infser Frauen schwantz kraut* nomine donarunt, ad al- *Monia.* tenus stirpis, de quā postea, differtentiam, quam *Wais kraut* appellant. Ego Parthenium alpinum voco, à Dioscoridei Parthenij odore, ad cujus etiam descriptionem fatis accedere videretur.

Sæpe illam cicurare volui, translati è loco natali plantis cum suo cespite, & in hortum illatis: sed ultra alterum annum non permansit, licet commodo & naturæ ejus apto loco reposuissem, & omni sollicitudine curassem.

PARTHENIUM PLENO FLORE.

CAP. XXXVI.



NIHIL protus à vulgati Martiaciā vel formā, vel magnitudine, differt hoc Parthenium: cubitales enim aut ampliores interdum habet caules, striatos, in multas alas divisos, folia vulgari perquam similia, & multis lacinijis divisa, herbacei coloris, validi odoris, & amari saporis: extremæ alæ plurimos flores candidos, & multiplici foliorum serie constantes ferunt, nullo, aut perquam exiguo in medutillio orbe, quemadmodum Chamæmeli pleni flores, quibus sunt per similes, vel etiam pleniores & candidiores: semen Parthenij vulgaris, secundum, licet aliquoties satum mihi non proveniret: surculis autem certiore proventu feritur, Leucoij pleno flore luteo instar.

Londini in Angliā primū mihi conspecta est *Natalis.* hæc planta, anno salutis humanæ M. D. LXXIX. quam inde Antuerpiam deferrebam: ejus verò iconem & semina adquirebam Viennæ, munere C. V. Riehardi Garthi Cancellariæ Londinensis Primicerij, & viti humanissimi, qui me multis beneficijs affecit: deinde lōgè frequentiore observabā biennio post, cum Londinam, scierorum quorundam negotiorum causā, redijissem, toto illo semestri quo illic hæsi.

Florere incipit Junio, & totā deinde æstate flores proferre non desinit, interdum ad ipsam usque brumam, nonnumquam squamata capita in multa viridia foliola transeunt, præsertim Autumno, è quorum medutillio emicant nivi flores reliquis majores. *Tempus.*

CETERVM valde ferax est Anglia hujusmodi florum multiplici foliorum serie constans, quos an arte & mangonio adquirent, ignoto: nam & Chamæmelum, & Lychnides silvestres, & Primulas veris, & alias pleraque plantas *Anglia florum pl. sil. instantium ferax.* *Welschflur* flore constantes, Belgicam inde primū accepisse constat.

TANACETUM INODORVM.

CAP. XXXVII.

GRACILIBVS, firmis, duris, cubitalibus, interdum verò sesquicubitalibus assurgit hoc Tanacetum caulibus, per quos tara sparsa sunt folia pennata, Tanaceto vulgari non admodum dissimilia, odoris tamen expertus, gustu linguam vellicans & fervido, circa radicem majora atque hirsuta: caulis summo fastigio in aliquot breves ramulos nudos dividitur, quibus insident magni flores, Bellidis majores flori semè æquales, octodenis aut vicenis folijs albis, nunc longioribus, modò brevioribus, mediū orbem flavum, ut in Bellide majore, eingenibus constantes, quibus marcidis, succedit in medijs capitibus longiusculum semen nigrum, quod terræ commissum plantas sui generis producit, & alias etiam non dissimiles, quarum flos est minor, secundo generi par: radix est minimi digiti crassitudine, obliqua, non in altum demissa, nigra & aliquot fibris hirsuta & vivax, quæ etiam pangi possit.

f

Provenit



Natalis.

Provenit ferè in omnibus utriusque Pannoniæ & Austriæ montibus humilioribus, & silvis cædis: ubi floret Maio & Junio, & si Autumno feratur, flores interdum producit sequente Augusto.

Tanacet. inod. 11.

Exit etiam iisdem locis aliud genus, floris magnitudine ab hoc diversum, qui Martiaciæ vulgaris, aut Cortulæ fortidæ florem non excedit: folia etiam minus elegantia, pediculo breviori cauli inhzrentia, nullo etiam odore nisi herbaceo prædita: nullum semen observavi: radix alteri similis, obliqua & multis fibris donata.

Nomina.

An aliquo nomine vulgari prædita sit hæc planta, mihi non est compertum, Tanacetum autem inodorum nescipavi, quia cum nullus manifestus odor in illo percipitur, folia vulgari Tanaceto quodammodo similia habeat. Secundo autem generi similem plantam apud Valentiam Allobrogum observasse videtur Lobelius.

ASSINTHIUM.

CAP. XXXVIII.

Abinthij varium.

PASSIM nascitur per Vngariam, Austriam, & reliquas vicinas Provincias, Abinthium illud majus, quod reliquæ, ut opinor, Europæ familiare est. Inveniuntur tamen alia quedam ejus genera, nulli adhuc Scriptori, ante meum in Austriam adventum cognita, quæ hoc capite describere est animus: prius obiter mentione factâ nonnullorum, quæ vel sponte istuc nascuntur, vel aliunde deventa, in hortis colebantur.

Abinthium Ponticum dicitur genus.

SPONTE autem et elicit non solum multis Pannoniæ, sed etiam Austriæ locis, atque Viennensi agro, cum in saxosis, tum aridis & salebrosis graminetisq; desertis agris, Abüothium illud tenuifolium Aboroni ferè folijs, vulgo Romanum vel Ponticum nuncupari, mira fecunditate radicibus fibrosis & latè serpentibus sese propagans, cujus duo videntur esse genera. Vnum enim planè incanum est, quo potissimum Viennenses officinæ utuntur, tamquam nobiliore, ita enim sibi persuadent. Alterum purpurascens habet cauliculos, folia non adeò incana, sed interna parte viridiora. id à nonnullis superiori præfertur: existimo tamen natales istam varietatem duntaxat parere. Incano congener esse videtur, quod Boissot ex Italia acceptum communicabat anno M. D. XC. & valde celebrabat.

Vngari, cum hoc, tum vulgare majus, communè nomine *tröm* appellant.

In cultissimo suo orto alebat C. V. Ioannes Aicholtzus Medicus & Professor Viennensis, duo Abinthij marini genera, ut è diversis locis advecta, sic totâ facie inter se discrepantia.

Abinth. mar. em. Patavum.

Nam quod Patavio allatum erat, folia habebat molliora, incana, lata, tribus, quatuor, aut ad sum.

Abſinthium Ponticum vulgare.

Abſinthium Auftriac. tenuifol.



ad ſummum quinis lacinijſ diviſa, interdum etiam nullis, ut Artemiſiam folio Lavendulæ quodammodo referrent (à qua tamen differt) ſatis grati quidem odors, ſed amari ſaporis.

Ex Miſinà verò miſſum, mulſtifiſa habet folia, ſucculenta, non minus quàm ſuperioris incana, proximè ad Seriphij, in Belgicæ & Angliæ marinis naſcentis, folia accedètia, gravioris tamen paulò, & validioris, ut mihi videbatur, odors, Seriphij Narbonenſis & Hiſpanici (quod nuſquam niſi in mediterranei maris littoribus obſervare memini) graveolentiam quodammodo referentis, æque etiam ſaporem.

Abſinth. marin. Myſin.

ACCEDIT aliud pumilum Abſinthij genus, vix palmi altitudinem ſuperans, tenuibus admodum cauliculis, quos circa radicem multa exigua mulſtifiſa tamen & incana ambiunt foliola non injucūdi odoris. Id in ſummis cauliculis quaterna aut quina fert capitula in pal- leſcentes floſculos ut ſuperiorum ſeſe explicantia. Noribergæ alebat in ſicilibus C.V. Ioachimſ Camerarius, ejusdem urbis primarius medicus.

Abſinth. pumilum Camerarij.

CETERVM ad ea genera non vulgaria quæ in Auftriâ & Sciriâ Provinciis naſcuntur, tranſeamus.

PRIMI caulis pedalem altitudinem plerumque æquat, nonnumquam etiam cubitalem attingit, firmus, canefcens, multis folijs, marini Belgarum Abſinthij foliorum quodammodo æmulis, tenuioribus, proſus incanis, quæ confuſo ordine eū ambiunt, præditus, qui ſuperiore parte in multos ramulos, ex tenuiorum adhuc foliorum aliſ naſcentes, diviſitur, plenos floſculorum propendentium corymbis: radix fibroſa eſt, & ſingulis annis novos frequentiores caules producit: tota planta impenſè amara eſt, ſed elegans & rara.

Abſinth. ad. naſc. ſc. Auſtriacum.

Crefcit in collibus & apertis quibuſdam locis Viennenſi urbi vicinis, æque à rhizotomis, promiſcue cum eo, quod vulgo Ponticum appellatur, ad Viennenſium phar- macopolarum officinas adfertur.

Natalis.

RARIUM etiam eſt Alterum Abſinthij genus, nec uſquam niſi in Auftriâ Sciriæq. celſiſſimis jugis à me obſervatum. Dodrantalibus autem aſſurgit cauliculis, gracilibus, incanis, in quibus rara & exigua ſunt folia, totà incanà lanugine, & veluti tomento obſita, circa radicem majora, Bellidis majoris folijs non valde diſſimilia, minora tamen, & magis incifa, ſatiſque craſſa, eximie amantudinis: ſummis cauliculis octoni aut plures inſident floſculi in umbellam diſtributi, floribus Achilleæ non diſpares, ſed majores, ſeptenis aut octonis candidis foliolis (medium orbem, ex alijs exiguis floſculis luteo ſtilo præditis efformarum) cingentibus, conſtantes: ſemen deinde quale Abſinthij vulgaris, odoratum: radix nigra eſt, aliquot libris donata, & à lateribus propagines ſpargens.

Abſinth. ad. pin. nubiſ. Sciriæ.

f 1

Iſtud,

Abſinthium alpin. umbelliferum.

Hortus.



Artemisia tenuifolia. II.

Artemisia
tenuifolia. II.Artemisia
tenuifolia. II.

Iſtud, ſub finem Iunij anno M.D.LXXIII. ſuis floribus onuſtum primum obſervabam & eruebam, dum ex Hohenbergerin, per ſumma vicinarum Alpium juga, in Snealben tēdetem, medio ſerē itinere, in ſcopulis præruptis, & in altiffima præcipitia (hortenſco referens) propendentibus: deinde illo ipſo anno, mēſe Auguſto, paulò majore copā in Eſcherberg & Durrenſtein, cum florens, tūm ſemine prægnans, quod cum nonnullis plantulis in Belgicā amicis mittebam, & quibus hæc icon delineata fuit: poſtremò, expreſſā & evulgatā meā Pannonicarum ſtirpium Hiſtoria, unam atque alteram ejus plantam inveniebam in Sneberg præruptis ſcopulis, dum ejus mōtis loca nondū à me adita petuſſetarem.

MONTANI venatores vniſt *Jaunen ranch* & *weſſen ranch* appellāt, ad Parthenij alpini differentiam, ut in ejus hiſtoriā antè diximus. Ego Abſinthij alpini umbelliferi nomen indidi, quia multas habet notas, quæ, ut inrer Abſinthij genera referte debeam, me impellunt.

ARTEMISIA TENUIFOLIA.
CAP. XXXIX.

QVASCVM QVE Regiones peragraverim, nulla fuit, in qua Artemiſiam illam vulgarem cum candidiorem, tum ſubpurpureſcentem & univèſe, ut puto, Europæ familiarē, creſcentem non viderim: verūm & alias qualdam ſtirpes obſervabam, quas ad ejus genera referri poſſe arbitror.

PEIOS altitudine fruticat, vel etiam amplior eſt. Prima, virgis in multos ramos diviſis, quibus adnata folia Abrotoni maris, ex viridi candicantia, amari ſaporis flores ex ſummis ramis, Artemiſiæ modo dependent, cujus autem coloris, mihi non cōſtat: radix lignoſa in plures alas ſinditur. Tota planta odorata eſt.

CRASSA admodum, lignoſa, multiſida, & ſatis multis fibris minoribus donatā radice cōſtat. Altera: ex qua plures rami ſpargūtur, humi plerumque ſuli, interdum etiam rectā aſſurgentes, lignoſi, duri, & in his multi ante hiemem nodi naſcentes, & quibus folia emergunt multiſida & tenuiter incifa, Abrotoni maris folijs propè ſimilia, candicantia, ſaporisq; non admodum ingrati, ſed poſtea ſalivam aliquantulum cientis. Inter hæc, ſubſequentis æſtatis initio, tenues vimineæq; prodeunt virgulæ, purpureſcentes, multis ramulis ejusdem coloris præditæ, & tenuioribus, jam modò dictis, folijs ſeptæ, qui parvis veluti corymbis propendentibus onuſi ſunt, Abrotoni maris, Artemiſiæve, aut Abſinthij inſtar viſcentibus, interdum purpureſcentibus, qui explicati, ex purpuratā candicantem oſtēdunt ſcoſculum Auguſti initio, nonnumquam etiam Septembri.

TERTIA ſimili pænè modo creſcit, ſed ut plurimum teſtioribus eſt virgis, iſſicque magnā ex parte ſingularibus, ſitmis, lignoſis, purpureſcentibus, & in ramulos ſimili colore donatos diviſis, folia licet ſuperioribus respondeant, minus tamen incana ſunt, ſed potiùs ex viridi atque purpureo nigricant: tenues ramuli, Sextili menſe, ſuis corymbis, purpureſcentibus ut plurimum;

rimum, onusti conspiciuntur, petinde ac in secundo genere: quo tempore, totus caulis nudus, & suis folijs marcidis orbatu conspicietur.

PRIORUM duntaxat videbam nonnulli Bæticæ locis, & Granatensi Murrianôque regnis, locis declivibus, interdum juxta fluentia, nonnumquam secundum vias, superioris anni flosculos è ramulis dependentes retinentem. Secunda & Tertia passim nascuntur secundum semitas, aridis salubrosisque locis Ungariæ, Stiriac, Austriac, Moraviæ, Bohemiæ, etiam ad Viennensis urbis vallum & fossas, nonnumquam in vetustis muris & ruderibus, præsertim Tertia, quæ etiam nusquam non occurrit locis aridis & incultis per universam Hispaniam, Lusitaniam & Galliam. Crescit & circa Francofurtum, & alijs quibusdam vicinis locis.

AN commodè ad *Ἀρtemίσια λεπτόφυλλον*, Artemisiæ tenuifoliam Dioscoridis hæc stirpes referri queant, petitionibus dispiciendum relinquo. Prior quodammodo ad ejus historiam accommodari posset, quia odorata est. Aliæ, odore carent, aut, si quem habent, is valde tenuis est Tertiæ, etiam ingratus, quem admodum & sapot.

PRIOR Granatensibus Abrotoni nomine donata erat, nonnulli *Bæta* vulgari appellatione nuncupabant. Secundæ nullum vulgare nomen intellexi. Tertiæ, Salmanticenses Ambrosiam vocabant, cum qua tamen nullo modo convenit. Mompeliæ Artemisiæ tenuifoliam appellare solebant. Ungari *Seppen fia*, hoc est, scoparum herbam vocant, quia vulgo apud illos, ex ejus virgis scopæ hunt, ob quem etiam usum, nonnulli Austriæ incolæ, præsertim apud Neapolim, vulgari ejus Provinciæ sermone *Tienflabt* dictam, *Desflant* nominant.


DIOSCORIDES scribit Artemisiæ tenuifoliam cum amygdalino oleo contusam, in malagmatis lentorem, & stomacho laboranti impostitam, sanitati testituere, necvotum quoque cruciatibus succum ejus cum rosaceo oleo utiliter illini.

ABROTONVM FEMINA VVLG.

CAP. XL.

EVS stirpis quam vulgus Herbariorum Abrotonum feminam appellat, nonnulli Santolinam vocant, duo sunt geneta, plerisque hortis satis communia.

Abrotonum femina vulg.



VNUM vulgatius, fruticans, & in plures candidos ramos divisum, quos ambiunt tenuia folia, sive potius foliorum nervi, in quibus secundum longitudinem nascuntur quatuor ordines brevissimorum & minutissimorum foliorum, ut tota folia denticulata videantur, incana omnino, amari saporis, & gravis cum suavitate quadam odoris: summis ramulorum fastigio fert interdum capitula (quamata luteos flores continentia: radix crassa est, ducta lignosa, & subinde in brachia fissâ).

ALTERIVS rami etiam candicant, minus tamen frequentes sunt, longiora habent folia, quatuor similiter denticulata ordinibus prædita, initio quidem incana, minus tamen quam in superiore, & quæ tandem omnino virescant, odor mitior est: sapore, radice, cum jam descripto convenit: Flores non observabam.

PRAETER illa autem, in meis peregrinationibus quatuor alia genera observare meminî: unum in Narbonensi Gallia, tria in Hispania.

NARBONENSE multum accedebat ad primum genus jam descriptum: sed longè strigosius erat, & ramosi duores, brevioribus, minusque frequentibus folijs obfessos habebat, colorem etiam inter utrumque medium: Flores in extremis ramulis majores & pallidiores in squamatis capitellis: radix in duos & lignosos ramos divancata erat.

Istud genus à me observabatur anno M. D. LII. Carcasione Mompelium redeunte, cum C. V. Gulielmo Rondeletio, inter Narbonem & oppidulum cui nomen à D. Nazario (quod Rondeletius Narbone divetterat à Nobile quodam viro evocatus) in acclivitate quorundam colliculorum, quæ nobis iter faciendum erat secundum fl. Attacis cornu alterum.

Abrot. fem.
xlii.Abrot. fem.
v.Abrot. fem.
vi.

Natalis.

Nemina.

Tomillo per-
rmo.
Eucalyptus.

TRAIA verò geneta in Hispania nascencia, tamen florum formâ cum illis conveniant, diversa tamen esse, ex illorum descriptione apparebit.

MVLTI ab uno cespice prodeuntibus ramis conflat Primum tenuibus, pedilibus, candidantibus, quos numerosa ambiunt folia Rosmarini coronatâ, sed minora & angustiora, quæ novella incana sunt, & nulla fere incisurarum vestigia apparentia habent: adulta autem, viridiora, longiora, & quasi minutis incisuris distincta sunt, multum tamen à Santolinâ creditur folijs diversa, amari gustus, & jucundi odoris: multas à singulis tamis producit virgulas palmares, raris folijs septas, atque in summo earû fastigio capitella florentemque luteum Santolinâ multo ampliorem: maturo autem femine, marcescunt hæ virgulæ: radix est lignosa.

ALTERVM, flore, folijs, denique totâ facie, Primo simile: sed per omnia minus & gracilius: quod natalibus tribuendû non est, quandoquidem uno, eodemque in loco simul nascentes plantas invenerim, neque etiam ATARI, quia utraque species, ex seminibus natali loco seorsum collectis & repositis, & mecum in Belgicam delatis, mihi nata est, magnitudine & exilitate, una ab altera non minus discreta, quam natali solo fuerat.

ILLI magnitudine par est Tertium, interdum etiam paulò majus: ramuli non ut in al-

tero candicantes, sed vitides: folia etiam viridia, & longiora, tenuiataque, non minus quidem amara quam illa, sed minus jucundi odoris: flos pallidus, virgæ quæ florem sustinebant tenues, maturo femine etiam arefcebant, ut in superiore: cujus radici hujus radix etiam respondet, sed magis fibrosa est.

Nascuntur Salmanticensi agro, montibus Segobizæ vicinis, quos el Puerto de Guadarama vocant, & veterem Castellam à nova separant, alijsque asperis & salebrosis Hispaniæ locis. Florent Maio & Junio: semen maturum Julio. Omnes autem hæ plantæ perpetuo sunt folio: vi. genus etiam nunc in horto alo.

DVO illa prima genera quidam Chamæcyparissum Plinij esse censent, potius à formâ & vulgati Belgicâ appellatione (Cypariss enim illis dicta) ut existimo, quam aliam ob causam: nam cum Plinius nullam ejus historiam describat, sed paucas ejus facultates duntaxat enumeret, certi quidpiam statui vix potest. Legitimum etiam Abrotonum feminâ esse nequit, cui folia tenuiter incisa, Scitiphij modo, tribuit Dioscorides. Salmanticensis quidem Hispanica geneta Abrotonum feminam appellant: sed vernaculâ linguâ, totâ Castella veteri, *Tomillo perruno*, hoc est, Thymum caninum, dicitur.

EARVM decoctum istuc aiebant utiliter propinati ad scabiem profigendam: quod si ita est, proculdubio habenda est ratio naturæ illorum, quibus datur.

MATTHIOLVS scribit istius folia sicca, & in pulverem trita, dati perquam utiliter ex aqua parthenij, semidrachmæ pondere, ad sisteda alba feminarum profluvia, si continuis decem diebus aut plurius fumantur à jejunis: & deinde interpolatis diebus.

PLINIVS Chamæcyparissum herbam ex vino potam, contra venena serpentium omnium, scorpionumque pollere testis est.

SALVIÆ GENERA.

CAP. XLII.

QVVM ab omnibus, qui de Plantis scripserunt, Salviæ historia sit tradita, supervacaneum censebam de illa scribere: tamen multa ejus geneta in meis peregrinationibus observaverim, latifolium videlicet & angustifolium, quod sponte in Hispanijs uberrimum crescit, & nunc in omnium hortis colitur cum latifolia Salvia folio vitidis eoque crispo vel non crispo, purpurascens, versicolore, & eo latifolio, quod in Austria primum observabâ candidis floribus, ejus semen istuc in Belgium amicis mittebam: quo nata plantæ.

Chamæcyparissum Plinij.

SEIN quia duo genera diversa femine à Creta misso, nobis & amicis sunt nata, de ijs ut agerem, operæ pretium esse existimavi.

PRIOR

Salvia Cretica pomifera.

Salvia Cretica non pomifera.



Salvia Cretica angustifolia.



ALTERAM, quæ & Angustifolia, nascentem non conspexi, sed ejus iconem vivis coloribus depictam ad me misit diligētissimus, & in Plantarum cognitione egregiè versatus, Iacobus

PRÆTER Salvia, quæ latifolia & pomifera, nata est semine à Creta misso à C. V. Honorio Bello Medico. Fruticacea alacris Salvia modo in multos ramos sparsa, quadrangulos initio & densa lanugine obritos, qui deinde in lineam substantiam transeunt, istam quadraturam amittunt, teneriores autè rami retinent, densioresq; lanugine sunt obiti: folia ex adverso, alternis nascuntur, semper bina, infernà parte valde lanuginosa, altera, viridia, & veluti attrita, Salvia latifolia foliorum instar, appendices utrimque secundum pediculum habentia, & veluti aurica, nonnumquam etiam appendicibus carentia nec tam ampla ut in latifolia vulgari, nec etià adeò angusta, ut in vulgari minore, quæ aurica habet folia: extremos ramos ambiunt verticillatim semini & plures caliculi, in quibus flores, vulgaris floribus formâ quidè similes, sed coloris ex albo purpureo: quibus cadentibus, semina nascuntur in caliculis terna aut quaterna, crassiora quàm in reliquis Salvia generibus, & illos ita replèti, ut quasi baccæ appareant. Totius plantæ odor paulò vehementior quàm alacris Salvia.

Salvia Cretica pomifera h. flor.

In Cretâ baccas, seu poma (quæ dicitur quædam excrecentiæ sunt) fert uncialis interdum magnitudinis, multâ lanugine obita, orbicularia, qualia ex Ægypto olim accipere memini, & ab Honorio Bello à Creta accepta, in propositâ tabellâ exprimi curabam Sed in hac provinciâ, utpote nimis frigida, nulla adhuc tulit.

Jacobus Plateau, ejus frequens in hac meâ Plantarum Historia mentio. Nata autem illi erat semine à Creta insulâ accepto.

*Salvia Crm.
stegiofolia.*

MULTOS porrò statim à radice profert ramulos, lignosos, ex fusco subrubentes, quos alternis bina semper ex adverso ambiunt folia, longè angustiora, quàm in ullo *Salviae* genere, in ambitu nònihil interdum crenata, seu crispâ, quorum sinu alij pusilli ramuli prodeunt: medius caulis in spicam purpureorum florum desinit, nullis intermixtis foliolis: radix dura, lignosa, in ramos divaticata. Quo tempore floruert, & an semen tulerit, nihil mihi ab eo significatum: sed ramis, aliorum *Salviae* generum instar, illam pangi posse, verisimile est.

STOECHAS.

CAP. XLII.

Stoechas longioribus ligulis.



Stoechas brevioribus ligulis.



*Stoechas
galeae.*

BREVEM stipitem habet *Stoechas*, ramos autem interdum cubitales, fruticosos, duros, lignosos, semper ex adverso nascentes, quos stipant numerosa folia, sibi invicem etiam semper opposita, incana, *Lavendulae* instar, sed angustiora & minora, amata & calida: extremi rami in quadrangulas virgulas desinunt, nudas, quæ capitula sustinent longa & angusta, nonnumquam breviora & crassiora, multis veluti squamis compacta, è quibus minuti prominent flores, *Lavendulae* fere, saturationis tamen coloris: summis e capitellis emicent veluti membranaceæ quædam ligulae, coruleo aut purpureo colore præditæ, admodum longæ interdum, sæpius breviores, præsertim in Hispanijs: semen in capitellis latet per maturitatem læve, exiguum, fuscum, quale fere *Lavendulae*: radix lignosa & multifida.

*Stoechas tri-
phylla.*

GENUS Alterum *Stoechadis* valde ratum mihi observarum, ejusdem cum superiore altitudinis, lignosis, fragilibus, tenuibus, quadrangulis ramis: folijs etiâ oblongis, angustis, omnino serratis & crispis, parte supernâ virentibus, infernâ cædis, calidi & amari gustus: ejus extremi quoque ramuli desinunt in dodrantes virgulas, nudas, quadrangulas, incanas, quæ spicam sustinent *Stoechade* longiorem & ratiorem, ad *Lavendulae* minoris spicam prope accedentem, è multis similiter veluti membranaceis squamis congestam, eum eminentibus in summo quibusdam latiusculis foliolis è purpurâ cæruleis, uti in superiore: flores ex singularum squamularum sinu copiosi, purpurei ut in præcedente: semen etiam simile, quemadmodum & radix.

Natalis.

Crescit *Stoechas* plurimis Hispaniæ, Lusitanæ, & Galliæ Narbonensis locis. Floret istuc Aprilis & Maio, non numquam etiam Autumno.

Secundum verò genus non nisi in summâ Calpe sponte nascês, & suis floribus onustum Februario mense inveniebam cû plurimis elegantibus plantis, tribus antè mensibus primùm mihi

Stœchas crispo folio.



Lavendula multifido folio.



etiam appellat. flores: cujus aliquot genera in Noricis, Surtz, Austricæ jugis observabam, ab alijs (quod sciam) nondum descripta.

mihî conspectum Scintzæ in Regiæ arcis hortulo, quatuor supra Vlyssiponem leucis, floribus & semine plenum.

Στίζακς κρίσος Græcis dicitur, Latinis Stœchas, Hispanis *Cantueso*, Salmanticensibus autem qui sunt in medullio ferè Hispaniæ, apud quos abundantissimè nascitur locis incultis, peculiariter *Tomillo*.

Secundo generi, serrati vel crispî folij cognomen addi poterit ad alterius differentiam, Lusitani *aluchrin francês*, id est, Rosèmarinum Gallicum vocabant: nam pleraque peregrina Francici vocabulo designare solent, non secus ac Germani suo *Witkeher*.

Hvis facultates non intellexi: verùm cum ejusdem cum priore sit temperamenti, similes etiam vires obtinere, verisimile est.

ILLVS porrò decoctum, hyssopi modo, ad pectoris vitia efficax esse Dioscorides testatur, antidotis misceri, viscera omnia ab obstructionibus & sanctu liberare. Addunt recetiores, ejus flores ad versus capitis dolores, & omnes ex frigida causâ morbos, valde utiles esse.

LAVENDULA MULTIFIDO FOLIO.

CAP. XLIII.

PRÆTER Lavêdulas vulgares, quarum una brevior est folio & spicâ: altera verò longiora habet folia, longiorémq; & inflexam spicam, florem nunc cæruleum sive purpureum ferentem, modò etiam albû. Invenitur aliud genus rarum admodum, & à nemine ante descriptum.

CYBITALI interdum altitudine id affurgit, quadrangulis & hirsutis ramulis, quos multitudine tenuiterque incita ambiunt folia, lanuginosa, cinereique coloris, acris gustus, & jucundi odoris: flores in summis virgulis quadrangulis, nudis & lanuginosis, spicæ instat, ut in Lavêdulâ, congesti, cæruleo colore præditi, odorati: spica autem aliquantulum contorta est, & in quatuor veluti vertus aut ordines digesta, alia interdum ex alia nascens: radicem habet duram, lignosam, & multis ramulis donatam, quam vivacem esse, facili mihî persuaserim.

Nascitur circa Malacam Boeticiæ urbem, ubi illam primò inveniebam, colle quodam illi urbi vicino, Februario mense florentè, deinde circa Murciam Martio mense, nec usquam alibi.

Neque hujus facultates sunt mihi compertæ. Cùm verò ejus odor multò mitior sit, & minus caput feriens Lavendulâ, præsertim eâ cui brevior spica est: credibile est, ejus potentiam & vires, eodem caloris gradu, quo illa est, non consistere.

VERONICA BRECTOR.

CAP. XLIIII.

IN spicam congesti sunt etiam ejus stirpis quam vulgus Herbariorum Veronicam re-

CYBITA.



*Veronica ere-
ctior latifol.
& major.*

CVBITALES proferunt caules Primum, interdum etiam ampliores, non valde ramosos, certè quàm rarissimis alis, sed multis nodis, præditos, folia contrariis inter se petiolis ad singulos nodos nascentia, duas aut tres uncias longa, unam lata, crassa, ex atro viridia splendètiaque, raris & vix conspicuis crenis serrata, gustus admodum adstringentis & exsiccantis, deinde acris: summo caule spicatum erescunt multi conferti flosculi, Veronica rectæ dictæ flonibus forma similes, sed colore paulò dilutiores, ab infimâ parte spicarum explicare se incipientes, quemadmodum Teucrij flores, & alij plerique qui spicæ in modum cõgesti nascuntur: semen in planis vasculis continet, exile, fuscum: radix crassa est, multique fibris donata, singulis annis novos ex lateribus caules producent.

1. Est alia huius species cubitalem alnitudinem non excedens, multique in summo caule ramis prædita, cujus folia superioribus non minùs ampla & crassa sunt, sed neque splendent, neque adeò atra sunt.

3. Conspicitur & tertia species, secundè nò valde dissimilis, cujus folia evidentioribus crenis serrata sunt, ramulique oblongiore florum spica præditi, in reliquis conveniunt: utrique sapor idem qui in priore.

*Veronica ere-
ctior angu-
stifolia.*

FIBROSA etiam est Alterius radix, lateribùsque se propagat, novos singulis annis stolonnes promens cubito non minores, tectos, virides, veluti nodis aut geniculis distinctos: folia in singulis nodis bina ex adverso nascentia, oblonga, ejus Lythimachæ quæ cæruleum fert florem pænè similia, sed crassiora, & in ambitu minus serrata, gustu primùm adstringente & ingraro, postea acriscululo: summi rami in spicas desinunt cæruleorum flosculorum simul congestorum, quatuor foliolis constantium, in quorum umbilico duo staminula cum exiguo stilo: semen in bifidis vasculis, planis quidem, sed aliquantulum tumentibus & pulveratis exile admodum, & rufum.

2. Habet etiam secundum hoc genus alteram speciem, cui media sunt inter utròque genus folia, hoc est, isto tamè angustiora, caules minus ramosi, dilutiorq; florum spica: sapor quidè adstringit & exsiccatur, sed non adeò vehementer ut in primâ specie.

Natalis.

Invenitur utròque genus cum suis speciebus, in multis Pannoniæ silvosis montibus, gaudetque umbra: Steriacarum verdè, & Aultriacarù Alpium radices, omnes species alunt. Florent Julio, aliquando etiam Junio, in hortis præsertim: semen Augusto & Septembri maturum est.

*Veronica fru-
strum.*

PEOALIBVS est fusculus Tertium genus, duris, lignosis, lentis & flexibilibus, humi sparsis & diffusis, ac veluti cinctis frequentibus nodis, unde ex adverso semper utròque ramuli nascuntur



Veronica recta minima.



enascuntur virentes, in quibus bina inter se opposita foliola, viridia, crassiuscula, splendens, longiuscula, & minutis crenis serrata, amari saporis: extremis ramulis seni aut octoni insident folioli, ex alarum sinu prodeuntes, quatuor, ut plurimum, interdum quinque foliolis constantes, cærulei coloris elegantissimi, pallente umbilico, & rubro circulo eum ambiente, unde duo staminula prominent, & ex medio veluti umbone stylus muscæ proboscidi ferè similis, semen in latioribus majoribusq; vulgari veronicâ vasculis, & compressis, exiguum, planum, fulvescens radix lignosa, & multas fibras spargens: quin & ipsi furculi proximè radicem, atque etiam longius à radice (si paululum terrâ operiantur) ad singulos nodos fibras & radices agunt.

Provenit hoc in Sneberg & alpestribus Stiriz jugis, ubi lunio floret: at in hortis etiam Maio, semen lunio ad maturitatem perducit.

Non dubium est, quin priora duo genera, ad Veronicæ vulgo vocatæ, præferim quæ recta cognominatur, sint referenda. Tertium, si quis inter Teucria potius recensere malit, non magnopere refragabor. Nullum verò vulgare nomen hæcenus intelligere potui.

Stalder.

CERTARVM Veronicæ vulgaris eam rectæ, tum supinæ, maxima in Pannonijs, Sciriâ, Austriâ infra Anisum, & Moraviâ, est copia: nec ullæ sunt eæduæ silvæ, nulli aridiores colliculi & aggeres, qui alterutrum non alant.

Veronica vulgaris.

Illius verò, quæ recta cognominatur, duæ species inter se discretæ inveniuntur. Nam altera

Form. vulgaris.

recta.

altera maior est, latioraque habet folia, & longiorem florum spicam: altera minor, gracilior, breviorémque caulem, angustiora folia, minorémque spicam. Vtriusque iconem etiam hic subiecimus.

Veronicez autem species C. V. Fab. Col. ad Alyssum Diosc. referendas putat.

TEUCRIUM.

CAP. XLV.

Teucry vulgaris.

ALIIQVOT stirpes varijs in Provincijs observabam, quæ, meâ opinione, plurimum ad Teucry historiam accedunt: quas quia à nemine descriptas videbam, optet pretium me facturum arbitratus sum, si earum descriptionem meis observationibus infererem, initium faciens à raro quodam genere quod in Hispanijs mihi occurrat.

Teucrium vulgare fruticans, sive t.

Teucrium fruticans Baticum, sive tll.



Teucrium vulgare.

Teucrium autem appello vulgo receptâ opinione, plantam illam siuticantem fragilibus ramis, quadrangulis, quæ folia fert secundum nodos bina semper inter se opposita, latiuscula, crassa, in ambitu Chamædryos instar incisa & quodammodo sinuosa, supernè viridia & splendens, infernè canescentia, jucundi (si terantur) odoris: flores in summis ramis spicæ ferè modo digestos, majusculos, hiantes instar florum Chamædryos repentis, nullâ ramen galeâ reclusos, coloris ex albo pallescentis: tamen si postremò descriptæ in hoc capite, propius forsitan ad Dioscorideam Teucry historiam accedant.

Teucrium Creticum.

Hic non valde dissimile est Alterum genus, semine natum, & duntaxat mihi observatum anno M. D. XCIII. nam perinde ut illud in fruticem assurgit, ramis tamen tenuioribus & incanis, quos ambiunt per intervalla bina semper folia contrario situ nascentia, Teucry quidem vulgaris folijs formâ similia, sed inferne magis incana, supernè minus virentia & splendens, atque etiam minora: flores ex singulis foliorum sinubus prodeunt utriculus inclausi quaterni aut seni, floribus Teucry vulgaris formâ non dispares, nisi paulò minores essent, & colore purpureo: semen nigrum rotundum. Tota planta odorata est.

Teucry Baticum, sive tll.

Mittebatur semen Creta Chamædryos majoris appellatione. ILLIS autem prioribus duabus stirpibus, valde affinis est frutex ille, quem in Batica observabam, proinde à me Teucrium Baticum appellatus, qui licet humanâ interdum altitudine assurgat, plerique tamen humilior est, ipso scilicet minime digiti crassitudine, candicante cortice obducto, & in aliquot ramos diviso, qui tali serie digesti sunt, ut bini perperuo sint invicem oppositi, quemadmodum in superiore, incana: folia præcedentis semine, majores paulò, in ambitu nonnulli sinuosa (quod pictor non expressit) ceterò à parte omnino

omnino incana, internâ verò ex atro virentia, non tamen splendens ut in primo genere, gustu perquam amaro: flos candidus est, labris inferne prominentibus, nulla galea superius imminente, aliquot oblongis staminibus sive villis ex medio flore exsurgentibus. Perpetuo viret, non secus ac vulgare Teucrium.

Montibus circa Calpen, ad Herculeum fretum, & Bæticæ maritimis, in sepibus & inter alios frutices inveniebatur: tum etiam Gadibus, eâ parte qua continenti recens conjuncta tum erat insulaponte admirabili, vulgo *Puente de Cuaça* dicto, sed humiliorē, quàm commemoratis locis. Florebat Februario.

Teucrium 1111.

Teucrij 1111. tertia species.



CYRTALES atque etiam ampliores habet Quartum caules, admodum frequentes ex una radice prodeuntes, quadrangulos, subhirsutos, nodis distinctos: folia Chamædryi ferè paria, aut illius folijs quæ à nonnullis Sacra herba exilimata est (de qua ad sequentis capituli calcem) similima, bina semper inter se opposita, per ambitu serrata, amari saporis summi caules in aliquot ramos dividuntur, gestantes oblongam spicam florum caeruleorum quatuor folijs constantium, quorum, quod superiorem partem obtinet, latiusculum semper est, venisque distinctum, duobus intus staminibus & stilo, qui marcescentes integri desiliunt: capitella deinde bifida, plana, ut in Veronicæ generibus, exiguo semine plena: radix fibrosa admodum est, & vivax, quotannis novos caules producens, qui infimâ parte secundum matrem fibras etiam agunt, & sese propagant.

Crescit in omnibus collibus & montibus Pannoniæ, ejus etiam quæ ultra Dravum est, Austriæ, Moraviæ plerisque & Bohemiæ, petrosis (herbosis tamen) locis, & inter frutices.

Illius genus invenitur inter vepres, non minoris longitudinis virgas ferens, tenuiores tamen humique diffusas, adeò frequentes, ut magnos cespites interdum late tegan, minori- bus folijs & dilutiore flore.

Tertium præterea in herbosis collium jugis paulò humilior, angustioribusque folijs, in cæteris aliis cum illis conveniens. Florent tres hæc species Maio: Prior & Secunda etiam Janio & Julio.

MULTA statim à radice fundit Quintum virgulas, dodrantaes, purpurascens, humiliorumque, quas alternatim bina semper ex adverso sita, amplectuntur sola, Chamædryos folijs forma & colore similia, & eodem modo per oras serrata, minora tamen, gustu linguam exsiccante, deinde amarulesculo: summa virgula in ramulososque, numerososque

Teucrium v.



Natalis.

Teucrium vulgare
dicunt flores.Teucrium
pennicum.Teucrium
maritimum.

Tempus.

Hominis.

Pauis.

merosos flosculos in spicæ formam nascentes gestant, quatuor foliis constantes, eo, quod superiorem floris partem occupat, reliquis majore & latiore, cui circa umbilicum duo staminula inhaerent, aliusque è medio umbilico protuberat, integri deinde flosculi, qui sunt aut cærulei coloris saturatissimi & elegantissimi, aut dilutiores & quasi cineracei, sponte decedentes, quemadmodum in Terio, siliquulas relinquunt planas, exili subrufo semine plenas: radix etiam valde fibrosa & vivax, singulis annis, ut Quarta, novas virgulas producens: quin & ipse virgulae nonnumquam secundum radicem fibras agunt.

Nascitur omnibus fere siccioribus agris ineultis, herbosisque aggeribus & colluculis, secundum vias publicas infectioni Austris, praesertim Viennensi agro, & apud Neapolim vicinam urbem loci naturâ munitissimam. Floret Maio.

Vnicam hujus generis inveniebam plantam anno M. D. LXXIX. ad radices Monsis pago Glanfeld imminentes, secundo à Neapoli jam memoratâ miliari, quæ flossem ex carne candicantem haberet, circa umbilicum carnei coloris venis distinctum, & ejusdem coloris stamina & stilum.

At in summo Etcheri jugo, nec usquam alibi, Sextum quoddam genus observabam pumilum admodum, semipalmatis virgulis quadam lanugine pubescentibus, quas bina, semper inter se opposita, vestiunt folia minoris Chamædryos folijs satis respondentia, inter quæ summus virgulis oblongiusculi nascuntur è barbatis caliculis flores, à superiorum formâ diversi, concavi enim sunt, extremis oris lacinia, latiores, cærulei tamen etiam coloris, è quibus duo staminula cum longo stilo exeunt: defluentibus integris flosculis, succedunt erassiores & majores siliquæ, exiguo semine plenz: radix etiam per summa serpit, tenuibusque fibris prædita est.

Hujus generis & aliam plantulam postea inveniebam in summo Sneberg jugo, quæ instar minoris illius Gentianæ vernæ elegantis, ex eodem radicularum capite, breves tam musculos in ambitu fundit humi recumbentes, & sustinentes quaternam aut sena foliola, alternis quidem sibi opposita, sed adeo arctè congesta, ut eodem exortu nasci videantur, quorum forma superioris folijs valde respondet, sed longè minora sunt: inter hæc cauliculus exilit uncialis, nudus, gracilis admodum, summo fastigio binos, inter duo minima foliola, prodeuntes flores sustinens, satis amplex, Quinque generis floribus formâ similes, cinerei coloris, qui etiam integri defluunt, ipsæ succedunt majuscula quàm in illo loculamenta.

Florēt ambo Julij initio, prioris semen maturum Augusto, quo mense etiam alterius maturefcere verisimile est: ego plantulam florentem & loculamenta adhuc inanis habentem legebam.

ΤΕΥΚΡΙΟΝ Græcis, Teucrium Latinis dicuntur hæc plantæ, aut eo nomine donari possunt, præsertim quartum genus cum suis speciebus, & quicquid. Nam Dioscorides Teucrium herbam esse ait, virgæ referentem effigiem Triflaginis similitudine, quam & Chamædryn à nonnullis appellari scribit: cui etiam Plinius suffragatur. Dodonæus 1. Chamædryn affubgentem vocavit. Nullum autem vulgare nomen istarum stirpium intelligere potui.

Dispicendum verò an Tertium genus ad Pædæota herbam, cujus Pausanias in Coniathiæc meminit, referri possit. Nam illic, Pædæoris folium minus quàm Efeulii, quæ majus quàm Illic esse refert, figuram illi inesse querni folij, atque alterâ parte nigricans, alterâ album, ejus color folijs Populi rectè comparari possit: cerne nostræ stirpis folium aversâ parte incanum, populi alba folij alteram partem candore valde imitatur. Nihil statuo, sed proficius ista considerandi ansam studiosis duntaxat præbeo.

ΤΕΥΚΡΙΟ porro, Dioscorides has facultates tribuit. Recens cum poscâ, aut aridi fere vasti jus, potu lienem potenter absumit: hæmorrhia cum aceto & ficiis illantur, nec in serpentium moribus ex aceto solo, sine ficiis.

CHAMÆ-

AFFINES sunt Teucrium & Chamædrys atque adeo affines, ut Veteres, Teucrium etiam Chamædryn, contra, Chamædryn Teucrium appellarint, propter eam quæ inter utramque est similitudinem: sed nec facultates dissimiles.

CHAMÆDRYS autem, de qua nobis nunc sermo, quæque ferè omnibus nota jam est plurimis regionibus est familiaris: frequentissima etiam in Vngariâ, Sutiâ, Aultriâ, vicinisque Provinciis: nulli enim agrorum paulò eduiore loco sitorum, nulli vinetorù sunt margines, qui eâ non abundant: sed & interdum, secundùm publicas vias, gramineis locis nascitur. Duorum porrò est generum.

Chamædrys vulgaris, sive II.

Chamædrys III. sive montana.



VNA, vegetior & uberior, longioribus, crassioribusque virgis, amplioribus & succulentioribus folijs, longiore florum comâ, maioribusque & dilutus purpurascensibus floribus.

ALTERA, minor, gracilioribus virgis, minoribus folijs, brevior florum comâ, & minoribus saturantibusque rubentibus floribus; vulgarior etiam, ex quâ videlicet in plerisque Angliæ locis, arearum in hortis spatia clauduntur.

Istam candido flore variantem, apud Monasterium Holtzkirche, infra Wirtzburgum, dum Noribergâ Francofurtum anno M. p. LXXIX. proficiscer, mense Julio observatam eruebam.

Omnium autem radix larè serpit, lanugine pubescunt virgæ, quæ humi diffuse, fibras plerumque agunt, & scerata sunt folia.

CETERVM elegans aliud genus invenitur, quod dodrantalibus interdum serpit ramulis, colore ex fusco rubente præditis, duris, lignosis, folijs nullâ serie eos ambientibus, Chamædryos legitimæ folia rescentibus, sed paulò minoribus, & subtus incanis, gustu admodum adstringente & exsiccante: flores illi in oblongis pediculis hirsutis singulares, albi, sex, ut plurimum, interdum etiam octonis aut denis (adeo pro loci natalis ubertate aliquando luxuriat) folijs constantes, Cisti feminæ floris parè magnitudine, multis staminibus in medio præditi, inodori: quibus decidentibus, villosum succedit semen, quale ferè Caryophyllatæ alpinæ aureo flore, libro v. describendæ: radix est dura, lignosa, in diversa tendens, & quibusdam nigricantibus fibris stipata: quin & interdum, humi procedentes & ipsi rami,

Chamædrys quorundam silvestris,

Hætalæ

Nemina.

Herba arvi.

Lentæ montana.

Esamitæ.



Ocimum Indicum.

Chamædrys silvestris.



Ocimum Indicum.

fibras agunt, ut integri nonnumquam cespites eâ tecti conspiciantur.

Frequens est in summis Austriacarum & Sti-riacarum Alpium jugis: floret Iunio, nempe solutis istius nivibus, semen ad maturitatem pervenit Augusto, deinde pediculi omnino exarescunt. In hortos translata (ubi, umbroso loco tenuique solo reposita, aliquamdiu persistit) maturus floret.

GRÆCIS porro priora duo genera χαμαί-δρυς, & χαμαίδριον, à χαμαίς, quibuldam etiam τριξάγον: Latinis Trixago aut Trisago dicuntur: Italis, Quercinola; Gallis, Germandre & Chis-mette; Germanis, Böhngel; Hispanis, Camedrens. Tertiam Gesnerus libello de raris & admirandis herbis, in descriptione Montisfrachi, Herbam cervi ex quorundam sententiâ, ni fallor, appellat: & Iosias Simlerus Commentario de Alpibus, Stimpunt, & Chamædrin alpinam.

AN verò ad Leucadem, quam Dioscorides Chamædryi subjungit, & ejusmodi genera facit, unam speciem, alteram hyssop, hæc referri possit, in tantâ brevitate certi aliquid statuere difficile est. Verum quidem est Leucadis montanæ facultates, nonnullis earum respondere, quas Chamædrys obtinet: nam has illi tribuit Dioscorides. Recentem in aqua decoctam, potu tussibus, indurato heni, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliari; menses eie-re, partus extrahere, huncem ex aceto potam consumere: adversus serpentium venena, ex vi-no, potu, illutūque efficacissimam &c. Leucadi autem, ut ex vino, contra animalium venena, præcipuè marinorum, opituletur.

VULGARIS præterea est totâ Pannoniâ, etiam interamni, Stirîâ, Austriâ, Moraviâ, Bohemiâque, planta illa Teucrij generibus quibusdam affinis, quæ passim in Hispanijs, Galliâ, Germaniâ, Belgicâque herbosis locis nasci conspicitur, flore cæruleo pulcherrimo, folijs penè Chamædryos & ejus nomine aliquando à vulgo donata, atque etiam in usum recepta: quam nunc plerique Chamædryn silvestrem appellant.

OCIMUM INDICUM.

CAP. XLVII.

PLANE novum est hoc Ocimi genus, & fœmine ex Italiâ missum primum in Germaniâ natum, anno nonagesimo supra millesimum & quingentesimum.

IN pedalem autem, vel ampliorem altitudinem assurgit, caule quadrangulo, saturni purpurei, ut plurimum, & quasi nigricantis coloris, interdum ex viridi duntaxat purpurascens, in plures alas, modò in hæc, modò in alterâ parte, ex adverso semper sitas, diviso: ad singulos nodos sive genicula, nascuntur ex adverso ampla folia, duas uncias aut amplius lata, tres longa, petiolis

petiolis longis innixa, in ambitu profundius incisa & serrata, pinguis sive densa, & succulenta, magnâ ex parte ex atro purpurea, interdum purpureis maculis, maioribus & frequentioribus, vel minoribus & rarioribus duntaxat infecta: summus caulis in florum spicam definit palmum longam, ex atro purpurea centem, qui verticillatim per intervalla semi cum ambiunt, hoc est, ex parvorum foliorum alis utrimque terni, coloris (dum explicati sunt) albi purpureis venis distincti: semen in vasculis, quale in reliquis Ocimi generibus, atrum, rotundum, crassiusculum: radix multis capillamentis firmata. Elegans hæc planta est, & tota graviter odorata, ut cetera Ocimi genera, illorum etiam instar huc me perit: novâ igitur singulis annis satione acquirenda.

Floret cum reliquis Ocimis, quorum magna est varietas.

CLINOPODIUM.

CAP. XLVIII.

QUAE sit legitimum Clinopodium Veteribus descriptum, nondum liquet, Necote: ricis diversas stirpes pro Clinopodio proponentibus. Ad ejus tamen genus aliquod referri posse arbitror, quam hic subiiciam plantam.

Clinopodium Austriacum.



DOORANTALIBVS ea est cauliculis, tenuibus, quadratis, duris, geniculatis, quos ex intervalis bina simul ad singula genicula semper ambiunt folia, contrariis inter se pediculis disposita, Sertpylo vulgari ferè similia: sed magis ad Clinopodij vulgo crediti, sive Acini Fuchsj foliorum formam accedentia, minora tamen, & raris crenulis serrata, vicia, non in jucundi odoris, saporis autem aliquantulum acris, sicut firmè jam dictum Clinopodium: flores summis cauliculis ad singula genicula profert Clinopodio vulgari non dissimiles, sed multò majores, purpureo saturo seu violaceo colore præditos (tamen nonnumquam inveniuntur albi) antroforum maxima ex parte propendentes, & conversos: quibus succedunt vascula, quaha in dicto Clinopodio, vètriosa, in quibus terna aut quaterna nigra semina, Calaminthæ aut vulgaris Clinopodij seminibus æqualia: numerosas habet radices, duras & multis fibris capillatas.

Crescit in montibus, Badënsibus rhermis imminuentibus, & ceteris vicinis ad Danubium procurrentibus: varijs præterea alijs locis. Floret Maio, semen lunio maturum.

NVLVM vulgare nomen, apud rusticos illius regionis adhuc invenerat, cum observabam, ego Clinopodium Austriacum nuncupabam, quia in sola Austria inveniēbam: non minùs commodè tamen Acinon Austriacum fortitan dixissem.

ILLVD porò Clinopodium, cujus modò memini, sive Acinos Fuchsj, vulgare est in Pannoniz, Austria, vicinarumque regionum locis aridis.

PASTIM item in cædis silvis, aut inter fruteta, & ad silvarum margines provenit Clinopodium Matthioli: cujus duo genera inveniuntur.

1. Vnum enim clarius est, majoraque folia, & longiora capitella habet, atque illa sæpius in multas coronas disposita.

g 3

2. Alterum

Clinopodium Austriacum.

Varietas.

Natalis.

Nomen.

Clinopodium vulgare.

Clinopodium Matthioli.

Majus.



Minn.

2. Alterum humilius, minoribus folijs, & brevioribus capitellis præditum est. Folia, & quadranguli caules utriusque incanâ lanugine pubescunt, flos purpureus, radix multis fibris capillata serpit. Vtrumque Iunio floret.

Calamentum
maius.

Sunt qui Calamentum inod. tum appellant, tametsi omnino inodorum non sit censendum, quandoquidem interdum odore quodam non ingrato nates perfundat. Non desunt qui Acioon vocare maior, sed Dioscoridis Acini historia refragatur.

Acini.

CETERVM quia in Acini mentionem incidimus, minimè prætermittenda mihi videtur elegans quædam plantula, quam anno M.D.XXI. meo scilicet Iulio florentem in Angliâ observabam, dum commodum navigandi tempus expectans, ad Ill. Dn. de Cobham, Garterij ordinis Equitem, & quinque portuum Præfedium proficisceretur: nullam enim hætenus videre memini, quæ ad alium Acini Dioscoridis historiam meo iudicio magis accedat.

Acini Dio-
scoridis.

PAUCOS habet illa ramulos dodrantales, tenues, siccos, subrubentes, quadrangulares, frequentibus nodis cinctos, ad quos bina semper ex aduerso sita foliola nascuntur, Fuchij Acino non dissimilia, sed minora & succulentiora, neque in ambitu serrata, Clinopodij Austriaci folia valde referentia, grati cujusdam odoris & Botrym quodammodo refertentis, sed non adeo validi & gravis: summos ramulos exornant verticillatim dispositi utriculi, quales in Acino Fuchij, deinde similes penè Bosculi, magis tamen ex ærulo purpureo tincti.

Facultates.

HAS autem facultates Dioscorides suo Clinopodio tribuit. Bibitur herba, & succi ejus decoctum, ad convulsas, ruptas, strangulas, serpentium ictus: menses & partus pellit: & peniles verrucas, quas achrocordonas vocant, eijcit, aliquot diebus potum: alvum sistit decoctum ad tertias, potumque, ex vino, si absit febris, febrem autem lentientibus, ex aquâ.

Acioo verò illas. Menses & alvum pota sistit: illita, paucos, sacrumque ignem sanat.

TRAGORIGANVM.

CAP. XLIX.

DVO Tragorigani genera statuit Dioscorides, quibus binas perfimiles plantas, (nisi iudicium me fallit) in Hispaniâ meâ peregrinatione videre oie mini: deinde tertiam, quæ ad Secundum genus reduci potest.

Tragoriganum l.

Tragoriganum alterum.



Tragoriganum l. altera species.



PEDALI, aut sesquipedali altitudine fructuat Prior, multis tenuibus & lignosis surculis, atque circum illos folia ad singula internodia bina ex aduerso respondentia habet, minora quàm sint Majoranæ folia, mediæ inter Origanum & Seryllū silvestre magnitudinis, omnino incana, odoris jucundi, & acris saporis: flores verticillatim extremos surculos ambiunt, vel illis etiam insident exigui, candidi, semen minutum in caliculis suis occultatum gerentes: radix lignosa multis fibris capillaria. Tota odorata est, & semper virens.

MINORES sunt Alteri surculi & candidiores, tenuiora longioraque folia, aliquantulum incana, acris gustus: odor minus jucundus quàm in Priore: flores etiam verticillatim circa summos ramulos nascuntur ex utriculis prodeuntes, majores alijs & galeati, candidi: semen observare non potui: radix priori similis, lignosa, dura, multifida.

TERTIA, quæ Secundæ genus, neque formâ, neque magnitudine valde ab illâ differens invenitur, surculis tamen nigrioribus, magis hispidis & arsis folijs, arque flore minore, purpureo. Vtraque etiam perpetuò vivet, sed posterior hæc longè odorator, eâ, quæ album florem fert.

Prior multis Hispaniæ locis provenit, arido & petroso solo, eum Stcechade permixta: nunc etiam inquilina facta mulorum hortorum, cùm in Galliâ, tum in Angliâ & Belgicâ.

gicâ. Alterius utramque speciem solo Valentino agro observabam Martio florentem, & sponte nascentem. Quæ verò purpureum florem gerit, in Belgicis hortis mihi etiam postea conspecta, & quibusdam Germanicis, sed vix istic hiemem ferens.

Nomen.

Tragopogon Græcis utrumque genus dicitur: *Tragoriganum* Latinis: Secundum etiam à nonnullis *arpatior*, *Prasium*, quod nomen fortasse secundæ ejus speciei conveniet. Castellani primum *farilla* vocant: quo nomine alterum utrumque vulgo appellant, non intellexi. Non desunt etiam qui priorem plantâ nomen *Clinopodium*: plenique tamen pro Maro habent, aliqui *Helenium* Theophrasti esse augurantur, cujus solû nomen apud illum Austrorem extat inter odoratas plantas cap. 1. & vi. libro vi. Plantarum Histor. Istius semen aliquando communicatum Ill^{mo} Cætorum Principi Wilhelmo, Ambræ dulcis nomine, ex quo natæ ipsi plantæ, quarum unam deinde siccam cum seminis ejus aliquâ parte, Viennam ad me pro suâ clementiâ mittebat.

Facultates.

TRAGORIGANVM aurem excalfacere, urinam ciere, menses trahere, decocto potu bilem ejicere, lienosis ex aceto bibi, & contra ixiæ venena ex vino: peripneumonici, tussientibus, ex melle in eclegmate dari scribit Dioscorides. Gratum ac mitè esse ejus potionem: quare cibum fastidientibus, & stomacho acida ruðanti imbecillique tradit: tumores cum polenta illicitum discutere.

HYSSOPVS SPICATO FLORE.

CAP. L.

Hyssopi vulgaris varietas.

HYSSOPI illius vulgaris qui in omnium hortis alitur, tria inveniri genera, colore flo-
ris duntaxat inter se varianria, etiam horrulani norunt, vulgarissimum, cæreuleo; bi-
na alia, vel niveo, aut rubescente, quæ satione in eum qui cæreuleum fert florem sæpissimè
degenerant, licet nonnullæ plantæ matris colorem adquirant.

Hyssopi minoris.

ALVIT aliquando Belgica aliud genus humilius & tenerius, hispanico semine natum, alioqui formâ non multum differens à vulgari, cæreuleis floribus, quod *hyssopus* vocabant, quia nimirum semen, ex quo natum, tali nomine inscriptum fuisse. An verò id genus istuc etiam nunc alatur, me latet.

Hyssopus angustifol. spicato flore.

Hyssopi tenuiflori.

Hyssopi vulgaris.



NUNC Quintum quoddam genus invenitur, non quidem à me conspectum: sed ejus icon ad me missa (cum tenellis ipsius stirpis ramis spicâ suâ florum onustis) *Hyssopi* spicaro flore nomine, Londino usque, ab optimo viro Jacobo Gareto juniore. Valde autem fruticat hoc genus, nec minus quàm vulgare suis virgis se propagat, quæ sesquipedales interdum sunt, dura, lignosa, in multos, virides, tenuesque ramos divisæ, quos obsident angustiora quàm in vulgari folia, viridia, calidi gustus, alternis & ex adverso inter se nascentia: summi rami desinunt in spicam florum illos verticillatim ambientium, vulgari forma similem, minorum tamen, coloris cæreulei: radix dura, lignosa, multifida, plurimisque capillamentis firmata, ex quâ etiam plures nascentes virgæ humi interdum procumbentes, fibras agunt. Tota planta, si digitis atteratur, odorata est. Similem deinde plantam nactus sum munere honesti & optimi viri Wilhelmi Parduyæ Middleburgensis.

MEMINT & aliud *Hyssopi* genus videre in Angliâ, anno reparatæ salutis humanæ M.D.XXc. vulgari non admodum dissimile, sed quod ad Quartum illud genus hispanico semine natum magis accederet, exceptis ramulis, qui in virgatum fastigium numerosi in latam comam spargebantur: propterea *Hyssopi* comosi appellationem indebam. Id

genus tum temporis Viennam transferre volebam, sed in itinere mihi corruptum.

THYMVM.

THYMVM.

CAP. LI.

Thymum legitimum.



SVFFRVTEX est Thymum, pedem ^{Thymum legitimum.} interdu[m] altus, multus ramis lignosis, tenuibus, & candidis præditus, quos per intervalla ambulant folia sibi invicem opposita, angusta, tenuia, candicantia, acris gustus, quæ quibusdam locis hieme decidunt: nam ubicunque sponte nascentem hanc plantam inveniebam, seu hieme, seu veris initio, folijs viduam conspiciebam: sed utrumque ab exortu & vestigijs foliorum, prominebant veluti oblonga capitella, instar eorum quæ in Origano Oniti sunt, ex tenellis foliolis viridibus congesta, adeo confertis & numerosis, ut unicum longiusculum folium appareret: ipsa capitella cum floribus in planta virente observare non potui, jam enim deciderant, sed illorum duntaxat vestigia summis virgis sive ramulis, in omnibus plantis conspiciebam. Hispali autem, ubi maximus est ejus proventus (nam aliud Thymum non norunt) magni ejus jam resecati fasciculi demonstrati sunt cum suis folijs & longiusculis capitellis suos purpurascences flores adhuc retinentibus, gratissimi odoris: illo enim in aquâ decocto utuntur ad dolia, quibus vinum asservatur, eluenda & repurganda: non minoris etiam usus est ad conciliandam odoris gratiam ijs vasis, quibus conditæ uvæ asservari solent.

Ceterum non modò circa Hispalim ^{Natalis.} copiosè nascitur, sed Gadibus etiam, quâ

parte in sula ponte jungitur continenti, totâ insuper Bæticâ in mantimis collibus meridiei obversis.

THYMVM verdè vulgare, quod nonnulli durius cognominant, quæque, teste etiam ^{Thymi vulg. varietas.} Plinio libro XXI. cap. X. Naturalis Historiæ, lapidei campi in Narbonensi Provinciâ referri sunt: & mediterraneis (quemadmodum Salmanticens[is] agro) & alijs Hispaniæ locis, sponte crescit gracili & salebrioso solo, nunc purpureo, quale in Narbonens[is] Galliâ, & Aquitanicâ, nunc albicante flore.

PRIMUM, Dioscoridis *Thymum* est, Latinorum etiam Thymus aut Thymum, Bæticis ^{Nomina.} *semillo* simpliciter, mediterraneis Hispaniæ ignotum, atque etiam universæ Galliæ. Alterum, Plinij thymum nigrum esse videtur, & illud quod Dioscorides cap. de Epithymo durius appellat: nam in hoc, cum in Hispanijs, tum in Galliâ Narbonens[is], cuscutam illam vulgarem delicatulam rubris filis copiosè nascentem & capillamentis se illi implicantem colligere memini. Castellani hoc thymum *semillo salsero*, aut *salsero* simpliciter: Galli, *du thyme*: Itali, *Thyma*: Germani *Thymus* oder *welscher Quendel* appellant.

DIOSCORIDE autem teste, thymum cum aceto & sale pituitum per alvum detraxit: ejus decocti jus prodest orthopnoicis, & anhelantibus, tinea ventris exigit, menses, partus & secundas pellit, atque utinas ciet: cum melle in celegmate faciliores efficit excretaiones: recentes rumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissolvit: verrucas pensiles tollit cum aceto: ischiadicis cum vino & polenta impositum subvenit: hebetibus oculis in cibo prodest, &c. Pares illi facultates tribuit Plinius: insuper addit, dari comitialibus, quos correptos olfactus excitat thymi: viris contra inflationes cum melle & aceto, & si venter torgeat, testèssæ, aut vesicæ dolor exigit: articularibus morbis & luxatis, tritum ac lanæ inspersum ex oleo imponitur: dant & potionem articularibus morbis trium obolorum pondete in tribus cyathis aceti & mellis.

THYMBRA

THYMBRA legitima.

CAP. LII.

Thymbra legitima.

Thymbra legitima.



Serpillum silvestre Zygis Diof.

Nomina.
Serp. sp.
Serp. sp.
Facultates.

Serpillum silvestre.

Serpillum Zygis.



THYMO subiiciemus Thymbram legitimam, primū mibi conspectam & exactē notam anno reparatē salutis humanæ nonagesimo quinto supra millesimum & quingentesimum, ut quæ mibi illo ipso nata, semine à Doctissimo rei quæ herbarum peritissimo viro Honorio Bello ē Cretā usque missa, ubi Cydoniz Medicam artem exercet.

MULTIS ea ramis statim à radice fructat, Thymi instar, quæ adragulis, subasperā lanugine obductis, purpurascens, quibus innascuntur alternatim semper ex aduerso ramuli, folijs eadem serie digestis onusti, Thymi genuini folijs pene similibus, subhirutis, odoratis, medijs quodammodo inter cunilam & Thymum odoris, acrisculis, saporis: summos ramos verticillatim ambiunt aliquot capitula multis foliis constantia, inter quæ calculi, ē quibus emergunt suauiter purpurascens flosculi, Thymi flosculis similes, in quatuor lacinias diuisi, quarum infima lauior est & repanda, suprema etiam lata, sed brevior, reliquæ dux minores, prodeuntibus ē medio quinque staminulis candicantibus, quorum apices fuscī coloris, & medio stilo bifido. Octobri & Novembri duntaxat flores protulit, eā ob causam nullum semē præbere potuit: ē quo tamen nata planta, pusillum, nigrum, Thymi feminis instar: radix dura, lignosa, quam apud nos perennem futuram, vix mibi persuadere possum, licet rami procumbentes fibras egerint.

GRÆCVM nomen *Thymbrā*, Latinum Thymbra: Cretenses etiam nū hodie *Thymbrā* & *Thymbrā* appellant. Dioscorides eadem illi facultates tribuit quas Thymo, si eodem modo sumatur. Paulus autem, siccare & calefacere in tercio ordine scribit; hinc oleum in quo decoquitur, rigores febriliū circuitu remeantes discurre, flores idem præstare, quorum decoctum menses ciat & sortus extrahat.


SERPYLLVM. CAP. LIII.

SERPILLI duo genera Veteres fecerunt Sativū & Silvestre. Sativum à serpendo dici tradit Dioscorides silvestre non serpere, sed in alium crescere. Plinius contrā lib. xx. cap. xxii. Silvestre serpere scribit: Sativum non serpere, sed ad palmi altitudinem increcere.

SERPILLVM autem silvestre Zygis appellatum, quale Dioscorides describit, observabam, ni fallor, in Castella veteri, ipsdem

Serpillum vulgare repens.

Serpillum Pannonicum L.



ijisdem locis cum Thymo duriore sive nigro, cui perquam simile est figura, ramis, altitudine & radice: folia verò paulò latiora habet quàm Thymum, minus odorata, sed gravius nonnihil olentia, urpote quorum odor ferè sit inter Abrotonum & Stachadem medius: in virgis item ramulos, qui floribus verticillatim nascentibus vestiuntur, coloris ex albo purpurascens: qua florum dispositione & odore, à Thymo di cerni penè duntaxat potest. Minor est præterea ejus acrimonia quàm Thymi, quippe quæ aliquid adstrictioris admistum habeat.

Florat cum Thymo duriore, & perpetuo etiam vires.

CÆTERVM præter hoc, aliud est silvestre, quod vulgariter crescit in omnium quas adj Provinciarum nudis collibus, gramineis campis, aut siccioribus pratis, viarumque herbosis marginibus. Ejus historia cum à plerisque sit descripta, minimè retexendam ducimus: iconem tamen subijcimus, atque tria alia genera mixtim cum illo in Vngariâ, Austriâ, & Moraviâ nascentia, hoc capite describere instituimus, quia ab alijs non esse observata video.

Serp. Hung. vulg.

PRIMUM est admodum simile vulgari in omnibus, ut opinor, Europæ Provincijs occurrenti: crassiora tamen & magis atra habet folia, quæ trita, citrij mali, vel melissophylli odorem referunt, & capirella paulò majora, magisque purpurascens, similibus tamen flosculis prædita: crassiores ramulos, quadrangulos, palmares, per retram tulos, ad singula internodia fibras agentes: radicem verò lignoiam, multosidam, fibrosamque, numerosos proferentem cauliculos, summâ tellure in orbem sese spargentes.

Serp. Aust. cur. g. odora.

ANGUSTIORA Secundo sunt folia, pauloque longiora, viridia, glabra, rarius per cauliculos sparsa, bina semper ex adverso, sed alternis, nascentia, quemadmodum magnâ ex parte in ceteris stripibus quæ quadrangulo sunt caule, aut virgis: cauliculi frequentes, tenuis, longi, humi fusi, & subinde ad internodia fibris sese firmantes, oblonga, mollia, & veluti spicata in summo ferentes capitella, flosculis, vulgaribus æqualibus, referta: radix lignosa est, dura, & multisida. Tota planta aut nucus juglandis foliorum odorem quodammodo

Serp. Hung. g. sub. glab. d. que f. an.

refert,

refert, interdum nullo manifesto odore prædita deprehenditur: soline mutatione, an aurtæ variæ afflatu id accedat, nec latet.

Serpyllum Pannonicum 111.

*Serpyll. an-
gustifolia agri-
colæ folio.*



Tamus.

Romina.

Famulina.

*Fini am-
bulat.*

L A T E serpit Tercium genus, & magnos cespites nonnunquam occupat. Nam licet duram & lignosam habeat radicem, ut præcedentia genera: tenuestamen, quos in circuitu spargit, cauliculi, subinde fibras agunt, quæ temporis succellu, in radices non minus duras & lignosas evadunt, quàm sit primaria, atque alios deinde fundunt in ambitu cauliculos folijs non minus quàm proximè præcedentis, oblongis, & ijs quidem angustioribus, præditos, incanâ mollique lanugine pubescentibus: longa in summis cauliculis capitella à secundi generis longo glabrâque folio capitellis non differunt, & similibus flosculis plena sunt: feminæ in villosis rufescentibus utriculis parva, rotunda, fusci coloris. Tota stirps pincum quodammodo siue resinæcum odorem trita refert, & calido gustu est.

Omnia hæc genera eodem tempore florent, mense videlicet Iunio: natales jam ante diximus.

DIOSCORIDI ἰσχυρὸς ἔρπος καὶ ὑγίς vocatur quod primum descripti: Latinis Serpyllum, & Plinio quidem domesticum quod serpere negat: vulgare autem passim nascens, etiam Serpyllum ab omnibus appellatur: quo nomine, alia quæ subjeci in Aultrâ & vicinis Provincijs nascentia, donari poterunt: nam, quantum ex temperamento conicere licet, similibus etiam facultatibus erunt prædita, aut certè non multum inferioribus.

SILVESTRE autem sativo efficacius esse, magis excoctæ, & ad medendi usum aptius esse testis est Dioscorides: proinde menses trahere, urinam potu eiere, torminibus, ruptis, vulvis, & jocinoris inflammationibus auxiliari: adversus serpentes, potu illitûve: capitis dolores mulcere tafaceo incoctum, & in aceto madefactum: maximè verò lethargicis & phreneticis convenit. Cruentos vomitus sedat succus drachmis quatuor ex aceto potus. Plinius addit ex aqua bibi ad jocinoris dolores: folia obolis quatuor dari ad hienem ex aceto: ad cruentas exfereationes teri in cyathis duobus, aceti & mellis.

Ceterum in Serpylli descriptione apud Dioscoridem, mendum esse suspicor in his verbis, φύλλον περιπλασμένον πυλινόν, legendumque ἐργασίον arbitror: nam quæ affinitas foliorum Rutæ cum Serpylli folijs? accuratius hic locus considerandus.

POLIVM.

PLVRA quàm Veteres tradiderint nunc inveniri Polij genera certum est, eaque vel ^{Polium v. d. r. g. m. r.} surculorum firmitate, vel foliorum amplitudine, vel florum varietate, atque insuper totius stirpis colore inter se differencia.

Polium montanum I.

Polium montanum III.



VNUM, palmares aut ampliores, ex eadem radice lignosa & dura producit cauliculos, ^{Polium I. albo flore.} in multas alas divisos, humi sparsos, quos disposito ordine, & ex adverso, semper tenera ambiunt folia, longiuscula, angusta, oris in externam partem reflexis, & leviter denticulatis, adeo ut vix, nisi diligenter observantibus, denticuli appareant, inanis: è quorum exortu alia numerosa prodeunt foliola magis tenella & incana: Summis ramulis capitella fert ex multis caliculis canescentibus & tomentosis congesta (unde flos emergit albus) & quæ semen continens per maturitatem nigricans, subrotundum, satis magnum pro plantæ ténerrate. Tota planta suaviter olet, eum gravitate quadam non injeundâ. Februario & Martio florentem observabam.

MULTIS Alterum fruticat ramulis, superiore firmioribus, non humi fufis, sed erectis, ^{Polium II. albo flore.} rotundiusculis, incanis, palmariibus, pletumque etiam longioribus: folia superiore angustiora, frequentiora, ex intervallis contrario situ ramulos ambiunt, extremâ parte duntaxat dentata, sed minis quàm in Primo: majora in summis ramis habet capirala longioraque, latiora ramen, neque adeo compacta, in quibus flos etiam albus, deinde semen prioris simile. Non minus odorata est hæc planta, quàm prior. Aprilis floret, interdum etiam Maio.

TERTIVM genus medix est inter primum & secundum magnitudinis, minus fruticosum, minisque firmis ramulis secundo, firmioribus autem primo: nam partim procumbentes eos habet, partim etiam erectiores, omnino ineanos, magis etiam quàm primum: folia item utroque ampliora, & roea candida: tenelli ramen ramuli capitella sua jam protrudere incipientes, cum ipsi folijs flavescente lanugine obducuntur, perinde ac ipsa ^{Polium III. flavo flore.} integra

integra oblonga capitella, quæ tandem luteum florem proferunt: semen autem alijs simile, ut postea ex eo quod apud Belgas alebatur deprehendi. Florebat verò natali loco Martio mense, apud Belgas ferius.

*Polium 1111.
florez albi
pallidiores.*

Ex istius porro semine in Belgicâ nato, & à Generoso Vito Ioanne vander Dult p. m. amico singulari, Viennam Austriz admissio, natæ sunt mihi istic plantæ, quæ, altero à satione anno, flores mihi prorulerunt, non eos quidem luteos, siue pallidos, quales mater, sed modo candicantes, modo interius pallescentes & foris exalbidos, comâque etiam non minus quàm folia canescentem, vel levissimè pallescentem: alioqui, latoribus & in ambitu crispis incanisque folijs, & candidâ lanugine pubescentibus virgulis, matrem referebant, quæ ut plurimum in maiorem longitudinem excrecentes, humi fuscæ erant, minores verò lurrecæ.

Hoc genus aliquot annis in hortulo, quem Viennæ colebam, conservavi, levitet adversus hiemis injurias tegendo tenerioribus aëgnis ramis: sed aspera illa anni M. D. XXCVI. hiemis corrupt, cum selectissimis alijs (ut aliquoties memini) stirpibus,

Polium montan. v. purpureo flore.



*Polium v.
purp. flo.*

QVIN TVM profusum tenellum est, exilibus & dodrantalibus ramulis, humi fuscis, multâ lanugine candidâ testis, qui subinde ad nodos radices agunt: folia illi sunt mediæ inter primarium & secundum genus magnitudinis, breviora tamen, denticulata, valdeque tomentosa, quæ adeo causa est ut in renellis folijs nulla dentium vestigia conspiciantur, nisi à diligenter observantibus: capitella superioribus paulo minora, totâque tomentosa, in quibus flos purpureus.

*Polium VII.
albi flo.*

SOLA teneritas stirpis, & floris varietas inter proximè descriptum, & Sextum hoc genus, discrimen facit, quod albis floribus est præditum. Vtrumque enim genus nihil ferè nisi tomentum sunt, & odoris suavitatem reliqua genera superant. Vtrumque suis floribus onustum Martio reperiebam, nec differentiam animadvertissem, nisi floris color, diligentius conferendi singulas plantas, ansam præbuisset.

*Polium VIII.
albi flo.*

MULTA ex eadem radice promit Septimum Polij genus virgulas, primi generis virgis similes, sed breviores & magis fruticolas, supra terram sparsas, folia in his per intervalla, bina semper inter se opposita, Libanotis coronariz folijs ferè æqualia, minorâ tamen, supernè viridia, infernè canescentia, nullis crenis per oras notata, amari gustus & iucundi quidem odoris, attamen minus grati, quàm qui in legitimi Polij montani folijs percipitur: florem extremis ramulis gerit copiosum, album, alterum Polij floribus formâ non ab similem, non tamen spicæ instar cretenscem, sed veluti in caput congestum: semen deinde in vasculis exiguum, nigricans: radix illi dura, lignosa, multâ, multis capillaribus fibris prædita.

Quia porro illius iconi, quam in Pannonicis Observationibus exhibui, nulli flores additi fuerant, sed sola vascula semen continentia, aliam iconem adijcere volui, in qua quidem flores

Polium VII. cum flore.

Polium Pannonic. VII. cum semine.



Polium montanum VIII.



dem flores bene expressi: gravius autem peccatum in foliorum præpostera serie, quæ temerè per virgulas sparsa esse non debent, sed alternatim ut in ceteris generibus disposita.

SEPTIMO etiam est Octavum quoddam genus omnium minimum, duarum unciarum longitudinem vix superans, exilibus ramuleculis, in quibus, non minus quàm in superioribus ordine & ex adverso opposita nascuntur foliola duriora, breviora & angustiora non denticulata: ramulis insident terni aut quaterni flores albi, superiori forma similes, sed minores: hujus semen non observavi, sed Septimo generi simile esse puto: radix etiam fibrosa est, & vivax natali solo. Nulla verò odoris gratia commendabilis est hæc planta. Floret autem serius, Junio videlicet.

Neutram harum postremarum stirpium, licet sæpius cum suis cespitiibus in hortum translata, umquam cicurare potui, sed consueto pabulo destituta, semper corruptæ sunt.

Primum, nascitur in maritimis Bæticæ, *Natalis*. Valentiniq; Regni, & Narbonensis Gallicæ. Alterum, non nisi in mediterraneis Hispaniæ observabam, solo exili & petroso, in collibus crescens. Tertium, regno Granatensi & Valentino. Quartum, semine Tertij

ne Tertij mihi natum Viennæ Austriacæ, ut paulò antè dixi. Quintum & Sextum, Murciano regno duntaxat inter Lorca & Veléz el rubio, in acclivitatibus tumulorum arenosorum. Septimum copiosè invenitur in ascensu montis Hamburgensis, qua parte Austriam sive Septentrionem spectat, octo infra Viennam miliaribus: sed multò abundantius in monte Badensibus Austriacis thetms imminente, alijsque montibus siccis & salebrosis, inter saxa, quibus delectari videtur: in tenui tamen solo (montium videlicet) unde graminei cespites exempti sunt, longè uberius provenire solet. Octavum, nascitur publica via agro Viennensi: id etiam, aut certè illi valde simile, in Allobrogum collibus, Lemano lacu vicinis, & meridiei obversis aliquando observare memini.

Nomina.

DICTUR hæc planta Græcis *αἰώνιον*, Latinis Polium; Primum genus, ad Dioscoridis montanum, quod ipse *ἐπὶ τοῖς ὄρεσιν* vocat, referri posse videtur: hoc Bæti *assana* appellant. Alterum, ad ejus secundum genus, quod fruticosius priore esse dicit, non tamen minus odoratum primo: id Hispanis dicitur *alsamica*. Tertij, nullum nomen vulgare intellexi. Quintum & Sextum, incolæ Chamæpityn esse putabant: vulgare autem nomen apud incolas erat *camarilla*. Thymarum accolæ Septimum *willb. Kofmuth* hoc est, silvestrem Rorem marinum nuncupabant.

Facultas.

CETERVM Polium viscera obstructionibus liberat, urinam & menses ciet, in antidoto miscetur, suffitum & kratum serpentes abigere, illitu vulnera glutinare creditur.

Polij ramuli
ut pangantur.

ILLUD porro rei herbariæ studiosos obiter admonitos volo, omnis generis Polij ramulos in terram umbroso loco depactos, siue difficultate radices agere, modò ipsa terra bene subacta, & repurgata sit: ut in aliquot ejus generibus periculum feci.

FINIS LIBRI TERTII.



CAROLI

CAROLI CLVSI RARIORVM PLANTARVM HISTORIÆ

LIBER QVARTVS.

SED nec Scabiosarum & Asterum, aliarumque quarundam illis similium, inelegantes sunt flores: eam ob causam, Quarto libro erunt comprehendende, cum nonnullis quæ non injucundo, & alijs quæ gravi odore prædita sunt. His adnectentur Sedæ genera, congeneres illis stirpes, & alia crassâ tuberôsâque radice donata.

SCABIOSA.

CAPVT I.



MAGNA sane est Scabiosarum varietas: nam nullas Prouincias adire memini, in quibus ejus aliquod peculiare genus non inuenirim, ut ex ijs lucubrationibus quas in lucem antea emisi, atque etiam in hac Stirpium Historia videre licet.

PRIVM locum dabimus Scabiosæ majori Hispanicæ, quæ folia, vulgaris Scabiosæ majoris folijs similia habet, laciniosa videlicet, altè incisa, mollia, lanugine pubescentia: caules nodosos, rotundos, interdum cubitales, e quorum geniculis folia inter se opposita: summis ramis capitula insident è multis caliculis membranaceis & paleaceis composita, qui singulares flores continent candicantes, quibus deciduis, in medio quasi singulorum caliculorum umbilico, exigua quædam stella subnigra conspicitur, quatuor, quinque, aut sex interdum radiolis constans: paulatim verò hi caliculi excrecentes expanduntur, donec semen hirsutum & crassum (quo caliculi sustinentur) maturescere incipiat: radix candida, crassa, vulgari similis.

Scabiosa major Hispanica, sive L.

Crescit iuxta Vinearum margines & semitas, locisque in cultis agro Salmanticensi, per reliquam etiam Hispaniam haud dubiè & in alijs calidioribus regionibus. Floret istic mense Junio. Apud Germanos verò, qui illam semine ex Italâ misso interdum natam colunt, ferius; sed cum magnâ ex parte circiter Autumni flores præbere soleat, plerumque inane succedit semen, (licet aliquando bonè maturum colligere

Natalis.

meminerim) & subsequens hiems stirpes corrumpit. Vidi tamen qui ramis in terram demissis propagare & conservare studuerunt: sed operam luserunt.

ALIA invenitur ei per similis, & solâ magnitudine differens: est enim per omnia minor, folia tenuius incisa, caliculi & flores minores ex cæruleo purpurascunt.

Iisdem cum superiore locis nascitur, atque eodem etiam tempore floret, & semen ad maturitatem perducit.

TERTIÆ cubitales sunt caules, rotundi, nodosi sive geniculati, nonnihil hirsuti, concaui, in singulis geniculis bina folia ex adverso nascentia, non multifida instar aliarum Scabiosarum, sed lata, in ambitu tamen crenata, Vrticæ folijs interdum majora, brevi petiolo

Scabiosa minor Hispanica, sive L.

Scabiosa latifolia, sive L. var. brevis, sive L.

A A

pendentia,

Scabiosa lll.



Scabiosa v.



pendentia, colore viridi diluioze prædita, amaro & acri sapore: ex alarum sinu rami etiam prodeunt foliati, qui ex lateribus pediculos protrudunt, floribus, vulgaris Scabiozæ modo congestis, ornatos, coloris rubescentis, nullius odoris: deinde semina simul congesta, angulosa, hirsuta, coicis ferè interdum magnitudine, stellatâ coronâ insignita: radix minimi digiti crassitudinem nonnumquam æquat, longa, nigricans, statim à capite quoddam fibras latis magnas spargens, & subinde ex lateribus oovos caules producens.

Scabiosa lutea
Pae. purp.
fl. seu lll.

Natalis.

Scabiosa montana, seu v.

Natalis.

Scabiosa montana, seu v.

QVARTA magnitudine illam superat, majorâque & oignora habet folia, purpurascens ex nigro florem: in reliquis satis conveniunt.

Provenit utraque in omnibus ferè cædis silvis, juxta sepes, locisque umbris per universam Pannoniam, Austriamque infra Ansum. Floret Maio & Junio, quo tempore semen plerumque etiam maturefcit.

QVINA aut sena habet Quintum genus folia, humi sparsa, Scabiozæ vulgariori, & inter segetes nascendi ferè similia, minimè quidem villis oblita, sed carnosa admodum & venosa, præ viriditate quodammodo splendentia, aliquot crenis ineisa, sapore si manducantur lento, & gummoso deinde aliquantulum acri: ex horum medio crescit palmaris caulis, aliquando paulò amplior, gracilis, rotundus, cujus inferiorem partem ambiunt quatuor aut sena folia, profundis & teouibus lacinijs divisa, bina semper ex adverso sita: extremo cauli infidet capitulum ut in vulgari scabiosa ferè, è multis flosculis quinque foliis constantibus congestum, quorum exteriores majores sunt, eleganti colore ex cæruleo purpurascens præditi, villis quibuldam nigris singulorum flosculorum sedem ambientibus: radix longa, nigra, crassiusculis albis fibris capillata.

Invenitur in fummis Sneberg & Snealben Austriæ & Scitæ alpium jugis in tenui gramine nascens, ubi floret Augusto: similiter in depressionibus nudisque circa Viennam collibus supercilijs, ubi Junio & Julio floribus onustum legebam.

CVBITALE aut ampliore affurgit Sexta scabiosa caule, satis gracili, qui in multos tenues ramos dividitur, extimâ parte veluti umbellam flosculorum in caput congestam gestantes, exterionibus flosculis, qui reliquos ambiunt, majusculis in quinque lacinijs divisis, quemadmodum & interiores flosculi, qui minores omnes autem coloris elegantis rubri saturi, & ad purpureum quodammodo tendentis: his succedunt stellata, ut in alijs Scabiozarum generibus, semina, in caput metz formâ congesta. Folia non abfimilia habet illis quæ conspiciuntur in sequente Pannoniæ *ωχρολιεύς*: sunt enim similiter ineisa, viridiora tamen, & splendentia, caulem atque ramos in singulis internodijs ex adverso amplectentia.

Anta.



An radix vivax esset & perennis initio dubitabam, quia anno primum M. D. XCI. florentem observabam semine mihi misso natam eodem anno. Sed sequens annus annuū esse me docuit.

Floret æstate & Autumno: fœmen sub Septembris finem, aut Octobris initium maturum fuit.

Accipiebam id fœmen ex Italiâ, Scabiosæ Indicę nomine: quod quibusdam amicis communicatum, florem variavit, qui fuit, illis referentibus, multo dilutior. Memini etiam Viennam mihi missum Scabiosę fœmẽ ex Hispanijs, quod flores dedit eodem anno quo factum: sed illi etiam rubri dilutiores.

CVBITALES sunt Septimę caules, rotundi, graciles, firmi, virentes, nodosi, eos ad singula genicula amplectentibus binis folijs ex adverso semper respondentibus, quę tenuibus & profundis lacinijs ad eodẽ divisa sunt ut alara videantur, color ex cinereo virescens, fœporamarisculus: quę verò secundũ radicem nascuntur, ante quã planra in caulem asfurgat, latiora sunt, minoribusque lacinijs divisa: ex summis alis ramulos fert rœnuẽ, & nudos, qui sustinẽt plana capitula, ẽ candidis sive potius *αγραιοειδẽ* (præsertim ante quã explicentur) inodorisque floribus simul nascentibus congesta, qui quinis foliolis (quorum tria inferiora majuscula sunt) constant, paucis intus staminulis: floribus succedunt hirsuta semina vulgaris (scabiosę seminibus minora, in orbiculare caput congesta: radix minimi digiti crassitudinem interdum æquans, multisque exiguis fibris in lateribus prædita, vivax est, & singulis annis novos caules profert.

Nullum est Austrię inferioris pratium siccius, editiotẽve loco situm, nullus ager gramineus, nulli fere arvorum margines, in quibus non nascatur hoc Scabiosę genus, adeoque fertile est in gerendis floribus & perennax, ut sola bruma illius luxuriam coẽrceat, alioqui Junio florere incipit: frequens etiam est in Moraviâ.

Memini in Belgicis hortis pænẽ similem ali solitam, cujus tamen flores essent candidiores: Aliam præterea larionibus folijs, firmioribus caulibus, & florum niveorum capitulis interdum singularibus, plerũque tamen binis aut ternis coherẽntibus & simul nascentibus. OCTAVVM porro genus invenitur quod bicubitali aut ampliore asurgit caule, tereti, firmo, rotundo, multis alis prædito, per quem sub nodis sparsa sunt folia, jam descriptę folia non valde dissimilia, viridiora tamen & dutiora, nec in ad eodẽ tenuis lacinias divisa, infœnota verò non respondent, sed latiora sunt, molliora, hirsuta, & in ambiru duntaxat serrata, ut si quis nascentem plantam conspiciat, aliam pænẽ à Scabiosâ judicet: flores extremis ramulis insident in caput compacti, alterius floribus similes, uno semper (præsertim in

Scabiosa alba Belgica et hortorum.

Scabiosa ix. five æstivalis.



exterioribus orbē efficientibus) majore & ampliore, non tamen ut in præcedente *æstivali*, sed omnino nivei, flaminulis in omnium umbilico eminentibus coloris candidi, apicibus autem subcartuleis, quibus deciduis capitula illa subrotunda fiunt, & veluti squamata, contineturque longiuscula angulosa femina, colorem fuscum maturitate acquirentia: radix non est viua, sed hieme perit, femine tamen deciduo enascuntur novellæ plantæ, quæ sequente anno flores proferunt.

Nonalet.

Hanc Scabiosam primum observabam anno M. D. XXXII. Augusto mense florentem & maturum semen proferentem circa Turnaviam Pannoniæ trans-danubianæ urbem, arque etiam secundum ipsius urbis vallum, quâ Metidiem spectat. Semine inde delato in hortis colî cepit. Memini & ejus semen in Belgicam amicis mittere, & ex eo nasas plantas matri similes postea ibi conspicere.

Scabiosa æstivalis
v. l. 13.

Hvivs primum nascentis formam & squamata capitula, in quibus flores, valde refert Scabiosa Nona, cujus iconem feliciter ab ipso (ut & pleraque alias) delineatam, ad me mittebat octennio post, honestus vir, & in Scirpium cognitione egregie versatus, Iacobus Plateau Tornacensis civis, Scabiosæ novæ æstivalis nomine. Nam folia habet illius folijs primum, ut dixi, nascentis & inferioribus non dissimilia, circa pediculum aliquantulum laciniata, deinde serrata, caulem tricubitalem aut ampliore, (ut adscribebat) totundum, hiesurum, in multos ramos circa summum divisum, quem alternatim bina semper ex adverso amplectuntur folia viridia, infimis similia, præter ea quæ in ramis, minora enim sunt illa, non laciniata, non incisa: summis ramis innascuntur squamata capitula, subcartuleis flosculis plena: quibus succedunt longiuscula albicantria femina: ad capitulorum latera nascuntur utrinque alij ramuli similibus capitulis & flosculis præditi, deinde etiam ex illis terrij: radix candida & fibrosa est, sed non reditiva, nam excusso femine perire solet, veluti superior, & illo deciduo perinde ut illa singulis annis sponte nascitur.

Ex quibus notis facile mihi persuadeo, illam ex eo semine primum in Belgicâ natam, quod ad amicos ante miseram. Illius autem iconem à pento artifice imitatum subiungere volui ut ipsius hystoriæ adnecti possit.

Scabiosa major
Marthioli.
v. l. 13.

INVENTUM autem in Austriâ pleraque Scabiosarum genera alijs etiam Provincijs cômunia, cum inter segetes, tum in pratis & silvis. Provenit & passim siccioribus agrorum marginibus, & juxta semitas Scabiosa major Marthioli, cujus plantas, ad Hertensalem pagum agro Viennensis situm, albo flore variantes etuebam anno M. D. XXXIII. Nusquam vero sponte nascentem conspicxi, quæ mihi (ante quàm à Cæsare Maximiliano II. felseis mem. Viennam accerferet) in cultioribus Belgicis hortis observata, flosculis ex purpureo subcartuleis

Scabiosa prolifero flore.

Scabiosa x. five repens.



fubezuleis in caput congestis, ad cujus lateta in orbem fundebantur multi longiusculi petioli, è quibus dependebat alij minores flores majoribus colore similes, & ex his interdum eriam terni, sed imperfecti: primis floribus succedebant semina Scabiosæ v. similia: radix subfusca & multis fibris prædita, sed non vivax.

LATA serpit Decimum genus, & interdum magnos cespices occupat, durâ & nigra radice sese per summam tellurem spargente, & reuibus fibris firmante: ex qua multi quæ versum expanduntur rami, humi diffusi, & subinde fibras agentes: folia faris numerosa, densa & carnosa, lævia, vincta admodum, Bellidis folijs, aut Globulariæ, quam Anguillara Aphyllantem appellat, similia, nullo mucrone prædita, sed cordis (ut vulgo pingitur) formam potius referentia, herbaceum quidpiam, non inamœnum tamen redolentia, oblongo pediculo, gustu amaro & quidem acrisculo: aliquor deinde prodeunt inter folia dodrantes cauliculi, teretes, singuli sustinentes capitulum Globulariæ majus & planius, multis crassiusculis villis aut flosculis hirsutum, Succisæ, five Morfus Diaboli similibus, coloris purpurei, nonnumquam aded diluti, ut cæruleus quodammodo appareat: semen Globulariæ semini proximum.

Nascitur in omnibus Pannoniæ & Austriæ montibus glabris & asperis, inter saxa & salubras sparfa, gramineis etiam quibusdam siccioribus incultisque agris, veluti supra Neapolim Austriæ. Floret Aprilis & Maio; semen Julio & Augusto maturefcit.

NVLVM porrò vulgare nomen istarum Plantarum intellexi: ne tamen prorsus nomine careant, earum nonnullis Latinum addam, ut eadem opera, à reliquis Scabiosarum generibus, quæ ab alijs descripta, distingui possint. Prior igitur sit, Scabiosa major Hispanica: Altera, Scabiosa minor Hispanica: Tertia, Scabiosa lanifolia Pannonica rubro flore: Quinta, Scabiosa Alpina: Sexta, Scabiosa Indica rubro saturo flore: Septima, Scabiosa Pannonica αχρηλινος: Octava, Scabiosa major Pannonica albo flore: Decima, Scabiosa montana minor repens.

Cererum non dubium est, quin ipsædem facultatibus sint præditæ, quibus reliqua Scabiosarum genera: quandoquidem omnium est idem temperamentum.

SCABIOSARVM porrò genera, non leuibus de causis ad Phyteuma Dioscoridis referenda esse censet Nobilis idemq; doctissimus vir Fabius Columna in suo de Plantis libro.

PASSIM porrò per Austriam & Pannoniam in gramineis campis, silvis à fruticibus & arboribus paulò liberioribus, interdum etiam graminosis viarum & seminarum marginibus, co-

Globularia.

Globularia
nivea flore.

bus, copiosè crescit pumilum illud Scabiozæ genus, quod apud Herbariæ rei studiosos Globulariæ nomen vulgo invenitur, Anguillara (ur dixi) Aphyllanthren appellat: Viennenses marronæ *Stem Ruffartia* hoc est, cæruleam bellidem nuncupant, quo nomine etiam in Belgicis hortis culta dicebatur: Gallis *Marguerite blanche*. Ego Viennensi agro, niveo flore variantem nonnumquam conspicebam.

IACEA.

CAP. II.

N VLLVM rei herbariæ studiosum adeò renues progressus in Stirpium cognitione fecisse arbitror, qui Iaceas vulgo appellatas, ad Scabiofarum classem pertinere statim non agnoscat. Earum nonnulla genera in Pannonicis Stirpium observationibus dedimus, à nemine tunc litteris prodita: ydēdē nunc Scabiofarum Historiæ proximum caput dabimus.

Iacea squa-
mata cap. 1.
montana.

P R I O R igitur numerosa ab eadem radice promit folia, oblonga, vulgarissimæ Iaceæ haud abfimilia, nec tactu minus aspera, sapore nonnihil calido, subadstringente tamen: caulibus plerumque cubitalibus, striatis, tamosis, folijs angustioribus, & interdum paucis lacinijs secundum pediculum præditis obtusos, ut in vulgarissimâ: capitula in extremis ramis crassiora, non hirsuta, sed multis squamis tenuibus, & si vel digiti leviter attingas, crepitantibus prædita, infernè candicantia, superne verò, quâ se flos explicat, fusca: flos multis exiguis foliolis ex purpurâ candicantibus, in quinque lacinijs divisus constat, è quorum medio purpurascens tubulus exilit, in summo veluti farina asperus, quem ambiunt purpurea majora longioraque foliola, quique inæqualibus lacinijs etiam constantia, uti vulgarissima, semen Cnico formâ simile, sed exiguum, nigrum, paulo majus quàm vulgare, subadstringentis gustus: radix etiam vulgarissimæ similis est, fibrosa, nigricans.

Floret Julio & Augusto, & subinde semen profert, quod maturum statim è vasculis repleans, siccum florem excutit.

Iacea squa-
mata cap. 11.
montana.

A L T E R A ferè per omnia similis, paulò tamen humilior, ut quæ rarò cubitalem superet altitudinem, folijs minus asperis, & aliquantulum incanis paulò dilutiorē flore, semine minore, nec nigro, sed candicante & cineraceo, linguam etiam magis excalefaciente. Maturius plerumque floret, & semen Julio perficit.

Scutell.

Provenit utraque copiosè in montanis Pannoniæ & Austriæ pratis.

P E R E G R I N O semine, hoc est Creta allato, Scabiozæ nomine, nata est hæc planra: mihi autem erit Terrum Iaceæ genus, quod, cum reliquis Iaceæ & Stoebes à me descriptis generibus, procul lubio ad Scabiofarum classem pertinet.

Iacea squa-
mata cap.
111. Cretica.

H A B E T verò multa longa folia, supra tellurem expansa, instar majoris Scabiozæ Matthioli, crasso nervo prædita, & secundum illius longitudinem, non modò multipliciter laciniata, sed ipse etiam laciniae in minores alias sectæ: caulis deinde emergit eubialis & amplior, striatus, durus, non dissimilis Iaceæ primo loco, hoc capite descripiæ, per quem sparsa sunt folia, jam dictis mihi ora, & minus laciniata: sudatur deinde in vanos ramos, minoribus adhuc folijs, & rarus sectis præditos: extremi rami sustinent squamata capita, quæ producant deinde florem multis longioribus stoculis purpurascens, interdum omnino albis, & valde sectis constantem, ex quorum medio exilar stilus pallescens: evanido flori, succedit semen non dissimile prioris semini, multa lanugine involutum: radix faris crassa, & fibris quibusdam prædita, instar radicis Stoebes Hispanicæ, quæ an vivax sit, me latet.

Iacea ma-
jor cap. 1.
cap. 11. alacris.

V E N U S T I S S I M A est Quarta Iacea, latæque & longa habet folia, superioribus majora, magis albescens, molliora, leviter per amburum denrata, gummoso quidem gustu, sed amaritudinis non exiguae: caules plures ex eadem radice promit, cubitales vel etiam ampliores, & interdum minores, angulosos & striatos; capitula terna aut plura contigua ferè, ex multis squamis imbricatis dispositis constantia, quarum cuspides exterior reflexæ, in adeò crebra tenuiaque filamenta, sive potius multitudine barbula desinunt, ut ipsa capita elegantissimo & tenuissimo reticulo inclusa videantur, miro Naturæ artificio: flores Priori similes, purpurei, paulò tamen majores: semen maturum cinerei coloris, gracilius oblongiusque priore, Cyani semini ferè respondens: radix priori non abfimilis, vivax, & multis nigricantibus fibris donata.

Iacea mont.
cap. 1. cap.
11. cap. 11.
cap. 11. v.
Dio. alacris.

Q U I N T A longè humilior est, cubitalem altitudinem vix attingens: alioqui, folijs, villosis & retis instar formatis capitibus, arque adeò floribus magnam similitudinem cum Quarta habet: semen variat, quod nigricans est, & paulò crassius.

Idem, quibus priores duæ locis, etiam hæ nascuntur. Floret Julio & Augusto: semen item cum illis proferunt, quod maturitate siccum florem è calicibus excutit.

FOLIA

Iacea 1111. Austriaca villoso cap.

Iacea Austriaca vi.



Carduus muricatus, vulgo Calcitrapa dictus.



FOLIA Sexæ sunt vulgari similia, secundum radicem leviter laciniata: caulis cubitalis aut amplior, gracilis, firmus, striatus, nonnihil interdum purpurascens, in multas alas inæquales divisus per quem, sub singulis alis, sparsa sunt folia jam dictis minora, angustiora quæ flores in summis ramis è squamato, hirsuto, nigricante capite producentes, vulgatissimæ Iacæ floribus omnino similes, & superioribus paulo saturatiores: semen priori æquale: radix alijs similis.

Crescit permixta cum superioribus, atque eodem etiam tempore flores ejus explicantur.

MOLLIORA sunt Septimæ folia quàm vulgatissimæ, quæ secundum radicem sunt, laciniata, ad Calcitrapæ vulgo dictæ, sive Cardui muricato capite folia accedentia: caules cubitales, angulosi, striati, in multas alas divisi: capirula hinc inde per ramulos confuso ordine sparsa, longiuscula, quamplurimis squamis constantia, quæ in minores tenuioresque quàm Calcitrapa aculeos, eosque valde barbatos desinunt: flos Iacæ aut Cardui muricari purpureus: semen non observavi: radix Calcitrapæ, sive Cardui stellati vel tectius muricati radicem æmulatur.

Ad montium radices, nonnumquam secundum vias nascitur in Austria inferiore & Stiria: & Augusto mense floret cum Calcitrapâ.

Illi autem non multum ab similibus videtur, quam ante multos annos nobis in Belgicâ natam memini, semine ex Italiâ misso Hyosciridis Phasianæ nomine.

Iacea mont.
hirsuta cap.
vii.

Iacea mont.
orbiculata cap.
viii.

Natalis.

Hyosciridis
Phasianæ.

IACEÆ

Serratula Matthioli.

*Carduus marianus cap.
Hippophæst.
Hippophæst.*

*Serratula
Matthioli.*



Iacea luteo flore.

*Iacea, seu
Carduus marianus
luteo fl.*

Natalis.

*Iacea purp.
Faventina
maritima
cap.*



florem deprementis purpureum: radix valde crassa est longaque & glutinosa.

GRANATENSIS vulgo *Arzalla* dicitur, & proponebant nonnulli, dum istic etiam,

IACEA appellatione has stirpes indigeta-
vi, propter similitudinem quam habent cum
eâ quæ vulgo Iacea appellationem obtinuit,
quam immutare nolui, donec aptiorem ali-
quam accommodare possemus: certum tamen
est, Scabiosis proximam esse. Earum autem pri-
mam, Iaceam monranam squamato capite
nuncupavi: Tertiam, Iaceâ Crenicam: Quar-
tam, Iaceam monranam villoso tetiformique
capite: Sextâ, luteo capite: Septimâ, echin-
ato capite cognomen addidi.

Sed quoniam in Calcitrapæ, sive Cardui
muticato capite (quod Hippophæstum, sive
Hippophæstis Dioic. esse suspicatur Fab. Col-
lum.) mentionem incidimus: crevit quidem
illa nonnullis Stiriz & Moraviz locis, verum
non adeo frequens ut in Germaniâ reliquâ, &
Belgicâ Galliz Provinciis. Nusquam verò
non occurrat in silvis Pannoniæ & Austriæ,
atque etiam in plurimis udis pratis, silvis con-
tiguus, ea planta, quam Matthioli Serratu-
lam cognominavit. Vtrique etiam mihi fre-
quens conspecta Francofurti agro. Sed cum
ab alijs ambæ sint descriptæ, illarum historiam
hic retexere non existimavi necesse: non in-
consulte tamen me factum putavi, si utrius-
que iconem subijcerem.

IACEA LUTEA. CAP. III.

ACANACEI quidem generis capita ha-
bet hæc planta, perinde atque Carduus
ille puricatus: reliquis tamen notis præfusus
ad scabiosas & congenetes illis stirpes potius
referenda.

LONGAS, cubitales, majoresve fert vir-
gas hæc planta, quas secundum radicem folia
Centaurij majoris quod multifido est folio &
laciniato similia amplectuntur, minus tamen
ampla, superiora verò quæ per virgas sparsa
sunt, Iaceæ nigre similia, ductiâ aliquantulum,
& candicantia, gustu utcumque acido: capita
in summis virgis Cnici silvestris majora, spinis
horrida, è quibus flos luteus Attractylidis: se-
men in capitibus cineracei coloris, exiguum,
multâ lanugine involutum: radix est longa,
alba, succulenta, dulcis, Eryngij vulgaris instar.
Flore senescente & evanescere, ex medio ca-
pite, veluti gummi quoddam rufi coloris flori
permixtum protuberat vermiculorum modo
convolutum, aut instar Tragacanthæ officina-
rum: inde occasionem sumpsisse puto Sal-
manticensis, ut illam Tragacantham appel-
larent: in quorum agro frequens nascitur, ad
Vinetorum margines & arido solo. Floret lu-
lio, semen Augusto maturum est.

SUPERIORI non multum abfimis abundan-
tissimè invenitur agro Granatensi & Va-
lentino, locis humidis & umbrosis: folijs Se-
ndis candicantibus, ramis cubitalibus & fle-
xibilibus, in quorum summo capita squamata

eram, pro Poterio, cum tamen ejus descriptioni tam respondeat, quam quod minimè. Florebat Martio.

Priorem in Belgio aliquando habuimus semine natam, quod ex Hispanijs ad amicos miseram: sed paucis perstitit annis.

STOEBE SALMANTICENSIS.

CAP. IIIII.

NEMO ibit inficias, quin & stirpes, quas hoc capite describere atgredimur, ad Scabiosarum classem sint referendæ, cum illarum forma plurimum ad Scabiosas accedat: propterea illas laccis subijcere volui.

Stoebe Salmantica 1.



Stoebe Salmantica 11.



PRIOR. laccæ similis, folia humi strata habet, Scabiosæ, laccæque folijs latiora, ad Cichorij folia accedentia, mollia, lanuginosa, & interdum candicantia: aliquot ex eadem radice caules exeunt cubitales aut ampliores, multis alis brachiati, quibus inhaerent minora minusque dissecta, & mucrone quodammodo spinoso folia: flores nascuntur in summis ramis villosi, purpurei, squamatis capitibus comprehensi: quos subsequitur semen subrufum Centaurij majoris æmulum, sed minus: radix est longa, candida, digiti interdum crassitudine, quæ nonnumquam vivax est, & plures annos durat.

Stoebe Salmantica 1.

SECUNDA, folia omnia habet mollia & lanuginosa, Erucæ instar laciniata, caulem infirmum, ramosum, in terram procumbentem, cujus flores in summis ramis innascentes superiore majores, barbulis exterioribus Cyani æmulis, purpureis (quibus intermixti vili quidam lutei) medium florem occupantibus: semen superiori simile, vel Cyani femini: radix digitalis, albicans, non vivax, sed quam subsequens hiems corrumpit.

Stoebe Salmantica 11.

TERTIA, numerosa promit folia, secundum radicem humi sparsa, ineana, oblonga, magnis & profundis incisuris, quemadmodum in nonnullis Scabiosarum generibus laciniata: caules plerumque cubitales, locis autem frigidioribus & humidioribus bicubitales aut majores, in frequentes ramos divisos: folia per ramos sparsa alæ quidem incila, ut ea ferè quæ secundum radicem nascuntur, sed minora multo, & breviora, inque molles quoddam aculeos definitia: ramorum fastigijs insident caliculi argentei veluti squamis sibi vicem imbricati in incumbentibus compacti, unde flos exilit Cyani forma, sed purpureæ dilutionis, & medio villosus: semen lanugine quadam includitur ut in omnibus laccarum generibus, & Cyani, exiguum, nigricans, summo capite villosum: radix lingularis, crassa, nonnumquam fibris aliquot, sed paucis donata.

Stoebe Salmantica 111.

ALEDATUR, ante quàm Belgicæ excederem, in hortis Quartum quoddam genus, semine

Stoebe Salmantica 111.

Stoebe Galli-
ca & An-
fricana
var.

Stoebe An-
fricana
min.

Natalis.



Centaureum majus, vulgare.

Centaureum
maius 11
fide *Lafitanti*
mon.



mine nabis è Gallia misso natum, Tertio adeo simile, ut ab eo, nisi à pennonibus vix dignosci possit: nam foliis caliculis, qui tam eleganti argenteo colore non splendent, sece- nebat. Id postea, vel certe valde simile frequenissimum observabam Viennensi agro ad arborum margines, & siccioribus graminibus locis. Hallucinatur ergo illi qui eam plantam cum Cyano minore confundunt, diversæ enim sunt: neque enim minore altitudine crescentem vidi quæ Viennensi agro nascitur, quàm quæ Gallico femine nata in Belgicis hortis.

Sed in collibus, & montibus Viennensi ubi vicinis, provenit aliud genus multo humilius, magis incanum, tenuioribusque virgis, quod non multum differre videtur à minore illo Cyano, de quo sermo.

Nascentur omnes præter quarto loco descriptam, abundè Salmanticensi agro in arborum & vinerorum marginibus. Postrema autem cum in Gallia tum circa Viennam.

Florent omnes Junio, Julio, Augusto, & subinde semen proferunt. In Belgicâ autem non nisi altero à saturo anno florent.

SALMANTICENSES primam & tertiam Stoebes nomine insigniebant, quod extrema folia utrumque aculeata sint: Secundam ad Cyani genera referebant, tertiam etiam pro Scabiosa utebantur. Prior vulgo istæ *Cabufula*, hoc est, capitulum dicitur, ex qua seopas sordibus purgandis & everrendis idoneas concinnant, ut apud Belgas ex Betule ramis, aut Ericâ.

CENTAURIUM MAJUS.

CAP. V.

CENTAURIUM magnum quale à Dioscoride descriptum est, vulgaris omnino est notitæ: illius propterea historiam non dabimus, sed alterius ejusdem, à me in Hispaniâ meâ peregrinatione observari. Vtriusque tamen iconem Lectoris oculis subijcere volui, ut discrimen tanto facilius agnosci possit.

ALTERVM ergo Centaurij magni genus longa habet folia, non in laciniâ divisa ut Primum, sed Armoracæ folijs nondissimilia, & ad Glasti foliorum humi expansorum similitudinem plurimum accedentia, per ambitum tamen serrata, satque viriditatis, & amari sculi saporis: eaules inter folia prodeunt cubitales aut ampliores, rotundi, circa summum bifidi aut trifidi, squamata capita sustinentes, Prioris Centaurij majoris æmula: Stolem villosum, coloris albescens, instar Primi: semen Cnicose ferè simile, seu, ut verius dicam, Primi, summo hirsutum, & molli lanugine involutum: radicem valde crassam, duram, longam, denso cortice tectam, foris quidem nigro, interna verò parte flavescens, succumque croceum resudante, qui cum amaritudine quadam aromaticus est.

Supra

Centaurium majus it. five Lusitanic.



Ptarmica Austriaca.



Supra Olyſſipponem, lapidoſus juxta Tagum *Natalis.* collibus duntaxat inveniēbam, in Belgicā peregrinum omnino: nam tametiſi radicem ad amicos inde miſerim muſco madido involutam, ut facilis conſervari poſſet, & poſtea etiam Olyſſipone acceperim, numquam tamen iſtic perſiſtere, aut illum aërem ferre potuit. At Primum illud vulgare ſoliſ diſſectis in omnibus hortis conſpicitur.

ΓΑΛΕΙ ΚΑΥΤΑΠΡΟΨ ΜΕΛΥΣ, Latini Centaurium magnum appellant. Luſitani, Tagi acco- *Nomen.* liz, alterum genus, quod apud illos invenitur, *Rapentū*, hoc eſt, Rhaponticum nominant, vulgarem Pharmacopolarum errorem ſequuti, qui, notius illud Centaurium majus, eo nomine donant.

PTARMICA AUSTRIACA.

CAP. VI.

CVBITALI aſſurgit Ptarmica Auſtriaca caule, candicante, Cyani æmulo: folia illi inſimā caulis parte ſecundūm radicem numeroſa, longuſcula, anguſta, ſupernè vitida, infernè inſolita lanugine incana, aciduſculi ſaporis, in ipſo autem caule rariora: caulis in aliquot ramos ſe ſpargit ſuſtinentes capitula, à ſquamis veluti argenteis imbricatis ſibi invicem incumbentibus contexta; è quibus emergit ſſos venuſtus & elegans, duodecim aut quatuordecim folijs conſtans, duris, ſiccis, mucronatis, coloris initio albi, deinde ex cæruleo quodammodo purpureſcentis, aut illius æmuli qui in Sefamoidis minoris Matthioli flore elucet, nullo odore commendatus, ſed ſolā venuſtate gratus, & immarceſcibilis: coloris enim gratiam retinet per multos annos è trabe ſuſpenſus, aut inter chartas repoſitus: in ipſā verò plantā (ſi non evellatur) ſeneſcens ſubſuſcuma contrahit colorem: ſemen non multum abſimile Sefamidi minori, tenuius tamen, & copioſum, inter albam lanuginem latet: radix ſingularis eſt, nigricans, dura, capillaribus quibuſdam fibris ſep̄ta, ſed annua.

Ptarmica Austriaca.

Exit plerique aridis locis Viennæ vicinis ſecundūm agrorum margines, omnium autem copioſiſſimè ad Structuram illam magnificam à Cæſ. Maximiliano it. inchoatam, ſed non abſolutam, quam ad Phaſianos cognominant, aut novam Structuram appellant (etiam intra ipſa pomeria in quibus varij generis arbores ſunt conſtitæ) atque etiam ſiccioribus quibuſdam gramineis campis, ſingulis annis ſemine deciduo ſponte renaſcens. Floret Julio.

Natalis.

PTARMICÆ nomen huic plantæ impoſui, non quòd ſtemutamenta moveat, ſed quòd reliquis notis ſatis aptè cum Dioſcoridis Ptarmica conveniat: tenues enim habet virgas, folia oleæ incana, molliora tamen, & Anthemidis pæne ſorem. Auſtriacam cognominavi, quia primum in Auſtriâ infra Anſum flumen, præſertim verò circa Viennam totius Auſtriæ metropolim, ſponte naſcentem inveniēbam: conſpicebam

Nomen.

speciebat etiam in Pannoniâ transdanubianâ, Tirnaviensi itinere. A mulierculis thyzotomis Scabiosa appellatur, siccâque in totum annum servatur, & venalis proponitur.

Sibi autem persuadent, illius decoctum pueris & infantibus propinatum, adversus fascinationes valde utile esse.

Parmica vulgaris.



Parmica vulgaris pleno flore.



*Pyrethrum
sive Parmica
ca. pratensis.*

CETERVM, *Parmica* illa vulgaris notitiâ, in Belgicis pratis nascens folijs longis, angustis, in ambitu serratis, flore Anthemidis albo, quam nonnulli *Pyrethrum silvestre* appellant, passim in Germaniâ, Bohemiâ, Vngariâ, Austriâ, & Moraviâ pratis similiter crescit: Crescit etiam in Angliâ.

AT istuc etiam in quibusdam pratis repente est aliud ejus genus elegans, referente honesto viro Jacobo Gareto Jacobi F. Arumati non Londinensi, qui ejus iconem, quam hic cum vulgari expressam damus, ad me mittebat.

*Parmica
pratensis pl.
no flore.*

EX eadem radice, quæ vivax est, & plurimis fibris capillaria, nascuntur singulis annis plures novæ virgæ, instar vulgans illius, quas nulla serie distributa ambiunt similia etiam folia, longa, angusta, in ambitu serrata, ex quorum alis frequentes prodeunt rami, tenues, similibus, minoribus tamen folijs ornati, quorum singuli in exiles pedicellos desinunt, sustinentes flores *Pyrethro* vulgari silvestri quidem eoncolores, sed multiplici foliorum serie constantes & plenos. Quo tempore floreat, non adhibebat qui iconem mittebat: verisimile tamen est, cum *Pyrethro* silvestri simplici flore, suos flores explicare.

ASTER.

CAP. VII.

ASTERIS non parva est varietas: nam in meis peregrinationibus observatæ mihi sunt elegantes quædam plantæ, quæ ad illius genera referri posse videntur. Nos autem illas describemus, initium ab eo *Astere* facientes, quod omnes doctiores legitimum esse censent.

*Aster arvensis
legitimus.*

VNICO plerumque affurgit Primus *Aster* cauliculo, pedali, duriore & quodammodo lignoso, lanugine pubescente, qui superiore parte in ramulos dividitur: caulem superantes, quorum extremis squamata insident capitula, folijs quinque ut plurimum longis, hirsutis, rigidiusculis, & radiantem expansis subtus extornata, in medio verò flos *Chrysanthemi*, aut *Anthemidis*, aut eius: folia per caulem sparsa mollia, lanuginosa, candescantia, ut *Lychnidis* ferè, sed angustiora: radix durabilis non est, ut quæ singulis annis pereat.

Frequentissimus est hic *Aster* Granatensi Regno, & agro Salmanticensi in arvis, ubi Maio & Junio floret: memini etiam olim Mompeliano agro, cum in illâ urbe viverem, ad per-

Alter I.

Alter II. lupinus.



Alter III. Austriacus I.



ad portam D. Ægidij, non procul Augustinensium cornobio, atque alijs locis urbi vicinis frequenter colligere.

ALTER lupinus est, cauliculis multis ab una radice prodeuntibus, donatus, humi magna ex parte stratis & diffusis, hirsutis: folijs numerosis, superiori penè similibus, sed paulò viridioribus: singulis rami durum & foliosum sustinent caliculi in quo flos luteus circumscriptus rotundus, Bupthalmi aut Chrysanthemi æmulus quo evanescente, caliculi in aded dura & lignosa caputula evadunt, ut ungue vix frangi possint, atque semen, quod in ipsis continetur & sitimeti inhæret, eximi.

Invenitur hoc genus quibusdam Castellæ novæ locis semine ex Hispaniâ misso natum etiam excrevit, & sicilibus aliquot annis observatum: sed postea exemptum testâ, & hortocommissum, subsequente hieme corruptum est.

TERTIUS, ex radice nigra, obliquâ, multis albicantibus fibris capillatâ, & lateribus propagines fundente, multa initio promittit folia, Scabiosa, aut, ut verius dicam, Succisæ folijs similia, dilutiore tamen viriditate, & tenui etiam interdum lanugine præfita, gustu aliquantulum acri & amari sculo: intet quæ pro lit caulis cubitalis aut amplior, teretes, plerumque rubescens, per quem sparsa sunt folia, jam dictis angustiora, mucronata, & nonnihil dentata: is extremâ parte in aliquot ramulos divisus est, magno sustinentes

B B flores,

Alter lupinus pro II.

Castellæ

Alter lupinus major pro III.



flores, ex multis quinque foliorum luteis flosculis, atque in orbiculare caput congestis constantes, quos per cucumferentiam ambiunt oblonga, latiuscula, plana folia, elegantissimo colore flavo, nullo aureo (aut certe perexiguo) odore praedita: floribus succedens semeo, inter villosam quandam in capitulis materia latet, angulosum & quasi triangulare.

Matula.

Passim ad Alpium Austriacum & Sciriacum radices aprico loco, nonnumquam etiam umbroso nascitur, ubi latio flores; Augusto ejus semen maturum est: at in Leytenberg, mulisque alijs collibus Viennae vicinis, ubi etiam frequenter crescit, lunio flores producit, semen lulio.

After V. folijs folijs, flos 1111.

CYBATALES habet Quartus caules, striatos, firmos, virides, in multis folijs Tertio angustioribus, salignea se se referentibus, nullâ tamen lanugine pubescentibus, sed viridibus, duris, in ambitu renuiter serratis (quod à pictore prætermisum est) nec acrimoniâ carentibus, praeditos, supremâ parte in tetnos aut plures ramulos divisos, sustinentes capita è multis viridibus foliolis sibi invicem incumbenibus compacta, quæ tandem in flores se se explicant non minus amplos quàm superiores, minore tamen disco sive medio orbe, & angustioribus eundem ambientibus foliolis, in extremo bifidis, lutei coloris: radice nigricantem, fibrosam, adnatis se minificè propagantem, & sub tellure serpente.

Matula.

Frequens est in montanis ficionibusque pratis, caeduis silvis, montibusque Viennae vicinis, unâ cum duabus succedentibus interdum nascens: etiam in Moraviâ. Florere incipit lunio.

After Lanugo folijs flos v.

QUINTVS multis etiam ab unâ radice affurgit caulibus, gracilibus, firmis, cubitalibus, viridibus aut purpurascenibus, subhirsutisque, quos confuso ordine ambiunt frequentia folia, longa, salignis similia, viridia, transversum digrum lata, ad terram nonnihil erecta, latâ sede caules amplectentia, molli lanugine obrita, sapore subamaro & acro: summum cauli insidet capitulum multis foliolis & veluti squamis constans, orbem satis magnum continens, è plurimis luteis, muscosis flosculis compactum, nullo odore commendatum, quem numerosa ambiunt longiuscula foliola Helenij florem ambiuntibus foliolis similia, angustiora tamen, flavi coloris, sed dilutioris, quàm medius orbis: circa summum caulem, à foliorum exortu, terni, interdum quaterni aut plures exeunt ramuli, summum ipsum caulem superantes, singuli florem primario similem sustinentes: re secans floribus, semen caiguum in ijs capitulis continetur, quod maturum, cum pappo, sive villosa sua casarie à ventro discutitur: radix admodum fibrosa est, nigricans, subinde novas propagines è lateribus producens, & recentibus fibris sese firmans.

Provenit

Provenit plerisque locis ad montium & collium radices secundum vias, agro Viennensi, *Natalis.*
& caesus Pannoniz silvis. Floret etiam Junio: semen Julio maturum.

After vi. Austriac. 1717.

After vii. Austriac. v.



HUMILIOR est superiote Sextus, pedalem altitudinem raro superans, numerosa à radice (non minus fibrosa quam Quartus, nec pauciores illà propagines agentis) proferens virgas, graciles, duras, virides, quas frequentia, sed confuso ordine nascentia ambiunt folia, superiore angustiora, inferiora, duriora, mucronata, Parmicæ vulgari sive Prarensî, quæ & Pyrethrum silvestre vulgò dicitur, non dissimilia, minime tamen per oras serrata, à matrisculi sapore, cui nonnihil acrimoniæ adjunctum sit: summis virgis insident flores, superiori formâ similes, artamen minoris, capite etiam foliato, sive cæbris foliolis imbricato: ramo sæ etiam circa summum sunt virgæ, sed rami matrem rarius superant: semen superiori simile.

In umbrosis montium urbi Viennæ vicinorum pratis, in ipsis etiam collibus herbosis, atque in silvâ ad Danubium sita paulò supra *Eberstæ* arcem Imperatoriam, primum cum semine ab urbe Viennâ militari copiose cecidit. Floret paulò senis postenore. *Natalis.*

MULTA sunt Septimo generi folia, circa sedem angusta, per summas oras latoria, cuspidè obruta & quasi orbiculata, Bellidis folijs non valde dissimilia, supernè arque infernè lanugine quadam nonnihil pubescentia, gustu primum exsiccante, deinde amaro: ex horû medio caulis exit dodratalis, foliosus, hirsutus, capitulum in summo gerens è numerosis, mollibus, & purpurascensibus foliolis conflatum, & in eo magnum florem, multis tenuibus longisque ex cæruleo purpurascensibus foliolis, flavum orbem vallâibus, constantem, qui maturus in pappum evanescit: tadix est Bellidis aut Scabiozæ, lateribus propagines fundens, & albis fibris capillata. *After dyl. noster flo. p. vii.*

Oritur herbolis Austriacarum alpium jugis. Floret Julio. In hortos translata, sub finem Maij & Junio floruit, subsequens deinde hiems abstulit & corrupt: ex earum enim stirpem est genere quæ cultura vix miscere volunt. *Natalis.*

HIS adjiciemus Octavum Asterem vulgaris notitiæ, qui florem habet constantem purpureis seu potius cæruleis foliolis orbem luteum ambiens: nam tamen à plerisque alijs descriptus sit, quia tamen multis Pannoniz & Austriæ locis & in ipsa enam Moravia, nascentem observabam vel latiore folio, vel angustiore præditum (duorum enim generum invenitur) latius quidem Viennensi agro, & plerisque alijs siccioribus locis, angustiusculum verò (cujus & pumilum genus est) in quibusdam montibus & pratis: suum locum inter reliqua Asteris genetia illum obtinere volui. *After carol. l. alerum flo. p. vii. d. n. r. g. n. h.*

GRACIS porro ἀστὴρ ἁπλοῦς καὶ βολβώδης Plinio, Aster & Bubonion, nonnullis Ingui-

BB a *Natalis.*

Aster VIII. Italarum & Fuchij.

Oculus Christi.



Aster Virgij.

Doronicum latifolium.

Doronicum latifolium.

Doronicum angustifol.

Doronicum 11. Austriac. minus frut. l.



Kestel.

nalis. Mompelliani Primum appellabant Oculum Christi, quo istuc vivebam tempore: Hispani *Bekas*, quam vocem à Bubonij vocabulo deductam puto, aut quod Inguinum tumonibus, quos illi *bekas* vocant, nideatur: unde etiam Latinis Inguinalis. Reliquiorum generum, nulum vulgare nomen intellexi ab incolis earum Provinciarum in quibus crescit: Secundo autem Supini cognomen posset adjici. An Tertius Lobelio Adverliariorum pagina 148. notus fuerit, me latet, cum ille suo unicum florem tribuat, hic plures flores sustineat: illum tamen Pannonicum majorem vocare licebit: Quartum, Asterem Pan. faligneo folio; Quintum, Pan. subhirsuto falcis folio; Sextum, Pan. angustiore folio; Septimum, Virgiliano Amello quodammodo respondere videtur, & fortitan Amellus alpinus dici queat: nam in alpinis pratis, ut dixi, nascitur: Octavus, Italarum & Fuchij Aster est.

DORONICVM.

CAP. VIII.

VARIA Doronici genera in Pannonicis Nonisique, five Siniacis Alpibus nascentia observabam, ab illis quæ in Belgicis hortis alebantur, diversa: Belgica verò Austriacis (quibus antea ignota) accersitis meâ operâ à Belgio usque eorum stirpibus, communia facta.

LATIFOLIUM, quale in Belgicis hortis alebatur, in Allobrogicarum Alpium scopulis supra Lemanum lacum sponte nascens colligere memini anno M. D. LIII. dum è Narbonensi Galliâ per Helvetos in patriam redirem. Id Lobelij Tertium est in Observationibus.

EIVS ordine Primum, longiore folio, ad Plantaginis folium quodammodo accedente, munere Parisiensis ejusdem hortulani, qui Burdigalæ vicinis locis delatum assererat, primus Petro Coldebergio Pharmacopæo doctissimo Lutetiâ rediens communicavi; is tum in Durgemont vicino Antuerpiæ pago hortu alebat.

FORVM autem Doronici generum, quæ in Austriacis, Siniacisque jugis à me observata, Primum (ut a minoribus initium faciamus) caule est brevi, pedali duntaxat, molli, hirsuto, striato: folia illi rara, parva, crassa, longiuscula, supina parte admodum viridia, & quodammodo splendens, omnino tamen villosa, pronâ autem lævia, dilutius virentia, at quæ caulem ambiunt, angustiora sunt, omnia porò peracris saporis: summo caule unicū plerumque fert florem Tertio Lobeliano similem, sed magis aureum, quo evanescente, succedit exiguum semen nigricans, lanugine & pappo coronatum, quod levi aurâ excutitur, & venti arbitrio fertur: radix parva, geniculata, & intermodijs distincta, nigricans, crassioribus candicantibus aliquot fibris donata, gustu aromatico.

Primum id observabam in Sneberg, deinde in Snealben & Neuberg: nusquam verò majore copia quàm in summo Ettscheri jugo, inter saxa, tenui nigraque terrâ leviter tecta. Floret Iulio, nonnumquam etiam Augusto, quo

menie semen subinde maturitatem consequitur.

ALTERVM



Doronicum 111. Sciriacum.



Doronic. 111.
Austriac. al-
terum.



ALTERVM caulem habet aliquando cubita-
lem, rotundum, striatum, viridem, intus con-
cavū, capitulum in summo caule magnum, ex
multis flosculis luteis cōcavis, & quinque cre-
nis divisīs congestū, quod ab alijs longiusculis
& in extremo crenatis folijs, fulgore auri splē-
dentibus ambitur, non inodoro: semen supe-
riori simile, cum suo pappo facili evanescens:
folia circa radicē longo pediculo inhxrentia,
orbiculata ferē sunt, sensim tamen à pediculo
in latitudinē sese explicant, in ambitu dentata
& ferrata, quæ verò caule ambunt, longiora,
& ab ipsa statim pediculi sede in larū expansa,
omnia saporis acris & amari: radix ex viridita-
te candicans, minimum digitū crassa, genicu-
lata, & quasi squamata, internodijsq; distincta,
sed nodis sursum tendentibus, non infernē, ex
inferiore geniculorum parte longas agens fi-
bras, albas, satis crassas, & propagines in lateri-
bus, gustu ferē fucci ē glycyrrhizæ radice ex-
pressi & densati.

Invenitur in Etzcher, Durrenstein, & qui-
busdā alijs Austriacarū, Sciriacarumq; Alpium
jugis, inter saxa, in profundis scrobibus, ubi
perpetuæ sunt nives, sed illis repercussione ra-
diōrū Solis rupes & saxa ferientis, foliis par-
te saxa vicinā, & veluti in fornitem cōcame-
ratis, nunquam tamen abundantius quā in
Durrenstein. Floret Iulij initio, aut etiam se-
rius, in hortos verò transfatur, ubi non diu
permanet. Maio plerumque.

Matules.

HUMILIVS plerumque est Tertium, & capite floris majore, folijs à pediculo statim pænē orbicula.

Doronic. c. v.
Sciriacum.



orbiculatis, ut in Cyclamino, alioqui superiori non dissimilibus: radicum item nodi & propagines neque in hoc, ut nec in præcedente, deorsum tendunt (nodi autem in hoc minus apparentes) aut anfarum instar longè à matre sese spargunt: sed quasi matri contiguae sursum tendunt, & extra terram folia proeminentes, fibris in tellure sese firmant, ne quis sine fibris in utrinque anfas existimet.

Natalis. Nascitur in Veytzalben supra Neuburg in Stiria: & eodem quo præcedens genus tempore floret.

DORONTEIS etiam adnumero tres sequentes stirpes, quarum Prior in omnibus ferè prætis sublimioribus ad Alpium radices, tum in ipsius Alpibus Austriæ sitis frequens est: præteritum verò in Wechsel, ad ejus radices Maio florebat, in ipso autem jugo, qua Septentrionè, & Orientem spectat, serius. Eruebam etiam his proximis annis in cædus silvis ad Mœnum amnem sitis, circiter mille passus infra urbem Francofurtum ad sinistram. Memini etiam in montanis Belgicæ cædus silvis erutam, ad nos Machliniam aliquando adferri, Damasofonij appellatione.

Doricum v. Germanicum. EA porro terna aut quaterna summa tellure fundit folia, Plantagini latifoliæ ferè æqualia, longiora tamen, & ad Digitalis, luteum seu pallidum florem ferentis, foliorum similitudinem magis accedentia, nec vis distincta, mollia, viridia, supernè nonnihil villosa, infernè candidiora & leviora, bina semper ex adverso nascentia, gultu nonnihil amaro, & acri: caulem habet ferè cubitalem, nudum, rotundum, hirsutum, qui superiore parte in paucos ramulos divisus, calicem sustinet hirsutum, ex quo magnus emergit orbis multis flosculis luteis in quatuor foliola divisus, constans: cum orbem ambiunt quindena aut plura folia, Doronio latifolio similia, latiuscula, & per extremum crenata, coloris flavi elegantis: semen floribus succedens, ut in Doronie generibus, in pappum evanescit: radix minimi digiti crassitudine parè æquar, nodis quibusdam informibus distincta, multisque fibris donata, lateribus propagines fundens, & singulis annis nova germina proferens.

Doricum Pannonicum sive vi. ILLI non valde dissimilem fanis copiosè nascentem inveniebã, vicinis Nemethwywar, munitissimæ Ill. Balthafaris de Batthyán arei, cæduarum silvarum declivibus: plura tamen secundùm radicem habebat expansa folia, minus nervata & angustiora, angustiora etiam quæ caulem ambiabant, perinde tamen ut illa ex adverso nascentia, quæ cù suo caule nonnihil hirsuta erant: ejus suprema pars in plures ramulos dividebatur, sustinentes hirsutos calices, unde emergebant similes ferè flores, coloris tamen aurei elegantissimi, duplici interdum foliorum, mediùm orbem ambiens, & quodammodo pet extremum embratio- rum serie constantes: radix gracilior est Superiore, non paucioribus tamen fibris adnascen-
tibus

tibus donata, quàm illa. Maio etiam florebat. An porro hoc geous Montana Duchissini viti Simonis de Tovar, an alterum secundo loco descriptum?

Doronicum VII. Austriac. III.



SEXTVM genus omnium maximum, bicubitalem interdum aur ampliorē habet caulem, micimi digiti plerumque crassitudine, striatum, hirsutum, summo cacumine in aliquot alas diffusum: folia circa radicem orbiculata, longo pediculo inhaerentia, rugosa, & nonnihil hirsuta, quæ veidò nullo ordine digesta caulem ambiunt, ampliora sunt, mucronata, in ambitu leniter dentata, pediculo nullo, sed instar foliorum Peruani Hyoscyami latifolia, Tabacum majus vulgo vocati, caulem latiore basi amplectentia, viridia, hirsuta: flores extremis alarum ramulis insidentē magni, vicienis aut tricenis oblongis folijs, & orbem fatis latum ambricnibus conflatens, lutei coloris, odoris expertes: semen ut aliorum Doronici generum, striatum, virefcentis tamen coloris, quod cum suo pappo, aur leni flatu defluit, initium ab exteriori ambitu faciēs, quem admodum & in reliquis Doronici generibus: radix ex viridi candicans, nodosa, squillulæ similis est: sed ubi propaginibus aucta est, crassior fit, & ex multis veluti corporibus in unicum conflatur, & coalescit.

Secundùm rivos è montibus labentes, locis umbrosis in descensu jugi Wechsel primum observabam, unde in hortum tranlatum mihi egregiè propagatum fuit: sed postea longè majore copia, declivibus, silvosis tamen, locis Erschieri & Herren alben inveniebam Augusto flores proferens, cum in

Wechsel floreret Iunij initio. In hortis cultum Maio flores dat, veluti & in montanis silvis ultra Dravum, Pannoniâ interarmis, ubi anno M. D. LXXIX. frequentissimum etiam observabam: semen in hortis Iunio maturum.

NULLVM Primi & Quarti generum in Austriacis & Stiriacis jugis observatorum vulgare nomen mihi compertum est. Venatores, pastoresque montani Secundum & Tertium genus *Emfswurty*/ hoc est, Rupicaprarum radicem appellant, & ad versus vertiginem non minus commendant, quàm Auriculæ ursi flavo flore radicem, viribusque firmandis adprimè utilem esse ferunt. Quartum genus, ut dixi, Alismatis seu Damafonij nomine ad nos missum, nec absimile viderur illi plantæ quàm Matthioli pro Alismate exhibet. Meminit etiam hujus, ni fallor, Iosias Simlerus ad calcem Commentarii de Alpibus. *Materwurty*/ ait, à quibusdam dicta, veluti plantago quædam Alpina, folijs plantaginis, leniter hirsuta, flore Doronici, radice aromaticâ.

CONYZA.

CAP. IX.

TRIPlicEM Conyzam facit Dioscorides, majorem, minorē, mediam: binas priores in calidioribus regionibus sponte oascentes observabam: postremâ etiam vidisse puto.

MAIOR plures ex eadem radice emittit caules, sesquicubitales plerumque, aut majores, duros, lignosos, hirsutos, pingues, obsoleti coloris: folia in his multa, inordinata, alternis caulem amplectentia, duplo quàm Oleæ majora, hirsuta & pinguis, seu glutine quodam & pinguedine obrita, ex viridi pallentia: flores ut plurimum extremis ramis spicæ instar innascuntur lutei, rotundi, Senecioni ferè similes, & in pappum, ut illius, evanescentes: semen exiguum, cinerei coloris: radix crassa, fibrosa, vivax & multis annis perstans, quottannis novos pluresque caules proferens. Tota planta pinguis, glutinosa, & odorata cum quadam gravitate.

Supra Olyssipponem frequentissima ad collium Tago flumini imminenti radices, Murciano item Valentini quoque regno, atque etiam Narbonensi agro juxta vias & vinearum margines. Aliquando apud nos in Belgica siccilibus sata provenit, & egregiè flores protulit, ideoque florentem depingendam curabam: verum cum hiems subsequens illam abstulisset & corrumpisset, non potuit radix adulta exprimi.

MINOR

Doronicum maximum Austriacum, Juss. VII.

Natalis.

Conyza major.

Conyza v. torrida tri-plica. Conyza major.

Natalis.



Conyza mi-
nor.

Minor, raro plus uno assurgit caule, cubitali, plerumque minore, ramoso, hirsuto etiam & glutinoso, sed magis virente quam superioris: folia sunt triplo minora, ad Linaræ folia accedentia, villosa tamen pinguique etiam illa: extremi ramuli secundum longitudinem, veluti in Majore, flores sustinent, minores & longe minus splendidos, in pappum similiter evanescentes: radix (omnium quidem quas observavi ejus generis stirpem) singularis, & annua. Tota planta odoratior est Priore.

Natales.

Crescit autem frequentissimè in agris non procul Madritio, via quæ Toletum itur. Memini etiam in Galliâ Narbonensi sæpe legere infra silvulam illam, secundum quam via est à Mompelio Peral, stagnis adjacentem pagum, dum ad maritimam herbarionem proficisceretur. Viennæ Aultriæ etiam mihi nata, semine ex Hispaniis accepto, aliquot annis in horto perstitit, ex semine deciduo rediit. Floret autem cum Majore, sub Autumnum videlicet, & subinde semen profert.

VERVM C.V. Leonhardus Rauwolfius Doctor Physicus, aliud hujus generis circa Tripolim Syrix observavit, quod primo libro sui Itinerarij deferibit his verbis.

Conyza mi-
nor hanc
vultis, foris
majorem ge-
nerat.

Eo loco conspiciebam Tithymalum paralum, Conyza præterea minoris generis, plures ex eadem radice proferēs cauliculos, circiter pedem aut paulò amplius altos, quorum nonnulli sunt surrecti, potissima verò pars humi procumbit, novâq; fibras agens, subinde alios cauliculos producit: longiuscula habet Oleæ folia, pinguis, subhirsuta, fatis gravis odoris, cui tamen suavis quædam admixta sit: alioqui floribus & ceteris notis Majore non valde dissimilis.

TERTIAM autem legitimam nemini adhuc cognitam arbitrabat, cum Hispanicas stirpem Observationes evulgabam, quia hoc nomine ab alijs exhibita, mihi nõ satisfaciebat, sed nec adhuc mihi probati potest. Postea tamen in Aultriâ versans, stirpem quandã sponte nascentem inveni, quæ non incommode referri posse videtur ad Conyzam Tertiam Dioscoridi descriptam, locis non tigris, ipso asserente, crescentem.

Conyza 111.
Aultriaca,
hujusma for-
tis Dreje.

PEDALES verò habet interdum caules, rectos, firmos, duros, incanã lanugine teptos, quibus longa inherent folia, Conyza majoris foliorum amplitudine, molliã, incanã, hirsuta, dorso prominente, longiore, quæ circa radicem sunt, pediculo, quæ autè superiorem caulis partem amplectuntur, brevi, aut prorsus nullo: ea trita, non in jucundum spirant odore, gustata amari scula & acriscula deprehenduntur: flores extremo cauli, & ramulis illi inhxrentibus insident magni, Helenij florum formã, multis foliolis luteis medium discum seu orbem palliscentem ambientibus, nullo odore præditi: radix longa, tenuis, nigricans, serpens, subinde ad ipsa capita, unde caules prodeunt, multas candicantes fibras undique spargens, resinaceum quidpiam olet, gustataq; amara & acris deprehenditur, vivax & perennis.

EXIT

Conyza media, vulgaris.

Conyza Marth. Baccharis Monspet.



Exit sponte fœcis & aridis locis, herbiferis tamen, decliuibus collum ad Zimmerin, qua ad Phasianorum iter est, primo ab urbe Viennâ militari, ad Badenſes thermaſ, Radaun, Petronellam, arque ſecundum vias publicas. Florer Iunio. Natalis.

GRÆCIS porò hæc planta *κόρυζα* dicitur: Plinius Conyza vocat, & majoris radicē à quibusdā Libanotum appellari tradit. Theophrastus ſexu etiam diſtinguit, maiorem nominans marem, minorē, ſeminam. Gaza pulicariam vertit, propterea forſe quam illi Dioſcorides enecadis pulicibus tribuit facultatem: nam alia eſt Pulicaria dicta ob ſeminis cum pulicibus ſimilitudinem. Hiſpani quidam *yerba pulgera*, nimirum ob ſimiles, quas dixi, vires vocant. Nervina.

CETERVM frequentiſſima etiam eſt, in omnibus Regionibus quas peragravi, locis riguis, Conyza illa vulgaris, ab omnibus Tertia Dioſcoridis aut Media credita, quæ duorum eſt generum, Major & Minor: utraque pro ratione natalium humidiorum aut ſicciorum, luxurians & uberior, aut retortida. Hujus nullum vulgare nomen intellexi, nec ejus facultates mihi ſunt compertæ: iconem ramen Lectoris oculis ſubiicere volui. Conyza vulgaris Major & Minor.

Quæ verò à Marthiolo Conyze majoris nomine exhibetur, Conyza eſſe non poteſt: ſed ad Dioſcoridis Baccharim accedete, non ineptè forſitan quis cenſeat, pro qua etiam Mompeliani cùm ibic viverē, illam habebant: Salmanticenſes verò, neſcio quibus rationibus inducti, Helenium vocabant, nullis ramen noris convenientibus. Radicem porò ex vino decoctam propinabant quædam verulæ ad proſtigandam ſcabiem, in quem uſum & nonnulli monachi ex ejus radicē & folijs unguentum parabant. Naſcitur etiam hæc ſponte pleniſque Pannoniæ & Auſtriæ cædis montanis filvis: & illius iconem hic adijciendam exiſtinavi. Conyza Marthioli, Baccharis Dioſc. etiam ſancti tateſ.

ALIAM autem plantam obſervavi in deſcenſu Libani montis ſcribit Rauwolfius. xii, cap. Lib. ii. ſui Itinerarij, quæ plurimum ad Dioſcoridis Baccharim accedere ipſi viſa eſt: ex notis ramen, quas illi tribuit, porius ad ea Gnaphalii montani genera referenda viderur, quæ à doctiſſimo Fuchſio & alijs pleniſque Pilofellæ minores appellantur, cum quibus ipſe etiam Rauwolfius magnam (ratione florum) affinitatem habere refert. Baccharis Rauwolfij.

IACOBÆA PANNONICA.

CAP. X.

VULGARIS illa multis Provincijs planta, quæ ab Herbarijs Iacobzæ appellatur, Iacobzæ vulgari etiam in Pannonijs, Auſtriâ, viciniſque Regionibus naſcitur frequentiſſima. Inue- Iacobzæ vulgaris.

niuntur ramen & aliz ſurpes, quæ, meo judicio, ad ejus claſſem referri poſſunt. Zeriv.

PRIMA, Iacobzæ vulgari admodum ſimilis, niſi tota mollior eſſet, caulem habet cubitalem, Iacobzæ Pannonicae.

Iacobææ vulgaris.

Iacobææ IL.



talem, striatum, in multas alas inæqualiter divisum, sub quibus folia valde laciniata, mollia, & tenella, saporis amariantis & aenuseculi, odoris non injuvendi: flores in extremis tamis ratiotes quàm in vulgari, minoreſque & pallidiores, qui maturi in pappum & lanuginem resolvuntur, cui subest semen vulgari simile: radix, tamen valde fibroſa, non est perennis, sed singulis annis perit. Tota stirps mollibus villis, & pingui quodammodo lentore est obſita.

Crescit in Pannoniæ & Austriæ cædis silvis, præsertim in Leytenberg: plurimum etiam observabam in silvâ, Zollnock III. D. de Barthy an oppido, vicinâ, haud procul à eâ bonarijs fornacibus. Floret lunio, & semine deceduo quotannis sponte renascitur.

Quibusdam Senecio fortidus dicitur. Nec multum ab eâ differre videtur, quæ in maritimis Belgicæ aggeribus sponte provenit: minus tamen crassa est, neque adeo succi plena.

Terna, quaternaria, aut plura habet Altera folia, latiuscula, in ambitu leviter dentata, caulem cubitalem plerumque, angulosum, gracilem, per quem inordinata sparsa sunt folia, infimis paulò minora, ac in supremo, angustiora, lata basi ipsum amplectentia: in summo caule quaterni aut quini, tamquam in umbella nascuntur flores, Iacobææ vulgaris floribus non multum abſimiles, ante quàm explicentur, ex atro rubescentes, sed ubi aperti sunt, auri fulgore splendentes, quos in ambitu ſubſpant quindena aut plura foliola per extremum utriusque, supernè phœnicea, ſubtus verò quodammodo rubentia: flores maturi in pappum abeunt, cui involutum est semen nigricans, oblongiusculum, vulgaris Iacobææ semini non dispar: radix non valde magna, nigricans, tenuibus fibris candicantibus donata, sub Autumno nova denuo folia latiora, ad veteris caulis sedem singulis annis producit. Tota planta molliscula, & quadam lanugine obſita conſpicitur: amariantis autem est saporis.

Nascitur apud Nemethwywat III. Balhafaris de Barthy an, alijsque Pannoniæ & Austriæ inferioris montosis & cædis silvis. Floret lunij initio, & sub ejusdem extremum finem, semen maturum est.

Cubitali interdum excreſcit Tertia caule, ſtimo, striato, quem ambiunt folia lata, rugosa, mucronata, per oras ferrata, viridia, latiore basi, & veluti appendicibus quibusdam prædita, infimâ parte quâ caulem amplectuntur, ingrati & nonnihil acris saporis: quæ verò à radice geminant, rotundiora sunt & majora, sed nullas appendices habent, perinde tamen ferrata atque superiora: summus caulis dividitur in aliquot ramulos, qui flores compingunt, Iacobææ vulgaris similes, multò tamen majores, & ad Bupthalamii amplitudinem accedentes, maturitate in pappum evanescentes: semen observare non licet: radix satis crassa & candicans, ſubinde fibras, vulgaris Iacobææ instar, in latera expandit.

Provenit in Austriacis Stiariſique Alpibus: nusquam tamen abundantius, quàm supra

Herren-

Natalis.

Senecio facidus.

Iacobææ Pannon. III.

Iacobææ Pannon. III.

Natalis.

Jacobæa III. latifolia L.



Malva trimestris.



Herrenalben, qua longus ascensus est in Durrenstein. Copiosè etiam invenitur non procul à Zollnok. Florer Junio & Julio, in horros translata, etiam Maio.

Crescit in iisdem montibus, sed præsertim juxta rivulos & fluentes aquas, Jacobæa Quarta, longè major, amplioribus & magis mucronatis folijs, prona parte aliquanrulum incanis, caule plerumque bicubitali: ceteris notis serè cum Tertia convenit. Sed maturius quàm illa floret.

Has binas pultremas, initio æroniæ relinebam, cum nullum nomè meo judicio satis aptum illis tribuere possem: à florum tandem similitudine, inter Jacobææ genera reserè, & Jacobæas latifolias montanas cognominare placuit.

Gefnerus in descriptione Montis fradii, ejus meminisse videtur his verbis. Conyze alpinæ genus, sesquicubiti aut amplius proceritate, corymbis florum luteis, fibris radicibus albis pluribus & confertis, subamaris: à pecore non attingitur. Pastorum plerique Boni vocant, aliqui Goldst. Hæc eadem Sivalerus ad finem Commentarij de Alpibus.

MALVA TRIMESTRIS.

CAP. XI.

PEDALI altitudine crescit hoc Malvæ genus, caule rotundiusculo, tereti, viridi, lanugine ramena aliquantulum oblico, quem rara & nullà certà serie distributa ambiunt folia, renella, viridia superne, infernè dilutiora: infimo cauli adnata, circinare sermè sunt rotundiorata, in ambitu serrata: supremum caulem & ramulos amplectentia angulosa sunt, ad foliorum Althææ formam pænè accedentia: flores summis ramulis inhæret satis magni, quinque folijs extrema parte lunaris trinitantes, purpurascens coloris, unguibus saturatione purpurâ infectis, prodeuntibus ex umbilico staminibus pallidis, villis purpureis: semen in foliaceis capitulis plenum: radix est parva, candicans, tenuibus fibris prædita, annua tamè, aut potius trimestris, quana subsequens hiems corrumpit.

Hujus siccam plantam suis floribus ornata, & chartæ implicatam mittebat ad me N. V. Ioannes Hoghelandius anno xci. supra millesimum & quingentesimum, ex quâ subjectam iconem delineari curabam.

ALTHÆA PANNONICA.

CAP. XII.

VLGARIS per Pannoniam est, agroque Viennensî, Althæa illa Belgicæ pratis multique Germaniæ locis communis.

ALIUD autem genus observabam, & etiam in Moraviâ, quod, licet folijs totaque pænè reliquâ facie cum vulgari conveniat: floribus tamen plurimū ab eâ differt, quippe qui

Jacobæa Pann.

Malva ped.

Althæa.

Althæa Pannon.

Althæa vulgaris.

Althæa Pan.
111.Althæa Pan.
1111.Althæa ap.
brera Lobelii.

Althæa frutex 1.

Althæa fru.
tem 1.

Natalis.

Althæa fru.
tem 11.

qui ampli admodum sunt, Alceæ floribus etiam majores, colore item illi vel respondentes, vel omnino fere candicantes, quibus semen vulgari simile calicibus inclusum succedit.

TERTIUM quoddam genus est, huic formâ non valde dissimile, sola in floribus differētia, qui minores sunt, vulgaris tamen floribus aliquantulum majores.

VERVM & Quartum genus istie reperitur, ejus folia licet incana & mollia, in tres tamen majores lacinas divisa sunt: flores etiam paulo minores superiore, Belgicę seu vulgaris floribus magnitudine respondentes, sed colore dispares, nempe qui toti carnei, sive incarnati coloris sunt, multis intus staminibus nigricantibus: ceteræ notæ cum vulgari conveniunt.

Gaudent humidis locis, & secundum rivulos sitis. Florent omnes lulo.

VIRARI vulgarem *sejer malva*, hoc est, albam malvam, & *manola* appellant.

ALTHAEA PAVTEX.

CAP. XIII.

QUARTA Dodissimus Lobelius Althææ arboreæ nomine exhibet, ea nobis aliquando Machluzæ usta semine peregrin missio, feliciter provenit, atque ex radice crassa lentaque, qualis in Althæa vulgari, duriore tamen & quodammodo lignosa summâ parte, aliquot stolonnes prætulit humanz proceritatis, qui adventante bruma marcescebant, singulis deinde annis novo vere plures protrudebant: flores Augusto demum producentes, semen Septembri, quo à ventis excusso & deciduo, aliz etiâ stirpes sponte renascebantur.

SAB aliud genus in Hispaniâ observabam, fruticans, apt arbuscule instar affurgens, crassifusculo stipite, lignoso, in multis magnosque ramos diviso, qui in alios minores, duros etiam, lignosos & minime obliquos, cortice cinereo lentosque rectos, sindebantur: ejus folia Althææ folijs similia, minora tamen, magis rotunda, valde mollia, & prorsus incana: flores extremis ramulis, & inter foliorum exortus nascentes diluere purpureus quinque folijs constans, Malvæ vulgaris flori non dissimilis, & major quàm in Althæa vulgari: semen planum, Althææ simile.

Illam juxta urbem Horuæ tam tantum, extremis limitibus Valentini Regni, Murciano finitimi, observabam Martio florētem, apud Rhamni prioris alteram speciem, de qua libro primo: an verò perpetua esset fronde, cum Hispanicarum stirpium historiam scriberem, ignorabam, cum mihi duxræt eo, quo dixi, loco esset conspecta. Multis autem post annis ex ea stirpe, quæ semine mihi à peritissimo rei herbariæ & diligentissimo Josepho de casa bona missio, Francofurti ad Mœnum nata est, & biennium in testaceo vase adservata, perduravit, deprehendi istam plantam folia non abjicere, nisi alijs novis enatis, ut pleræque stirpes perpetuâ fronde virentes, facere consueverunt.

NON minus rarum & elegans est Tertium Althææ fruticantis genus, non à me quidem observatum, sed ejus iconem ad me mittebat Jacobus Plateau. Fruticis modo affurgit, & colonibus



Alcea fruticosa Cannabino folio.



stolonibus lignosis, cortice nigricante obductis, quali etiam vestiti rami in quos stiones dividuntur: his nullo ordine distributa adnascuntur folia, angulosa, in paucas lacinijs dissecta, in ambitu serrata, supernè admodum viridia, infernè quodammodo pallescentia: summis ramis innascuntur flores Rose instar ampli, elegantes, quinque folijs constantes, albas, quæ multis purpureis venis prædita sunt: ungues purpurâ floridiore, quàm in Sabdarifæ (de qua paulo post) flore, infecti: ex umbilico prodeunt multa stamina flava, & stilius albus multifidus: an semen apud eum ruerit, me latet, vix tamen puto, quandoquidem ad me scribebat, sub Septembris finem illi demum flores protulisse: folia illi decidunt Novembri, extremo Aprilis nova denuo germinare solent. Facilius fert frigidioris aëris injuriarum: nec adeò tenera est, ut Sabdarifæ.

Nata forsitan hæc planta semine, quali me donabat superiore anno Ioseph à casa bona, Althææ arboris duorum generû appellatione, reces ab ipso in Creta insula collecto. Vni ex amicis quibus communicabam, provenit planta, quæ sequente anno, nempe xciit. supra u. & o. valde adolevit: nam ramos protulit bicubitales, cortice viridi tectis, cui inspersa est plurima incana lanugo, seu potius tomentum, ut in priore quod descripti genere folia etiam habet incana, angulosa, & per oras dentata, illis tamè majora: flores minores, Althææ vulgaris florum magnitudinem vix superantes, quinque folijs constantes instar reliquarum malvarum, coloris rubri valde diluti, & ad carneum (si ita vocare licet) inclinantis, multis staminibus ex albo pallescentibus in oblongo, tubo & crassiusculo stilo nascentibus & umbilicum occupantibus: floribus defluentibus succedunt plana capita, ut in vulgari malva, semen in orbem serie quadam distributum continentia.

ALCEA. CAP. XIII.

VARII quas peragravi regionibus, Vulgarem Alceam sponte crescentem inveni: cum autem ab omnibus qui Plantarum historiam scripserunt, ejus mentio sit facta, non existimavi diutius illi immorandû.

Genus tamen illud, quod ex radicis capite plures crassas & lentas alias radices Althææ instar fundente, multos stiones seu virgas crassiores, interdum bicubitales producit, quibus inhaerent folia magis laciniata, quàm in vulgari, ad Cannabinam serè accedentia, & flores innascuntur vulgaris floribus majores, plumbus Vngariz & Austriæ locis circa sepes nascens observavi: his etiam proximis annis in Hassiâ & circa Francofurtum ad Moenum conspexi: ut autem facilius agnoscant lectores quam intelligam, illius iconem adijciendam esse existimavi.

CC

SE D

Althæa fruticosa

Althæa fruticosa

SEd peregrinum quoddam Tertium genus memini nobis in Belgica natum, femine à C. V. Alphonsio Pantio Ferratia misso, quod à nemine adhuc descriptum arbitror. Illud ipsum etiam Viennæ Austriæ diu in horto alui, atque etiam Francofurti & Lugduni apud Batavos.

Alcea peregrina.

RECENS igitur natum, folia habet silvestris & erraticæ Malvæ panè similia, circinatæ quodammodo rotundatis: deinde à radice minimi digiti crassitudinem æquante & in ramos devaticatâ, & summo capite quasi nodosâ, exeunt virgæ cubitales aut ampliores, in ramos divisæ, quibus innascuntur folia, ad jam dictæ modum lacinia, secundum verò extremos caules & ramos, tenuius incisa & multifida, ad verbenæ folia femè accedentia: flores in summo caule & ramorum extremis copiosi & conferti, quinque folijs constantes, fati magni, dilutioris purpuræ colore, & quasi albicanres, intercurrentibus tamen purpureis venis: floribus succedunt capitula, semen planum & compressum cunctinentia, alterius quidem semini forma simile, sed multo minus & nigrum, quod maturitate decidens, proximo anno novellas plantas producit: vivax tamen est hujus plantæ radix, & multos annos perdurat, singulis annis novos caules proferens.

ALCEA AMERICANA.

CAP. XV.

Alcea Americana.



LEET elegantissima hæc planta nunc sit vulgaris notitiæ: quia tamen video ejus historiam à recentioribus satis leviter adumbratam, atque ejus iconem non fideliter imitatum, operæ pretium me facturum existimaui, si paulò accuratius illam describerem, & iconem feliciter expressam, qualem à Jacobo Plateau accipiebam, Lectoris oculis subijcerem.

CAULEM autem habet rectum, striatum, purpurascens, binos aut ternos cubitos altum, vel etiam altiores, si in horto, pingui solo, feratur (in fistilibus satis brevior est) quem ab imo multa ambiunt viridia folia, nulla observata setie, hinc inde sparsa, infima serrata quidem in ambitu, sed non lacinia, quæ medio cauli inhaerent, in tres lacinias dentatas divisa, suprema autem in quinque, Cantabrinorum foliorum instar, dissecta, summo fastigio, veluti in gemmularum & angustorum foliorum spicam desinentem: singulares fert in singulis alis calices molliter echinatos, è quibus exire floris magnus quinque folijs præditus, coloris ex albo pallescentis, quorum ungues saturâ & nigricante purpurâ, radiatim in folia se spargente, infestâ, ut in Alceæ illius vesicariæ seu Hypecoi Matthioli flore, floris umbilicum occupât multa stamina apicibus flavis prædita, & stilus medius supremâ parte ramosus, albus: floribus valde fugacibus (nam ipsoque sunt) succedunt

brevia, echinata, acuminata capitula pentagona, interius villis albis obdita, semen cunctinentia quale fere Stramonii: radix quidem multis candicantibus fibris ut plurimum constat, sed non est vivax, nam sequente hieme perit, & singulis annis novâ facione adquiritæ, apud nos saltem, quibus rarissime fert semen: etenim cum sero admodum, nempe sub Augusti finem, vel Septembris initio floreat, & frigoris sit impatiens, primæ pruinx illam corrumpebat. Solis orientis radijs delectari videtur, & frequenter rigatione.

Sabbasia.

Ex Italiâ primum semen ad nos missum Sabbasia appellacione (nescio an tale nomen apud quos sponte nascitur obtineat) deinde ex Hispaniâ, pro genere Malvæ Indiæ elegantis: haud diu ad Malvæ seu potius Alceæ classem referenda, propterea Alceam Americanam nuncupavi.

ALCEA ÆGYPTIA.

CAP. XVI.

Bamia del Cayro, Alcea agyptia.

PEREGRINVM etiam est hoc Alceæ genus, ex Ægypti Alexandriâ primum Italiæ communicatum, inde Germaniæ & Belgicæ, *Bamia del Cayro* appellatione.

ROTUNDO autem affurgit caule, recto, virecente, sesquicubitali: cui inhaerent nulla etiam

Alcea Ægyptia.



Phlomis Lychnitis.



FOLIA autem suprà tellurem fundit crassiuscula, Salvia tenuifolia pœnè similia, longio-

CC 2

Phlomis
Lychnitis
Linn.

etiam serie disposita folia, circa infimam quidem caulis partē Malvæ folijs pœnè similia, angulosa & in ambitu serrata, à medio verò caule ad summum, in quinque profundas lacinas, instar foliorum Sabdarifæ, divisa, dilutius virentia: flores in alis nascuntur Sabdarifæ quidem formâ & colore seq̃e similes, pallescentes videlicet, minores tamen, sed non minus fugaces: his succedūt crassiuscula, longâ, pentagona, villis obdita, & mucronata capita, semen Orobi, seu potius Leontopetalii seminis instar continentia, lanugine tamen quadam leviter recta: radix in aliquot fibras sparsa, non vivax tamen: nam primæ etiam prunæ totam plantam corrumpunt, sic ut non mirum sit, si ad frugem pervenire nequeat. Hujus etiam icon à Jacobo Plateau missa, à diligente pictore in lignæ tabellâ me curante, quemadmodum & superior, expressa est.

DILIGENTISSIMVS Prosper Alpinus qui librum de Ægyptiacis plantis scripsit, illius etiam meminit, Bammiamq̃ appellat, & frequentissimam in Ægypto nasci tradit. Præterea eam gentem, illius seminibus, non secus quàm Europæi ex Phasiolis, pisif, alijsq̃ leguminibus fercula parare ait, frequentissimè autè his ferculis velci in jure catinum paratis: frigida & humida in primo gradu apud Ægyptios censerî, habereq̃e vim resolventem & emollientem: proinde pectori ac pulmonibus convenire, vētre emollire, ac lumbicum reddere, fomenti vel emplastri modo folia apposita inflammationes resolvere, dolores mitigare, tumores emollire, concoquere, ac ad suppurationē, suppurandos, movere. Mulieres ad uteri duntiem, ipso referente, fomenti, emplastri, infusionibus, ex folijs & fructibus procuratis, multa cum utilitate urūt: in renum verò inflammatione, & calculis ex iisdem paratum decoctum per os cum saccharo candido sumptum aliquibus diebus, pro selectissimo auxilio habet: ad ophthalmias etiâ, finita fluxione, decoctum collyrii modo usurpant, atque cum eo fovere latus dolens in pleuriticis solent.

Non dubium est, quin illa ipsa sit planta quam Rawwolfius in legentibus nascentem cum alijs quibusdâ stirpibus observabat non procul ab Ana urbe, ad Euphratem sita, ut refert lib. II. cap. V. sui Itinerarij. & in colis Lobis Endigi nomine, hoc est, Phasioli indici, cognitam esse asserit, ex multis autè notis, Theophrasti ipsiusq̃e esse censet: quam vocem cur Gaza Trionum latinè reddiderit, causam non video.

PHLOMIS LYCHNITIS.

CAP. XVII.

NON sum ignarus varias stirpes pro Phlomis Lychnitide proponi ab Herbariæ rei Scriptoribus: nulla tamen, meo judicio, ad Diosc. descriptionem propius accedere videtur, quàm quæ à nobis proponitur.

Phlomis
Lychnitis
Linn.

Verbascum fil. Marthioli.



Katis.

Dagil.
Dagil.
Dagil.Candida,
Mouche.Verbascum
fil. Marth.

Mouche.

Horminum silvestre 1.

Horminum
fil. Marth.
Horminum
fil. Marth.
Horminum
fil. Marth.

Ceterum ad Hormini silvestris classem referendas etiam censeo nonnullas alias species, quarum Historiam hoc capite scribere animus est.

ra tamen & angustiora, candicans, inferiore parte densa & fetida lanugine prorsus obdita: inter hæc exeunt cauliculi dodrantes plerumque, interdum paulo majores, quadranguli, villosi & candicantes: e quorum geniculis bina folia longiuscula, superioribus similia, infer te opposita alternatim nascuntur, cauliculi totum fastigia, breviora habet, & sedes latiuscula prædita. Flores Lamij, lutei coloris, citra extremos cauliculos verticillatim ex densa lanugine & quasi villis quibusdam pallidis prodeunt, comâ plerumque inflexâ & nutante: radix nigricans est & lignola.

Exit hæc collibus, siccioribusque, & petrosis locis per universam Hispaniam & Lusitaniam observaveram & antea in Narbonensi Galliâ.

Floret Maio & Junio, semen autem subrum Verbasci silvestris Salvia folio fere simile in vasculis lulo profert.

PHLOMIS hæc Græcis λευκή, à quibusdam ὀφθαλμὸς appellatur: Latinis Lychinis & Thyrallis: Mompelliani, dū apud eos vivebam, Verbascum silvestre vocabant: Castellani *Candidera*, Granatensibus *Mouche*, eadem prope ratione dicitur, quia scilicet ejus folia, non modò sicca, sed etiam recentia oleo inspersa ellychnij vicem supplere possint si accendantur, quod etiam illis tribuit Dioscorides.

An ullas alias dotes habeat, neminem veterum scribere memini.

ILLO verò hîc adijciendum putavi, Verbascum Marthioli silvestre Salvia folio, & quorundam aliorum, magnâ copîâ in jugis illis montium qui Lusitaniam à Bæticâ distimulant, nasci, ubi ab incolis *Matulera* dicitur: sunt autem illi montes pars ejus, qui Hispanis *Serra morena* vocatur, hoc est, mons niger, & Vererum Mons Marianus esse creditur. Tota etiam Bætica Silvestri illo Verbasci abudat, quo potè nomine vulgari Bæticæ appellât, nō intellexi.

HORMINVM SILVESTRE. CAP. XVII.

HORMINI silvestris appellatione, comprehendendo Scarleam vulgo Herbariorum nuncupatâ, cum eam quæ à nonnullis Colus lovis vocatur: sunt enim revera Hormini genera.

Scarleam potè sponte nascentē, videre non memini: sed in hortis dumtaxat cultam, & valde familiarem. Quæ verò præpinguis & leni humore quomodo petrus est ramis, flavo flore, Colusque lovis cognominatur, per universam Pannoniam adeo frequens est, ut nihil illâ vulgatus sit ad collum & montium radices, atque etiam ad sublimiorum & editiorum loco sitotum hortorum margines, inret sepes & arbores. Nascitur & multis Austriæ locis: atque memini ante multos annos ad lacum Lemannum sponte nascentem observare. Est præterea tertium genus vulgo notum, de quo suo loco.

ALIQUOT

Hormini fil. II. flores.

Hormini fil. II. caulis cum radice.



Horminum silvest. III.



ALIQVOT habet Prior caules, cubitali interdum longitudine assurgentes, quadrangulos, nonnihil villosos, firmos, geniculatos: folia ampla, hispida, mucronata, in ambitu serrata, rugosa, singulis geniculis ex aduerso adnascencia, Scarlex folijs haud multum absumilia, minus tamē incana, & odore minus gravi: ex alarum cavis oriuntur ramuli, floribus purpureis (minoribus quàm Scarlex flores, & Lavendula vix maioribus) verticillatim usque ad extremum onusti, inflexam & veluti procumbentem atque nutantem (picam efformantes: semen in vasculis pusillum, nigricans: radix illi magna, pollicari crassitudine, nigro cortice obducta, dura, vivax, singulis annis nova germina producent.

Invenitur passim Viennenſi agro juxta vias, in montanis pratis circa Marię cellā, & S. Crucis Abbatiam, supra Badēſcs rhermas, & plerisque Alpeſtribus Austrię arque Stirię locis quintetiam apud Marcomānos, & apud Hirtz-pach pagum ferri fodinis nobilem, supra Noribergam Pragenſi in incire reperire memini. Floret Junio, semen Julio mense perficitur.

ILLIUS porro silvestris Hormini, quod Gallitrichum quidam cognominant, non meminisse, quia ab alijs jam exhibitā: nisi plures ejus species & florum colore, & foliorū formā nonnihil inter se differentes inveniri observasse.

LONGA habet Prior secundū radicem folia, parte inferiore latoriora, deinde sensim in

mucronem definentia, nullis lacinijs divisa, sed per oras dumtaxat serrata, supernē viridia

CC 3

& nullis

Horminum
fil. II.

Nasaba.

Gallitrich. II.

Hormini fil.
III. 9a.
class.



& nullis villis obſtā, rugoſa tamen, infernè autem villoſa, odore reliquorum Hormini generum gravi, & ſapore amaro: caules eubitales, quadrangulos, geniculis diſtinctos, villis obſiſtos, quos ad ſingula genicula, bina ſemper folia inter ſe oppoſita amplectuntur, ſuperioribus paulò minora: extremus caulis plerumque purpureſcit, pinguiſque eſt, & deſinit in longiſculam, præpinguemque ſpicam florum hiantium, galeaque editiore prædiorum, coloris purpurei ſaturatioris elegantiffimi: ſemen deinde in caliculis, rotundum, nigrum: radix craſſa eſt, nigra, multis fibris prædita, vivax, ſingulis annis nova germioa proferens, novòſque caules producens, ſecundùm radicem ſubinde fibras agentes.

Hormini fil.
lxx. Species
altera.

ALTERA ejus ſpecies, illi quidem ſimilis, ſed floris colore variat, qui proſtus hiveus eſt, folia etiam iucana, non virentia: in reliquis notis conveniunt.

Hujus unicam ſtirpem Maio menſe florentem primùm obſervabam anno M. D. LXXIX. in ſiccioribus pratis Sopronio Pannoniæ vicinis, & erutam deſerebam Viconam in D. Aieholziſ hortum, ubi aliquot annis permanſit, & deciduo ſemine multiplicata eſt, atque alijs communis facta.

Hormini fil.
lxx. Species
tertia.

TERTIA ſpecies majore altitudine excreſcit, caule quadrangulo, ut reliquæ ſpecies, & folijs ad ſingula genicula ex adverſo oſceſcentibus, ſed ejus extima pars non purpureſcit, verùm viſcens eſt: flores tamenſi forma ſimiles, dilutioris ſunt coloris: folia inferiora majores habent incifuras, ut nonnihil laciniata videantur, reliquæ notæ conveniunt.

Paffim in ſilvis cæduis, montanis pratis, viarumque marginibus ſpòte naſcitur cum Primâ, non modò in Pannonijs & Aſtriâ. Sed in Bohemiâ, Moraviâ, tota Germaniâ, & alijs pleniſque Provincijs. Floret Maio, interdum etiam Junio.

Illam in hortis Francofurtenſibus, fructiferis arboribus conſiſtis, florem variantem conſpicebam, ut qui neque purpurei coloris ſaruri, neque diluti eſſet, ſed quaſi albefeſcentis & cinereæ: quæ colorum diverſitas facilius obſervari poterat, quia diverſæ ſtirpes his coloribus prædix, in eodem interdum horto mixtim naſcebantur.

Hormini fil.
lxx. Species
quarta.

QUARTAM ſponte naſcentem non vidi, ſed mihi Viennæ nata anno M. D. LXXVII. ſemine ex Italiâ muſſo. TERTIA ſpeciei valde diſſimilis non eſt: perinde enim aſſurgit caulibus quadrangulis, genicularis, in quibus ex adverſo, ut in alijs generibus, naſcuntur folia rugoſa, viridia, ſenſim in mucronem deſinentia: flores verticillatim in ſummo caule & ramis naſcentes, ejuſdem cum præcedentibus formæ, galeatos habet, minores tamen, & coloris rubri, ſemen in caliculis exile, nigrum: radix vivax, ſingulis annis nova germina producit. Florebat mihi Junio.

Hormini ſil. IIII. quinta ſpecies.

Hormini ſil. v. altera ſpecies.



SE D & Quinta ſpecies Hiſpanico ſemine mihi Viennæ Auſtriæ nata, illi non valde diſſimilis: etenim caules habet non minùs altos, quadrangulos, nodis cinctos, villis quibuſdam obſiſcos, & folia in ſingulis nodis ſerè ſimilia, paulò tamen duriora, leuiora, anguſtiora, anguſta quodammodo, mucrone magis obtuſo, & laxioribus dentibus prædita, præſertim quæ ſecundùm radicem naſcuntur: è caliculis, in extremo caule ſummiſque ramis verticillatim naſcentibus, & veluti in ſpicam deſinentibus, emergunt flores reliquis ſpeciebus longè minores, Lavendulæ ſorum ſerè æmuli, nec colore ab illis valde differentes: quibus decedentibus, ſuccedit ſemen nigrum: radicem habet ſuperioribus ſimilem: & tota planta ſimili cum reliquis odore prædita. Florer etiam Iunio.

Hormini ſil. IIII. quinta ſpecies.

Naſcitur & hæc ſponte in Anghà: nam cùm negotiorum quorundam cauſâ, anno M. D. LXXIX in eam inſulam eſſem proſectus, & in aulâ, quæ tum Grenwycij, quarto infra Londinum miliari erat, verſarer, ſatis frequentem ad Regiæ arcis Hippodromum invenicbam, Septembris initio eùm florentem, tum ſemine onuſtam.

Hormini ſil. v. altera ſpecies.

PROALI plerumque eſt Horminum ſilveſtre Quintum altitudine, quadrâgulis caulibus & genicularis, reliquorum generum inſtar: folia ad ſingulos nodos bina, ſibi in vicem oppoſita, rugola, ſalviæ foliorum præne æmula, non ramen incana, per oras nonnihil ſerrata, dura, guſtu ſexticeantis & amari, odoris verò, quàm ſuperius deſcripta, jucundioris: flores à medio caule ad ſæptimum uſque verticillorum inſtar io orbem naſcuntur: è purpureis caliculis exenſis, ſalviæ ſimiles, ſed minores, eleganti colore præditi ex cæruleo purpuraſcente, & quaſi violaceo, interdum etiam dulciore, nonnumquam verò quaſi cinetacco: ſemen in caliculis nigrum, reliquis generibus minus: radix digiti minimi craſſitudine aliquando æquat, nigriſque coſtice teſta eſt, interiori parte flavelcente, multos ſingulis annis producit cauliculi, interiori, & terræ viciniore parte humi procumbentes, atque è nodis radici proximioribus ſubinde fibras agentes. Tota denique planta aſpectu elegans.

Hormini ſil. v. altera ſpecies.

Vbiq; circa Viennam Auſtriæ naſcitur, totâque Pannoniâ, ſecundùm vias, in agrorum, vinearumque marginibus. Integri à æſtate florēt, & ſubinde ſemen profert.

Eſt huius generis alia ſpecies longè major, duorum cubitorum altitudinem plerumque attingens, interdum etiam ſupetans: ipſius caules triplo craſſiores, quadranguli tamen, &, uti alterius, geniculari: folia multo majora, & craſſiora, albis maculis magnâ ex parte diſtincta, qualibus & ſalviæ cujuſdam, & Menthaſtri folia notata videre memini: ſpicæ ſorum longior & craſſior, ſorum verò formâ, coloreque, atque etiam ſemine, ſatis conveniunt.

Hormini ſil. v. altera ſpecies.

Rarior

Rarior est hæc species Priore, nec nisi in pratis herbosisq; locis, ubi gleba uberior, invenitur: & paulò ferius alterâ florere incipit.

Nec inelegans est Hormini silvestris genus illud minus supinum, quod semine ex Cretâ primùm allato, deinde Lugdunum Batavorum ad Ioannem Hogelardum misso, illi natum est anno M. D. XCII. & sub extremum sequentem Iulium flores tulit.

FOLIA autem promit per terram strata, pollicari longitudine minora, secundùm pediculum angusta, deinde paulatim in latitudinem expansa, rugosa, per oras crenata: caules ejus aliquantulum angulosi, in quibus per intervalla nascuntur bina semper folia sibi opposita: quibus in orbem dispositi incumbunt semi flores albi, Cactariæ vulgaris floribus formâ, & amplitudine pares. Tori planta insipida est.

Nomen. SILVESTRIS Hormini, ὀφύριον ἀγρίον, ut dixi, genera videri has omnes plantas, censeo: nemini tamen legem imponere volo, sed cui libet, quo nomine eas donare velit, liberum relinquo. Mihi verò, Schatlea vulgaris, sive Sclarea (ut quidam dicere malunt) quam Galli

Ornale *Ornale*, Vngari *Zent laas fœe*, hoc est, S. Ioannis herbam, vocant, Horminum silvestre Primum erit: Colus Iovis luteis floribus, Horminum silvestre Secundum: licet quidam Galeopsum luteam vocare malint, notis reclamantibus ramen: Quod mihi primo loco descriptum est, Tertium: Quod secundo, Silvestre Lobelij, Gallitricum vulgo dictum, Tra-

sub Galeo
beg go verò *sub Galeo* Quartum: cujus quinta species semine ex Hispaniis misso Baccharis nomine mihi nata, magna autem illa Plantarum historia, quæ triennio post divulgata meas Pannonicarum stirpium observationes in lucem prodijt, Sicut itidem querno folio appellare videtur: Quod autem penultimo loco descripti, mihi Quintum erit: rhizotomæ mulierculæ Austriacæ *sub Galeo* id est, agrestem salviæ nominant, vulgòque venalem proponunt, cum alijs balneantibus herbis. Matthioli secundam ejus speciem, Horminum silvestre vocare videtur: Lobelius inter Verbasci genera recensere maluit, & Verbascum nigrum salvisfolium appellat, quod an luteo flore variet, nunquam observare memini. Sextum autem erit, supinum illud Cretico semine natum.

MENTHASTRVM.

CAP. XIX.

Mentha syl-
vestris.

1.
Mentha syl-
vestris.



Radix.

NULLAM Provinciam adire memini, in qua non confexerim Menthastrum, sive Silicularem Mentham, Græcis ὀφύριον ἀγρίον dictam, sponte secundum aquas & rigus locis nascentem: Binas verò alias, præter eam, plantas observabam, partim in Pannoniâ & vicinis locis sponte nascentes, partim semine peregrino accepto mihi Viennæ natas, quæ ad ejus classis pertinerent videntur.

CVBITALI, aut ampliore Prima affurgit caule, quadrangulo, medullâ pleno, multis nodis constante, ex quibus bini semper ex adverso oriuntur ramuli similiter quadranguli, circa quorum extremitates partes oblongæ spicæ, verticillatim compositis caliculis constantes, in quibus flores Menthe silvestris aut illius potius Calaminthæ, quam vulgo Cattariam vocant, floribus similes, exalbidi, grati odoris: folia ad vettis inter se pediculis caulem & ramos ad singulos nodos ambiunt, Menthastrum ferè similia, sed magis ad Cattariæ folia accedentia, colore tamen minus albicante quàm illâ, aut Menthastrum, sed potius viridi, menthastrum odorem referentia, acrem & calefacientem saporem: radix dura, & lignosa ex lateribus propagines spargit, ut reliquæ congeneres plantæ.

Sponte nascentem hanc plantam inveniebam, primùm ad Austracarum Alpium radices in pratis monasterio S. Crucis vicinis, & ad Rehenaw Præfatus Neubergensis arcem, Augusto florentem: deinde maximâ copiâ in Vngariâ,

ad radices scopuli, in quo extructa est munissima arx Nemerthwywar, Germanus *Epistolog* dicta, Illi Viri Balhafaris de Bathyan p. m. qui, dum vivebat, hereditarius Archidapifer erat Regni Vngariæ, & S. C. R. Q. M^o à Consilijs: tum etiam in Leytenberg supra Manderstorff Junio florentem, quo tempore similiter, in hortos translata, flores producit.

ALTE.

Menthastrum 11. Montanum.

Menthastrum 111. tuberosa radice.



11.
Menthastrum
tuberosa
radice.

ALTERA, quæ mihi Viennæ semine nata est, & alijs quibus id communicabam, acceptum ex Hispanijs Calaminthæ tertix nomine, cubitales habet caules, quadrangulos, rectos, frequentibus, ut superior, nodis cinctos, sub his futos: folia longiuscula, rugosa, in ambitu nonnihil serrata, superioris Menthastris folijs non dissimilia magis tamen incana, non suavis odoris, amari & acris saporis, singulos nodos æquali, sed opposito inter se situ ambiunt: summi tamen cum extremo caule, in molles, canescentes exilium foliorum spicas desinunt, & inter ea verticillorum ritu compositi nascuntur caliculi, quibus prodeunt flosculi candidi, Cattariæ florum æmuli: his marcidis, succedit semen illi par, exile, nigrum: radix erassa, luccuienta, taphano ferè æqualis, fortis aliquantulum fusca, in multos hinc inde ad latera quasi paruos adnascentes napos extuberat, alijsque longiusculis fibris donata est, perennis, & plures singulis annis caules proferens: imo ipsi etiam napi à matre abrupti, & terrâ obruti, novas interdum plantas procreant. Floret Iunio.

Prior non satis fideliter plantam expressit: nam & inferiora folia latiora esse debebant, & rugosa, & adnati in lateribus napi crassiores & magis tumentes, & fibræ omissæ, quas aditas oportuit.

EODEM potè tempore quo semen, ex quo hæc planta nata, ex Hispanijs mittebatur, additum erat etiam aliud Calaminthæ primæ appellatione inscriptum, ex quo pulcherrimum Cattariæ genus enatum, cubitales habens caules, quadrangulos, geniculatos, multis raris præditos oblonga, angusta, per oras crenata & incana folia, odore quàm in Cattariæ vulgaris folijs vehementiore, fervido gustu: flores spicati in extremis ramis nascentes, candidos: vulgaris Cattariæ floribus respondentes: deinde semen in exilibus calicibus nigrum, Calaminthæ semini par: radicem duram, fibrosam, perennem, singulis annis novos caules proferentem. Floret Iunio & Iulio.

MENTHASTRUM montanum Pannonicum appellari poterit Prior: Alteri, tuberosæ radice cognomen addi: Cattariæ verò, Hispanicæ tenuifoliz nomen aptari.

MARRUBIUM.

CAP. XX.

LEGITIMUM Marrubium multis locis frequens crescit: at in Austriâ & Pannoniâ rarum est, & certis dumtaxat locis ipsæ paucis sponte nascitur. Aliud verò genus frequentissimum illic conspexi, quod (dum Pannonicarum stirpium observationes vulgabam, ne-

Marrubium vulgare.

Marrubium alterum Pannonicum.

Marrubium
alterum Pan-
nonicum.

ham, nemini adhuc descriptum fuisse arbitror. Ejus Historiam hoc capite dabimus: sed legitimi iconem præponere volumus, ut utriusque collatione facta, facilius agnoscere possit quæ sit differentia.

MVLROS verò ex eadem radice profert Pannonicum caules cubitales interdum, quadrangulos, firmos, nodosos, in plures ramos divisos: folia ad singulos nodos bina, contrario situ nascentia, duas uncias longa, unam lata, in ambitu serrata, legitimo Marrubio parè similia, sed angustiora, nec adeò orbiculata, imò paulatim à petiolo in latitudinem exerescentia, sensimque in mucronem desinentia, prorsus incana, non injucundi odoris, amaritudinis tamen manifestæ, & acrimoniz: flores candidi, marrubij floribus similes, in mollibus & canescenibus caliculis nascentes, verticillorum instar summum caulem summoque ramos ambiunt: radice cum legitimo convenit, quæ singulis annis novos stolones còsequè numerosiores profert.

Adeò vulgare hoc Marrubij genus est toto Viennensi agro, ut vinetorum agrorumque margines, sicque & graminis campi eo abundant, imò in ipsius urbis (quæ ab aquis sunt liberæ) fossis nascitur. Nullo tamen, quod sciam, apud illos in usu est. Floret Iulio.

Natum id apud Belgas, non Hispano semine (nullam enim similem plantam in Hispaniâ videre memini) sed Austriaco.

An porò, Marva lantusa Serapionis, cujus meminit lib. de Simplic. Med. ex plâris, c. 197

ALTYSSVM GALENI.

CAP. XXI.

EX multis quæ Alyssi Galeni nomine circumferuntur plantis, nullam prorsus inveni, quæ descriptioni responderet. Sed in meâ Hispanicâ peregrinatione quâdam observasse arbitror, quæ illius delineationi ita exactè quadrare mihi videtur, ut quin illud ipsum sit, nullum dubitationis locum amplius relinquere possit existimem.

Alyssum Ga-
leni.

PEDALI verò est altitudine, quadrangulo caule, statim à radice in multos ramos diviso, canescentes omnino, & veluti tomento obductos, circa quos, ad singula genicula bina folia contrariis intet se pediculis semper enascuntur Marrubio similia, breviora tamen magisque crispâ & incana, inodora, amara; calices per intervalla verticillatim ramos ambiunt, quinque plerumque aculeis horridi, candidi, è quibus Marrubij flos exilir, sed colore diversus nempe purpurascens: semen in aculearis vasculis subrosum, Marrubiano semini par: radix dura, multifida, vivaxne an annua, istuc observare non potui. Sed semine quod ex Hispanijs attuli, apud meos Belgas nata, eo quo floruit anno plerumque perijt: semine autem ma-

Alyssum Galeni.



tem maturo sponte deciduo singulis annis renascebatur adhuc, eum inde excessi: atque etiam nunc in quibusdam Belgicis hortis cōspici puto.

Vno duntaxat Hispaniæ loco (tametsi non dubitem pluribus inveniri) hanc plantam nascentem observabam, ad Elda videlicet pagum, in cœmeterio, quo plurima cœnographia Arabæis litteris sculpta videre licet, Valentino regno, septem sub Horiuela (Orceli veteribus dicta) miliaribus, si ve leucis Hispaniis, eamque florentem, & semine maturo onustam, medio Martio.

CETERVM primo conspectu Marrubium esse censebam, donec & aculei caliculi, & flos ipse, in memoriam mihi revocarent Alysson quod Galenus lib. secundo de Antidotis in hunc modum describit: Alysson herba est Marrubio similis, asperiores tamen & magis spinosus in furculorum summitatibus orbes habet, florem ad cæruleum vergentem profert. Hanc intet camiculæ ætus colligere oportet.

Nomiois autem rationem, atque ipsius etiam facultates libro sexto De simp. medic. refert. Nuncupata (inquit) est hæc herba *αλυσσον*, quod misicē iuvet demorosos à canerabido. Sed & rabienti quoque data, sæpe in totum sanavit: atque hoc ex rotius substantiæ similitudine efficit. Didum prius est, ralem facultatem ex solâ percipi experientiâ, & plantam.

Natalis.

Alyssum cur
sic dictum.

nè nullâ constare methodo. Quod si quis ad multa experiatur, cognoscat facultatem habere medioctner resiccanrem & digerentem, nonnihil etiam abstergentem. Hac ratione & vitiligines, & maculas faciei à sole prognatas expurgat. &c.

PAVSANIAS in Arcadicis eandem nominis rationem assignat Alyssō: eandem etiam Plinius, cuius tamen Alyssum ab isto longè diversum est.

MEAM autem opinionem de Alyssō Galeni rejicere non possum, licet multis post annis ab evulgatâ meâ Hispanicarum stirpium Historiâ, viderim quæ Nobilis idemque C. Vir Fabius Columna scripserit de Alyssō Antonij Coli: nam, ut initio capitis dixi, nullam stirpem videre memini, quæ proximius accederet illius Alyssi historiam, quam hæc. Marrubium certè esse non potest, quia nec odorem habet Marrubij, nec utriculos lenes ut illud, sed asperos & pungentes, floresque purpurascētes, non albos.

GALEOPSIS.

CAP. XXII.

NVLIVS Recentiorum quotquot de plantis scripserunt, mihi satisfacit in icone Galeopsis historiæ additâ: nam vel Lamij genus aliquod, vel Scrophulariam vulgareque substituunt, eum ad illarum nullam Dioscoridis descriptionem aptari possit. Legitima tamen ejus Auctoris Galeopsis, est adeo frequens multis locis, ut mirum sit, neminem hæcenus in eam animum intendisse.

LEGITIMA porro Galeopsis ex radice fibrosa & singulis annis augefcente, multas interdum fert virgas, quadrangulas, quibus alternis inhaerent folia ex adverso nascentia, longis pediculis innixa, urnæe folijs adeo similia, ut prima facie imponere possint, villosa quidem, sed non mordacia: summum virgarum fastigium quodammodo in spicam definit, verticillatisque ambitur quinis aut senis simul nascentibus caliculis in quinque lacinias divisus, à quibus prodeunt longiusculi flores instar florum Lamij hiantes, sed longè minores, coloris ex atro purpurascētis, propendentibus labelis, albis quibusdam venis notatis: semina in caliculis quaterna, maturitate nigra, ut in Sideriside.

Galeopsis
na Dasy.

Tota planta gravis odoris est, præsertim umbrosis locis nata: ejus verò quæ in apertioribus locis, ut in recens succis silvis, crescit, remissior est odor. Floret lunio & Iulio.

CYBITALI autem est Altera Galeopsis caule, interdum etiam majore, quadrangulo, crasso, secundum radicem rubente, frequentibus geniculis prædita, è quibus bina semper intet se opposita nascuntur folia, Vtæe folijs haud absimilia, per ora similiter creata, sed lon-

Galeopsis
maxima
Parnassica.

Galeopsis legitima.

Galeopsis maxima Pannonica.



sed longè majora, palmaremque amplitudinem sæpius superantia, hirsuta quidem, sed non mordacia: à medio caule sursum versus, ad singulos nodos, orbiculatim seni, octoni, nonnomquam deni nascuntur flores, non simul, sed successivè sese explicantes, Lamij floribus multo majores, saturè rubri & tamquam purpurei, galeæ instar huanes, labro inferiore (ejus laciniatæ oræ) bifido, & frequentibus ad latera barbulis præditi, interiore parte purpureis & candidis lineis depicto, quatuor staminibus cum stilo sub galeâ latentibus, odore gravi, & ingraro, uti tota planta, si teratur, gustu etiam insuavi & amaro: laciniata vascula, deciduis floribus, quateroa semina continere deprehenduntur Mollucæ similis: radix crassa, fibrosa, perennis, singulis annis augecens pluresque stolones proferens.

Maxima.

Maximâ copîâ nascitur in silvosis illis montibus, arcu Grebén III. Balchazaris de Bathyan, in Paonia ioteramni firæ, vicinis. supra Warasdinum, ubi florentem Maio meosè eruebam anno M D LXXIX. & inde delatam in hortum Viennæ transferebam, in quo multos perstitit annos mitificè augecens, & semine deciduo nascentibus novellis plantis, vicinas areolas & pulvinos implens.

*γαλεόψις ἡ
λαίβηλος.*

GRÆCIS porro dicitur Prior planta Γαλεόψις ἡ λαίβηλος: Plinius Galeopsum & Galeobdolon appellat, atque iisdem verbis, quibus Dioscorides, totius stirpis historiam, ejusque facultates describit. Altrius oulium nomen intellexi.

LAMIUM.

CAP. XXII.

VRTICAE illius innoxie & morfu carentis, quam Plinius Lamium appellat, varia sunt geœra, cum foliorum formâ, cum floris amplitudine, exilitate & colore inter se differentia: ea cum sint ab alijs propofita, hâc inferre non est necesse. Sed alias quâdam stirpes in medium adferre lubet, quæ non minorem affinitatem cum Lamio habere videntur, quàm illa.

PEDALES & majores interdum habet Prior caules, quadrangulos, hirsutos, Lamij æmulos, quibus, per intervalla, adversis semper pediculis, bina, veluti in Vrticarum genere, innascuntur folia, Melissophyllo fere similia, rugosa, atrâ viriditate nitentia, gustû aliquantulum acri: flores ex singulis nodis inter folia terni aut quaterni prodeunt, omnes antrosum spectantes & propendentes, longiusculi, inodori, Lamij florum quodammodo æmuli, majores tamen, & nullâ galeâ insigniti, solo labro inferiore promisso, & reliquis folijs

*L. Lamium P.
peduncul.*

Lamium Pannonic. i. versicolore flo.

Lamium Pannonic. i. albo flo.



folijs (quę in quibusdam floribus ex albo purpurascunt, aut dilutiorē purpurā nitent) majore, purpurei coloris: utriculi ex quibus flores prodeunt, satis laxi & capaces, ex viridi pallentes, semen magnum, nigricans, inæquale continet: radix crassiuscula, & aliquantulum nodosa, multas fibras agit, & singulis annis novos caules profert, instar Yrtice, & aliarum similiarum plantarum.

Copiose in Leytenberg, monte Badensibus thermis imminenti, Gumpoltzkirche, Medeling, & alijs editis Austrię & Pannonię locis, umbris & silvosis invenitur. Nascitur etiam in editis illis silvis Francofurti viensis ad dextram, Septentrionem versus. Floret Maio, semen maturum est Junio. Repenitur etiam niveo flore, sed rarissima. Apud Laufamiam ferretur in Allobrogibus, nullam aliam stirpem videre memini, quàm quę album florem ferret, anno videlicet M. D. LIII. dum ē Narbonensī Galliā per Helvetios in patriam redirem.

2. Ejus in Austriā (speciem alteram observabam, non valde ab illā differētem, nisi quod infirmiores haberet caules, frequentiores etiam, ex radice singulis annis repullulantes, folia item paulō angustiora.

Fuchsivs & Tragus hanc plantam Melissophyllon appellarunt, cū tamen exiguū odoris gratiā prædita sit, nec apes ejus floribus valde delectentur: & haud scio an apra sit ad alvearia intus confricanda, alicicndarum aut retinendarum apum gratiā, ut est vulgaris melissa, quibusdam citrago, ab odore citri mali, dicta, quę omnium Doctiorum judicio verum μέλισσόφυλλον censetur. Ego ad Lamij genera potius referendam arbitror.

EXOTICA est Altera, cui, dum primum nata est, subrotunda sunt folia, utriusq; folijs similima, nisi ampliora ut plurimum essent, molli lanugine villosa, pingui & lento quodam velut rore leviter aspersa, dum novella sunt, in ambitu ferrata, longispediculis fulta, inter quę altero anno emergit caulis vel sexangulus vel quadrangulus (utriusque enim formę nascuntur) molli lanugine pubescens, per quem ex intervallis æqualiter, sed ad verso semper situ, in nodis sparsa sunt folia, modò terna, modò bina, superioribus minora, & brevioribus petiolis hærentia, ē quorum alii, nunc bini, modò terni, pro foliorum numero, exiliunt pediculi, unciales, tenues, firmi, hirsuti, ternos vel quinos flores sustinentes, concavos, anteriori parte nonnihil hiantes, exiguo labello prominente, & tenui stilo cum filamentis emergente, præditos, coloris viridi pallēscentis: floribus succedunt capicula, Lini ferē, aut potius Scrophulariæ vulgaris, mucronata, exili nigro semine plena: radix utriusq; similis, obliqua & multis fibris capillata, cujus caules hieme pereunt, sed novæ vere, interdum etiam ante hiemem alij plures ex ea ad latus renascuntur.

Matajus.

Lamium P.
annon. i. albo
flore.Lamij Pann.
nensis i. flo-
ris aliora.Melissophyl-
lon Fuchsijpetiolis sep-
tatis digynis.11.
Lamium PA-
nnonicum al-
teram formam
exant.

DD

Hanc



Hanc stirpem primùm florotentem observabam Viennæ Austriæ in meo hortulo ad parietem natam nescio quo semine, anno M. D. LXXV. III. sublequens hiems auferebat quidem, sed deciduo semine prignata sunt insequente anno aliquot plantæ, quæ demùm alteto vere flores protulêre. Floret Maio, semen luno maturum est: deinde tota planta cadicitus petit. nonnumquam tamen ex radice etiam repullulat.

Si quis me hanc plantam minus aptè inter Lamij genera reposituisse putat, liberum illi esto, vel ad Galeoplia, vel aliam quampiam congenerem referre.

111.
Lamij 111.

SE D. & ad Lamium fortè referri possit elegans hæc planta, quæ ex radice, vulgari (ut mihi telarum) urticæ simili, plures profert cauliculos pedales, teretes, quadrangulos, frequentibus nodis cinctos, ad quos alternatim bina contrario situ in longis pediculis æqualiter nascuntur folia, Lamio, sive Vrucæ non mordaci vulgari, & foetidæ, quæ purpureo flore est, similia, proximus tamen ad Hedetæ terrestris sive Chamæcissi vulgaris folia accedentia, inter quæ caliculi terni, quaterni aut quini, continentes flores, hedetæ terrestris vulgaræ floribus forma proximis, huantes, nulla supetnè galea imminente, sed latiusculo dumtaxat folio reflexo, mixtis colonibus cæruleo, albo, & purpurascente insignitis.

Nascentem numquam videre contigit: sed iconem suis coloribus diligentissimè expressam, mihi dono dabat anno M. D. LXXIX. III. Dn. de Barthyas: mutilam tamen & sine radice, ut hic expressa est. Aliquot post annis radicem urticæ similem esse intellexi.

BETONICA.

CAP. XXIIII.

Betonica vel
galea duorum
generum.

NVLLE sunt in Pannoniâ, Austriâ, vicinisque Provinciis montes herboſi, nullæ silvæ, nullæ præta, in quibus non abundantissimè proveniat Betonica usitata flore rubro sive purpureo: quæ duorum generum est. Vna enim breviorum florum spicam habet, & maturius floret. Altera autem longiore, molliore, & magis fuscâ est florum spicâ, illique etiam scitius flores suos explicat: solet præterea hæc postrema in majorem altitudinem ex-crescere, quàm prior, licet eodem loco utraque sponte nascatur, vel eadem pulvino excolatur.

Betonica ad
hæc flore.

VERVM istic mihi observata est alia Betonica, cui multa sunt folia rugosa, subhiurata, in ambitu serrata, Betonice vulgaris foliorum potius æmula, non adeo tamen fuscâ viriditate nitentia, sed dilutiora: quadrangulati caules, geniculati, subhiurti ex illorum medio ex-cunt,

Betonica.



Sideritis 1.

exerunt, & in pedalem altitudinem excre-
scunt, subinde extremâ parte in alas fere di-
videntes: folia in singulis geniculis caulem
q̃ quali sibi ambiunt, humi sulis minora, nul-
lo pediculo fulta, odorata, quemadmodum
& illa, gustus amaricatis summi caules & ra-
mi in dentato caliculorum spicam desinunt,
è quibus flos emergit vulgari formâ similis,
sed coloris omnino albi: semen deinde in
vasculis, Betonice vulgaris semini par, fu-
scum: radix non dissimilis, vivax, singulis an-
nis augetur, & plures caules producit.

Crescit in ascensu montis Neuberg, Er-
schen jugi & alijs quibusdam editionibus lo-
cis: sed omnium abundantissimè super Aze-
hof, magno ultra Garmingam militari ger-
manico, quâ iter est in Herrenalben & Dur-
renstein. Fl. ret. isch. Iulio, in hortos translata
maturus aliquanto, ubi egregiè augetur.

Hujus meminit diligentissimus peritissi-
musque Cordus lib. II. Hist. Plant. cap. CLIX.

SIDERITIS. CAP. XXV.

SIDERITIDIS, multa, ab his qui Stir-
pium Historiam scripserunt, adferuntur
genera, quæ forsitan non omnibus adhuc
cognita: quædam tamen in medium adferre
est animus, quæ ad Sideritidis Primæ Dio-
scoridi Heracleæ cognominatæ, classim re-
ferri posse videntur.

Prior caules habet quadrangulos, cu-
bitales, hirsutos, geniculatos, folia ad singu-
los nodos bina, ex adverso nascentia, rugosa,
villis obsita, Ternæ folijs majora, per ambi-
rum serrata, graviter odorata, gustus amari-
cantis & acrisculi: ramuli ad singula parè
genicula nascuntur minoribus folijs obsiti:
flores summum caulem verticillatim ambien-
tes in spicam desinunt, galeati aliquatulum,
candidi, odorati, hiatum sive rictum sangui-
neis notis confectum habentes: semen in
pentagonis vasculis inæquale, nigrum: radix
dura, lignosa, ex summo capite plures inter-
dum proferens caules.

Pasim in Galliâ, Germaniâ, Pannoniâ, *Natalis.*
Austriâ, siccioribus agrorum & silvarum ce-
duarum marginibus nãvia est, hæc Sideritis.

Humilior est Altera, neque pedalem
excedit altitudinem, in raris divisa ramulos, *II.*
folijs priori similibus, mollioribus tamè: flo-
res ampliores, albi, pallescente labro, & pau-
cis rubris punctis asperso, verticillatim in
utriculis caulem supremosque ramulos am-
bientes, breviorum quam in superiore, &
quasi mutulatam spicam conficiunt, ut in
Prunellâ vulgo dictâ.

Nusquam non occurrit in agris, & inter
segetes multis Pannoniæ & Austriæ locis:
circa Triebswinkel autem frequentissima.
Floret Iulio.

Longiore est Tertia folio quàm Mar-
rubium, satis ad Salviz folium accedente, mi-
nore tamè, quærni fere folij divifura, scabro, *Sideritis III.*

DD 2 villis



1.
Sideritis vul-
garis.

II.
Sideritis II.

Sideritis III.

Sideritis III.

Sideritis IIII.




Sideritis V.

Sideritis.

Sideritis IV.

Sideritis VI.



villis quibusdam prædito, nec in iucundi gustus nec odoris: caules fundit quadrangulos, palmum ut plurimum excedentes, interdum procumbentes, duros, hirtos, candicantes, quorum summitates per intervalla verticillati orbes coronant, ut in primo genere, oebes vasculis constant, in quibus flos prior par, ex candido nonnumquam purpurascens, quo evanescente, semen in vasculis nigricans reperitur: radix dura, lignosa, vivax.

Frequens occurrit aridis & petrosis Caestellæ veteris locis, æstate florès, quibusdam etiam locis, in Autumnum usque floribus onusta conspicitur.

ALIQVOT habet Quarta, ramos procumbentes, quadrangulos, tenues, villis quibusdam obritos, quos per intervalla contrario semper firu bina cingunt folia, Primæ fectè similia, paulò rament minora, à medio ad extremum ferrata, nonnihil etiam villis: summos ramos verticillatim ambiunt vascula in quibus flores, prioribus formâ similes, quantum ex delineatione colligere potui, propterea de colore nihil pronuntio, neque de semine, quod superiorum semini par esse verisimile est: radix nõ videtur vivax, sed coanno, quo planta flores prorulit, perire.

QVINTA, medium caulem habet surrectum, quadrangulum, deinde, statim à radice, multos in latera spargit ramos, humi fusos, quadrangulares, quibusdam villis pubescentes,

Sideritis vi. Pannonica.

Sideritis vii.



befcentes, geniculatos, quos bina ſemper inter ſe oppoſita, ad ſingulos nodos, amplectuntur folia, præcedētis folijs penē ſimilia, minus tamen ſertata, inter quę, ab imo ad ſummum uſque, verticillorum ritu naſcuntur io vaſculis flores, ſuperioribus etiam formā ſimiles, quorum color (ni fallor, nam io arvis Belgicę illam olim obſeruaſſe puto) albus: nec huius radix vivax eſſe videtur.

Harum duarum poſtremarum, cum illius quę ſeptimo loco deſcribetur, icones ad me mittebat Iacobus Plateau anno M. D. XC. ipſius manu eleganter expreſſas (quemadmodum & pleręque alię ab eo acceptę) quarum priores nudę omnino, ſolo duotaxat Sideritidis alterius nomine adſcripto tertię autem quędam notę adjeſtę.

S E X T A pedalem non ſuperat altitudinem: caulis illi quadra ngulus, ab radice ſtatim ramosus: folia ſecundū radicem priorĩ genere non breviora, eodem modo venoſa, ſive nervis quibudam excurrentibus prædita, ſed molliora, nec in ambitu ſerrata, at, quę ſummum caulem & ramos ambiunt, breviora: Boſculi ſtatim à ramorum exortu, ipſos & caulem, in calculis quinque lacinijs cooſtantibus verticillatim ambiunt, primis longē minores, & è vaſculis vix prominentes, formā tamen illis ſimiles, ſuſci colonis, labello autem parte interiore pallido: ſemen ſuperiorum ſemine minus, nigricans: extre mos porro ramos caulemque, foliolorum pallescentis coloris coma occupat, totaq; adeo planta molli lanugine prædita eſt: radix albefeſcens, lignoſa, aliquot fibris hirta, ſed non vivax, quippe quam maturo ſemine ſubſequens hiems penitus tollere ſolet, non minus quā Alſetam & Quartam.

Sideritis vi.

Frequentiſſima eſt in Pannonię Auſtrięq; inferioris arvis & inter ſegetes, macro & ſterili ſolo. Floret Iulio & Iulio, ſemee ſubiode maturum etiam Iulio.

Herba.

PLURES ex eadem radice promit Septima caules, pedales, quadra ngulares, lignoſos, ſurrectos, in quibus, ad ſingulos nodos, bina naſcuntur folia, ſibi invicē oppoſita, anguſta, hyſſopi vulgatis foliorum quodam modo æmula, ſarutius videntia: flores Quintę, mioreſ & Lavendulę floribus noo valde diſſimiles, nonnihil pallescentes, in orbem naſcentes, inter latiuſcula, brevĩa, ſerrataque folia ſummos caules ambiunt, & illa extremorum foliorum coma flavefeſcit: radix longa eſt, dura, lignoſa, pallescentis fuſco infecti coloris, aliquot annis perdurat, frigotiſque panens hiemem in hortis ferre poteſt. Floret Iulio & Anguſto.

Sideritis vii.

DICITUR Gręcis *σίδις* *ήράκλεια*, Latine etiam Sideritis. Prima vulgo Herbariorum in Galhā & Germaniā, Terrahil & Herba Iudaica: Tertia etiam apud Hiſpaños Terrahil. Prima Vngaris *Tetris ſin*, id eſt, nobilis herba dicitur. Prima & Sexta rhizotomis Viennēſibus mulierculis *ſano yon frans*. Quartam & Quintam (ut dixi) Sideritidis alterius nomi-

videtur ē
ignota.
Terrahil.
Herba Iu-
daica.
ſano pter
ſeunt.

ne accipiebam: Septimam verò pro Alpina, siue montanâ Sideritide; ea aliquid affine habere mihi videtur cum Sideritide montanâ Lobelij.

Facultates.

Sidentidis illius folia, referente Dioscoride, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo jungunt. Primam & Sextam in usum desiccata adseruant rhizotomæ mulierculæ. Nam præterquam quod aduersus capitis dolorem, quem Sciri, siue per appellant (unde herbæ nomen) ipsum decocto illius lavari utile censent, à nescio quo indocto empirico edoctæ: earundem etiam decocto pedes & alios artus defatigatos, aut aliqui rigentes, utiliter soven prædicant. Hoc equidem scio, quosdam ad crurum erysipelata (Belgæ de reſſi Germani bene appellant) curanda, Primæ recens collectæ & adhuc virens decocto non sine felici successu viſos esse, crura fovendo, aut decocti fumo leniendo.

OCIMASTRVM VALENTINVM.

CAP. XXVI.

Ocimastrum
Valentinum.Acerasidii
piperis.

ἄκαρασιδι porro, quod quidam *φλερῆσις* cognominant, semen in vino potum, viperarum, ceterarumque serpentium moribus medetur, teste Dioscoride: & cum melle, vino, myrrhæ, & pipere Iſcluadici datur.

PRYNELLA ET BUGVLA.

CAP. XXVII.

Prynella
vulgaris.

DIXIMVS in Pannonicarum & Austriacarum stirpium Observationibus, eadem Prynellæ, & Bugulæ genera apud eas gentes inveniri, quæ alijs Provincijs cõmunia sunt: nonnulla tamen etiam illic nasci, quæ ab alijs minimè observata esse agnoscebam, de quibus peculiare caput insinueramus. Cum autem in eadem nunc etiam sim sententiâ, illud ipsum caput hic repetere volumus.

HABET autem illarum plantarum Prior, caulem quadrangulum molliter hirsutum, geniculatum: folia in singulis geniculis bina, ex adverso sita, nonnihil villosa, vulgaris Prynellæ folijs fermè respondentia, gustu amaricante: capitula in summis caulibus crassiora quàm in vulgaribus: flores illius floribus formâ quidem similes, sed longè majores, nec ingrati odoris, ventre, quod pector non observavit) laxiore, galicæque saturatis plerumque purpurascents, tamen si inveniatur aliquando dilutiores, & quali exalbidi, interdum etiam subcinerei coloris: semina in singulis vasculis, ut plurimum quaternâ: radicem nigram, multis crassiusculis & candicantibus fibris præditam, novisque propaginibus sese, annis singulis, augentem.

Raritas.

Eam primùm in Vngariâ & Austriâ, deinde etiam multis alijs Provincijs nascentem inveniebam,

Prunella 1.

Prunella 11.



Bugula carneo flore.



Prunella 11,
non vulgaris,
alio flore.



veniebam, editioribus & graminis locis, minus tamen ubertem & luxuriantem, quam quæ in Austria crescit. Floret Iunio, Iulio, & Augusto, semen Iulio & Augusto maturum est.

ALTERA dodrantales similiter & quadranguli sunt cauliculi, villis obfiti, ramosi, & singulis nodis bina cōtratio semper inter se situ profertentes folia, non ut vulgaris subrotunda, sed longa, & in aliquot profundas lacinias divisa, gustu, quæ admodum in vulgari, adstingente: flores summo caule summisque ramis ipicatum, ut in vulgari, nascētes, à quibus quidem formà non differunt, sed color subinde variat: nam vel niveus est, vel cineraceus, vel carnei coloris, vel purpureus, quali colore etiam Mompelliano agro, post monasterium Egremonie nuncupatum, ad silvæ marginem Septentrioni oppositè olim colligete memini: semē alteti persimile: radix fibrosa est, ex qua prodeuntes singulis annis novæ virgæ, fibras plerumque agere solent.

Gaudet & hæc herbosis & graminis locis, licet & alijs quæ à fluminibus nonnumquam inundantur, inter saxa inveniri. Floret maturius superiore, nempe Maio, tamen etiam Iunio.

TERTIA, non differt ab eâ quam vulgo Bugulam & Consolidam mediam vocat, vel formâ, vel viticulis summâ tellure tepētibus, quæque nunc flore extrulco, interdum cinereo, atque etiâ omnino niveo invenitur: illis tamen

Bugula carneo
non colorata

tamen hæc paulò tenerior est, florēſque habet ab ijs quos enumeravi, colore diverſos, ſunt enim in hac rubri diluti, ſive carnei.

Florentem cum alijs congeneribus primùm obſervabam anno M. D. LXXVII. non procul Zollonoek, in acclivi nemoroſi cujuſdam collis: deinde iterum ſubſequentē anno, ad monaſterium Maurpach è prato quodam aliquot ejus planras eruebam: conſpiciebam denique anno M. D. LXXI. in exculro horto Philippi Stephani Sprengeri Palatinalis Pharmacopœi etiam Maior florentem, qui mihi referebat illam frequentem naſci circa Heidelbergam, unde tranſtulit ſet quam in ſuo horto alebat.

CETERVM quæ Bellis media à Matthiolo, major autem à Lobelio nuncupatur in Obſervationibus, & à vulgo ex Conſolidæ minoris generibus cenſetur, frequentiffima eſt in Alpinis pratis, unde illam ſæpius in hortum tranſtulimus, cum Viennæ agerem.

PARIETARIA SILVESTRIS quorundam.

CAP. XXVIII.

CVA hanc nonnulli Parietariam ſilveſtrem appellent, cauſam non video, cum neque ad parietes, neque ad macerias ſponte naſcatur, imò potiùs loca culta fugiat & ſilveſtribus gaudeat. Quia tamen aliquam affinitatem cum proximè deſcriptis habere videtur, proximum illis locum dare viſum eſt, & illam in tres ſpecies diſtinguere.

Parietaria ſilveſtris t.

Parietaria ſilveſtis i.



Parietaria
ſil. quorundam t.



Parietaria
ſil. quorundam i.

QVADRANGULO Prior aſurgit caule, pedali, nodoſo, villis quibuſdam hirtis, in quo alternatim ad nodos bina ſemper ex adverſo naſcuntur longa folia, ſecundùm pediculum lara, & ſenſim in mucronem deſinentia, aliquantulum villoſa: ſummus caulis & rami deſinunt in foliorum comam ſuperioribus minorum, ad pediculum laciniatorum, molliſque lanugine pubefcentium, coloris purpurei, nunc dilutiſſis, modò ſaturationis elegantiſſimi & violacei: inter quæ bini ſemper inter ſe oppoſiti flores naſcuntur longiores, concavi, aliquantulum hianſes, ſuperiore labro nonnihil reflexo, & villoſo, inferiore laniſculo, & dorſum propendente, coloris initio lutei, deinde omnino aurei, omnes tamen, licet alternis contrario ſitu naſcentes, antrorſum exporrecti & ſpeſtantes, quod piſtor nō obſervavit: radix candicans eſt, quam ſubſequentis hiems corrumpit.

ALTERA caulem etiam habet pedalem, rardè ampliorem, quadrangulum, nonnihil interdum purpurafcentem, ſtatim à radice in ramos diviſum, qui alternatim, æquali ſemper, attamen contrario, ſitu naſcuntur: ſub his expanduntur folia oblonga prioris ſerè ſimilia, virentia, ingrati & aliquantulum acris ſaporis: flores in ſummis ramis inter pinnara & anguſta

Parietaria silvest. 111.



Verberna vulgaris.



Verberna vulgaris

angusta folia nascuntur, ut in priore, minores, lutei coloris, qui tamē in marefcentibus exalbescit, rictu manente luteo: radix cum superiore convenit.

Crescunt in sepibus & silvarum marginibus, umbratisque locis Ungariz, Austriæ, Moraviz, Bohemiz, atque etiam Germaniz.

An has referenda esse videtur, quæ in omnibus ferè Provinciis inter segetes nascitur. Etenim superioribus quodammodo similis est, licet angustiora habeat folia, & quæ cumam efficiunt, tenuius etiam laciniata, totaque rubra aut carnei coloris: flores item prioribus formâ similes, coloris tamē varij: nam labrum inferius cum galcolâ & extremâ caudâ, putrascent, media pars, quæ circa tistum turgit, lutea est: succedunt in caliculis valcula fufcum semen continentia.

Sunt omnes annuæ & maturo semine petire solent: flurent autem Maio & Junio.

Quo nomine hæc donari debeant, me ignorare fateor: sunt tamen qui priorem silvestrem Parietariam appellaverint, nescio qua ratione ducti. Altetam Cratarogonum: Tertiam, triticum vacinum, & Melampyrum & *Cratogeom.* *Melampyrum.* *Cratogeom.* *Theoph.* *Alopecurus.* Theoph. lib. de Plantis vii. cap. x. quem & sequutus Plin. lib. xxi. cap. xvii. inter spicatas recenset: nec defunt qui Alopecurum Plinij esse putent. Plinij tamen Alopecuros, si quis diligenter perpendat, à Theophrasti Alopecuro, haudquaquam disterre comperietur: Atrebatæ mei à comæ colore *rouge herbe*, id est, rubram herbam cognominant.

Nullum, quod sciam, in medicinâ usum obtinuerunt: sed plerumque negligi solent. Posterioris autem semen, in Occidentali Flandriæ parte, ubi copiosissimè inter segetes (rusticorum plerumque negligentia, qui eam tempestivè non evellunt) nascitur, panem viriare solet, & magis atrum reddere: quoniam ovis qui eo vescitur, caput gravedine plerumque tentari solet, non secus atque si lolio vicini assent.

VERBENA.

CAP. XXIX.

COMMUNEM Verbenam in omnibus, quas perlustravi, regionibus nascentem conspexi: sed aliud elegans genus in meo per Hispanias itinere observabam, cujus historiam hic damus.

QUATERNI aut quini sunt illi cauliculi, angulosi sive quadranguli, quales vulgaris Verberna habet, tenuiores tamen, supini, & in terram procumbentes, nodosi seu geniculati: ad singulos nodos nascuntur sub ramulis folia, colore quidem à vulgaris folijs non differentia, sed multò magis incisa, & multifida: flores in summis ramulis spicæ in modum congesti nascuntur, ut in vulgari, etiam ex cæruleo purpureascentes, minores tamen: semen illi aquale est, nec radix dispar.

Salmanticensi agro frequens, & quibusdam alijs Castellæ locis, juxta semitas, ubi minor, exsucca & teretrida, tum etiam declivibus, fluminibus,

Natalis.

Paris. fl. quæren. 111.

Cratogeom.
Melampyrum.
Cratogeom.
Theoph.
Alopecurus.

rouge herbe.

Verberna vulgaris.

Heliotropium supinum.



Heliotropium minus Tricoccum.



Quam herba ex aquâ fasciculo manus plene, potu, pruritum, bilicque per alvum extrahere: contra scorpionum ictus ex vino potum, & illud prodest: ad alligari ad conceptus arcendos: folia infantium de stillationibus, quas syriacis vocant, podagris, luxariisque, utilissime illini: mentes citere: partus, triam & impositam, pellere: illud semen fornicantes verrucas pensilisque & rhymos, & epinyctidas exliccat: præterea, aiunt, inquit, per horam unam ante accessiones, seminis grana quatuor cum vino quartanas: tria vero, tertianas finire. Plinius autem addit Magi Heliotropium quartanis quatet, in tertianis tet alligari iubent, ab ipso ægro: in pletisque alijs facultatibus Dioscoridi suffragatur.

HELIOTROPIVM MINVS TRICOCCVM.

CAP. XXXI.

MINVS Heliotropium unico assurgit ^{Heliotropium minus.} caule, pedali, ramofo, illius folia superiorum folijs dissimilia, nonnihil ad Xanthij, plurimum verò ad Solani somniferi folia accedunt, mollia & candicantia: flos pusillus, racematim cõgestus, luteolus, inutilis, quippe qui sine semine perit, veluti flos Ricini, & quarundam aliarum stirpium, quæ sua semina è floribus non producant: ex alarum tamen cavis dependent ex longis petiolis, sub folijs quasi occulæ, sine flore enatæ filique triangulæ, quales Tithymalorum, sed asperiusculæ, scabræ, nigricantes, in quibus semen cineracei coloris, quod dehiscens filiquulis exilit, quemadmodum Tithymalorum & Ricini semina: hæc capita sive filiquæ pannis affricatæ, florido viridi colore eos inficiunt, qui temporis momento in coruleum, eumque elegantem, mutatur: radix inutilis, nec vivax: ut quæ singulis annis, uti priores, pereat, & novæ plantæ, semine deceduo renascantur.

Salmanticensi agro frequentissima est hæc ^{Natalis.} planta, multique alijs reliquæ Hispaniæ locis nascitur etiam copiosè in Gallia Narbonensi. Iulio & Augusto floret, & lubinde semen etiam mature scit. Nobis in Belgio, atque Viennæ Austriæ sæpius lata, & aliquoties nata, ad frugem nunquam pervenit.

^{Heliotropium minus.} Heliotropium minus Latinis dicitur: Plinio etiam Tricoccum, qui ejus historiam cù Scorpioide Dioscoridis cõfundit. Castellani ^{Tornef.} Tornefili, Narbonensibus Tornefili: quæ voces à Græco nomine deductæ videntur.

^{Familiam.} Dioscorides ait, herbam cum suo semine potam, adjecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aquâ, latus teretisque tineas excutere: pensiles verrucas, achrocordones vocatas, cum sale illitam, tollere.

PRÆLUM.

PHYLLVM duplex est Veteribus, qui tamen in ejus descriptione diffentire videntur. Nam quod Theophrastus marificum facit, id Dioscoridis feminificum videtur. Præterea Theophrastus Phyllo Ocythi folia tribuit, Dioscorides Oleæ. Nos ex ipsis veris & legitimis plantis quas frequenter vidimus & collegimus, utriusque generis descriptionem concinnabimus.

Phyllum marificum.

Phyllum feminificum.



Phyllum marificum.

MARIFICVM (Theophrasti enim sententiam potius sequemur) pedali, ut plurimum, cubitali interdum est caule, quadrangulo, firmo, ramoso: folia illi Oleæ, seu verius Ziziphæ Cappadociæ, incana, lanuginosa, mollia, bina semper certo ordine & per intervalla (ut in omnibus præne quadrangularem caulem habentibus plantis animadvertere licet) disposita, acidi & salsi gustus: inter quæ, iuxta ramulos, nascuntur bini globuli, uni & eidem pediculo inhxerentes, ut in Mercuriali mare, vel (ut Theophrastus ait) fructus sicut oliva, cum primum ex musco, sive flore, emergit, geminus, testiculi hominis instar, quo continetur semen Tithymali femini non dissimile, rotundum, cinerei initio coloris, qui tandem ad cyaneum vergit: radix minimi digiti crassitudinem & longitudinem nonnumquam æquat, duræque est, lignosa, candida, in multos ramos fissâ.

Phyllum feminificum.

FEMINIFICVM, quod Dioscoridis est Marificum, superiori prorsus est simile: altius tamen plerumque assurgit (licet infirmioribus caulis) & numerosiora habet folia: præterea, flos oleæ modo mucosus & ex herbaceo pallefcens coloris, longis tenuibusque inter folia petiolis insidet (quem in Marifico vix observare licet, fructu statim ex alarum cavis enascente) semenque rarò admodum perficit, quod globulis etiam, nunc binis, modò pluribus eidem pediculo inhxerentibus continetur. Puto tamen ex prioris semine utrumque plantæ genus nasci, quemadmodum in Mercuriali, Spinacijs, Cannabi, alijsque nonnullis plantis accidit.

Natalis.

Vtraque calidioribus regionibus, in quibus sponte provenit, tota incana est, & quodammodo tomentitia, longèque minoribus folijs, quàm in frigidioribus, ubi rarò vivax est. Illud etiam utrique commune cum Mercuriali, Cynocrambe, & Heliotropio minore, ut erutz radices, temporis succellu cæruleum colorem contrahant.

Nascitur utraque multis Hispaniæ, & Galliæ Narbonensis locis, secundum vias, ubi Aprilis, interdum etiam maturius floret: in Belgicâ verò, non nisi æstate nobis flores dabit, & singulis annis, ex semine deciduo novas plantas producebat.

Cantabrica quorundam.



Convolvulus Altheæ folio.

GRÆCVM nomen huic plantæ est *φύλλον & διαφύλλον*: Latinum, Phylum: & primum qui dem genus *ἀρίστογονον*, alterū *θηλαγονον* Theophrasto: cōtra verò Dioscoridi, ut diximus. Hispani agro Salmanticensi utramque vocabant *Terna de Santa Gusteria*, Granatēsis verò, *Carra*.

Arrhenogoni potu masculi sexus fieri par tus, ut Thelygoni feminei, Theophrastus & Dioscorides scriptum reliquere. Salmanticen ses utriusque decoctum, quibuscumque ani malibus à cane rabido demorsis, propinabatur, magno, ut inquit bāt, successu Granatēsisbus, Mauritanis præsertim, ad muliebres morbos, frequenti in usu erat.

CANTABRICA quorundam.

CAP. XXXIII.

MVLTIS tenuibus, adeoque junceis ex eadem radice procedētibz ramulis, præ dita est hæc planta, humi procumbentibus, pe dalis, interdum cubitalis longitudinis, duris, flexilibz tamen, lanuginosis, qui in summo aliquot flores proferūt purpurascētes, inodo ros, convolvuli xmulos, minores, unico folio constātes, sed ita implicato, ut quinque videan tur, florum oris in totidem angulos desinenti bus, &c, dum clauduntur, complicatis: folia per ramulos nullo ordine sunt sparsa, longa, angu sta, tenui laougine obdusa, salicis folijs haud absimilia, gūmōsa si quis mordeat, & aliquan tulum amara: radix candicans, singularis, infi mā parte ramōsa est, & vivax.

Frequens est multis Hispaniæ & Lusitaniz locis, mihi ante in Galliā Narbonensi obser vata. Postea illam etiam inveniebam in colle Thermarum urbi, vulgo Baden, imminenti, quarto ab urbe Viennā Aultriacā miliari. Flo ret Maio & Junio, nonnumquam & Autum no. Apud Belgas, semine ex Hispanijs accepto nata, non nisi Julio & Augusto, ubi nullum se men perficere observabamus, tamen si magnā diligentia testaceis conservatam: calidioribus autem locis, in quibus sponte nascitur, semen fert in vasculis convolvolo nō absimilibz, mi nonbus tamen, fuscum, angulosum, inæquale.

Sunt qui hanc Cantabricam Plinio lib. xxv. cap. viii. appellatam putent. In eadem, inquit, Hispaniā, inventa est Cantabrica, per Diyi Au gusti tempora à Cantabris reperra. Nascitur ubique, caule junceo, pedali, in quo flosculi ob longi, velut calathi: in his semen perquam mi nutum. Et eodem capite, ejus, cum Didamno & radice Aristolochiæ, drachmam in vini he mina sæpius bibendam jubet, contra serpen tum morsus.

CONVOLVULVS Altheæ folio.

CAP. XXXIIII.

FLORIS cum Convolvulo similitudo fa cit, ut hanc plantā, alioqui non cōgenerem supponi, nec forma illi respondentē, subnectā.

VEREUS atque fruticibus adnascitur hæc planta, illisque convolvitur, alioqui si admi niculis ea: et humi jacer, nec sese attollit: nam infirmioribus est cauliculis seu viticulis, gra cibus,

Convolvu lus Altheæ folio.

cilibus pedalis aut cubitalibus, villis quibuldam obfita: folia habet inordinata, Hedera, aur Altheæ folijs ferè respondentia, mucosa, incana, in ambitu crispa, nonnumquam serrata, & aliquantulum laciniata, gummosa si gulfetur, subacria, & subamara: flores exalaturæ sinu promit longis pediculis inhaerentes, coovolvuli floribus similes, unico folio inftar calarhi aut campanulæ constantes (sed ita implicato, ut ex pluribus folijs conflare videatur) ex purpureo candicantes, interdum omnino putrescentes: radix teous, exilis, fusca, per fummos cespites repit, & subinde alias plantas producit.

Natalis.

Coovolvulus minor.

Tagus Flou.

Palatia
maior.



Lysimachia lutea communis.

Lysimachia
quædam ma-
gna varietas.

Lysimachia
lutea.



In collibus juxta Tagum flumen lato solo, in Bxticâ, plurimisque alijs Hispaniæ locis nascitur. Floret Martio & Aprili. Ad Tagum autem, etiam Decembri florentem ioveniebam.

A o quam stirpem Veteribus descriptam referri hæc planta, cui, à viticulis, vicinis rusticibus aut herbis se implicantibus, Convolvuli non en indidi, possit, ignoro: nisi quis fortè, lationem, cuius Plinius lib. xxix. cap. xxxi. meminit, esse existimet. Valentini convolvolum folio Altheæ Hispani vulgari nomine *Campanilla*, id est *Campasoulam*, Lusitani *Perdesilla* appellabant, & ad vulneta curanda efficacissimam esse tradebant.

VOLVILEM porro illam minorem (quandoquidem in Convolvuli mentionem incidimus) quam Dodonæus Smilacem lævem minorem nominat, passim in cultis arvis nascentem, frugibusque se convolvētē & implicantē, nonnumquam etiam in incultis, & ad agrorū margines crescentem, florem valde variare agro Francofurtensū observabam: Nam vel omnino niveuserat, vel albus quidem, sed in quo secundum quinque complicationum longitudinem subpurpureus color elucebat, umbilico etiam albo, aut omnino purpureo: vel prorsus purpureus, radijs secundum complicationes albis: vel medio inter utroque colore: vel radijs crassioribus, saturatius purpureiscentibus, reliqua parte albis.

LYSIMACHIA. CAP. XXXV.

PRÆTER Lysimachias vulgares, quarum hic icones proponimus, historiam autē non tradimus, quia ab alijs satis luculenter est descripta: luteam videlicet, purpureā, siliquosæ cognominatas, quarum alix annuæ dumtaxat, alix vivaces longe lateque serpente radice donatæ sunt, & inter has quæ à C. V. Conrado Gesnero Chamænerion vocata, flore niveo interdum à me reperta, tum quæ cæruleo est flore (nam & hæc omnes in Pannoniâ, & vicinis Austriâ atque Sciriâ regionibus, vel secundum rivos, vel in montanis pratis sponte nascuntur) duo alia geneta, dum Viennæ Austriæ vivebam, minimè ab alijs descripta observabam.

CVBITALI plerumque assurgit Primum caule, interdum etiam amphiore, firmo, duro, lanuginoso, & villis obfito: hunc ambiunt ordinatâ quadam serie quaternâ pletumque simul, nonnumquam etiam ternâ adversis inter se pediculis, folia, mollia, aliquanrulum incana, ptimæ, quæ luteo flore est folijs minora, acidi initio saporis, deinde salivam cientis, infernâ parte oigris punctis distincta: circa summum caulem, ex singulorum foliorum sinu prodeunt vel ramuli aliquot floribus onusti, cum singulis ali-

quot

Lyfimachia purp. communis, major.

Lyfimachia filiquosa major.



Lyfimach. filiq. iii. Chamænerion Gessl.



quot floribus, vel singulares duntaxat flores, præsertim summo caulis fastigio, lutes, eum quadam gravitate odorati, veluti quinis muconatis folijs constantes, sed qui tamen infima se decohxrent, & simul defluunt, eum totidem staminibus flavis: radix geniculata, ex singulis ut plurimum geniculis novas propagines producens, & subinde fibras agens, quibustellum firmiter inhzret.

Crescit in Alpium Austriacarum, aliarumque *Natalis.* vicinarum regionum conuallibus, & pratensis locis plurima, atque etiam in eodius quibusdam silvis, quæ ad montium radices sunt: observabam præterea non procul Viennâ plerisque locis secundum aquas. Floret Junio.

HUMILIS est Alterum genus, vulgari Rubra sive Purpureâ, cubitale altitudinem raro superans: caules illi teneriores, graciliores, quadranguli, eacumine in plures ramulos, ex adverso inter se nascentes, divisi: folia vulgari minorâ, & angustiora, sibi invicem etiam opposita, si mordeantur, lenta & quodammodo gummosa, deinde nonnihil acrimonix & amantudinis excrecentia: quæ in summis ramulis nascuntur, confusum habent ordinem, neque seriem ullam servant: inter quæ caliculi emergunt rariores, minores, neque adeo barbati aut verticillorum instar caulem ambientes ut in Purpureâ vulgari *Lyfimachia*, plerumque hexagoni, ex quibus prodit flos sex foliolis constans, colore rubro,

aliquot staminibus ex umbilico prodeuntibus: radix dura, lignosa, non repens ut superior, EE 2 sed

Lyfimachia purp. ii. flos minor.

Lyfimachia cœruleo flore.

Lyfimachia lutea 11.



Lyfimachia purp. 11. five minor.

Lyfimachia
lutea 111.
five minor

sed ex eodem corpore multos caules singulis annis proferens, & subinde lateribus se propagans, multisque fibris inhaerens.

Provenit multis Pannoniae locis, in humidis pratis & Danubij insulis, frequentissimè verò, ultra Posonium, vulgo Presburg dictum, itinere Tirnaviensi. Floret eum vulgari Junio & Julio.

Non dubium est, quin ad Lyfimachiae genera utraque hæc planta referri debeat: adeò illi facie sunt similes.

Sed nec à Lyfimachiarum classe forsitan rejicienda elegans plantula, ejus siccam stirpem, eum plerisque alijs Kaufburno ad Alpes sito ad me mittebat Francofurtum anno M. D. XC. Doctissimus vir Rudolphus Schliekius Doctor Medicus, postquam Heidelbergâ, ubi Professoris publici munere fungebatur, ad illam urbem evocatus est, ut *πάρπος* esset. Is, dum vicinos montes (quârum negotia permittabant) stirpium petquirendarum gratiâ adit & lustrat, plurimas (ut ex ijs quas ad me misit deprehendi) illis similes quas in Austriaci & Scitriaci Alpibus observatas, in Pannonicarum stirpium historia descripsi, invenit, & inter reliquas etiam hanc, cujus historiam quàm exactè fieri poterit, & iconem fideliter expressam, hæc subjeciam.

Habet autem illa pedalem eaulem, tenuem, striatum, cavum, multis nodis septum, ab imo

Lyfimachia lutea III. five minor.

Lyfimachia lutea altera Lobelij.



ab imo brevibus binis folijs, vel potius vaginulis, ad singulos nodos ex adverso nascentibus cinctum, quæ circa medium caulem nascuntur, longiora sunt, angusta, tenella, ex viridi pallescens, tenuibus quibusdam venis obliquè secta, ex quorum sinu, enascuntur unciales pedicelli, tenues, sustinentes florũ muscoforum, & quinque flavis foliolis constantium (prodeuntibus ex medio longiusculis tenuibus staminulis cum apice aureo) vcluti spicâ: radice nititur longâ, hac se spargente, ad cujus internodia frequenter crescunt tenues, & quasi capillares fibræ, quibus pleræque aquatica stipes donatz sunt: adnatis se propagat.

Nascitur hæc, Schilickio referere, riguis locis ad Alpium Kaufburno vicinarum radices.

Eandem esse puto, cum illa, aut certe illi valde similem, quam noster Lobelius, in Appendicè ad calcem Stripium historiz Teutonico idiomate evulgatz, sic describit, exhibita etiam ipsius iconè, quam nos etiam adiecimus, licet radices & infima caulis pars, non satis scitè expressæ mihi videantur.

Antè quinquennid inquit, Alterum hoc genus *Lyfimachiz* lutzæ frequens inveniebam in humenibus fossis circa Gandavum, è regione palatij Principis, deinde inter Tenermundam & Gandavum: anno autem MDXXI. in Hollandiâ circa Amstelrodamum magna copia inter harundines è quibus ædium prætexa conficiuntur. Radix fibrosa, rubris maculis infecta, hac illac repit vulgaris *Lyfimachiz* instar, caulem ferens pedalem, quem ambiunt bina & bina folia, communis *Lyfimachiz* folijs angustiora, ex viridi pallentia, inter quæ flosculi nascuntur in longa capitula congesti, mollibus illis falcis capitellis luteo flore præditis non dissimila.

GALERICVLATÆ *Lyfimachiz* satis luculenter à Lobelio descriptæ non meminif- *Lyfimachia galericulata*
Lobelij.
sem, nisi alteram illi congenerem videre mihi contigisset, lectam in Itinere à Doctissimo Medico Gulielmo de Mera ex Italiâ redeunte, & in sportulis adservatam. Lobelianæ porro bini illi flores ex foliorum, contrario situ in cauliculis quadrangulis nascentium, sinibus prodeuntes, semper in anteriorem partem propendunt adeo æqualiter, & contigui, ut ex eodem sinu orti videantur, quod pictor in unico duntaxat nodo & geniculo observavit, plantam delineando. Nascitur etiam illa copiose in Vngariâ, Austriâ, Suriâ, Moraviâ, Bohemiâque, secundum rivos è montibus defluentes, rusticis neglecta.

A r quam à Mera accipiebam, dodrantalis est altitudinis, statim secundum radicem *Lyfimachia*
rubra ad-
mon.
ramulos in latera fundens, graciles, virides, frequentibus foliolis, angustis instar foliorum lini, sed brevioribus, obfitos, inter quæ nascuntur singulares, interdum gemini caliculi.

EE 3 longiuscu-

Valeriana Indica.

Valeriana
Indica.

Valeriana annua altera.

Valeriana
africa.

longiusculi, quales ferè in *L. vlmachia* rubra minore, e quibus emergit flosculus quinis foliolis conitans ex purpura egruleis: quibus defluentibus, succedunt capirula membranacea caliculis inclusa, exili femioe candicante plena: radix longiuscula, fusca, aliquot fibris dooata.

VALERIANA INDICA. CAP. XXXVI.

SEMINE ex Italiâ misso Valerianæ Indi-
cæ nomine, nata est hœc nova, & paucis
abhinc æonis Europæ cognita elegans plan-
ta, quæ primum ex terrâ emergens, noo val-
de abfimilis est illi quam Belgæ eddē-*reopm* /
id est, campeftrem lactueam, appellâr, Lug-
dunenſis plantarum hiftoria, Polypremum
Caſſiani in Geoponieis eſſe, aſſerere vide-
tur, Lobelius Phu minimi appellatione do-
navit. Inter media folia caulem promit pe-
dalem, nonnunquam cubitalem, concauum,
tenellum, anguloſum, nodofum, & ad ſiogu-
los nodos in bina brachia, ut plurimum, di-
uiſum, adnaſcentibus utrimque ex adverſo
ſingularibus folijs, binas uncias plerumquo
longis, unam laris, mollibus, craſſiusculis, ſi-
nuolis ioterdû, & in lateribus aliquantulum
ineſis, inſipidi fere guſtus: ſingula deinde
brachia ex genieulis prodeuotia, in breves
alios ramulos dividûtur, ferentes ſummo fa-
ſtigio multos in caput congeſtos flosculos,
longiusculos, extremâ parte apertos, & ia
quinque lacinias diuiſos, quarû duæ ſuperio-
res, breviores & latiores, inferiores autem
tamquam labra peodulæ, & media reliquis
lôgior, coloris omnes vel carnei, vel prorſus
nivei, odoris expertes: ſingula deinde capiru-
la in longitudinē & latitudinem auſcunt,
ſemecoq, oſtendûr craſſiusculum, fungoſum,
nigricâs: radix parva eſt, cãdida, quam ſubſe-
quente hieme petire, ipſa experientia docuit.

Floret interdum Maio & Iuio maritius
ſata: ſubinde ramen in hiemem uſque flores
& ſemen proferentem vidimus.

VALERIANA ANNUA, ſeu Æſtiva.
CAP. XXXVII.

HÆC ſtatim à radice multa folia promit
humî diffuſa, viridia, inſtar foliorum
Calcitræ vulgò appellatæ, ſive Cardui mu-
ricato capite, lacinia, inter quæ prodeunt
aliquot caules rotundi, cavi, ramoſi, binos
cubitos fere alti, virentes, quem ad ſingulos
nodos utrinque ex adverſo amplectuntur
folia inferioribus minora, lacinia etiam,
Valerianæ ſilveſtris vulgarioris foliorum æ-
mula: ſummis ramis eximoq, caule ſuſti-
neatur tamquam umbellæ florum quinque
folijs conſtantium, non diſſimilium floribus
Valerianæ Indiæ anteriore capite deſcriptæ,
coloris rubri diluſionis ad carneum tenden-
tiſin ramulos exereſcunt tandem illæ velu-
ti umbellæ, & ſemen ferunt quale pœnè Va-
lerianæ tubræ, ſed minus: radix alba, & ſaris
lignola,

Valeriana silvestris 1.

Valeriana sil. minor.



Valeriana sil. alpina 1. latifolia.



lignosa, quam tamen subsequens hiems corrumpit. Floret estate, & subinde in Autumno usque floribus & semine onusta conspicitur.

Nata est Francofurti ad Mœnum in exculto horto Joannis Myleri Pharmacopœi diligens & rei herbariæ studiosissimi, semine illi communicato, quod à Belgicâ acceperam à Jacobo Plateau, anno, nisi fallor, MDCXC.

VALERIANA ALPINA & Saxatilis. CAP. XXXVIII.

NON minus vulgaria sunt in Austria, Stiria, vicinisque Provinciis duo illa Valerianæ silvestris genera à Neotericis prodita, quàm in universâ Germaniâ, & alijs plerisque regionibus. Verùm duo alia in Sclaviacis & Austriacis Alpibus observasse existimo, quæ alibi mihi conspecta non fuere: quibus vulgarium icones præfigendas censuimus, ut ex collatione discrimen facilius agnoscere possit.

PRIMUM affurgit palmari cauliculo, interdum etiam pedali, terete, rotundo, viridi quem ambiunt oblonga folia in binas aut ternas crenas profundiores nonnumquam divisa: alia verò majora ex radice prodeunt, ad hederæ trachelivæ formam accedentia, minora tamen & teneriora, amari gustus: flores in summo caule quasi umbellatim nascuntur, ut in alijs Valerianæ generibus, pu-

Valeriana
silvestris al-
pina 1. latifolia.

silli, albi, quibus succedit exiguum semen, forma alioqui alijs silvestribus Valerianis simile: radice



Valeriana fil. alpina 11. saxatilis.

Nardus mont. primum germinans.



radice serpit nodosâ, albicante, odoratâ, & cum aliquâ adstrictione amariusculâ, ex quâ aliquot capillares fibræ dependent.

Natalis.

Crescit in ipsis Austriæ & Steiræ Alpibus, locis umbratis, inter saxa: nusquam tamen uberius quâ in Durrenstein, in quo omnes alpine plantę magis luxuriant & adolecere videntur.

Floreret Junio & Julio, deinde semen paulatim maturefcit.

Valeriana fil.
alpina 11. fi-
ve saxatilis

ALTERA bina aut terna à radice exeunt folia, Bellidis montanę foliorum pœnè æmula, è quorum medio caulis assurgit pedalis, gracilis, rata habens folia inter se opposita, angustiora, & minora: supremus caulis in ramulos finditur, qui flosculos sustinent albos, reliquis Valerianę silvestribus similes, semen, quod subsequitur, non etiam diversum: ejus radix aliarum Valerianarum Alpinarum modo in saxorum fete commissuris serpit, nec minus odorata est superiore.

Provenit inter saxa ad flumen Myrtz quod monasterium Neuberg alluit, qua ex eo monasterio iter est in Hohenbergerin & Spital. Invenitur & in alijs locis, sed istic primum observabam. Floreret sub Junij finem, & Julio, interdum maturius, nonnumquam serius, pro celi & aëris naturâ atque tempore.

DE Valerianis consulendum censeo Fabium Columnam virum acerrimi iudicii.

MONTANAM Nardum in illis montium ingis invenire non contigit, tametsi summâ diligentia perquisiverim. Verum anno MDXCII. eam ad me mittebat Neapoli doctissimus vir Ferdinandus Imperatus è monte Virgineo erutam, ex quâ numerosas flosceas nactus sum plantas: quin & semine deciduo pleræque feliciter natæ in meo horto.

Nardus mō
tana.

TUBEROSAM porro habet eâ radicem quæ quotannis adnans alijs valde se propagat, multisque & quasi capillaribus fibris infimâ parte & summo capite prædita est, ex quâ stolones oriuntur folijs ex atro virentibus superne & splendentibus, nec in ambitu serratis infimâ parte, onusti, deinde alijs in lacinijs dissectis, uti pœnè Valerianę majoris folia, sed minora, quoque stolones magis adolefcunt, eos magis dissecta vellunt folia, ex adverso semper sita: summo caulis fastigio confertim nascuntur flores Valerianę silvestris floriibus non dissimiles, odorati, minus tamen quàm radix, quæ silvestris Valerianę radicem odorem valde æmulat.

Hujus autem quam proponimus iconem, non ex adultâ, sed ex primo germinante plantâ, altero postquam illam accepissem anno, Fiar celsius christi cultor.

NARDUS

MINIME dubium est, quin hæc plantula ad silvestrium Valetianarum classem sit referenda, aded illas odore, & nonnihil etiam formâ, præferum saxanlem modò descriptam, refert.

Nardus alpina.



INTEGROS interdum cespites occupat serpendo, & latè summâ tellure sese inter mucum diffundendo: oblongi procumbentesque humi ramuli, tenues, plurimis veluti foliolis, aut siccis squamis circumsepri, subinde fuscas & nonnihil capillatas fibras agunt, summâ parte in unicum, aut bina ternave extuberant capitula, aliquot longis, secundum caput angustis, deinde in latitudinè paulatim sese laxantibus folijs, satisque crassis & succulentis plena, colore, dum primùm emergunt, viridi, deinde sub Autumni initium, aut Æstatis finem, flavescente, gustu amariusculo: palmaris aut dodrantalis, nonnumquam etiam major inter ista emergit cauliculus, satis firmus, ut in minutionibus Valetianis silvestribus geniculatus, bina ad singulos nodos inter se opposita habens exigua foliola, cui, circa summum, ex singulis alis enascuntur pedicelli, binos aut ternos flosculos coloris pallidi sustinentes, quibus succedunt semina, Valetianæ silvestri Alpoæ, saxatili præferim, secundo loco superiori capite descriptæ, proxima, paulò tamen minora.

Nardus alpina, seu Nardus Celtica.

Tota plantula aromatica est, & radicem Valetianæ silvestris odorem æmulat.

Copiosè nascitur in Iudenberg summo Sti-riacarum Alpium jugo inter mucum, saxosis locis, unde plantas cum suis cespitibus erutas, & pietasque alias elegantes stipes referebat anno M. D. LXXVI. C. V. Doctor Ioannes Aicholtzius Medicus ac Professor Viennensis, vetere amicitia mihi conjunctus, quatum nonnullas copias ad eos transfertur.

Nardus.

nullas suo horto aliquot annis aluit. Nascitur & in Tyrolensibus atque Salzburgergensibus montibus, teste C. V. D. Ioachimo Cametario, Inelytæ Reipublicæ Noribergensis Aethiarto.

Mense Augusto floret sub ipsis ferè nivibus: folia deinde promit cum illæ dissolvi & diffluere incipiunt. Legitur autem ab iocolis sub Augusti finem, & Septembris initium, cum folia flavescere incipiunt: tum enim summam habet odoris gratiam, quâ caret dum folia primùm promit, & adhuc viridis est.

IN COLÆ *Opus* appellant, nomine è latinâ voce desumpto: Pannonæ, quibus frequens ejus usus est in capitis lotionibus, *Bechy su*, hoc est, Viennensem herbam nominant, quia Vienoâ copiosè ad eos transfertur.

Opus, Bechy su.

SE DVM MAIUS LEGITIMUM.

CAP. XL.

TRIVM Sedi generum historiam Dioscorides nobis reliquit, majoris, minoris, & tetrij, cujus faculrates à reliquis generibus sunt diverfæ. Majoris descriptionem hoc capite dabimus, minoris proximè sequente.

MAIVS, frutex est potius, quàm herba, duorum cubitorum nonnumquam altitudine, brachiali verò crassitudine, multos ferens ramos pollicaris crassitudinis, aut majores, qui in multis alas dividuntur digitalis crassitudinis, summo fastigio veluti in orbem desinentes, multis folijs confertim & imbricatum sibi mutuo incumbentibus constantem, perinde ac in Sedo majore vulgari, sive Cotyledone alterâ Diosc. Catnosa sunt autem ea folia, succi plena, & linguæ infar efformata, hoc est, ab infimâ sede paulatim in latum sese dilatantia, in ambitu, crebris & minutis veluti denticulis aded leviter serrata ut vix appareat, gustu paululum adstringente: cortice denso, carnosio, succulento totus frutex cinctus est, cujus membrana exterior subsufca, maculisque, seu potius sedis foliorum vestigijs respersa, ut in Thymalo characiâ. Interdum summis majoribus ramis emergit crassus & veluti foliosus quidam

Sedum majus, seu Sedum majus.

Sedum minus I.

Sedum minus II.



Sedum minus III. sive palustre.



liola longiuscula, subhirsuta, succi plena: flosculos in summis cauliculis quinque foliolis constantes, purpurascences, aut carnei coloris, cum aliquot internis staminibus: totidem succedunt cornicula quae fuerunt in singulis flosculis foliola, initio viridia, deinde purpurascencia, semen exile continentia: radix exigua est & inutilis, secundum quam, ex infimo caule, furculorum propagines in orbem humi diffusae sunt, multis exiguis foliolis Sempervivi minoris fervidi (quod Octavum genus erit) fere similibus, minoribus tamen, angustioribus, & obrusiore mucrone praeditis, cinctae, saporis insipidi & aequi.

Florens hoc genus observabam uliginosis locis apud oppidulum Freying, qua Pragae iter est Noribergam, sub finem Iunii, cum anno M. D. LXXIX. in Belgicam & Britanniam proficiscerer.

TERTIA vetum Dioscoridis Sedum minus est, teretibus, crassis, succo plenis & mucrone praeditis folijs, flavis floribus. Vulgo in hortis alicur, atque ejus folijs solent Galli in acerarijs quemadmodum Portulacae folijs uti: sed & sponte nascitur in Hispanijs in muris & macerijs. Ejus verò duo sunt genera: Vnum cujus summus caulis in ramulos divisus sese inflectit instar summitatum Scorpiuri sive Heliotropij majoris, id mihi Quatuor Sedi minoris genus erit: Alterum cujus ramuli summo fastigio non incurvantur, quod mihi Quintum Sedi minoris genus est.

Sedum minus
Diosc.
sive modicum

Sedum minus
VII.

Sedum minus
VIII.

SEXTVM Sedi minoris genus, in Pannonicis Observationibus primo loco positum, affine est jam

Sedum minus 1111.

Sedum minus v.



Sedum minus vi. five alpinum i.

Sedum minus
viii. 1111.Sedum minus
viii. 1111.
Dioic. 1111.
Sedum minus
viii. 1111.
Sedum minus
viii. 1111.

est jam memoratis: nam summâ tellure serpit, ut illa, numerosisque & succulentis ramis præditum est, quos ambiunt longiuscula & mucronata foliola, Secundo Dioscoridis Sempervivo, quod Galli *Triguemadame* appellant, & illis in usu esse jam dixi acetarijs conficiendis, haud multum abîmilia, minus tamen crassa, planiora, & gustu valde exiceante: flores in cauleculis palmaribus numerosi, majusculi, quinque folijs constantes, ex luteo colore aliquantulum pallescētes: radicem habet in crebros ramos divisam, qui, per terram sparsi, tennes fibras agunt.


Crescit in Sneberg alijsq̃ue Sciriacarum Alpium jugis, in Tauro monte Carinthiæ & Ludenberg: & Montibus Kaufburno vicinis. Floret sub finem Julij, & Augusto.

In rupibus veteribusq̃ue muris nascitur Sempervivum genus cum in Hispaniâ & Lusitaniâ: tum in Galliâ Narbonensi præsertim Mompelij ubi id observabam quando illic vivebam in muris suburbiorum, ad portas urbis protensis. Non valde abîmilia est Sempervivo tertio Dioscoridis sed folia paulò crassiora sunt, candidiora, teneriora, nec, ut illa, fervidi gustus, sed

viribus Secundo respondentia & frigida: flos item ejus candidus, qui in Tertio Dioscoridis luteus: semen exiguum est, & subruffum. Floret Junio, semen Julio maturum.

OCTAVVM genus, est Dioscoridis Terrium, quod ab aliquibus *αἰσθητὸν ἄγριον*, & *αἰσθητὸν* vocari aasserit, à Romanis illecebram. Habet id crassa & succulenta etiam folia, frequentia, sibi invicem ferè incumbentiâ: flores luteos. Vulgaris est notitiâ: nam passim in tectis, muris & petris nascitur, etiam in aggenbus, salebrosis & aridis locis quæ tenui gramine ob-

stita:



fira: adeo autem vivax, ut tenuissima ramulorum fragmenta facillimè radices agant. Vim habet excafcatoria, acrem, & exulcerantem, teste Dioscoride, & ipsa experientia.

Novum, quod Tertium est in Pannonicis Observationibus, compactis & sibi invicem insidentibus est foliis, valde exiguis, crassis, cinerei coloris ad cæruleum quodammodo tendentis, ut tota planta (quæ acidi saporis est) nihil ferè nisi muscus quidam videatur: pedicelli è medio foliorum exiunt, duas præne uncias longi, graciles, juncei, in quibus terni plerumque flosculi, quinque foliis constantes, candidi coloris, cum aliquot intus luteis staminibus: cum in fæmen abeunt flores, cauliculi aliquantulum excrefcunt. Mirum in modum propaginis serpit & radices agit alterius Coryledonis ritu, integros cespites, cujusdam musci instar, interdum occupans.

Præruptis Snealben jugi locis, atque inter saxa nascitur, quâ descensus est ad Monasterium Neuenberg, atque etiam in Sneberg. Invenitur & in monte Fracto, teste Gesnero. Julio & Augusto flores.

Decimi folia paulò majora sunt & longiora, crassiuscula, in ambitu villis obsita, gustu etiam primum acido, deinde amariuscule & excafciente: adnatis se propagat, atque è medio foliorum, hirsutum pediculum profert, longitudine cum præcedente parem, in quo feni plicumque velut in umbellâ dispositi sunt candidi flosculi, quinque foliis constantes, umbilico luteo.

Invenitur in Sneberg & vicinis jugis. Sub finem Junij & Julio istic flores.

Vnecimum longiora nonnihil habet folia graminis modo angusta, dura, viridia, lævia, subacidi initio saporis, deinde ingrati: unicus aut alter inter folia erumpit cauliculus lævis, gracilis, junceus, trium ferè unciarum longitudinis, rarè major, in quo unicus, interdum binii sunt flosculi, superiore majores, candidi, medio lutei, quinque foliolis, cordis, ut vulgo pingitur, formam referentibus, præditi.

Serpit & hinc reliquorum instar, ysdemq; cum Decimo locis crefcit, atque eodem cum illo tempore flores.

Svnt etiam Duodecimo angustiora folia, rigidiora, aliquantulum hirta, ab imâ sede in circuitum sese expandentia, Coryledonis ætenuis, & reliquorum montanorum Sedi minoris generum modo, gustu quidem adstringente, nonnihil tamen amaro: ex horum medio unciales exeunt pediculi, firmi, nudi, qui summo fastigio quinque aut sex flosculos coloris lutei gestant: deinde crassiusculas mucronatâque siliquulas, semen exile, planum, fulvescens continentes: radix crassiuscula est, longa atque candicans, quæ, ex summo capite, multas plantulas adnatas & simul junctas producit.



Natalis.

In summis Austriacarum & Sciriacarum Alpij jugis, inter saxa provenit. Memini dum olim e Narbonensi Gallia per Helvenos in dulcissimam patriam redirem, in Allobro-

gum Alpijs cum alijs plenisque venustis stirpibus eruere. Hujus etiam obiter meminit Gesnerus in descriptione Montis Fracti, Historiam vero tradunt Pena & Lobelius Adversariorum libro: cum autem in supra memoratis Alpijs frequenter etiam collegerim, huic capiti cum reliquis Sedi minoris generibus (tamen forte non per omnia ejus facies respondeat) inferere libuit.

*Sedum mi-
nus 1117.*

NUMEROSA habet Decimum tertium genus foliola, ternis profundis incisuris laciniata, ut Ajuga fere folia, minora tamen & viridiora, neque ulla lanugine vestita, quorum sapor admodum adstringens & exsiccans: cauliculi assurgunt exiles, binos transversos digitos, si- ve sesquicentiam longi, singuli singulares sustinentes flosculos ex herbaceo pallecentes, quin- que foliolis constantes: radice scripit multis exiguis fibris capillata, & multas propaggines à lateribus generare, ut integros cespites interdum occupet, multumque quendam ementiatur.

Crescit in summo Sneberg jugo, inter saxa recenter à nivibus libera. Floret Augusto.

*αἰζων δασύ-
φυλλος.*

Quo nomine à montanis pastoribus & venatoribus omnes illæ plantæ in Austriacarum Alpij jugis nascentes, quas hic ordine descripsi, donatæ sint, hæcenus intelligere nō po- tui: & haud scio an illis ullum nomen indiderint, solent enim ejusmodi minuta negligere. Ego Sedi parvi generibus adnumerandas esse censeo. Si cui autem mea sententia minimè placeat, aliq; nomine insignire malit, per me semper licebit. Septimum portò, Dalecham- pius, siue quisquis is fuerit qui Generalem illam Plantarum Historiam Lugduni expressam scripsit, αἰζων δασύφυλλος cognominare videtur. quæ sanè appellatio omnibus Sedi gene- ribus quorum folia sunt crassa & densa nō minus quam, illi peculiariter, convenire potest. Illud verò mirum, quod Duodecimum genus non inter Sedi genera recēscat, tamen ejus- dem temperamenti esse asserat, sed Phyllum Arthenogonium Diofcoridis esse velit. cujus quæ cum hac plantâ sit affinitas, Doctioribus, qui in Stirpium cognitione versati sunt, dis- piciendum relinquo.

Facultates.

CETERVM Diofcorides similes facultates tribuit Sempervivo parvo, quibus pollet ma- gnum præcedens capite descriptum: Tertium autem genus, quod in hoc capite Octavum est, illitum cum axungia, strumas discutere ait. Nisi quis supposititias esse has facultates di- cat, & Diofcoridis textui infertat, ut non sine judicio censeat Fab. Columna, qui vulgarem illam Sedi quam Octavo loco reposui speciem, πῶ αἰζων nominat (similes enim sunt om- nium Sempervivorum facultates) sed facie αἰζων referre dicit, & Plinii alterum vel ter- tium dasylum, quem postremo cap. lib. xx. 1111. Natur. Histor. describit, esse suspicatur, cui opinioni acquiesco.

*Dasylum Pl-
ny 1. 3.*

COTYLEDON.

CAP. XLII.

*Facultates
veneris.*

UMBILICI VENERIS, siue Cotyledonis historiam alij tradiderunt: mei tamen in- struti esse putavi (quandoquidem alteri ejus generi peculiare caput damus) hoc capi- te brevem illius descriptionem retexere.

HABET autem multa folia à radice prodenntia, summa tellure confertim stipata, in ace- tabuli formam tornata, hoc est, orbiculata, & in medio, umbilici instar, depressa, succulen- ta, teuera, inter quæ exit caulis non valde firmus, aliquot folijs præditus, non orbiculatis ut inferiora, sed longiusculis, & extremâ parte quæ latiuscula est, crassaque & succi plena, in

tres

Cotyledon, Vmbilicus Veneris.



Cotyledon altera i. Sedum vulgare.



tres plerumque crenas divisas; ex quorum sinu procedunt interdum ramuli, qui, cum caule, à medio ad summum fastigium multis floribus sunt onusti longiusculis còcavis & propendèntibus instar pusillorum tintinnabulorum, coloris ex herbaceo candicans, qui firmiter inhzrentes, unà cum caule siccantur, & tandem pèdri: maturi floribus occludunt parvas siliquulas plenas exili fusco semine, quod sponte decidens, numerosas circa matrem, & in vicinis, si quæ adfunt, vasis fidelibus, generant plantulas: radix est ruberosa, non bulbi modo efformata, sed potius orchidis pleniorè radicem referens, modò orbiculata, interdù ruberis aut Aconiti hiberni radici similis, ut illius instar confringi, & fragmentis pangi possit.

Sponte verò nascitur non modò in muris veteribus & parietibus: sed etiam in tectis, muns sive parietibus, ex argilla formaceis, faxis & rupibus. Iium interdum solo fertili, ad Olcatum, Chamæraphis, & Corruæ radices, atque etiam in annosis Suberis arboribus sponte crescentem observabam plenisque Hispaniæ & Portugalliæ locis.

Græcis hæc planta *κωυλόν* dicitur, ab aliquibus *κωυλόν*, ab alijs *κωυλόν* Dioscoride referente; Latinis Vmbilicus Veneris. Gal' Latinos sequi *Nombil de Femme* appellant; Salmanticensium vulgus *Pajides*, id est, acetabula aut vascula nuncupabant à cava folij capacitate acetabulū referente.

Sacris ignibus, strumis, inflàmationibus, permionibus, illitu auxiliari, stomachi ardorem refrigerare, folia cum radice còmanducata, calculos frangere, & urinam ciere, atque hydropicis ex melle dari, auctor est Dioscorides.

COTYLEDON ALTERA. CAP. XLIII.

ALTERIVS Cotyledonis nomine intelligo Sedum majus vulgare, ex Dioscoridis mente, cujus in Austriæ montanis alia inveniebà genera nulli ex Neotericeis Scriptoribus, quod sciam, observata, quæ hic ordine describemus.

PINGVIA, crassa, numerosàque habet Primum folia, circa radicem densa, Acetabulo alteri, sive Sempervivo vulgari majori (cujus iconem præfiximus, ut differentia conspici possit) similia, minora tamen, & in ambitu leviter dentata, succulenta, & gustu acido: inter quæ multa in ambitu capira è similibus sed minoribus folijs cògesta exoriantur, longis pediculis inhzrentia, quæ tandem aucta in novas plantas efformantur: ex ipsius matris umbilico emergit caulis dodranalis, foliosus, rectus, ferè in ramulis florem alterius Cotyledonis instar albicantem, magnum, sex folijs còstantem, cui succedunt siliquæ, seu vascula tondem angulis discretæ, semine exili plena: radix Sempervivo vulgari majori similis, minus tamen

Natalis.

κωυλόν, κωυλόν, κωυλόν.

Nombil de femme. Vasillos.

Facultates.

Cotyledon altera. Diosc. Sedum majus vulg.

Cotyledon altera.

tamen crassa, candicans, subinde novas plantas præter jam dictas è lateribus fundens.

Natalis.

Frequens est in omnibus jugis urbi Viennæ vicinis, atque in Austriacis Striacilque Alpibus. Floret Julio.

*Alteras
con.*

2. ILLIS ipsis locis invenitur aliud genus huic valde simile, per omnia tamen minus, & cujus etiam folia magis sunt dentata.

Cotyledon altera 111.

Cotyledon altera 1111. sive Marth.



*Cotyledon
altera 111.*

CONFERTIS, frequentibus, pinguibusque sive crassis, atque in orbem digestis est etiam Tectum genus folijs, Superiore tamen minoribus, nec detatis in ambitu, tamen si aliquantulum hispida appareant, sub quibus, è radice capite, alix similes plantæ crassius fibris præditæ, in orbem se se propagant, & radices agunt: è matris umbilico, palmatis, nonnumquam etiam dodrantalis, exilit caulis, succulentus, rubescens, multis crassis succis: plenis & mucronatis folijs cinctus, angustioribus quàm superiora, & mucrone purpureo etc., qui supremâ parte in ramulos dividitur, multis floribus superioris Cotyledonis alterius floribus formâ similibus onustus, minoribus tamen, duodenis que, ut plurimum, angustis, mucronatis, stellæque instar decussatis folijs constantibus, coloris ex rubro purpureo etc., totidem siliquulis in caput aut veluti coronam compactis, floris umbilicum occupantibus, & vicinis quaternis staminibus eam ambientibus: semen illis siliquulis sive loculis ad eum exile, ut oculorum aciem propemodum effugiat: radix mediocriter crassa & fibrosa est, alterius Cotyledonis modo. Plantæ quæ florem tulerunt, cum in hac tum in superiore intescunt, perinde atque in Cotyledone alterâ, sive Sempervivo majore vulgari, succedentibus matri reliquis in orbem prolixis.

Natalis.

Crescit in Taurinarum Aspium jugis non procul Saltzburgo: ubi floret Julio, in hortis autem, in quos translata fuit eum reliquis ejus generibus etiam Maio.

*Cotyledon
altera 1111.*

HVC etiam numerosa & conferta sunt folia, oblongis ligulis similia, crassiuscula, mucronata, nonnihil per ambitum crenata, candicantia, acido & subadstringente gustu: è quorum centro, seu medio foliorum exortu caulis interdum cubitalis, ut plurimum autem pedalis duntaxat, assurgit, superiore parte hirtus, brevioribus folijs inordinatim nascentibus septus, summo fastigio ex singulis foliorum alis pedicellos emittens, quibus insident bini aut terni flores colore albi, è quinque foliolis compositi, internè veluti sanguineis guttis aspersi, umbilico pallido & splendente decem staminulis cincto: semen continetur in capitulis exile, nigrum, radix subest fusca, tenuis, fibrosa, cui, secundum matrem, multæ alix in orbem adnascuntur plantæ, ut integrum cespitem aliquando tegant, vulgaris Sedi majoris instar.

Nascitur

Nascitur non modò in Sneberg, sed & in reliquis Austriæ & Stiriz Alpibus, saxis & scopulis inhærens: in quibus floret Iunio & Iulio: at in hortis translatum, Maio: semen profert Iulio, aut maturius.

Istius Quarti generis Cotyledonis alterius descriptionem prætermittere non potui, licet à Matthiolo & alijs ejus història sit prodita, quia meo judicio succinctor apud eosest quàm oportebat.

QUINTVM etiam genus invenitur affine Quarto, sed mollius, angustioribus & longioribus folijs, non dentatis, sed alba duntaxat lanugine hirsutis, minus etiam incanis, brevioris crassiorisq; pediculo & multis folijs sepeo, quæ plerûque tam supernè quàm infernè nonnihil hirsuta sunt: paucioribus floribus hinc inde secundum caulem ad singulas alas sparsis.

Observabam hoc genus in Erichenianis jugis, mense Iunio suis floribus onustum. Cotyledon altera.
Græcis vocatur *tripa xotulad* vñ ea planta quam vulgus Herbanorum hæcenus pro Sempervivo majore habuit: Latinis Cotyledon altera. Eandem licentiam sibi sumpsit in Quarto hujus genere, quam in Duodecimo Sedis minoris genere, qui Historiam illam Generalem Plantarum scripsit, vult enim Phyllum Thelygonum Dioscoridis hoc esse, quem admodum illud Arthemonogonum. Natalis.

Dioscorides porrò Cotyledonem alteram scribit ad eadem utilem esse, ad quæ Sempervivo commendatur. Serpentaria.

RHODIA RADIX.

CAP. XLIII.



MEDIAM quandam naturam obtinere quodammodo videtur Rhodia radix, inter Cotyledonis alterius priora genera, & Telephium vulgo nuncupatum: sed Telephium magis affinis judicari queat. Propterea illi peculiare caput inter utramque stirpè dare volumus: non quod ejus historiam tradere habeamus in animo, vulgaris enim est notitia, atque ab alijs descripta. Quia tamen aliquoties sponte crescentem conspexi & erui, facere non potui, quin illius mentionem facerem.

Illam autem maximè copiam nascentem observabam in scopulis jugi Durrenstain, cujus in hac Scirpium historiam crebro meminimus, & florem variantem mensibus Iulio & Augusto: nam quædam plantæ illum pallescentem habebant, aliz veluti rubescentem: semen in exiguis vasculis, quemadmodum in Telephio, exile, quasi scobis instar. Quæ in hortis alio solet, maturius fleret. Natalis.

VOCATUR porrò hæc planta Græcis *ῥοδία* *ῥοδία*, Latinis Rhodia radix, quod resiccata ejus radix, rosam redoleat: eodè nomine Officinis nota. Montani pastores, ubi sponte nascentem observabam, etiam ab odore rosæ, illam appellare noverant. Natalis.

Dioscorides capitis doloribus utilissimam esse tradit, si rosæci momento commixta, fronti & temporibus imponatur. Natalis.

TELEPHIUM.

CAP. XLV.

NON ignoto ambiguum esse, an quas hoc capite describam plantas, commodè ad Telephij historiam accommodari possint: cum tamen illarum pleræque, apud rei Herbariz scriptores tale nomen obtinuerint, malui illud retinere, quàm nullo nomine donatas eas relinquere.

HABET autem Prima, duos, tres, pluresve caules ex radice prodeuntes, cubitales, succulentos, in latus se inclinantes, in quibus ordinata sunt folia, hoc est, ex intervallis bina semper adversis pediculis nascentia, crassa, succi plena, ut in Crassulâ majore, sed majora, & magis carnosa; flos in extremis ramis quasi umbellatim nascitur, quemadmodum in Crassulâ majore, pallidus: radices illi plurimæ glandulosæ, Crassulæ vulgaris similes. Telephium.

Nascitur in Hispaniæ umbrosis quibusdam locis: unde ad Belgas delata, faciliè comprehendit & aucta est: valde enim vivax est, ut etiam rami in terram depacti statim radices Natalis.

FF 3 agant:



Telephium
Austriac.

Telephium
vulgare
nos 11.

Telephium
111: pur-
purascens
flor.

Telephium
1111.

Telephium v.

Telephium
v.1.

Dieff. forae

agant: eam ob causam, pauci apud Belgas erant horti, cum illinc excederem, in quibus non aleretur. Floret cum Crassula.

Illi omnino similem, modo eadem non sit, ad Austriacarum Stiriacarumque Alpium tadicis, locus umbrosis sponte nascentem inveniēbam.

ALTERA, quæ vulgo Fabaria & Crassula à foliorum crassitudine dicitur, promittit etiam plures à radice caules, succulentos, pedales aut ampliores, satis fragiles, & folia in illis inordinata, sive hinc inde sine ordine per caulem sparsa, crassa quidem & succulenta, Hispanicæ Telephij folijs tamen minora, frequentiora & magis conferta: flores in summis caulibus congestos, coloris albi; radix nodosa est, & multis veluti uapis constans, ut superior: cum quæ etiam floret.

Aliut hæc in hortis, sponte etiam in veteribus muris Septentrioni expositis nascentem observabam.

TERTIA huic non valde dissimilis, à me conspecta ad agrorum margines inter vepres nascent, viâ cavâ & umbrosâ non procul à Rotenburgo Hassiæ oppido ad fluvium Fuldani sito, cui rariora tamen erant folia; flores etiam superioribus colore dissimiles, qui ex purpurâ rubescentes erant.

QUARTAM observabam anno MDCX. in montibus illis Francofurti vicinis, & quâ Septentrionem spectat, oppositis; eam in hortum transferebam, ubi mihi singulis annis egregiè floruit, aliarum tempore.

EX radice autem crassiuscula, & bulbis instar parvorum naporum, multisque etiam fibris prædita, aliquot singulis annis (nam vivax est) produxit caules cubitales, quibus innascentur folia satis frequentia, inordinata. Secundæ folijs præne similia, crassa, succulenta, in ambitu tamen nonnihil crenata & veluti sinuosa: summæ virgæ comam, umbellæ instar, flusculorum quinque foliolis constantium, tetunt, coloris gratissimi ex rubro purpurascens, quibus evanescentibus, succedunt capitula pentagona, in quibus tenuissimum instar scobis, semen, fulcum: ingruente hieme marcescunt illi caules & pereunt.

HVIC non valde dissimilis videtur, quam Lobelus exhibet purpureo flore præditam, nisi radicem haberet paucioribus (ut mihi quidem videtur) napis constanter.

PERIGRE ad nos mittebatur, dum Machliniæ commorabar, Sextum genus, non Telephij, sed alterius plantæ nomine: si quis tamen accuratius observabit, asserere auiam, iudicaturum nullam ex prædictis proximis ad Telephij à Dioscoride nobis propositi historiam accedere, quàm istam: habet enim cauliculos humi procumbentes instar Porulacæ, folia illis fere paria, coloris ærugineum quodammodo referentis: flores in extremo caule

confertim

Telephium v. purpureo flore.

Telephium vi. Cepra Pancij.



Telephium legitimum Imperati v. 17.



conferunt nascentes instar forum Crassulæ sive Fabaræ, coloris purpurascens: multas habet radices fibrosas, atque ipsi etiam caules procumbentes facile fibras agunt, perinde ac Sempervivæ illa prima minora. Hoc autem peculiare habet ut a plâta, quod nulla hiemis injuriâ offendatur, sed brumam & pruinas contemnens, perpetua in suo vigore & vitiditate permaneat.

SEPTIMUM Telephij genus, mihi Viennæ Austriæ natum anno M D XCV. semine Florentiæ missum à Iosepho de Casa bona: postea etiam Francofurti ad Mœnum crevit Joanni Mylero Pharmacopœo semine, quod acceperum Neapoli à Doctissimo humanissimoque viro Ferrante Imperato Telephij legitimi nomine ipsi communicabam: ex cujus Myleri horro plantam unam et uerbâ, quam pictori exprimendam darem. Siccam verò hujus plantam etiam ad me Francofurtum mittebat cum alijs stirpibus Amplissimus vir Jac. Anto. Cortusus, ignotæ adscriptâ notâ, quam tamen apud eos frequentem in hortis nasci assereret.

MULTAS autem à summo radice capite producit tenues virgas, summâ tellure diffusas, pedales, interdum breviores, aliquando longiores, non sunt enim omnes æqualis longitudinis, quas incœdito ordine sepiunt multa folia, præfertim novellas, & quæ nondum florem ferunt (nam quæ flores dant, rariora

Telephium
v. 17. f. v. l.
legitimum Im-
perati.

plerumque habent folia) minora quàm reliquorum generum, minus crassa, neque adeo succulenta,

culenta, neque adeo fragilia, coloris quidem viridis, cui ætugineum quidpiam admixtum sit: extrema virgæ, multis flosculis quinque foliis albis constantibus, & confertim nascentibus, onusta, quibus marcescentibus succedunt angulosa vascula exili, fusca semine plenæ: radix minimi digiti crassitudinem interdum adquirit, lenta, candicans, in aliquot ramos diuisa, & quibusdam fibris donata, vivax, & singulis annis plures novas virgas producens, vetetibus corruptis. Florer cum Cissulis.

Nomen.

PRIMUM genus vocabant Telephium Hispani: Cissulis sive Fabarijs adnumerandum: nam facie & facultatibus respondent, priora quatuor genera. Non ineptè tamen ad Telephij classem referri etiam possint, præsertim Sextum, ut dixi, genus, nobis, ante multos annos in Belgicam missum à C. V. Alphonso Pancio Ferrariensi Medico Cepeæ nomine, Germani Secundum, & Tertium genus habebant: Dumbtraut / Gethraut / Scheymentzsch. Quartum habebant: melle appellant: Galli secundum Orpin. Græcis Telephium dicitur τηλεφισον.

Facultates.

TELEPHIT autem folia, teste Dioscoride, senis horis illita, vitiliginem sanant, sed postea locus hordeaciâ fatinâ illini debet: peruncta ex aceto in sole, idem quoque præstant, sed ubi inaruerunt, absterguntur. An porro Telephij genera hoc capite deinceps, similibus facultatibus sint prædita, me lætet. Hoc autem obleruavi, priora duo genera, ab etucis non minus plerumque infestari solita, quàm Brassicas.

Cepæ Matthioli.

Cepæ.



Facultates.

Bistorta major.

Britannica Dracaena.

Bistorta alba minor.

Matulis.

SED quoniam in Cepæ mentionem incidimus, frequens in Belgicis hortis ali solebat, semine ex Italiâ missa nata plâta illa, quam Matthiolus pro Cepâ proposuit, cauliculo dodrantali, ex parvâ & inutili radice prodeunte, in terram procubente atque in multos ramulos fisso, cui ad singulas alas adnascuntur folia etasiliacula Portulacæ folijs minora & angustiora: summis deinde ramulis albi flosculi quinque foliolis constantes, quibus succedunt tenuia, ut in Cissulis, capitula exili, scobis instar, semine plena. Annua autem est, singulis annis deciduo semine sponte resurgens. Sine verò legitima Dioscoridis Cepæ nec ne, hæreo, atque aliorum acnoti iudicio relinquo.

CETERVM Dioscorides, sive Cepæ folia, in vino pota, urinis stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus opitulanti scitbit, maximè autem id præstare, si cum decocto alpatagi quem γωνιακισον, hoc est, cottadam vocant, bibatur.

BISTORTA.

CAP. XLVI.

AD Austriacarum & Sciriacarum Alpium juga, acclivibus locis & citra scopulorum radices sponte nascitur Bistorta illa major quæ vulgo in hortis ali solet, folijs pænè Rumicis, infirmè incanis, nodoso caule, spicato flore subpurpureo, quæ fortasse non incommode Dioscoridis Britannica censeri possit. Ejus iconem hic subjunximus, quia de altero ejus genere pu-

milo nobis, in hoc capite, erit sermo.

CAULICVLVM autem promittit dodrantalem interdum, sed ut plerumque palmarem, tenuem, genicularum. gerentem summo fastigio exiguum candicantium flosculorum spicam: folia vulgaris Bistortæ majoris folijs multò minora, unguis humani latitudinem raro excedentia, nonnumquam tamen paulò majora, longa, dura, venosa, per otas reflexas venulis quibusdam ita distincta, ut serrata videantur, superne virentia, infernè verò incana, non secus ac majoris folia: excusso flore, qui albus est, paulo grandior sit spica, quæ plerumque similis, quo major, semine onusta est, non raro tamen, seminis loco, multa foliola brevè & viridia in capitula congesta profert, quibus sponte decedentibus, plantulas ejusdem generis in eadem in quâ alebatur areolâ, & viciniotibus natas sæpe vidi: radix vulgari longè capillaria, gustu, uti tota planta, adstringente.

Nascitur in summis Austriacarum & Sciriacarum Alpium jngis tenui gramine vestitis: floretque Iulio. In hortos verò translata (ubi formam & magnitudinem non immutat) maturius.

CERTVM

Bistorta major.

Bistorta minor.



CERTVM est iisdem facultatibus esse præditam, quibus maior: de quâ multa alij Scrip-
tores, quæ non est operæpretium hic repetere.

Bistorta potest Britannicam, vini habere adstringentem, privatim depascentibus oris & *Britannica*
tonillarum ulceribus accommodam, & valere ad reliqua quibus adstrictione est opus, scri- *faculiat.*
bit Dioſcorides.

RVMICVS autem, qui huic plantæ congener videtur, non minus varia genera observa-
re memini in jugis illis Alpium Austriacum & Stiriacum, quàm in alijs Regionibus
veniuntur.

AT *Oxalis*, Oxalidis genus in jugo Wechsel observabam, sativo multò majus, folijs *Oxalis mont-*
valde amplis: cui hoc peculiare erat, ut in caulis nodis & geniculis, subinde veluti tubera *ana montana.*
quædam adnaſcerentur, è quibus folia tandem sese explicarent: quæ tubera tellure obruta
(peticulum enim feci) sui generis plantas protulerunt.

NASCITVR etiam in omnibus illis jugis, præsertim circa humidiora illa loca, ad quæ *Rumex lati-*
armena, stationem istuc habenna æstivis mensibus aquationis gratiâ convenire solent, fre- *folius vulg-*
quentissimè, magnum illud Lapathum amplis & circumnatis quodammodo folijs, nonnullis *Rha asthma-*
instar jacer, brachialiter interdum crassitudine, fibris subinde se firmans, antetius ut Acotum, *um.*
& Polygonata augmentum sumens & progrediens, totus ex luteo putputascens. Ea reficca-
ta, Rha substantiam æoulatat, nec minus eo inficit.

ARISTOLOCHIA.

CAP. XLVII.

TRA Aristolochiæ genera Dioſcotides constituit, rotundam, longam, Clematicin:
Plinius quattuor addit, pistolochiam.

ROTUNDA unicam speciem veteres faciunt, Anguillata plures inventi scribit, ego bi-
nas dumtaxat observavi.

Prior multos ex una radice germinibus, cubitalibusq; interdum palmitibus constat, qua-
drangulis, quibus, ex intervallis, folia inhærent, mediæ inter malvæ & hederæ folia magni-
tudinis, mollia, venosa, colore ex viridi nigricante, brevi pediculo: his incumbunt oblongi
flores, cavi tubæ instar, ex purpura nigra, teste Dioſcotide, quorum labrum prominulum,
scu exuma pars, latior est, quàm in longæ aur clematicidis flore, & tota nigricans: his succe-
dit fructus rotundus, parvi Melopeponis forma, qui multa grana continet ordine disposita,
lata,

Aristolochia
rotunda 1.

Aristolochia rotunda L.

Aristolochia longa L.



lata, nigricantia, intercutantibus quibusdam membranis, & materiâ etiam fungosâ, albâ, singulis granis interposita, quod reliquis Aristolochiæ generibus commune est: radix est ampla, rubetosa, rugosa, foris fusco, intus buxco colore prædita, cortice crasso, & (ut Theophrastus ait) carni adhzrente.

Natalis.

Crescit pingui solo, in pratis & humidioribus agrorum marginibus Hispaniæ, Narbonensis Galliæ, & sicut intelligo, etiam Italiæ. Floret calidioribus regionibus incunte Veræ, in Germaniâ & Belgicâ non nisi Maio & Junio.

Aristolochia rotunda L.

Altera tamulos seu palmites habet prioris, sed frequentiores & breviores; folia longæ quidem formam & colorem æmulantia, sed majora, longioræque pediculo quàm superioris fulta: flos ex albo purpurascens, interius fulcum, Longæ flori parè similis: ejus fructus priore longior, pyri in modum turbatus, graciliore quàm in illa meta: semen planum, minus priore & tufum: radix superiori similis, cortice tamen magis flavo.

Floret paulò maturius superiore, omnèque semen ferè abiecit, quando prioris maturæscere incipit. Hanc non nisi campestribus & inter segetes sponte nascentem conspuebam, deinde cultam in orto Pharmacopæi cujusdam Viennensis, cui, atque etiam ipsi Docturibus, ignotum erat primum genus, quemadmodum & cetera Aristolochiæ genera, præter Clematitin primam. Superiore firmior est, & injuriarum hiemis toletantior.

Aristolochia longa L.

LONGÆ cauliculi etiam quadranguli, duos palmos longi, interdum longiores, in multos ramos divisi, humi, uti Rotundæ, diffusi: folia quàm illius minora firmiora, dilatoris coloris, longiore pediculo fulta. Soldanellæ foliorum parè forma: flos similiter oblongus, concavus, ex viridi candicans, Rotundæ alterius florum effigie, sed extimâ parte, coloris magis herbacei, intus, ut reliquorum, villis obfusus: fructus pyri in morem turbatus. sed nõ ad eodè tenui metâ, ut alterius rotundæ fructus, qui maturitate dehiscens semen ostendit larum, tufum, & tandem fulcum. Hujus radix digiti crassitudine est Dioſcoridi, & dodranci longitudine, quod de triennibus & junioribus plantis intelligendum autumo: nam adultarum longè amplior magnitudo, etenim multas etuere memini, quæ crassitudine brachium, longitudine pedem æquarent. Adultæ verò omnes plerumque exte ma parte obtusæ sunt, & æqualis ferè per totam longitudinem crassitudinis, subinde tamèn culpside tamola: juniores graciles sunt, multasque fibras habent.

Natalis.

Provenit campestris locus inter segetes, & quibusdam vinetis in Narbonensi Galliâ: memini & novo vere florentem etuere in insula medys in stagnis sitâ, ubi templum Magalona nuncupatum, olim Episcopi Mompelliani sedes, circa oppidulum Villa nova nominatum, secundo à Mompellio miliari.

Quædam

Aristolochia Clematidis vulgaris.

Aristolochia Clematidis Batrica.



Quædam etiam differentia in Aristolochiâ longâ observari potest : nam illius quam in Hispaniâ observabam (tametsi Gallicæ fere per omnia similem) flos à diligentius inspicien-
tibus nonnihil differreprehendetur, quippe cujus extrema pars interiore parte purpurei coloris sit, qui in alia herbaceus: Hispanicæ item radix extréma parte non est gracilis in novellis plantis, ut altera, sed plerumque obtusior, & ipsa radix brevior.

Aristolochia longâ.

Nascitur in Hispaniis inter vites, regno Valentino frequentissima, ubi Martio florentem & jam semen perficere incipientem eruebam: Vtraque autem cum in Germaniâ, tum in Belgicâ frigoris est insipiens, & diligenti curâ adservari debet. Aliquoties Viennæ periculum facere volui, an hiemem in horto ferre posset, etiam abietis frondentibus ramis testâ, ut reliquæ, quas hac ratione conservare solebam, plantæ: sed operam lusi, & semper corruptæ sunt. Itaque accepto damno prudentior factus, in vasis fictilibus postea semper alui.

Natalis.

CLEMATIDIS præcedentes magnitudine superat, caulem habet firmiorem, rotundum, striatum, supra cubitalem altitudinem assurgentem: hujus folia reliquarum folijs multò ampliora, ex viridi palléscentia, longo pediculo sulcata, formâ Longæ, vel potius Rotundæ alterius folia referentia: flos pallidus, copiosus in singulis alis, qui in alijs generibus singularis, longe floris formam quodammodo referens, quo evanescente succedit fructus reliquarum fructu major, exigui mali magnitudine, semen continens quale est reliquarum Aristolochiarum, sed majus. Hujus radix, quæ reliquis cum gravitate quadam est odoratio, tenuis & ad minimi digiti crassitudinem nunquam accedens; longe lateque serpit, & altissimè sub terrâ mergitur, adeo vivax, ut etiam frustulatum concisa, facillime renascatur, & magna difficultate eruarur: quâ de causâ subinde molestiam ijs adfert, qui illam semel in suos hortos receperunt.

Aristolochia Clematidis vulgaris.

Edithora amat loca, & nonnullis Narbonensis Gallicæ vineis adeo frequens est, ut vina ab illius odore vitum contrahant. Invenitur & in plerisque alijs Gallicæ, Hispaniæ, Ungariæ, Germaniæ superioris & inferioris, locis. Floret cum reliquis.

Natalis.

ALIVD Aristolochiæ genus circa Hispalim itinere Olyssipponensi, plurimisque alijs Bæticæ locis, in dumetis, vepribus, & vetustis quibusdam olivis sponte nascens observabam, quod ad Clematidin mentò refecti posse videtur.

Id longa, ramosa, tenuia, striatâque habet sarmenta, quibus vicinas sepes & interdum arbutulas superat, ijs se cōvolvens & implicans Convolvuli aut Lupuli modo. Folia illi reliquarum Aristolochiarum folijs similia, seu potius generis illius Apocyni, quod in maritimis nascens, Mompelliani Scamoneam meo tempore appellabant, extremo mucrone

Aristolochia Clematidis Batrica.

acumina.

ac ut in toto, superne lævia & viridia, inferne ex purpureâ albicantia, longo pediculo innixa: flos Aristolochiæ longæ incurvus, oblongus, ex purpureâ nigricans, intus tenax longinque plenus, longissimo omnium pediculo insidens: fructus (ut ex illius rudimento colligere licet) reliquarum Aristolochiarum fructui similis, tale etiam esse semen, ex eo quod Dodonæus. Vir Simon de Tovar mittebar observavi, fructus verò æque magnus ac in Clematide vulgaris, & à pediculo delibens: radix prælonga, sarmenticia, Simlacis asperæ instar (cum cuius crassioribus fibris magnam habet affinitatem) nunc per summa serpens, mox altè sub terrâ se condens, pallidi coloris, non ingrati saporis, gustata enim, aliquantulum adstringens deprehenditur, & manifestè acrimoniæ. Tota planta odorata est.

Natalis.

Nasceri pingui solo, ijs quæ commemoravi locis, temper istius virens & Ianuario Februanoque florens: etiam circa Cordubam mihi observata.

Hic vix neminem facere mentionem scripsi, cum Hispanicarum quarundam Striptium Historiam publici juris facerem, præter unum Petrum Bellonium, qui eam in Cretâ observasse scribit lib. 1. Observationum cap. xvii. Idem nunc denuo assero: nec me movet, quod, qui Generalem illam Plantarum Historiam Rovilianis typis Lugduni expressit, scribat. Huius neminem meminisse ait Clusius præter Bellonium &c. Dodonæus tamen eandem Clematidis nomine depinxit &c. Fatetur Clusius, sed à se acceptam, & totam adeo Aristolochiarum historiam, cum Purgantium historiam meditaretur Dodonæus, ipsi liberaliter (ut & pleraque alia) communicasse ait. Sed & ipse Dodonæus istuc expressè refert, circa Hispaliem plurimisque alijs Beticæ locis, in dumetis & vepribus Carolum Clusium offendisse: addit Clusius ruto etiam decennio, ante quàm ille Purgantium Historiam evulgareret. Et unde quæ hæc hausisset Dodonæus, qui tum temporis pedem è Belgicâ numquam extulerat, quàm ab his qui peregrinas lustrassent regiones? Sed ea est quorundam supina negligentia, ne dicam, fœcordia, ut solâ iconum inspectione contenti, tantum orium non sumant, ut ipsarum Striptium historiam legere dignentur. Sed de his satis: taceamus ad Aristolochiarum Historiam.

Pistolochia.

Pistolochia.



Natalis.

Aristolochia peregrina Rauwolfii.

Rhafis, Ramogi.

PISTOLOCHIA canaliculos magna ex parte pedales habet, nonnumquam majores, angulosis, striatos, & ut Aristolochia Longa, ramosos, tenuiores tamen: folia Longæ folijs non dissimilia, nigriora, minora, magis rugosa, & aliquantulum in ambitu sinuosa: florem Rotundæ priorum æqualem, minorem tamen, & aliquantulum nigrum, interdum ex herbaceo flavescen-tem: fructum Rotundæ primæ fructus effigie, verum minorem: semen etiam simile: densis est radicis capillamentis juncti, ut rectè Plinius ait, pleniorem crassitudine, buxo colore.

Oritur in Olivæ, & petrosi Hispaniæ Gallicæque Narbonensis locis. Senus floret reliquis Aristolochiarum generibus: ac hoc peculiare ejus fructus habet, ut, dum maruit, eâ, qua pediculo adhæret, parte, dehiscat ut in Bactica Clematide: longæ verò, & reliquarum, ab extremâ.

Novum autem & peregrinum Aristolochiæ genus circa Halepum Syriæ inter olivæta observabat C. V. Leonhardus Rauwolfius Augustanus Medicus, cuius nomen Lib. 1. sui Hodæporici cap. ix. ab incolis *Rhafis* & *Ramigi* appellatur.

Id odore quidem prædicitur, sed illo ingrato, habebat quatuor cauliculos albicantes, prope radicem sibi instar graciles, quibus circa superiorem partem utrinque inhærebant septem vel octo folia sibi invicem obiecta, tenella, cinerei

coloris, magnitudine & incisuris floriboræ Filicis folijs valde similia, nisi quod in summa parte & cauliculis proxima, rotundas veluti auriculas adnatas haberent, ut in minori Salviâ: inter inferiora verò folia, quæ paulo majore interstitio ab invicem distant, flores Aristolochiæ, aliquanto tamen majores, colore magis fuscis, & longiore pediculo subnixi: radix satis profundè demissa, nostro Pyrethro plane similis, gustu amara, unde colligere licebat, cam siccare, & nonnihil calefacere.

Natalis.

Hæc porro planta Græcis ἀριστολόχια nuncupatur, quod, ut refert Dioscorides, ἀριστολόχια, ὁλοχία.

λοχία, id est, optima puerperisxi sumetur: Romanis Plinio teste, Malum terræ. Sed id nomen rotundæ potius convenit, quæ Græcis *αριστολοχία* *εργυρία*, à *Θάλαμ*, Aristolochia rotunda & femina vocatur. Secunda *αριστολοχία* *μακρά* à *μακρά*, Aristolochia longa & mas appellatur, item à nonnullis *δακτυλῆτις*, *δακτυλites*. Tertia *κλεματίτις*, Clematidis, quasi Sarmentitia cognominatur: & primum quidem ejus genus, à plerisque, pro legitima Longa usurpatum, Gallis *Sarrasin*, Narbonensibus *Fanterne* dicitur, Germanis *Distelwurz*, alterum autem ejus genus Bœticæ ruficis inepte *καρφα παρὶς*, quasi tubus vincula. Quartam Plinius Pistolochiam vocat, quam nonnullos à numerosis radicis capillamentis *πυλὸν* *πυλόν* cognominare scribit lib. xxv. cap. viii.

CETERVM Aristolochiæ radix teste Galeno lib. vi. de Simp Med facult multo est ad medicationes utilissima, amara & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est rotunda: Longa minus quidem tenuitatis obinet, quàm Rotunda, abstergens ac digerens, sed non minus calfaciēs, imò fortan plus etiam. Itaque in quibus usus est modice absterrens, commoda est longa: at in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic usus est rotundæ. Quæ Clematidis appellatur, fragrantior est, itaque et ad unguenta utuntur unguentarij, sed ad sanationes infirmior.

Paulus Ægineta Aristolochiam Clematidin inter medicamenta simplicia quæ bilem purgant, recenset. Aëtius Tetrabibli primæ sermone tertio, piruitam ac bilem evacuare testis est.

Clematidis autem primæ, sive vulgatioris folia, inter plana saxa confracta & trita, ligneas assulas, spinasque corpori infixas adposita, valenter extrahere, Inflammationes sublequutas curare, experimento didicerat doctissimus vir D. Michaël Lingelius, Medicus & Professor Viennensis.

Plinius, Pistolochiam convulsis, contusis, ex alto præcipitatis, radice potâ ex aquâ, utilissimam esse tradit.

ARTSARVM.

CAP. XLVIII.

DVORVM est generum Arisarum, tamethi Veteres unci historiam posteritati dereliquerint.

Anisarum latifolium I.



VNUM, Hedcæ aut Smilacis ferè folia habet, tria aut quatuor, viridia, mollia, satis tamē carnosa, acris saporis, oblongo pediculo innixa, anteriore parte, qua pediculo adherent, utrimque pinnata, Ari foliorum instar, sed obtrusivis & quasi orbiculans angulis: inter quæ pediculus duas uncias longus, multis tūbris maculis distinctus et emergit, cui oblongus flos insidet, monachalis cuculli sive Aristolochiæ floris modo efformatus, amplior tamen, extremâ parre fulci coloris qui dorsum radiatim tēdit, in ceteris albus, caninum olens, pectillum obtusum, incurvum, & veluti ex cucullo prospiciēs continens, ut pictura demonstrat, quæ ex illâ, quam ipse cū plenisque alijs in Hispaniâ mçâ peregrinatione observatis exprimebam, fideliter delineata est: radix rotunda, globosa, Arominor, fons nigricans, intus alba, aliquando etiam tuberosa & oblonga, initio dulcis, deinde acris, minùs tamen An radice (licet veteres contra sentiāt) fitebis aliquot supra eam expansis, ut in Orchidibus.

Aliud ejus genus etiam Invenitur paulò amplioribus folijs, & rotundioribus aliquantulum atque mollioribus, pluribus tuberculis se propagans, oblongasque & crassas radículas sepius in latum & obliquum spargens.

ALTERVM diversâ prorsus est formâ: nam ejus folia longa sunt, & angusta instar ferè Plantaginis angustifoliæ foliorum, viridia, splendens, quina, aut scna, post quæ flos seu cucullus longior & mucronatus, retrorsum inflexus & albicans prodit, e cujus rima oblongus veluti vermis exiit, ipsam x interdum longitudine, inflexus, coloris aut purpurei canis, aut ex purpureo virentis, non ille quidem obtrusus extrema parte, sed mucronatus: fructus racemi instar confertus, albus (non ruber, ut quidam, qui non observarunt, prodidère) vix terrâ emergens suo tempore subsequitur.

GG

Latifoli.


Anisarum latifolium I.

Anisarum latifolium II.

Anisarum angustifolium.

Arisarum angustifolium.

Matula.



Arisarum, & Aris.

Iris. Fustilios.

Arum Byzantinum.

Facultates.



Arum Byzantinum.

Latifolium in collibus Lusitaniz frequēs salebroso & lapidoso solo, in sepibus & iuxta vias: ubi Novembri & Decembri floribus suis praeditum eruebam, arque etiam nonnullis Betutiz locis solo foecido & pingui, seeddum publicas vias & horrores aggeres, ubi Ianuario & Februatio. Alterum autē illius genus umbrosis locis nascebatur ad Olearum radices pone urbem Vlyssiponem Inde in Belgicam translata, numquam florere voluerunt: imò nisi magnā diligentia & curā, siccilibus, ut plerique alię plantę ex ferventioribus regionibus delatz, adserventur, pereunt.

Angustifolium sponte nascens non vidi; sed ad nos peregrē delatum, in hortis alebamus in Belgicā, tum Viennę Austriae: florebat Vere: Julio & Augusto sine folijs fructum proferebat. Vivax magis hoc est, neque tanta curā indiget. Illud anno M. D. XCIT. accipiebam ab Imperato, Neapoli missum.

Quia cum hujus plantę nomen est *arisarum* si alię Latine, Arisarum: sed & Aris Plinio dicitur, qui eam duplicem facit, albam gemino caule, alteram uno tantum. Lusitanis *laro* dicebatur, quod nomen etiam *Aro* commune est. Amarus Lusitanus *Fraullos*, id est, frutesculos Hispanis appellari asserit, quia, fortē, ejus flos monachalem cucullum emulatur.

ILLUD nomen sistere tradit Dioscorides, & ex radice colligina fieri ad fistulas efficaciam. Amatus addit Germanos inferiores contra pestis contagia uti: quod satis mirari non possum, quandoquidem ejus tempore Arisarum toti Belgicę fuerit incognitum, & anno demum M. D. LXXV. quo illud Antuerpiam ad amicos Vlyssipponē mittebā mense Ianuario, istic innotescere cepit Latifolium. Angustifolium verò post meum ex Hispanijs rediit ex Italiā primum accipiebamus.

ARVM BYZANTINVM.

CAP. XLIX.

CUM ante aliquot annos hujus Ari tuber cum alijs tubenbus bulbisq; Constantinopoli allatis, Viennę acciperem, hærebam, utrum ad Ari, an Arisari genus referrem: deinde cum folia proferre cepit, primis duobus annis pro Arisario latifolio habui, ducere me in eam sententiam foliorum quadam similitudine. Nam ea conspiciebam satis ad Arisari latifolij folia accedentia, nec valde mucronata, sed potius orbicularem figuram referentia: nec radicem valde dissimilem. Verum postquam ea augeri cepit, digitalem longitudinem adquisivit, multis tuberculis inaequalem, & uncialem aut ampliorē crassitudinem, multisq; proles adnatas habuit:


folia item protulit longē majora, ad Ari foliorum formam plurimum accedentia, nec illis minus splendētia superne & inferne: ejus autem florem dumtaxat videre contigit anno

M. D. XCVI.

M. D. xcvi. licet toto octennio ante aluiffem, singulis annis novo vere emergentem, atque interduum etiam ante brumam. In vernis tamen folijs quandam differentiam obferuabam, non quod ad formam & figuram attineret, funt enim illa pro rufus fimilis formæ, fed inæqualis magnitudinis & (quod valde mirabar) in quibufdam plantis, licet ex eadem matre abruptis (unicum fiquidem rubet Conftantinopoli accipiebam) folia erant nigris aliquot exilibus maculis diftincta, alia minimè: tum etiam flos colore variat, nam plantæ maculis nigris notata folia habentes penicillum purpureum folliculo incluſum habuerunt, alie verò candidantem Maio menſe anni M. D. xcvi. arque poſtrema folia ante brumam plerumque germinate ſolent, alterius novo vere duntaxat.

COLOCASIA.

CAP. L.



QVATERNA aut quina habet folia, ^{Colocasia} carnoſa Nymphaeæ foliorum modo, ſed nervoſa admodum, & pluribus venis ſive fibris eminèntioribus exteriore parte contexta, incanaque ampliffima, uſperumque Perlonatæ folia magnitudine ſuperet, numquam madentia, etiam ſi aquis immergantur, longis, craſſis, firmiſque pediculis ſubnixæ: radice craſſa, magnâ, duplici ut plurimû, & lagenulæ inſtar efformata (tales terrè eruebam pleraſque radices ad Monafterium Pera longa, & ex illis hanc iconem ipſe illic exprimebam) quæ alijs ad larera adnatis ſe propagat, & fibris aliquot mitor.

Frequens eſt multis Luſitanæ locis circa ^{Natalis.} r. vos, ex Africâ, ut intelligebam, primum edelara. Videbam etiam omnium maximam, & ampliffimis folijs Hiſpali in areis Regiæ horto: ubique tamè vel florem, aut fructum ferre negabant: percoctabar enim ſenio, quia nullum in omnibus plantis florum rudimentum aut veſtigium conſpiciebam.

LUſITANIS Mauritanos ſequutus ^{Inhæm.} perperam dicebatur, Baricis ^{Alcoleaz.} Alcoleaz, quæ vix proculdubio à Colocaſia deducta eſt, Caſtellanis ^{Mante de nueſtra Señora.} *Mante de nueſtra Señora*, id eſt, ^{Chlamys D. Virginis.} Chlamys D. Virginis (à folijs nimirum amplitudine) quæ tamen appellatio, illi etiam ^{Tuſſilaginis generi.} Tuſſilaginis generi, quod vulgo Peraſires

æſtimatur, communis eſt. Cùm verò hæc planta pleniſque notas cum veterum Colocaſiæ communes habear, nihil aliud mihi perſuadere poſſum, quàm illam ipſam eſſe, quæ ^{Graz.} *Graz* ^{καλαμαρία} dicitur: nec me mouet quod alij Arum ^{Egyptium} *Egyptium* appellare maluerint. Nam per Luſitaniam valde à mancipijs ^{Ethiopibus} *Ethiopibus* experitur, eâque erudâ & coſiâ veſcuntur.

BELLONIVS lib. II. Obſervationum cap. XIX. refert Colocaſiam Alexandriæ, urbibuſque ^{Natalis.} pagis vicinis frequentiffimam in foro venalem inveniri, ^{Egyptiôſque} *Egyptiôſque* ratò cibum ſumere, quin Colocaſia adponatur cum carnibus cocta: propterea magnum ejus veſtigial per univerſam ^{Egyptum} *Egyptum* eſſe. Capite autem xxviii. ejuldem lib. negat eam aut florem aut fructum ferre. Ejus verba hic ſubjiciam, quia Veterum de Fabâ ^{Egyptiâ} *Egyptiâ* ſententiam ſuſpectam habet.

Acra, inquit, plurimis locis, Oryzâ, Papyro, Muſâ arbore erant conſitri, interduum etiam Colocaſiâ. Quia verò hujus Colocaſiæ, quæ etiam Lotus & Fabâ ^{Egyptiâ} *Egyptiâ* appellatur, fructum, magnâ diligentia fruſtra perquiſivimus, illiuſque in quaſitione Cæni incolis ridendos nos præbuiſimus, occaſionem ſumpſimus inquirendi, cur Veteres eam Fabam ^{Egyptiam} *Egyptiam* nominarint, cùm fabas non ferat: tandem hanc erroris originem eſſe deprehendiſimus. Herodotus auctor vetuſtiſſimus, duarum Scirpium in Nilo naſcentium meminit, quarum altera ſit forunda radice (quæ Colocaſia eſt) altera quidpiam olivarum nucleis ſimile, quodam capite ferat. Reliqui poſt eum auctores, alter alterius verba ſequuntur, ad arbitrium deinde deſcripſerunt. Nam quod Theophraſtus ſpinofam illi radicem tribuit, rem aliter ſe habere, ipſa experientia docet. Dioſcorides de Fabâ ^{Egyptia} *Egyptia* agent, Theophraſti verba ſerè expreſſit, & utrumque interpretatus eſt Plinius. Hæc Bellonius. Quo loco etiam addit ſponte naſcentem ad rivulos in Cretâ ſe inveniffe, ^{Egyptios} *Egyptios* verò magnâ curâ & diligentia colere.

VARRVM evulgatâ Hiſpanicarum Scirpium Hiſtoriâ, meam & Bellonij ſententiam con-

Coloca.

firmabat Mag^m & Generosus vir Hieronymus Beck à Leopoldstoss, Libet Baro Austria-
cus, Bellicæ annonæ per Vngariam Præfectus, Cæsan à Consilijs, idemque multis peregrina-
tionibus clatus, qui assererat hanc plantam ab Arabibus *Coloca* appellari in Ægypto,
istucque adeo frequenter esse, ut nullus sit rusticus, qui magnos ejus acetvos non habeat.
Ejus radice coctâ, vesici illos, perinde atque Germanos rapis, quibus tamen minus grata sit.
Nullam verò aliam ejus sationem intellexisse, quàm è nucleis ad latera adnatis: quos vel
avellanæ, vel nucis juglandis magnitudine luto vel argilla involutos, in flumen secundum
ripam demittant. Has postea crescere, & novam messem generare.

SE O & doctissimus Rauwolfius, qui illam toto anno venalem Tripoli Syriæ conspexit,
ut quâ incolæ frequenter vescantur, & tantâ copiâ in Halepo coli asserit, ut ejus radice non
minor numerus hominum alatur, quàm in Germaniâ rapis licet illis, & flavâ passinacâ non
careant: addit in rivulis sponte oascentem observasse, florem autem vel fructum num-
quam vidisse.

POST REMVM omnium, ad confirmandam meam de Colocaliâ sententiam, acce-
dat testimonium C. V. Prospetti Alpini, Medici Itali, qui aliquot annis Medicam artem
in Ægypto exercuit. Is in eo Libro quem de Plantis Ægypti scripsit, cap. x x x i i i. in quo
de Colocaliâ, sic ait.

Coloca.

N V L A planta magis nota Ægyptijs, Colocaliâ, quam illi *Coloca* (pronuntiandum
u, ut ou, Italoꝝ & Germanoꝝ more) vocant, neque magis in usu, quando omnes,
hujus plantæ radices in jure coctas, atque alijs multis modis in cibis paratas assidue esitent,
non secus, quàm nostri rapas. Agri Colocalijs pleni ibi spectantur, atque, quod mirabi-
lius videtur, nemo illorum aliquam ipsarum plantarum floribus vel fructibus usquam præ-
ditam vidit. Ego ex innumeris illis viventibus à me sæpe inspectis, nullam unquam flo-
rentem, aut cum aliquo fructu, vel aliquo caule videre potui. Ex quædubirandum vi-
deretur, eam plantam esse Græcorum Fabam Ægyptiam, Planta hæc ibi spectatur folijs
Nenuphanis, longioribus, Ari proximis. sine caule, flore, aut fructu: ejus radix magna, crassa,
Chnæ radicibus similis crinita, lapore subamaro, & acn cum aliqua viscositate, quæ co-
cta dulcescit: quotidie passim toto anni tempore per urbem innumera radices venduntur,
vilioti pretio. Hinc sane multum semper miratus sum Dioscoridem, Ægyptiæ fabæ flores
atque fructus tribuere, & eam Colocaliam esse prodere: quam tamen nusquam, ut dixi,
floruisse, nullumque fructum dedisse viderim, aut aliquem vidisse unquam audiverim. Sed
hanc litteram alijs dirimendam libentissimè relinquo. Eam tum crudam, tum coctam, avi-
dissimè veneti indulgentes mandunt, quia putant semen multum gignere, & hibernem
prævalide movere. Hæc Alpinus.

Dioscoridis
lapp.

Facultates.

Faba Ægy-
ptia, sive
Colocalia,
non est Ara-
bica.

F A C E S S A N T igitur, qui eam quam exhibeo plantam, Colocaliam sive Fabam
Ægyptiam esse negant, quia flore & fructu caret: sed Arum Ægyptium esse, cerebrosè &
pettinaciter contendunt.

Q V I A porro Dioscorides Lotum Ægyptium quibusdam notis cum Faba Ægyptia si-
ve Colocaliâ convenire ait: audiamus quid idem Alpinus de eo sentiat: nam subsequente
ejusdem libri capite sic scribit.

Lotum Ægy-
ptium.
Nymphaea,
Nuphar.

P R O X I M O de Colocaliâ cognito errore, hic alius de Loto Ægyptio animadvertitur,
quando hæc planta planè eadem sit, quam nostri Nymphæam, Arabes *Nuphar* appellant.
In toto quidem flumine Nilo Ægyptia loca lambente, nulla alia planta est inventa, quæ
notas Loti præ se ferat, quam Nymphæa ipsa, quæ profecto similis est (ut de Loto affir-
mat Dioscorides) Colocaliæ, seu Fabæ Ægyptiæ, floremque fert album (loquor de ma-
jore Nymphæa) Lilio valde similem, quem clarius expressit Theophrastus, qui dixit: &
flos candidus, lilijs foliorum angustia proximus: verè enim hic majoris Nymphææ flos
est, qui Sole occidente clauditur & sub aqua occultatur, oriente verò supra aquam afflu-
git, foras exit, & aperitur. Quod non modo in Ægypto, verum in multis Italiciæ locis in hac
plantâ observatur. Et quid? nonne etiam ex flore caput producit, Papaveris capitibus
valde simile, in quo multa semina minuta, qualia verè mihi existunt, continentur, radixque
crassa est? Non possum non vehementer admirari Theophrastum, Dioscoridem & alios
omnes, qui distinctissimis capitibus Lotum Ægyptium à Nymphæâ sejunxerint, cum utra-
que unum atque idem planè sit, & mirandæ ad Solem conversiones de Loto celebratæ,
eædem sint, quæ in communi Nymphæâ ab omnibus animadvertuntur.

Vetorum er-
roꝝ causa: sive
de Loto
Ægyptio.

Rafesnil.
Loti Ægy-
pti, sive
Nymphææ
facultates.

Ægyptij caules crusos cum suis capitibus, per æstatis calores mandunt: subdulces enim
sunt, atque humidi, valdeque refrigerant & humectant: eos appellant *Rafesnil*.

Vtuntur præterea floribus & folijs confusis ad omnes calidas inflammationes, & succe-
o, præsertim ad de mulcendos dolores à causâ calidâ abortos, lacte atque rosaceo oleo mixto:
eodem itidem modo, oleo quod ex floribus tant, ad calidos dolores, inflammationes, ex-
ustiones, ulcera, & dolores capitis in febricitantibus, vigilijs, tum externis folia confusa
applicant, tum ejus succe cum oleo & aceto frontem & tempora illinunt: ad concilian-
dum autem somnum, syrupum ex eo paratum usurpant, & tum seminum tum radicis pul-
verem ægrotis cum ejus decocto exhibent. Vfus radicis, seminumque secreti loco habetur

apud

Nymphæa alba. Lotus Ægyptia Alpini.

Nymphæa lutea major.



apud multos, ad gonorrhæam, & in mulieribus ad album profluvium firmandum, & ad dyfentetiam. Multi verò ab hujus plantæ usu abſtinent ejus loco alia potiùs uſurpantes, metuentes ne & Venetis deſiderium & vites imminuantur: apud eos enim omnes compertum eſt, feminum & radicis uſum, homines reddere valde frigidos & ad Venetem tardos: eam ob cauſam multis ibi ſanctis heremicis in uſu eſſe audio, ut faciùs calibem vitam ducere queant. Hæc Alpini.

Verùm, ut demus, pleraſque notas quas Dioſcorides & Plinius Loto Ægyptio tribuunt, Nymphææ etiam convenire: radix tamen diſſimilis eſt. Quia autem ea Alpini eſt opinio, nos Nymphææ utriuſque iconem addere hic volumus, illuſ nempe quæ florem album habet, cujuſ radicis quæ aliqui affabè delineata fuerat, neſcio qua inveniã fuerit corrupta, & altèrius cui ſos eſt luteus.

BATATA.

CAP. II.

TRIS hujus plantæ ſunt genera, quæ Baticam peragrans obſervabam, colore æternò inter ſufficientia, etiam guſtus ſuavitate: nam aut cortex externus quodam modo rubefcebat, ſive purpuraſcens erat (& hoc genus præſtantiſſimum judicabatur) aut pallescebat, aut albus erat: ſingula tamen genera albam intericiuſ catenem habebant.

PRODUCUNT autem illa Cucumetis ſilveſtris modo ſarmenta humi diſſuſa, ſatis craſſa, ſucculenta, lævia, quibus inhxrent folia utcumque carnola, ex viridi caneſcentia, Ari ſolis, ſeu potiùs Spinachij haud diſſimilia: ſtorem an fructum ſetat, à nemine intelligere potui, radice autem fit latio: ea plerumque dodrantalis eſt, grandis raphani nonnumquam amplitudine (nam memini Londini me ineunte anno M. D. XXI. recentes admodum, & optimi quidem generis emere, quarum una libræ & amplius pendeſebat) inæqualis, cui ratæ & breves adnatæ ſunt veluti fibræ: binæ autem, ternæ, vel plures ex eodem tamquam capite dependent aliquando radiceſ, ſiſetis radicum inſtar, vel etiam ſingulares, imò parte obuſiores, deinde ſurſum progrediendo graciliores.

Sponte naſcitur in novo orbe, viciniſque iſulis, unde primùm in Hiſpaniam delatam ferunt: nunc in multis Baticæ maritimis locis ſecit, vel integra, vel in talloſas ſectæ: principatim autem obtinet Malacæ nata, quæ & Gades, & Hupalim, imò Vlyſſipponem etiam uſque deſerri ſolet. Habuimus etiam aliquoties in Belgio facis recentes, ſed quæ germinare noluerint, imò brevi corruptæ ſunt, frigidiore nimirum regione. Sed & quæ

GG

Londini



Camotes.
Amotes.
Ajes.



Vna.

Londini emebam, diuturniore morâ (nam Viennam deferre volebam) ante quam telluri committere possem, corruptæ sunt.

AN Veteribus fuerit cognita hæc planta, hæreo, propterea nullum nomen græcum aut latinum addo: Hispani *Baratas*, nonnulli autem *Camotes*, aut *Amotes*, quidam etiam *Ajes*, tamen nonnihil, ut aiunt, inter se differant, sitque *Baratas* radix longè tenerior & suavior.

Estur verò ab ipsis incolis, aut cruda, aut cocta: nunc Hispanis etiam in delicijs ob saporis gratiam & teneritatem, præsertim si sub cineribus cocta, &

exteriore tenello cortice repurgata, deinde in orbes concisa, ex pauxillo vino, stillatitijque rosarum liquoris & facchari momento edatur. Sunt qui ex oleo, aceto, & sale escent: nec defunt qui radices recentes coctas & repurgatas faccharo condiant, & in usum seruent. Sed & radix non cocta, dum corrumpi incipit, si cultro secetur, non secus rosam olet, quam ipsa *Rhodia* radix.

QVI plura de hac radice volet, consulat C. V. Iulij Scaligeri Exercitationem clxxx cap. xvi lib. xv. de Subtilitate ad Cardanum: in primis verò cap. 1111. lib. vii. Primæ partis Historiæ generalis & naturalis Ferdinandi Oviedii.

LECTORI porro non ingratum facturum existimavi, si *Baratas* historiæ, alterius cujusdam crasse radici descriptionem subijcerem, quandoquidem Indiæ Occidentalis & insularum quarundam incolis familiari in usu est.

Ignamé frus
Inhame b.
ferra.

VARIÆ autem interdum est formæ radix illa, & *Ignamé*, sive *Inhame* appellatione ex D. Thomæ insulâ, sub æquatore sitâ, non proculâ provincie *Atamengo* continente. delata anno m. d. xvi. Nam munere honestissimi viri Willelmi Parduyn civis Middelburgensis in Walachria Zelandiæ insulâ, deinde doctissimi viri Thobiz Roëlsij ejusdem urbis Medici, radices habui, quarum nonnullæ pedalem aut ampliorem longitudinē æquabant, brachialem autem crassitudinem, vel etiam quarum diameter esset quatuor unciarum: pleræque dodrantalem longitudinem vix attingerent, nec earum diameter binas uncias excederet, aliquot etiam breviores sed crassas, & in aliquot quasi breves napos infimâ parte protuberantes.

berantes, testas omnes scabro & inæquali cortice, ut Aristolochiæ longæ legitimæ radices, & muleis exiguis fibris sparsim nascentibus præditas: ipsa radicis substantia alba, lenta, & succulenta est, atque veluti grumosa, tenera tamen, nec ingrati saporis (crudam enim gustabam) exiguo autem post momento nonnihil asperi & acrisculi: alia verò (nam & gustare volui, ut certius observare possem) tenerior est castaneâ, & pyri instar, cui grumosa substantia, edulis. Qualem caulem, aut folia habeat, non intelligebam, unam tamen radicem cum germine accipiebam, sed vecturâ abrupto, quale in eadem tabellâ cum radice, quàm commodè potui, exprimebam.

D. Thome infulanos eâ asâ & elixâ vefci intelligebam, ejûsq; rei gratiâ Lusitani quidam, qui multos istuc cum viros, tum feminas & pueros emerant, ut Vlysiopone pro mancipijs venderent, istas radices in naves intrulerant in miserorum alimentum, præterea nuces quaspiam, quibus cum radicis cujusdam farinâ vescerentur. Omnes autem illæ naves eodem anno in Walachiam delatæ.

Sed & aliam ab eodem Wilhelmo cum superiore accipiebam, nec formâ, nec colore, nec magnitudine superiori dissimilem, quam *Igenam* etiam vocabat Lusitanus, qui illam ipsi dabat, licet aliud genus esse non inficiaretur: sed totius radicis cortex magis inæqualis erat, & veluti quibusdam tuberculis oblitus: è quibus tenues fibræ emergebant, præterea radix summo capite, paulo crassioribus, durisque & pedalis sive palmaris lógitudinis fibris, seu verius viticulis, magnâ ex parte spinosis erat prædita. Nonnulli *Tcam Peru*.


Natalis

Igenam
non aliâ.

ARACHIDNA THEOPH. fortè, Papas Peruianorum.

CAP. LII.

Arachid. Theoph. fortè, Papas, radix.



ESCVLENTA etiam est radix hujus novæ, & ante paucos annos Europæ primum cognitz plantæ: vereri tamen, meo judicio, non ignotæ, ut postea ex ijs quæ in medium proferemus, apparebit.

PRIMUM autem ex bulbo (qui Aprilis plerumque ferendus apud nos, non maturius) paucis diebus à satione, folia promit ex atro purpurascencia, villosa, quæ deinde explicata, viridem contrahunt colorem, quina, septena aut plura in eadem ala nascentia, à Raphani folijs non valde aliena, impari semper numero, interjectis alijs minoribus folijs, & impare extremam alam semper occupante: caulis pollicari crassitudine, angulosus est, lanugine obductus, quinque aut sex interdum cubitos longus, *πυλωλας*, & in multos ramos divisus, longos, infirmos, & nisi radica aut alijs adimiculis sustineantur, pondere suo in terram procumbentes, & larè se spargentes: ex ramorum alis prodeunt pedales, crassi, angulosi pediculi, denos, duodenos, aut plures flores sustinentes, elegantes, uncialis amplitudinis aut majores,

Papas la-
stera.

maiores, angulosos, singulari folio constantes, sed ita complicato, ut quinque folia discreta videantur, coloris exterioris ex purpurâ candicantis, interioris purpurei, radius quinque herbaceis ex umbilico stellæ instar prodeuntibus, & totidem flammis flavis in umbone coeuntibus, stilo prominente subviridi: floribus, qui Tilæ florum odorem referunt, succedunt orbiculari mala, Mandragoræ fructui non dissimila, sed minora, initio vitidia, maturitate alba, humida pulpa plena, quæ multa plana grana continet, sicum grani haud majora: radices habet, vel unâ singularem, vel binas aut tres crassiores rectas, in profundum ut plurimum de se edentes, & aliquantulû ramosas, deinde à summo radicû illarum capite nascentes alias tenuiores albas in latera se spargentes, & satis procul à matre aliquando terrâ emergentes, foliaq; siue novellas plâras producetes, è quibus propèdunt crassiusculæ & longæ fibræ, quibus (dum mensè Novembri post primas pruinas eruitur ipsâ Planta) inhaerereprehenduntur variz magnitudinis tubera, inæqualia, vestigijs quibusdam notata, unde germina sequente anno sint emerfura: tuborum autem, quorum plura quinquaginta ex unâ stirpe colligere memini (ad eâ fecunda est) alia majora, ut interdum unciam aut etiam binas pendant, rubefcente vel ad purpureum colorem vergente sunt exterius cute, alia minora ut quæ nondum matura, magnâ ex parte albicantem habent cutem, quæ tenuis valde est in omnibus tuberibus, caro autem ipsa fita & candida. Omnia autem ista tubera vel cum fibris quibus inhaerent, vel illis detracta, in fictili aut alio vase terâ siccâ pleno reponuntur, & sub tequm inferuntur, in spem futuræ insequente anno satiationis, tametsi & nuda sicco loco, calido tamen, conservari possint: radices autem hieme corruptuntur si in horto hæreant, nisi foris paulo calidioribus regionibus, & altè de fossâ, terrâ exemptæ, arcescunt & inutilis redduntur. Ex folijs igitur tuberibus expectanda est generis conservatio, & ex semine, quo natæ plantæ etiam eodem anno flores tulerunt, sed colore à matre diversos, ut ab alijs intellexi, numquam peniculum feci. Certè mihi amicus N. Vir Ioannes Hogelâdius ad me scribebat natas ipsi stirpes semine à me misso, quæ albos omnino flores dederunt, quas eum eodem tempore erueret quo è tuberibus natas, nulla tubera generasse agnovit, stirpibus foris nōdum satis maturis. Illud observabam, tuber ex quo planta nata, cum eruitur, inane prorsus interdum reperiri, aliquando integrum adhuc & firmum.

Tempus.

Floret Iulio, & subinde in Autum num usque, vel etiam ad primas usque pruinas (à quibus facile offenditur) flores & fructum ferre non desinit.

Vide primi hæc plantam natam.

PRIMAM hujus stirpis cognitionem acceptam fero N. V. Philippo de Sivry Dn. de Walhain & Præfecto urbi Montium in Hannoniâ Belgicæ, qui ejus bina tubera cum fructu, Viennæ Austriæ ad me mittebat sub initium anni M. D. XXXVIII. sequente autem anno rami ejus cum flore peditam. Is à familiaribus quodam Legati Pontificis in Belgio se accepisse sciebat anno præcedente, *Taratensis* nomine. Mittebat deinde ad me Jacobus Garatus junior, integræ stirpis iconem Francofurtum: verum neutram hic exhibere volui, sed aliam quam duabus tabellis ex vivâ planta exprimi curavi, alterâ flores atque fructum representante, alterâ radices & tubera suis fibris inhaerentia.

Tarantensis.

Vnde primum nati sunt Itali, ignorant: certum autè est, vel ex Hispanijs, vel ex Americâ habuisse. Mirari autè solet, cum tam vulgaris & frequens esset in quibuldâ, ut aiunt, locis Italiæ, ut ejus tuberibus cû vervecinâ carne coctis, non secus ac rapis, & pastinacæ radicibus vescerentur, imò etiam subis in pabulû cederent, hujus stirpis noticiâ tam serò ad nos pervenisse: illud autem magis mirum, Patavinæ Scholæ fuisse ignotam, ante quàm amicis, qui Patavij Medicæ arti operam dabant, Francofurto ejus tubera mitterem. Nunc verò plerisque Germaniæ hortis satis vulgaris est facta, quandoquidem ad eâ fecunda est.

CETERVM non dubium est, quin sit ea Planta, quam Petrus Cieçacap. x. l. Primæ partis Chronici sui describit Hispanico sermone: ego Latino sic reddebam.

Papav. Perri Corja.

Lociis Quito vicinis, præter Mayzum, habent incolæ duo alia, quibus magnâ ex parte vitam sustentant, *Papav* videlicet, radices tuberibus fetè similes, nullo putamine, aut officulo testas, quæ coctæ, teneram instar castanearum elixarû habent pulpam: Sole siccatæ *Chumo* vocantur, & in usum servantur. Producit hic fructus stirpè Papaveri [condonanda est hæc comparatio militi] similem. Alterû est *Quinua*, planta humanam altitudinè æquans, folijs Bili Mauritanici, semine pusillo, albo, vel rubro, ex quo portionem parât, aut elixo vescuntur ut nos onza: meminit & alijs locis. *Papav* etiam mentionem faciunt Augustinus Garate, atque Gomara in sua Generali Historia Indiarum. Quibus non valde ablimis videntur eæ radices, quas Virginienfès *Openawé* nominant.

Chumo.

Quinta.

Openawé.

CONSIDERANOVVM potè ad hæc Planta Veteribus fuerit cognita. Theophrast. lib. i. Hist. Plant. cap. xi. Arachidnæ meminit, quæ cû hac perbellè cõvenire mihi videtur, præsertim radicis historia. Nam *αραχιδνών* à *παρὰ τὸν ἀπὸ τοῦ* fructum ferre asserit nō minorem eo qui in supernis plantæ partibus nascitur: & radicem quidem unam carnosâ & crassâ, quæ in alrum demittitur, ceteras [in quibus fructus] tenciores, summo cespice, & quæqua verum diffusas. Neutrum tamen folia habere dicit, aut folijs quidquam simile, sed quasi utrumque fructum edere, quod mirum, inquit, videtur. Sed mihi facile persuaserim, utnufque plantæ historiam, Theophrasto sua commentanti, parum integrâ fide recitatam: primo etiam ejusdem libri capite, illam reponit inter stirpes quæ sub terra fructum ferunt. Diligenter expendant Petitiore, & forsitan ad meam sententiam accedent.

αραχιδνών
ἐκ τῆς
ἐπὶ τῆς
ἀπὸ τοῦ

Quinua, sive Blitum majus Peruanum.



Canna Indica.

His castanearum aut pastinacæ in modum paratis, vesciebatur, ut intelligo, Legatus, ad firmandas vires, quia erat valde imbecillâ valitudine: non minus autem alere puto quàm castaneas & pastinacas. flatulentas tamen esse, propterea, ad proritandam Venerem, nonnullis uti Ego elixas, deinde, epidermide verius quàm cute purgatus, facillimè enim cedit, & inter binas lances, naporum aut raporum pinguiore vervecis iusculo maceratas degustabâ & finè non minus sapidas & palato gratas deprehendebam, ipsis nâpis. Crudas verò, nimis asperas & flatulentas esse existimo.

QUINUA, sive BLITUM MAJUS
Peruanum. CAP. LIIII.

QVIO porro sit *Quinua*, cuius Petrus Ciesca, ut diximus, meminuit, tamquam tertij alimentij, quo se sustentant Quito incolæ, operæ precium esse duxi, hic explicare; licet jam multo tempore universæ Europæ fuerit vulgaris, sed hoc nomine ignota.

Nihil igitur aliud est *Quinua*, quàm majus illud Bliti genus, humanâ altitudinem interdum superâs, caule crasso, firmo, in multos ramos inæqualiter nascêtes diviso, vulgaris Bliti folijs, sed amplioribus & longioribus, summo caulis fastigio multas ferens spicas, sive paniculas, palmum & amplius longas, nutantes, extremâ nõnumquam parte lausculas & quodammodo cristatas, instar comæ Amarantij cristati, coloris coccinei obsoletioris & degeneris, quæ maturæ, multa granula alba rotunda continere conspiciuntur. Quod grana rubra fert, numquam vidi, sed alba grana ferentis iconem Lectorum oculis subiijcimus.

Quinua.
Sivum majus Peruanum.

CANNA INDICA. CAP. LIIII.

HIC plantæ unus primùm, deinde plures stolones ex eadem radice prodeunt, cubiti unius, interdum duorum altitudinis, digiti verò crassitudine, harundinis modo nodati: quem circa singula genicula ambiunt ampla folia, nervosa, & firma quidem illa, foliorum Musæ instar, sed tenuia, herbaceâ viriditate pallescenna, extremo mucronata, quæ, dum primùm erumpunt, chartaceorû cuculorum in morem circumvoluta conspiciuntur, gustata autem herbaceum quendam saporem initio habent, cui paulò post nonnihil acrimoniæ conjunctû deprehenditur: extremo caulis, insidèr aliquot flores, Gladioli floribus formâ non valde dissimiles, sed elegantissimi minij florido colore nitentes, & capitulo inhærentes cuiusdam hirtio, quod cum suo flore nõdum aperto Suavillæ fluvialis sive marinx coctæ chelam quodammodo refert: deciduis aut marcidis floribus, augentur ista capitula, fiuntque triangula & moliter echinata, capitulorum Rieini ferè instar, in quibus continetur semen rotundum, Fabæ veterum, sive fructus Lotic arboris magnitudine, plenâ maturitate nigerrimum: radix nodosa, & crassioribus fibris itipata, alios

Canna Indica.



radicis nodos adnascentes habet, qui stolones etiam matri similes proferunt.

Lufitaniz

Lusitanæ quibusdam monasterijs valde frequentem videbam, sub fillicidijs ad murus statim, etiam ipsa brumâ flotentem: nunc passim à rei herbaræ studiosis alieu in siccilibus, ornatus gratiâ, raro tamen apud Belgas ad frugem pervenit, quod serò admodum germinet, nec hiemem sic tre istic poris sit, ut in sequentem annum servetur. Viennæ autem Austriæ multis annis in siccili albamus, singulis annis flores proferentem, & probum semen interdum dantem, licet non adeò nigrum, ut quod in calidioribus regionibus crescit, sed fusci dumtaxat coloris, mirificè etiam sese radice propagantem, adeò, ut alternis annis siccili eximere, & nodos divellere cogere mur, eâ ratione, plures plantas ex unâ adquirentes: verum hieme in hypocauftum seu vaporarium recipienda erat, & proximo fenestre vitreæ loco, ut aëre externo per simulas ingrediente nonnihil refici posset, frigidioris aperti aëris, atque etiam cameræ cellæ impatiens: semel autem, aut bis ad summum, singulis hebdomadibus, adfusa leniter aquâ, riganda. Illud etiam in hac plantâ observabam, e vetustis stolonibus, cum marcescentes in vaporario præcinduntur, lacrymam exstillare albam, tragacanthæ æmulam, subdulcem & lentam: atque in ipsis folijs istic etiam fenescantibus, tenue quoddam excrementum niri sapore.

Quo nomine Vetenbus dicta sit hæc planta, me ignorare fateor ingenuè. Nonnulli hæc ætate, quia illius flos nondum apertus, cancri vulgo dicti echlas, formâ & colore, ut diximus, referat, florem Cancrî nuncuparunt: alij Canium Indicam, quia ex Americâ primum delata sit, & ejus stolones cannatum sive harundinum modò nodosi sunt, appellare maluerunt: Hispani & Lusitani *Cuentas* dicunt, à numero, quod ex hujus grani spherulæ ad numerandas preces idoneæ, fieri solcant, non secus ac ex tenellis malis arantijs.

Flos Cancrî.

Cuentas.

LIMONIO CONGENER.

CAP. LV.

Limonium pergrinum.



PEREGRINA prorsus, & elegans est hæc planta, cujus iconem & telicacû folium, Lutetiâ usq; ad me mittebat humanus vir & diligensissimus Pharmacopæus, Claudius Gonnier, qui siccam eâ, & contrafacto caule mutilâ, Vlyssipone, veluti ad me scribebat, acceperat.

SUNT verò huic plantæ (Claudio teste) folia novem, decem, aut plura, à summo radice capite prodeuntia, quorû forma, ab omnium quas unquam viderim stirpium folijs diversâ est, quia cava sunt, florû Aristolochiæ instar, tumente alvo & veluti palæari prædito, gibbo dorso, infima parte angulò, sensimq; in laxitatè crescente, supremâ parte laxiore & aperta, quasiq; in hemicyclum formatâ: totû folium durum est, & tâquam cutaceum, suprema folij pars aperta, internè multis crassis venis ex atro purpureis distinctâ: inter folia prodibat caulis contrafacti, ut pictura referebat, pars inferna radix nõ valde magna, & in quoddam ramos divisâ: quales flores, quòdvc semen proferat, non fuit adscriptû, natales non indicati, neque quo tempore flores det, notatum.

Ad quam porrò stirpium classem hanc referre debeam, hæc eo: foliorum tamen cras-

situdo, vel (si ita loqui licet) carnositas, & aliæ quædam notæ, me scèrè compellunt, ut ad Limonij Matthioli genus aliquid referendam censcam: poteritque (mea opinione) Limonium pergrinum tantisper nuncupari, donec aliud magis proprium, ex totius plantæ diligentiore observatione, inveniat.

Ne autem in nostris Scirpium Observationibus locum non haberet, ad illarum Quatti Libri ealcem, ejus historiam tejecimus.

Limonium pumilum, & ejus Natalis.

CETERVM, quandoquidem in Limonij Matthioli mentionem incidimus, quod ubique in maris litoribus, præsertim autem Mediterraneis, frequens est, circa Valentiam Hispaniæ pumilum aliud genus observabam multis exiguis foliolis, Bellidis minoris pæne foliorum instar, e summâ radice prodeuntibus præditum, inter quæ cauliculi prodibant frequentibus, elegantibusq; flosculis onusti: ejus radix beræ radicî per similes erat, minor tamen & subrubra. An illi simile alterum pumili Limonij genus, quod Doctissimus Lobelius apud Colcestriam se observasse anno M. D. xcvi. ad me scribebat?

CAROLI CLVSI
RARIORVM PLANTARVM
HISTORIÆ
LIBER QVINTVS.



CABIOSARVM, aliarumque non inelegantium florum
Historia absolutâ, Quintum librum adgrediemur, quem à
Narcoticis auspicabimur: illis subiiciemus deleteria faculta-
te pradias, aliasque quarum folia incisuris earum formam
imitantur: deinde acriguâ donatas, molles præterea quasdam & acu-
lentas: postremò aliarum stirpium congeriem.

HYOSCYAMVS.

Hyoscyamus niger vulgaris.



CAP. I.

Hyoscyamus Aegyptius.



NIGER Hyoscyamus, vulgaris est notitiæ, ejus historia ab omnibus qui de herba-
riâ scripserunt est tradita: quia verò de ejus stirpis alijs quibusdam generibus hoc capi-
te sumus acturi, non præter rem me facturum existimaui, si Nigri iconem præponerem, &
Albi etiam adderem, ut differentiz eò facilius dignosci queant.

PRIMVS autem eorum generum quæ describere volumus, peregrinus est, & cubitalis
altitudinis, minimique digiti crassitudinis caulem adquirit in hortis, firmum, molli inca-
næque lanugine præditum, per quem hinc inde sparsa sunt folia, vulgaris folijs nõ valde ab-
similia, sed minora, & frequentibus lacinijs divisa, tenuique (dum adhuc tenella sunt) &
longa

1.
Hyoscyamus
niger vulg.

2.
Hyoscyamus
Aegyptius
rubellus fl.

longâ lanugine pubescentia: summus caulis in aliquot ramos nutantes & inflexos dividitur, qui alternatim inter angustiora, minoraque, nec laciniata folia, caliculos ferunt vulgari similes, in quinque cuspides satis firmas delincentes, in quibus flores colore quodammodo similes vulgari, hoc est pallentes, & purpureis venis distincti intrinascuntur, sed deinde in paulo maiorem amplitudinem excrecentes, in elegantem ex rubro purpurascentem colorem mutantur, saturationibus tamē venis, nec umbilico purpureo, ut vulgari nigri flores, sed candicante, stilôq; purpurascente, & quinque staminibus exornato: floribus succedunt bullata, quemadmodum in vulgari, capitula, fœntem etiam simile continenna.

Nobis is primū natus est anno M. o. xxc. semine quod doctiss. vir Bernardus Paludanus Frius, nunc πολυαρδς (Enchusianus) ex Syriacâ, Ægyptiâque peregrinatione redux, Patavio ad me miserat *Scote* nomine.

Katala.

Is fortē est, cu. us Bellonius cap. lxxv. & lxxxviii. lib. ii. Observationum meminit, & in Ægypto frequentem esse asserit: quem etiam apud Halepū observasse scribit C. V. Rauwolfius lib. i. cap. ix. sui Hodeporici.

Hyoscyamus albus, vulgans.

Hyoscyamus albus, Creticus.



III.
Hyoscyam.
alb. vulg.

TERTIUS ordine erit is, qui *Hyoscyamus albus* appellatur. frequens & spontaneus in calidioribus regionibus: at in frigidioribus, non nisi in eorum hortis qui re herbariâ delectantur conspicuus, candidioribus mollioribusq; nigro folijs, nec ita laciniatis, sed potius quodammodo sinuosis, brevioribus, satis crassis, longiore pediculo fultis: flores illi albi, minores, calices læviores.

IIII.
Hyoscyam.
alb. Cretic.

QUARTUS etiam peregrinus, nec mihi adhuc conspectus: sed iconem ad me mittebat honestus vir Iacobus Plateau, quam imitatus etat ex plantâ, ipsi, semine Cretâ accepro, narrâ. Scribebat autem totam plantam esse molliorem & teneriorem *Hyoscyamo* albo jam memorato; folia longo pediculo nitentia, molli lanugine prædita, latiuscula, magis sinuosa quàm Albi folia, & virginea minora tamen, & tenetiora, in ambitu quodammodo denticulata habere: ramos candidiore lanugine pubescentes: flores prius autors, interne circa umbilicū violacei coloris: radicem satis crassam, napi ferè instar. Perennis ne esset, an non, nihil significabat.

V.
Hyoscyam.
Cretic. alter.

IOANNI ab Hangelande, semine Cretâ allato, quod illi mittebam, natum est anno M. d. xciii. Quinque quoddam *Hyoscyami* genus non minus peregrinum, cubitalis aut maioris altitudinis, mollior ramis præditum molli lanugine oblitis, terribus. per quem, alternatim sparsa fuerunt folia molli, lanugine obsita. longiore pediculo fulta, in ambitu, nunc maioribus, modò minoribus laciniis secta, vincta, acnisculi (si mandantur) saponis ex quorum aliis

rum alis longiusculi nascuntur petioli, lanugine obducti, sustinentes longos calices, in quinque lacinias supernâ parte divisos, in quibus flos cavus, quinque fariam scissus, ut quinque foliis constare videtur, quorum terna superiora, majora & flavi coloris sunt, inferna duo pallescent, umbilicus nigrâ purpurâ nitens sensim evanescit, ex quo quina stamina emergunt putrascentia, quorum apices flavescent, deinde stilus oblongior ejusdem coloris, inuolucris, deinde nutans: flori deciduo succedunt bullata capicula, semine exili, instar vulgaris plena.

Ani madvertebat porro in hac plantâ Hogelandus, omnes ramos protulisse flores Soli aduersos, verum, quum marci essent, illi avertos, in eâ caulis parte quæ Septentrionem aspiceret.

DE Hyoscyami Peruani utriusque genere, in nostris ad caput de Tabaco scholijs, lib. Nicolai Monardi de Medicament. simplicibus ex Occidentali Indiâ delatis, satis abunde loquuti sumus.

CETERVM *ὄσφυαρος* Græci, Apollinarem & sabam suillam Latini, Iusquiamum Officinæ, *Iusquiamo* Itali, *Peleño* Hispani, *Hancbane* Galli, Pistones verò & Andegavenes, vernaculo sermone, *l'Herbe aux tignes*, quasi dicas herbam aduersus pruriginem: solent enim illarum Provinciarum rustici istam plantam jam maturam, & semine onustam, in camino suspendere, deinde hunc cum illis manus frigore tument, cinros ejus carbonibus inspergere, fumumque exhalantem manibus excipere: isto enim vapore non modò tollitur manus tumor, sed etiam prurigo illa molesta, frigore contracta: ut me docuit CLV. Iosephus Scaliger, magni illius lully Scaligeri F. *Bilfen* trami Germani, *Bilfen* tripi Brabantii appellant hanc plantam, Vngari *Belen*: quæ vox Hispanicæ valde affinis.

HYOSCYAMVS omnis refrigerat, soporifer est, & dolores sedat: aduersus acres calidâque defluxiones oculorum aliarumque partium prodest: sanguinis eruptiones & muliebria profluvia coarctat, & ad testium aliarumque partium inflammationes adhibetur.

SOLANVM SOMNIFERVM.

CAP. II.



HIC Solano plures ex eadem radice prodeunt caules, cubitales aut ampliores, satis crassi, rotundi, in aliquot ramos candicantes & lanuginosos divisi: quibus iohærent numerosa folia, bina semper ex aduerso sita, mali cotonei folijs similia, densa, mollia, lanuginosa, & gustu aliquantulum calida: flores terni aut quaterni inter folia, pallidi, longiusculi, quadrifariam divisi, caules & ramos ambiunt, quibus succedunt acini, in molli lanugine pubescentibus folliculis, maturitate vel rubri coloris, vel ex rubro crocei: radix subest longa, crassa, dura, fusci coloris cortice donata.

Nascentem videbam hanc plantam in inferiore arce uisibis Malacæ, vulgo *Malaga* dictæ, ad mare Mediterraneum in Hispaniâ sitæ, loco petroso, & inter rudera: florentem & semine maturo præditam Februario. Istic vivacem, & plures annos perdurare certum est: nam superiorum annorum caules adhuc retinentem conspiciebam: apud Belgas, atque etiam in Germaniâ singulis annis serenda est: neque enim ad frugem pervenire, neque hiemem ferre posse didici, aliquoties facto ejus rei periculo.

Dioscor. *εργον οπιακον & δλιανθος* *Namias*, appellat: Theophrastus *εργον οπιακον*: Latini Solanum somniferum. Plinius etiam Hallacabum vocat & Morion. Malacenses *Orvale* dicebant.

RADICIS cortex, teste Dioscoride, in vino, drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, Papaveris succo mitiorem, & ejus fructus vehementer urinam cit. Verum, ut rectè Plinius, auxilia ejus non sunt tanti, ut ijs commemorandis diutius in hærendum sit, præsertim tantâ copâ innoxiorum.

SOLANI porro genus illud quod lethale vocant, & Theophrasti Mandragoras esse, à quibusdam non ineptè fortè censetur, apud vulgus Italorum *Bella donna* nomen obrinuit.

HH

apud

Solan leth.
Mandragora
theoph.

Solanum lethale. *Bella donna.*

Christophoriana.



Nomina.
Natalis.

Solan. leth.
duo gener.

Christopho-
ritana
Atlas Plinij.

Aconitum
hirsutum.

apud Germanos *Dellmoury* & *Dellmour* apud Belgas *Ennet nascope* & *Delle lesine*: multis Pan-
nonix & Austrix silvosis montibus sponte provenit: nusquam verò frequentius unquam
videre memini, quàm in silva illa Zollonok III. Dn. de Batthyán urbi vicina, tumulo quo-
dam, qui ab urbe circiter germanicum miliare abest.

Id autem duorum generum esse deprehenditur. Vnum amplioribus folijs, brevioris pe-
diculo pendulis, flore majore. Alterum minoribus folijs & magis arsis, longiore pedi-
culo fultis, minore flore. De Altero Solano manico, consule Fabium Columnam, & mea
in caput de Datura Christi à Costa, seholia.

FREQVENS est & plerisque earundem Provinciarum silvis quæ vulgo Christopho-
ritanæ nomen obtinuit, & à quibusdam *Astra* Plinij esse censetur, cujus meminit cap. vii.
lib. xxvii. & gravi foliorum odore, caulibus asperis, geniculatis, semine nigro, ut *Hederæ*,
baccis molibus nasci asserit in opacis & aspersis, aquisque Dari acetabulo pleno interio-
ribus feminarum morbis. Nonnulli aconitum bacciferum nominant, quia non minus
exitialis ac noxia fertur, quàm Aconitum.

MANDRAGORAS.

CAP. III.

Mandrago-
ra femina.

Natalis.

MANDRAGORÆ Feminæ folia angustiora, minoræ, & nigriora sunt quàm Maris,
magis etiam rugosa, crispæque, virola & graveolentia, & humi expansa: inter quæ
longi pediculi exiliunt per terram strati, quibus insident flores, Meloeporum floribus for-
ma fere similes, coloris ex cæruleo purpureiscentis: quibus succedunt fructus, non turbi-
nati instar pyri, sed rotundi, Vesicariæ fructu triplo majores, initio virides, maturitate
palescentem ex luteo colorem adquirentes, odorati, succi pleni, semine abundantes pla-
no, ut maris fructus, sed minore nigrioreque: radix pedalem aut amphorem longitudinem
æquat, interdum bifida, intus alba, foris vero fusca, cui aliquot fibræ adnascuntur.

Supra Gades, itinere Hispaniæ, non procul ab urbe Xerez de la frontera dicta, ad arvo-
rum margines quæ secundu m flumina sita sunt, & quibusdam alijs Bæticæ Incis uliginosis
florētē observabam initio Februarij anno sexagesimo quinto supra millesimum & quin-
gentesimum: & paulo post, eodem videlicet mense, fructum maturum colligebam inter
Calpen & Malacam, nimirum toto illo maritimo tractu supra fretum Herculeum ad Me-
ridiem converso, & valde aprico, propter montes, uno aut altero miliari à mari distantes,
qui in mediterraneis, usque ad fretum continuè sene producantur. In Belgio nunquam vi-
dere

Mandragora femina.



Apocynum Syriacum.



dere memini, nec de semine quidem, quod ex Hispanijs deferebam, germinare unquam voluit: ut nec in Austria, quod aliquoties ex Italia postea accipiebam.

Mandragora Græcis dicitur, & *Spadonice* à foliorum Lactucæ similitudine: Latinis *Mandragoras niger* & femina.

HABET *Mandragoras*, ut scripsit Galenus libro vii. Simpl. medic. vincentem facultatem refrigeratorem, adeo ut tertij sit ordinis refrigerantium: in pomis nonnihil caloris & humiditatis inesse ait, proinde soporem conciliandi vim habere: & radicis corticem, cum sit valentissimus, non tantum refrigerare, sed & desiccare.

APOCYNVM SYRIACVM

fortè. CAP. IIII.

PRIMO Libro non incommode repouit poruisset hæc Scirps, capite de Apocyno, si strutex esset longis viriculis prædixus, quas Dioscorides & Plinius Apocyno tribuunt, licet hederaceo non sit folio. Cum autem multas notas habeat Apocyno non dispares, non ineptè, meo judicio Apocynum nuncupare poterimus siue Syriacum, siue Palæstinum, & forte etiam Ægyptiacum: quandoquidem in Ægypto, ut postea dicemus, crescit.

ASSVAGIT autem, referente Doctissimo viro Christophoro Weixio Medico (qui illam circa Hierico nascentem ad flumen Iordanem observabat & legebat) ad duorum cubitorum, vel etiam ampliore altitudinem, satis crasso stolone, in aliquot ramos diviso, qui multo succo ex candido pallescente abundant. Quantum verò ex resiccatæ plantæ parte (quam ipse Weixius ex Ægyptiaca, Syriaca, & Constantinopolitana peregrinatione redux, mihi Viennæ Austriæ communicabat cum uno fructu, & alijs exoticis) colligere potui, striato est caule, cui alternatim bina semper, contrarijs inter se pediculis innascuntur folia satis magna, crassa, & quodammodo cutacea, ex viridi pallescencia, aliquot nervis, ex mediocris satis crassa se spargentibus, prædicta, obtulo mucosone, gravis odoris, re-

Mandragora niger.
Temporaria.

Apocynum Syriacum fortè.

ris, tenella folia extremis ramis adnascencia prorsus incana sunt: ex foliorum alis alternarum emergunt crassi & longi ramuli bifidi, sustinentes aliquot flores longiusculis petiolis ionitentes, unico quidem folio constantes, sed quinque profundi incisuris cincti, instar florum Apocyni, Asclepiadis, & multorum aliorum, coloris, quantum conjicere licebat, toris palliscentis, interné obicuré & obliolé purpurascens, quibus succedunt singulares, binæ, aut ternæ crassæ, incurvæ, binas unicas longæ siliquæ quibus biscentibus, sub summa siliquæ cute, inclusa apparent membranaceo involuero, frequentia & quali imbricatim disposita grana plana, qualia fere Asclepiadis, & Apocyni vulgaris semina, quorum extremæ & angustiori parti inhaeret candidissima & mollissima quædam villosa materia.

Beidlar. Sine perennis an non, nihil æstimare possum. Qualem autem à Weixio accipiebam plantam, ut commodius describere possem, paululum in aquâ macerabam, deinde crassâ minervâ delineabam, observatâ in fructu addito eâ proportionem, ut dimidio minorem exprimerem, quam illi qui à Weixio mihi donatus. *Beidlar* autem ab incolis appellari dicebat.

Beidlar. Non dubium est quin ea sit, quam doctissimus vir Prosper Alpinus Medicus cap. xxv. Libri quem de Plantis Ægyptiacis evulgavit, & circa Alexandriam Ægypti obsecuram descripsit *Beidlar* nomine, fruticosam, multis stolonibus ab radice rectis, sursum ad duorum cubitorum altitudinem sece arrolentem, folijs longis, latis, crassis, & candidis, ex quibus discitis, lacteus succus emanet, fructum habentem in quo lanugo, & minima parva, lara.

Facultates. Eius autem facultates esse ait, ut folia contusa, cruda, & in aqua cocta, emplastri modo apponantur, frigidis tumoribus & doloribus: ex lanugine parent cubilia in suum usum, eaque tanquam elica idoneâ & pabulo, ad ignem silice excussum excipiendum, ac fovendum utantur: lactem ejus succum calidissimum & exurentis facultatis esse, quæ plerique quibuidam valis excipiant ad depilanda coria, nam aliquâto tempore in eo macerata, pilis nudari. Lac quoque siccatum præstanter corpora solvere, dysentericos autem fluxus lethales facere: præstantissimum verò æstivari remedium, ad impetigiem curandam, & alias corporis maculas tollendas, si eo partes illinantur.

De hac porro planta, consulè Hanorij Belli viri doctissimi Tertiam ad me epistolam, in quâ multa diligenti observatione dignissima.

HACHAL INDI, SIVE ADMIRABILIS PERVANA.

CAPIT. V.

Admirabilis Pervana.

H Vix Stirpis iconem ante aliquot annos dabam, atque qualemoque historiam adumbrabam in Notis ad Atopiarum Garciz Historiam, paulò post quam nostræ Europæ innotuit. Eam postea in Pannoniarum Stirpium Observationibus auctiorem faciebam. Nunc licet adeò vulgaris sit notitiæ, ut nullus ferè sit hortus, in quo culta non repenatur, etiam à rei herbariæ imperitis, ob florum elegantiam: ejus tamen descriptionem hoc loco repetemus, nonnullis additis, quæ interea circa illam observavimus.

Admirabilis Pervana.

P R I M U M igitur emergit Ocymî, quod cereale nonnulli cognominant, aut Circæ Lutetianæ ferè modo: deinde caulem promiscubitale, aut bicubitale, vetelem interdum amphotem, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flavescens, frequenter, uti Balsaminæ feminæ caulis, geniculatum, & in multos ramos, eisdemque similiter nodosos divisum, qui ex ipsis prodeunt, non bini utrimque, & ex adverso oppositi, sed singulares dumtaxat, alternarum modò in unam, modò in alteram partem vergentes, & quem primùm servatur ordinem aut lenem, perpetuò ferè retinentes, hoc est, ut tertius, quintus, & sepiemus ramus in eandem partem spectent, quam primus: quartus verò, sextus, & octavus (si modò tot primarijs ramis planta sit prædita) eodem latere nascantur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis bipa adversis pediculis semper nascencia, Siliquastri folijs pænè similia, viridia, fatis carnosa, succulenta, circa pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliquastri gravem odorem, gustata verò, ingraram saporem, & tandem illius, vel soliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in extremorum ramulorum alis singuli, longi, coarctati, in quinque sinus, antequam aperiuntur, complicati, explicati verò Tabaci floribus non valde dissimiles, non tamen in mucronatos arculos, ut illi, desinentes, sed in obtusos, Convulsioli florum instar, Tabaci etiam floribus amplioris, elegantissima interdum purpurâ, sive ketmesino colore nitentes, nonnumquam læticitij, aliquando flavi,

do flavi, aut pallentes interdum prorsus albi, vel exalbidī duntaxat, nonnumquam obsoletē rubentes aut flavescentes, sæpissimē binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo rhediam floris partem occupante, vel virgatiū totum florem intercurrente, aut radijs modo flavis, modo purpureis alternatim totum distinguētibz, vel interdum magnis, nonnumquam exiguīs purpureascentibus maculis vario situ & mixtura per totum florem vel flavescentem pallascentemve, aut album, candicantēve, vel obliolērum, aspersis, odoris sarris suavis, & Naresissimū quidpiam referentis, sex oblongis staminulis, stiloque paulo longiore ē medio flore emergentibus: valdē autem caduci sunt hi flores: nam cū noctu explicari incipiunt, postdie sub horam octavam antemeridianam (per æstus præsertim) sese contrahere incipiunt, florum convolvoli modoxat temperatiore aurā, integro nonnumquam die expansi permanent, & sub noctem dumtaxat contrahuntur: singulis tamen diebus alij recentes aperiantur, qui si integri cottidie decerpantur, & inter chartas reponantur (dū enim colorem retinent) atque deinde inter se conferantur, ejdem quidem coloribus constare deprehenduntur: eorundem situ & mixtione, inter se variare, quisquis diligēter observaverit, animadverteret. Quæ sanē insignis varietas, quoquoque istum florem observant, in summam admirationē, non immeritō rapere debet: etenim diuissimē virer, & à Julio mense ad Octobrem usque (nisi pruinz interveniant) numerosā florum sobole luxuriare solet, caliculi flores amplectētes in quinque mucronatas lacinias sunt divisi, virides & quasi membranacei, in quibus unicum semen, nullā membranā sive pericarpio inclusum, mucrone, cui flos insedit, obtuso, infusa verō, qua caliculo adhæret, parte, ramquam exigua corona ornatum, pentagonum setē, baccae myrti propē magnitudine, initio viride, maturitate fuscum, & quibzdam veluti tuberculis oblitum, sponte, vel renui ventro, vel levissimā commotione decidens, nucleūque continens album, qui tritus in candidissimam, & amyli instar niveam friabilemque pulpam resolvitur: radix satis crassa, & *perparva* est, intrus alba, foris nigra, aliquor fibris prædita, gustu nonnihil acri, cui admilla ūr superficialia quædam dulcedo. Eam licet annuam initio censeremus (nam singulis annis nobis erat ferenda, hieme radicem in horto relictam corruptente) vivacem ramen esse, ab optimo & peritissimo viro Sebastiano Wolmaro Ill^{mo} Ducis Wirtembergici Pharmacopœo, & horti Medici tum temporis Præfecto, nunc verō Senatore Eßlingensi candidē sumus admoniti. Is eōm cū sub Autumni exitum aliquot plantas eruisset, & caule præciso ex illis unam, propter formę elegantiam excicandam servasset, initio autem Martij sequentis cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & quasi revirescentem deprehendēs, terrā in sicili obruit, & paucos post dies folia proserere cepit, deinde circiter Kal. Julij etiam flores. Cujus rei postea nos etiam aliquoties periculum fecimus, atque etiam alij nostro exemplo. Sed exigui momenti est compendium illud conservandarum huic radicem: nam novo Vere terræ commissa, forsitan flores proferant quindē diebus ante, quā illæ plantæ, quæ semine terræ eodem tempore credito, sunt natæ.

Admirabilis Peruana rubro flo.



At *iv* d autem genus habuimus, quod licet à superiore, caulis magnitudine & crassitudine, ramorumque situ & foliorum forma non differret, color tamē stolonis & florum dissimilis est: nam dum primū terrā emergit, cauliculi foliorumque pediculi, uti betæ rubræ iam recens nascentis, purpureascent, manētque is color in adultæ etiā caule & ramis: flores verō rubente mediocriusque purpurā infecti videntur, sex etiam tenuia stamina longiorēq; stilum continentes, ejusdem cum superiore odoris. Hi verō non mutantur, sed unius perpetuo sunt coloris, & quem ptimi habuerunt, reliqui deinceps retinent: semina in caliculis singularia, superioribus respondentia: radix non dissimilis.

Hoc genus ē superioris semine, cui rubri flores insederant, originem trahere non est dubium, quia proximo anno & alijs subsequentibus, utriusque generis semina seorsim terræ mandavimus, ut diligentiū istam varietatem & colnū distinctionem observare possemus,

possemus, & comperimus ex tubi floris semine nullas alias stirpes prognatas, quàm eas, quæ rubros flores darent.

Admirabilis
floris flore.
Admirabilis
al. flore.

Idem periculum fecimus de granis flavo flore genitis, quibus provenire observavimus, quæ nullos alios flores darent, quàm flavos: simile etiam de alborum florum semine factum periculum, ex quo nate plantæ, albos quidem initio flores dederunt: sed qui sub Autumno primum explicabatur duorum colorum evadebant, commixtis in eodem flore albo & purpureo, minus tamen quàm in varicolorum primum descripta.

Illud præterea observabam in istâ distinctâ varione, ex foliis planis rubræ semine natis, statim ab exortu initio agnosci posse, quos flores sint daturæ: ex varicolorum autem, flavotum & alborum semine provenientibus, nullum certum iudicium, si mixtum sint sate, sumi posse, quia ejusdem omnes sunt coloris in tenerâ ætate.

111.
Folia rubra.

Admirabilis Peruana albo flo.



ALFV. porro Rubræ genus mihi Viennarum, semine ex Italiâ allato *Lasmin rose*, hoc est, *Lasmini rubri* nomine: in fideliibus quidem nate plantæ, pusillæ & humiles etiam, latè nihilominus ramos fundentes: quæ autè in horto sate, superiori generi rubros flores gerenti longè ampliores, & latissimè ramos ipsas gentes, eadem serie quàm in supra descriptis alternatim nascentes, eundemq; ordinem servantes, ut videlicet alternis in idem latus semper vergerent, atque spectarent, ipsi similiter cum suo caule admodum succulenti, & frequentibus nodis sive geniculis præditi, atque magnâ ex parte purpureascentes: folia in hoc genere magis atra, magis splendentia, interdum majora, alterâ parte magis prominula, & inferius suum exortum in nervo habentia, similis tamen cum superioribus & odoris, & saporis: flores alijs forma pares, eodemq; modo ex postrematum alarum sinibus nascentes, oblongiores tam è, tenuiores, & colore dilutius rubente, extremâ etiâ parte minus ampli, sex similiter staminula cum stilo in medullâ continentes, suavemque odorem spirantes: semè in caliculis rubro aliter simile, hoc est, angulosum & tuberculis obitum, sed brevius & magis crassum: radix etiam brevior & crassior altera, interdum in binos aut ternos ramos crassos divisa.

Magis serotina est reliquis, & nisi solè valde apricum habeat, vix ad frugem pervenit in frigidioribus regionibus. Ex radicibus tamen, per hiemem in fideli, sicca terrâ pleno,

conservatis loco calido, plantas Viennæ habui, quæ maturû semen protulerunt: sed cum per meam absentiam, ex horto nõ essent erutz sive illâ hieme anni M. D. XCV. corruptæ sunt, & genus illud mihi intercidit: Lugduni vtrò apud Batavos semine peregrè accepto, denuò natum M. D. XCV. Sed illud mirum in omnibus his plantis & observatione dignum, quòd, cum tabescere incipiunt, primum folia, deinde integri ramorum articuli simul decidunt, & circa nudos jam remanentes nodos, candida quædam efflorescentia interdum adnascatur, quæ tempore successu concreta, falsi gustum referat: ejus postremæ notæ C. V. D. Joachimus Camerarius pro nostrâ amicitia primus me admonuit.

Nomina.

CETERVM peregrina & venusta hæc planta, varia, pro regionum diversitate obtinuit nomina: etenim ex Hispanijs semen primû missum est *Marabilla del Peru* appellatione, propter admirabilem florum in eadem stirpe varietatem: deinde *arbolera* nomen inditum: ex Italiâ nunc Indici, nunc Mexicani *Lasmini* nomine ob suavè videlicet ejus florum odorem: Belgæ *Solanum odiferum*, à foliorum cum Solani folijs similitudine, & florum odoris gratiâ vocarunt: Peruani, à quibus initio semè ad Hispanos pervenit, *Hachalinda*, crassâ & in palato formatâ pronuntiatione nominare inrelligo: Mulierculæ Viennenses, apud quas etiam in delicijs est, & *Hachalinda* Indianis *stamen* id est, varicolores Indicos flores nuncupant.

Hachalindi.

An apud quos sponere nascuntur hæc stirpes, medico in usu sint, nondû intelleximus: magis autè elegantiz, & hortos suâ venustate exornandi causâ, ab omnibus alijs arbitror, quâ facultatum ratione. Scribebat tamè ad me Patavio usq; amplius, vir Iacobus Antonius Corrusus, ejus, quæ vario est flore, radicis binas drachmas intus sumas, egregiè aquas educere. An ita sit, nullû feci periculum: herbari tamè cognitione se se oblectâres de cã re admonere volui.

PAPAYER

P RÆTER vulgare corniculatum Papaver quod flavo est flore, & omnibus maritimis ferè locis calidiorum regionum sponte nascitur, duo alta genera observabam, ab alijs, qui ante me Plantarum Historiam scripserunt, nondum prodita.

Papaver corniculatum flavo flo.

Papaver cornutum phoeniceo flo.



Papaver corniculatum flavo flore.

1. Papaver cornutum phoeniceo flore.

VNUM folio est, Erucæ foliorum instar, laciniato & altè inciso, vulgari minore, tenuiore, non adeò incano, sed hirsuto: caules interdum vulgari non minores, tenetiores tamen & graciliores procumbunt in terram: flores quatuor etiam folijs constantes, minores, nonnumquam intenso colore rubent, & illi primi sunt, quos planta florere incipiens producit, interdum languidiore, & quodammodo pallente colore, medijs folijs ad phoeniceum tendentibus, qualis ferè in altero floris genere qui à vulgo herbariorum Adonis flos dicitur, nimirum quando mediam ætatem superàs planta, jam deficere incipit, & hirsuta illa in caule & folijs dilabi: alioqui si quis vigentem & flores primum producentem plantam conspiciat, deinde jam adultam & senescentem, ex florum colore & caulis, ramorum, foliorum hirsutia, vel glabritia facile quis diversas esse stirpes sibi persuadeat, atque ut verum fatear: id mihi, dum Salmanticæ viverem, imposuit: prælonga autem floribus succedunt cornicula, quibus insident latiuscula quædam veluti opercula vel capita, semen in his nigrum, rugosum, Papavere majus: radix longa est, alba, satis crassa, & in Ramos interdum divisa, quæ tamen perennis non est, sed plerumque, prolato semine, perire sequente hieme solet.

Nascitur agro Salmanticæ secundum vias & agrorum marginibus, ubi florebat lunio, semen autem lulio proferebat. In Belgicâ satum, non nisi Augusto & Septembri florere voluit, interdum etiam seruis, nec nisi altero à satatione anno, ut plurimum. Viennensi etiam agro, & per Moraviam atque Bohemiam sponte nascentem etiam observabam & flores proferens lunio mense, in arvis avenâ confitis, præsertim secundum vias publicas. Omnibus autem ijs locis croceum in illa planta succum videre mihi non contigit: tamen non desint, qui simili succo turgere eam plantam putent.

Natalis.

ALTERI folia sunt multo minora, teneriora, valde minutim dissecta, non candicantia, sed viridia: cauliculi tenelli, subhirsuti: flos superiore non minor, quatuor etiam folijs constans, coloris ex purpureo cærulei exsaturati, & nigre violæ panè æmuli, fugax admodum, & qui lævissimâ aurâ excutitur: huic succedunt cornicula digitali dumtaxat longitudine prædita, plerumque etiam breviora, exilia, duriuscula, rigidioræque hirsutia prædita, in quibus continetur semen valde exile, coloris ex cinereo nigricantis: radix tenuis est & inu-

tt. Papaver corniculatum phoeniceo flore.

Invenitur

Papaver cornic. phœnic. pallesc. flo.

Papaver cornicul. violaceo flo.



Natalis.

Invenitur hoc multis Hispaniæ locis, sed non nisi inter segetes: Maio mense floret. Apud Belgas satum, multo serius, quod tardè admodum germinet: istuc tamen, & in Austriâ nonnullis hortis satum, semen ad frugem pervenit, & in terram sponte decedens, novas plantas producit: sed longè minores & teneriores, quàm ubi in arvis sponte nascitur, quod contra evenite solet in reliquis femine Hispanico naris, quæ plerumque ob multi alimèti copiam, frigidiore nimirum cœlo, & humidiorè solo, valde adolefcunt. Memini etiam olim colligere agro Narbonenti in agris a vena confitus, non procul Laterâ, secundùm flumen Ledum, paulò infra Mompellum.

Nemina.

GRÆCIS hæc Planta *μακρον κωνικον*. Latinis Papaver corniculatum dicitur. Nomen vulgare non intellexi: Castellani tamen, genus illud quod cœruleo sive violaceo est flore, *Rosetta*, nonnulli *Amapolas moradas*, id est, Papaver erraticum purpureo flore, à succi mororum colore appellabant: nam erraticum papaver, Hispani *amapelas* vocant. Mompelianni, cum apud eos virebam, inter Anemones terebant.

Voculatio.

PAPAVERIS autem ceratitidis radici vim eam inesse Dioscorides tradit, ut in aquâ decocta ad dimidias, coxendicum & jocinoris affectus potu sanet, prositque his qui crassa quedam, aspera, aut araneosa eum lorio reddunt: semen leniter alvum purgat, acetabulo in aquâ multâ potio: crustas emarginare illita ex oleo folia, florèque, & argema ac nubesulas jumentorum perundas, abstergere.

PAPAVER SPINOSVM.

CAP. VII.

Papaver spinosum.

PERELEGANS & planè novum est hoc Papaveris genus, nemini, quòd sciam, adhuc descriptum. Cubitalem verd aut ampliorem adquit caulem (plantam autem quam apud Ioannem Mulerum Pharmacopzum Francofurtensem in horto pensili datam vidi, describo) digitalis crassitudinis, rotundum, infernè candicantem, quibuldam spinis obstitum, per quem inordinata nascuntur folia, nullo pediculo illi inherencia, sed medium quoddammodo amplectentia, sinuosa & lacinijis aliquot divisa, ipsis lacinijis & crenis oras foliorum ambientibus in spinas desinentibus, infernè canescencia, superne viridia, albis tamen venis per foliorum & laciniarum longitudinem excurrentibus, in istar foliorum Cardui B. Maris vulgo nuncupati, minus autem ampla: ex horum alis nascuntur rami spinosi similibus folijs præditi, sed minoribus, in quorum & caulis fastigio nascitur capitulum triangulare, spinosum, in tres majores firmioresque spinas desinens, quo dehiscente & defluente, flos se-

Papaver spinosum.



Hypecoem legistrum.



flos sese ostendit senis folijs confans colore flavis, corticuli papaveris vulgarioris floris instar, odorem Chelidoniij majoris quoddammodo referens, caducus admodum; in cuius medio sese exerit capitulum spinosum pentagonum, multis staminibus flavis id ambientibus; quod summâ parte rubescit dum tenellum est, maturum verò & vetustum nigricat, & pollicans est crassitudinis fescundioris longitudinis; frequentibus firmisque spinis oblitum, semina continens rotunda, rugosa, nigra, seminibus Papaveris cerantibus rubello flore instar, cui & persimilem habet radicem: quæ an vivax sit, me latet. Tota planta flavescens succo, instar Chelidoniij majoris, abundat. Florebat Julio & Augusto anno M D XCIII.

HVIS plantæ capitulum rescicatum cum paucis semine, Londino utque primum ad me mirrebat Jacobus Garerus junior, nullo addito nomine: nam cum alijs rebus navi allatis acceperat. Id semen terræ commissum, non germinavit: quod verò Londino attulit Ioachimus, magni illius Ioachimi N. Ioachimi achiatri Noribergensis F. Camera-tius anno M D XCII. istuc eodem anno natum, fertile fuit, & hanc quam describo plantam protulit. Nominabat autem *Fico inferno*, hoc est, Ficum infernale.

HYPECOEM LEGITIMVM. CAP. VIII.

FOLIA sunt huic plantæ multis incisuris divisa, figurâ, colore, & aspectu Ruræ folijs valde similia, molliora tamen, & interdum longiora: canaliculi aliquot, qui in multos ramulos divisi; pusillis floribus onusti sunt flavis, satis odoratis, senis folijs constans, sed mirandâ figurâ, & à reliquis floribus diversâ: nam duo folia habet reliquis majora, nervo viridi foris extremâ parre (quæ obrusior est, & velut compressa) prædita, quatuor alia perextiguntur, & vix, nisi flore expanso, conspicua: cornicula succedunt in singulis ramulis quaternâ, aut plura, longa, plana, articulis distincta, & falcis instar incurva: semen in singulis internodijs nigricans, longiusculum, quod difficulter admodum extrahi potest, continenna: radix singularis, subflava, interdum bifida, annua tamen, nec vivax: tota planta ingrati admodum saporis.

Primum istam plantam observavi in Gallia Narbonensi anno M D LII. supra Nemausum urbem, inter Asmarques & Voyet, Arelateni sitinere: deinde valde copiosam inter segetes, agro Salmanticensi, rotæque Castellâ, Granatensis item Murcianaque Regno, Florebat istuc Martio & April, semen Maio maturum erat. Apud Belgas & Viennenses satis, proyenit quidem, sed longe tenacior, quàm ubi sponte nascitur, veluti papaver illud corniculatum violaceo flore, cuius paulo

Hypecoem legistrum.

Narbol.

ante

ante meminimus: scrius etiam florebat: semen tamen plerumque ad plenam maturitatem perveniebat.

Nomen.

Cum in initio hanc plantam observabam, illico mihi visa est ad Hyppocri historiam plurimum accedere, quod Græcis *ὑπὸ κρίῳ* & *ὑπὸ κρίῳ* dicitur: & certe nulla mihi hactenus occurrat, etiam illarum quæ hoc nomine à Rei herbariæ scriptoribus proponuntur, quæ ad Dioscoridis Hyppocri magis accedat, meâ quidem opinione. Non desunt tamen, qui ad Cuminum silvestre alterum Dioscoridi descriptum referre malior, hec facultates sint dissimiles. Vocatur autem hæc Granarépibus & Murciaus *gaderia*.

Dioscoridi, Plinio, Galeno, natura ejus eadem quæ Papaveris succo.

ACONITUM LYCOCTONVM.

CAP. IX.

Aconitum lycocten. vulg. luteo flo.

Aconitum lycoct. flo. Delphinij i. Silesiac.



*Aconit. lycoct.
luteo flore.*

1.
*Aconitum
flo. Delphinij
arculis, Se-
lesiac.*

P R Æ T E R vulgare Aconitum Lycoctonum, quod plerisque Austriæ & Striæ montibus umbrosis sponte provenit (perlestrim verò quodam jugo supra Peresthorf ad Septentrionem obverso, secundo fere à Viennâ militari, ubi copiosissime) varia alia nascuntur in iisdem Provinciis Lycoctoni genera, nusquam alibi mihi conspecta, quæ omnia hoc nono capite Quinti Libri describemus, nonnullis etiam additis, quæ, aliunde missa, in hæc aluimus. Initio autem, vulgaris flore luteo iconem præfigendam celsissimus, ut tanto facilius reliquorum ab eo diversitas observari possit: proximè historiam dabimus illius peregrini, quod foliorum similitudine maxime ipsi respondet, & florum elegantia insignis est.

C V B I T A T I igitur aut ampliore affurgit peregrinū illud Primum genus caule, firmo, lævi, intus cavo, foris ex purpureâ virecente, & quasi farinæ polline leviter asperso, live eo coloris flore, qui in prunis, & plerisque alijs fructibus, Tulparumque folijs & caule, nondum manu radis elucescit, levissimoque tactu detergitur: folia longis pediculis in hærentia, inordinatè caulem ambiunt, longè ab ejus Lycoctoni, quod flore Delphinij vulgo cognominatur, cuiusque iconem huic subiiciemus, folijs diversa, subhiisura, minoribusque & minus profundis incisuris divisa, Lycoctoni luteo vel pallido flore folijs similia, superne tamen magis atrâ summum caulem exornat oblonga florum spica, qui pediculis in hærentes, ante quàm aperiantur, locustas aut parvos lacertas a mulantur, longiusculis caudis & sub extremum incurvis insignes, expansi verò, quimis folijs, quemadmodum aliorum aconitorum flores, consistere deprehenduntur, duobus ad latera, binis infernè parte, & superiore quinq; o, quod in oblongum corniculum rugosum, & extimâ parte inflexum definit, omnibus folijs

externè

externè rugosis purpureisque, internè lævibus & elegantissimo cartuleo colore præditis, singulorum otis anteriore parte introrsum nonnihil reflexis, colorèq; è viridi palliscente: medium florem occupant quatuor alia foliola fusca & nigricantia, quorum bina superiora dura, & quasi in vnum coëuntia, formicem referunt, duo alia inferne propendent, molliora, luteo partim villo, partim albo hirsuta, multis staminibus capillaceis subius delecte cæribus excusso flori succedunt trigona siliquosa capita simul coherētia ut in alijs Aconitis, in quibus semen inæquale, fuscum, rugosum: radix crassa, tuberosa, instar radices alterius Lycodoni flore Delphinij, quod apud Belgas alebatur, nigra, rugosa, nonnul concava, graviter olens, multis tenuibus, fuliginosisque lanugine pubescentibus fibris prædita, ad cujus latera secundum inferum caulem, singulis annis nova germina repullulant.

Nascitur referente doctissimo viro Achille Cromero Medico, qui ejus plantas anno *Natalis* M.D.LXXVII. Viennæ Austriæ ad nos mittebat, frequens in montibus territorij Freywaldensis in Silesia, & ab incolis *Wolfsurtz* hoc est, Lupina radix appellatur, ubi in tricubitali interdum altitudine excre scere & Augusto florere aiebat: quod ab eo cæte missum, in horto colebamus Vieonæ, Junio florebat, & sesquicubitalem altitudinem primo anno non superavit, æ subsequenti bus bicubitalem, aut majorem attingit.

Aconit. Lycod. flu. Delphinij II.

Aconit. Lycod. t. II. Tauricum.



Hic subijcimus vulgare in Belgicis hortis genus illud Lycodoni flore Delphinij alterum, cujus folia longè tenuius incisa, & multifida flores purpurascētes.

Folia Secundo peregrino, sive Quarto Lycodoni emergunt ineunte Vere satis crassa, quinque incisuris usque ad summum pediculum divisa, & in multas deinde profundas lacinijs diffecta, minus tamen quàm Napelli vulgaris folia, atrè viriditate superne prædita, non infernè, utrumque tamen splendētia: quæ alternatim caulem ambiunt, tenuius aliquantum incisa sunt, eodem tamen modo splendēt: caulis cubitalis, aut sesquicubitalis plerumque, firmus, medullosus, lævis, splendens, supernà parte in aliquot ramis dividitur, paucos flores fetentes, vulgaris Napelli floribus formâ similes, quatuor videlicet folijs constantes & humili cassi lè illa tegente, coloris violæ saturatissimi & elegantissimi: succedunt deinde, quemadmodum in vulgari, tria cornicula fusca, angulosa, rugosa, nigricans semen continētia: radix exigui napi magnitudine, multis longis fibris, tenui, fuliginosisque coloris lanugine pubescentibus prædita est, in lateribus alios similes napos promens, qui singulis annis novos & teccentes caules profertunt.

Invenitur in Tauricis montium jugis, non procul à Salisburgo, in quibus florēt Julio, in *Natalis* culis

*Eradium flu.
Delphi pur-
purasc. flu.
II.
Lycod. pro-
cox Tauric.*

culnis verò multò maturius, imò reliquis Lycoctoni generibus præcocius, nempe Maio interdum menſe.

Aconitum Lycoct. v. Neubergeſe.

Aconir. Lycoct. vi. Napellus vulgar.



xxx.
Lycoctonum
Neubergeſe.

LATIORA vulgari Napello habet Tertium genus peregrinum, ſive Lycoctonum Quintum, folia, licet ſimiliter incifa & laciniata, magis atra ſimiliter & ſplendens. caulem rectum, firmum, rotundum, trium interdum cubitorum altitudinem æquantem, & in multis ramulos ſuperiore parte ſepenumero diſiſum, qui flores ſpicæ inſtar congeſtos ſerunt, colore purpureos, Napelli vulgaris floribus plane reſponderes, hoc eſt quatuor folijs conſtantes, quanto veluti galeola ſupereminente, & bina circumvolura, inſtar Litui, cornicula occultente, ſtaminum tamen media congeries magis fuſca eſt: ſorum ſpicæ in extremo caule naſcens, reliquis oblongior eſt, & magis expanſa: ſingulis floribus terna ſuccedunt cornicula, interdum quaterna & quina in caput unum congeſta, ſemen atrum & inæquale eonrincientia: radix illi vulgaris Napelli inſtar, parvo napo ſimilis, cui in lateribus adhaerent alij nagi fibræ præditi, quibus ſe propagat.

Napellus.

Creſcit in montis Neuberger Ducatus Stiria jugo, ad vaccarum, iſtiæ æſti vis menſibus paſcentium, ſtabula. Floret paulò poſt vulgarem, videlicet Julio.

Napellus
vulg.
Napellus.

VULGARIS porò Napellus frequentiffimus eſt in Snealben, & aliorum quorundam montium jugis, ubi ternis illis æſti vis menſibus Junio, Julio, & Auguſto, boves ac vacæ ſua ſtabula habent in qua nocte recipiantur, ſic ut ſimi pinguedine, & bubuli ſtercoris illa eluvie, cum præcedente delectari videatur.

xxxx.
Lycoctonum
Lycanum.

MEDIUM quodammodo inter vulgarem Napellum, & genus Aconiti illud præcedens, Lycoctoni Quartum peregrinum genus, ſive ordine Septimum eſt: folia enim illis ſimilima obinet: caulis inter illos medius, infirmior ramus, & ſupernâ parte aliquanulum nutans: flores utriuſque floribus proſus reſponderent, niſi caſſis ſupra quatuor folia eminentis, magis ſublevaretur & haret, roſtoſque magis mucronato eſſet: ſemina in ternis corniculis ſimul junctis ſimilia: radix etiam non multum variat.

Napellus.

Miſſum fuit Viennam hoc genus à C. V. D. Stopio p. m. è Linzaniſ montibus erutum, quod poſtea in horro cum reliquis generibus alimus. Floret cum ſuperioribus, aut paulò etiam ſeriùs. Proximè accedere videtur ad id Aconitum (ſi ex icone iudicium ferre liceat) quod Matthioli ſeptimo loco depingit.

v.
Lycoctonum
vulgare.

TRIUM nonnumquam eubitorum altitudine aſſurgit Quintum genus peregrinum ſive Octavum Lycoctonum, caule tamen ſatis gracili, rotundo, ſuperiore parte in multos ramos diſiſo & nutante: ſummo caule longam ſorum ſpicam fert, Lycoctoni cærulei vulgaris

garis

Aconit. Lyco^o. viii. coma nutante.Aconit. Lyco^o. ix. Iudenbergenſe.

garis ſive Sexti Napelli dicti ſonbus ſimilium, ſed paulò dilutiore purpurâ ſplendentium, quorum ſingulis (ut in alijs Lycoſtoni generibus) ſuccedunt ſerua longuſcula cornicula ex eodem pediculo naſcentia, ſe mine inæquali, fulco plena: folia ampla & oblonga, in multas tenues profundaque lacinias magis dividuntur, quàm in ullo alio Lycoſtoni (præter id quod à Belgis flore Delphinij nomine alitur) genere, quæ ſuperiorem atrâ quidem viriditate prædita ſunt, non ſplendent tamen: radicem habet craſſam & longam, napi ſerè magnitudine, foris nigricantem, & per intervalla multis fibris donatam, ac ſuperiore parte in multa capita extuberantem, è quibus caules emergunt: ſubinde tamen recentes exiguos napos ad latera adnatos habet, quibus ſe propagat.

A C. V. Fendrico Sebzio Medico primùm ex Italiâ Viennam delatum eſt, & nobis Natalis communicatum. Floret Iulio. fortè Matthioli ix.

HABET etiam Sextum peregrinum genus, ſive Lycoſtonum Nonum folia in quinque lacinias altè diviſa, & illas denuo in ambitu conciſas, Thoræ Italicæ folijs interdum adeo ſimilia, ut ſi quis planas, ante quàm in flores abeant, conferar, nullum ſerimè diſcrimen deprehendere quear, niſi Italicæ Thoræ folia ſplenderent, hujus minimè. caulem bicubitalem nonnunquam, rotundum, non valde craſſum, firmum tamen & rectum, ex viridi purpureſcentem, ſuperne quinos aut ſenos ferentem flores inrer omnia Lycoſtoni genera maximos, quatuor folijs ut reliquorum generum, conſtantes, ſupereminente paleâ longè majore, & uncialis aliquando longitudinis, elegantis ex cæruleo purpurei coloris, ſub quâ bina longa cornicula exrimâ parte latiora, & litui Veterum Romanorum ſere inſtar inflexa, coloris dilutius purpureſcentis reguntur, ſtaminibus nigris medium florem occupantibus: floribus ſuccedunt tria, ut plurimùm, cornicula conjunctim ex eodem pediculo naſcètia, interdum quaterna & quina, ut in Tertio peregrino genere, ſed longè majora, ſemen inæquale, ſuſcum continentia: radix parvi napi formam æmulatur, nigricantibus fibris prædita: alias præterea ſimiles radices lateribus adnatas habet, tenuioribus adhuc fibris præditas, quæ ſingulis annis recentes caules proferunt: ſed etiam infimi caulibus noſtris adnaſcuntur tubercula, non ſecus ac in Italiâ Thorâ.

Sponte provenit in Iudenberg, altiffimo totius Stiriz monte, ubi Spica celtica legitur, & plurius aliz elegantes ſpecies naſcuntur: Floret iſtic Auguſto, in hortis ſub extremo Iulium, ſerius reliquis ſuperioribus. Anno autem M. D. LXXXV. copioſe inveniebam in alio Snerberg jugo, quâ difficillimus eſt aſcenſus, cum Aleſtorolopho alpinâ, & alijs raris plantis.

ITALICA Thorâ (quo nomine aliquando ad nos in Belgicam mittebat C. V. Alphontius Pantius Ferrarienſis Medicus) huic (ut ante dixi) admodum ſimilis, florem minorem & dilutiorem

antea observata non memini, præter unum aut alterum, quæ hæc inferenda censui, quia sponte nascenna observabam in ijs regionibus quas adj, cum in Belgicæ cultioribus hortis duntaxat alantur. Initium autem facimus ab eo genere quod folia habet primis duobus Lycoctoni generibus non dissimilia.

Geranium 1. pullo flore.

Geranium 11. batrachiodis minus.



CYBITALES frequentissime ex unâ radice producit Primum caules, firmos, geniculatos, virides, sanguineis tamen veluti guttis asperios, lanugine pubescentes, in aliquot ramos divisos: in quorum fastigio, ad singula genicula longiuscascuntur pediculi, in quibus bini flores, quinque laciniatis (præter reliquorum Geraniorum usitatam formam) foliolis constantes, colore saturatus rubente, & quasi atro, medium florem occupantibus multis staminibus circumvolutis cum stilo prominente: semen deinde succedit in valvulis mucronatis (quæ maturitate, ut in reliquis Geranijs, dissiliunt, & circumvolvuntur) foscum: folia illi ex radice multa, ampla, mollia, lanugine obdacta, externâ parte nervosa, Geranijs batrachiodis folijs similia, quin, semis aut septenis profundioribus incisuris divisa, nõ tamen usque ad umbilicum, deinde per ambitum serrata, qualia etiam ad singulos nodos sub ipsis ramis nascuntur (minora tamen) atque subinde ad singulas incisuras nigricantibus maculis insignita: radice nititur magnâ, in multa crassa rubentiaque capita, & multas fibras spargentem, exuberantem, singulis etiam annis augescere & novos stolones producere.

Invenitur in Stiriacibus, ubi silvæ desinere solent: & floret Junio: in hortis verò, in quibus felicissimi me provenit & luxuriat, Maio. Anno item M. D. LXXIX, maximâ copâ observabam Maio mense suis floribus onustum in silvis illis montibus Pannoniæ inter Dravum & Savum sitæ, & propterea, Interamnensis cognominatæ. Semine autem Viennâ ad amicos in Belgicam misso, natus ex eo plantis isthæ innotescere cepit.

ALTERVM prodeuntibus è radice frequentibus longoque pediculo nitentibus folijs prædictum est, Ranunculi platyphylli, aut Aconiti Lycoctoni pallido flore, folio respondentibus ferè, rugosis, subhiis fuscis, in aliquot profundas lacinias divisis, deinde in ambitu serratis, quæ gustata initio adstringere, & linguam exsiccare, deinde nonnihil callicare deprehenduntur: caule cubitali ut plurimum, firmo, rotundo, geniculato, in multas alas diviso, quibus subnascuntur folia superioribus minora, pauciori busque lacinijs divisa, perinde tamen in ambitu serrata: summi rami in oblongis pediculis flores gestant quinque folijs constantes, Geranijs batrachiodis quod in Belgicis hortis alitur, floribus forma pares, paulò tamen minores, nec, ut illi, cærulei, verum ex purpurâ rubentes, decem staminibus cum stilo ex umbilico floris producentibus: deinde oblonga erectaque rostra, non inflexa aut inclinata, quin

1.
Geranium
pullo flore.

Nata in.

11.
Geranium
batrachiodis
minus.

Geranium III. *Batrachium* majus.

Geran. IIII. bulbosum Pennz.



ta, quinis utriculis ad eorum basim turgentibus & semen continentibus, quod maturitate exilit, aliorum Geraniorum more: radix superiori ferè responder, & summâ tellure in plu-
ta crassa, internèque rubentia capita extubetat, quæ fibras etiam agentia, singulis annis
augentur.

Notulæ.

Crescit hoc in Pannonicis Stiriacisque alpinis, nusquam tamen abundantius, quàm su-
pra Gaminiam, in illo ascensu ex Herrenalben jugo ad sublimes scopulos Durrenstein. In
quibus floret Julio & Augusto, in hortis autem Maio.

III.
Geran. bat-
rach. majus.
Notulæ.

GERANIUM autem illud Batrachiodon majus, cæruleo flore, quod in Belgicis hortis ale-
batur, sponte provenit abundè in pratis ad Corenneuburg non procul à Danubio, banis su-
pra Viennam milliaribus, aliisque Austriæ pratis, tum etiam maximâ copiâ in pratis Brun-
næ Moraviæ urbi vicinis, atque etiam Bohemæ, non procul ab oppido Werawn, tribus
milliaribus à Pragâ distanti, vicinisque Francofurto pratis & hortis gramine consistit.

IIII.

QUARTI, quod foliorum similitudine Secundum refert, iconem mihi anno M. D.
LXXXI. communicabat Londini C. V. Thomas Pennæus ejus urbis Medicus, cum hac
descriptione.

Geran. bul-
bos. Pennæus.

Geranium bulbosum, radicem habet ex multis parvis & longis bulbis constantem, ver-
sus summum fibratam, caulem cubitalem, geniculatum, juxta radicem & genicula parum
rubentem: è singulis geniculis duo folia longiusculis pediculis nientia, in quinque præci-
piuas partes dissecta, quatuor singulæ in ambitu inæqualiter incisæ sunt: è singulis juncturis,
juxta foliorum exortum quinque foliola muctonata exoriantur: flores in summis ramulis
conjugatim parvis pediculis insistentes rosei, ex quinque foliis constantes, colore ex pur-
pureo rubescentes, Geranij cæruleis floribus similes, sed paulò minores.

Notulæ.

In Daniâ provenit agro Hafniensî, unde doctissimus & mihi amicissimus Turnerus, Me-
dicus Anglus attulit & mihi dono dedit.

V.
Geran. mæ-
diæ Pennæus.

ALIQUOT à radice promit Quintum folia, satis firma, in quinque lacinias altè divisa,
inter quæ bini aut terni caules assurgunt pedales, graciles, ex fulco purpureo, genicu-
lati & nodosi, bina ad singulos nodos seu articulos ferentes folia ex adverso sita, in tres d'un-
taxat lacinias secta, deinde è medijs alis longiores pediculos, in quibus bini semper flores
conjugatim nascentes, quinque foliis bifidis (ut malvacæ) constantes, purpurei coloris, sed
quibuldam saturationibus venis distincti, protuberante in medio rubro umbone, summo
fastigio in quinque partes fissi, qui in longiusculum deinde tostellum tranût, quod infernâ
parte in tumentibus utriculis semen continet, maturitate, ut in reliquis generibus sponte
exiliens

Geranium v. nodosum Plateau.

Geranium v. tuberiferum Plateau.



exiliens radix nodosa est & geniculata, aliquot præterea fibris donata. Floret Maio & totâ deinceps ætate in Autumnum usque flores, & semen, sæpe non definit.

Hanc plantam unâ cum icone, Francofurtum Mœno flumini impostam urbem Imperialem, ad me mittebat honestissimus vir, & in Stirpium cognitione egregiè exercitatus Iacobus Plateau, quæ semine sponte decidente satis feliciter deinde sese propagavit.

PRÆCEDENTI non valde dissimile erat Sextum genus: nam eaeules nodosus, circa genicula rubentes, folia etiam in caule nata tribus duntaxat lacinijis divisa habebat, radicis item caput multis crassissimis fibris, fusco colore rubescente permixto infectis, perinde firmatâ. Huic tamen folia è radicis capite nascentia majora erant, & in quinque lacinias scissâ: flores in summis ramulis, non bini, sed plures, tres videlicet aut quatuor simul nascentes, à superioris floribus formâ & colore non discrepantes: quibus succedebant longa, ut in illo, rostra, semen in utriculis, quod maturitate exliebat, continenria. Illud autem singulare habebat, ut ex ipsius Plateau literis (qui hujus etiam iconem suis coloribus eleganter expressam Francofurtum ad me mittebat anno M. D. XC. III.) intellexi, quod productis floribus & seminibus, eitea Septembrem & Octobrem adnascerentur in radicum superficie, caulibus & ramis, multa veluti tubera, albi initio coloris, instar florum Brasiliæ floridæ, sive Cypriæ, qui tamen supervenientibus pluvijs, eluatur, tubera etiam durefiant. A tuberibus autem illis occasione sumptis Plateau, Geranium tuberiferum cognominandi. Insequente tamen Septembri scribebat idem Plateau, hoc Sexrum genus à Quinto non differre: sed unum genus esse, quod diversis temporibus fuisset delineatum: nimitum, eum ipsum monuisse idem genus mihi videri, nulla verò in ea planta quam ad me miserat conspectâ fuisset tubera. Iconem tamen jam expressam addere volui.

SEPTIMO, Multi sunt caules admodum ramosi, & frequentibus nodis cincti, villis obstiti, supernè, quâ Solem spectant, purpurascetes vel rubentes, folia, ad singula genicula, bina, contrarijs pediculis nascentia, Geranij columbini alterius folijs haud multum absumilia, in quinque lacinias ad umbilicum sæpe divisa (quæ magnâ ex parte in tres alias minores lacinias incisæ sunt) lanugine pubescentia, supernè virentia, infernè nonnihil canescentia, gustu linguam exsiccante: ex superioribus alius oblongi nascuntur pediculi, unicuique sustinentes singuli florem, inter reliqua Geranij genera maximum, quinque folijs constantem. Cisti maris flori formè parem, colore eleganti rubro, decem intus staminulis: deinde capita mucronata, seu rostra pentagona, semen (uti reliqua) in tumescensibus utriculis continencia, quod maturum cum sonitu exilit, circumvolventibus se (quemadmodum in ceteris genetibus) utriculorum mucronibus radix satis crassâ, rubescens, aliquot fibris donata, novas

VI.
Geranium
tuberiferum
Plateau:
quod est
tam Quinto.

VII.
Geranium
columbinum.

Halea.

Geran. nino-
vadu alijarūd.VIII.
Geranium
Salomonis,
refracum.Geranium
Craus.

Cariophyllata vulg. Geum Plinij.

Nemosa.

Empetrum fa-
culat.Ternu. Pa-
terum.

Geran. Plinij.

sub terram propagines singulis annis ad lare-
ra spargit, quæ nō modò similiter fibras agūr,
sed etiam crassioribus radicibus interdum se-
se firmant.

Nascitur in omnibus Pannoniæ, & Austriæ
infra Anisum, cædis montanis silvis, editio-
ribusq; graminis locis: mons præterea arcis
Grebén imminens ultra Dravum in Panno-
niâ interamini, totus ferè eo Geranij genere
constitus, quâ parte Occidentem spectat. Sil-
væ etiam Francofurto ad Mœnum vicinæ eo
abundant. Floret Maio, & plerumque totâ
subsequente Æstate.

2. Simili quidem flore, disparibus tamen so-
lijs & Batrachiodis Geranij foliorum potiùs
æmulis, invenitur aliud genus ad pratorum
margines umbrosos & inter vepres, ad pa-
gum Calzeret, supra Noribergam innere
Pragenfi.

PERVILLVM aliud Geranij genus, Sal-
manticæ agens, observabam in vicinis ultra
Thormim amnem collibus nudis ferè & pe-
trofis, aut saltem tenui gramine tectis; cum
pusillâ illâ Lychnide silvestri v. m. huius
historiæ Tertio libro descripta: & Colchico
montano, cujus iconem & descriptionem li-
bro Secundo inter Colchici genera dedi. Id
autem, Ranunculi ferè folia habebat, purpu-
reum exiguum florem, & longissimam, crassissi-
mâque (pro stirpis tenuitate) capitula ro-
strata, Geranij Cretici (quod Mompeliano
agro etiam sponte nascitur, rostris præ æqua-
lia: semen observare non licuit: radicem ve-
rò valde exilem.

TRAGO Septimum genus non ignotū fuisse
videtur: sed ab eo *Thymum* appellari celsæ.
Reliquorum hoc capite descriptorū nullum
vulgare nomen mihi cognitum. Vngari vul-
gare Geraniū, tenuiter incisus folijs *Varya lab*,
id est, Cornicis pedem nūcupant. ut Colum-
binū *Golia korem*, hoc est, Ciconiz unguem.
Germani *Stapel schnabel*, id est, Ciconiz ro-
strum; Galli *Bec de Grue*, hoc est, Gruis ro-
strum; Hispani, *Pico de Ciguña*, quod signifi-
cat, Ciconiz rostrum.

SLAVONICÆ mulieres Sexti decoctū ex pro-
fluente aqua, misce cōmendant in capitis
gravedine, si sinciput, ubi dolor est, eo ablua-
tur, deinde herba decocta superimponatur,
postremò (quod superstitione non caret) in
profluentem, unde aqua hausta, abiciatur.

Dioscorides Geranium nullius in medicinâ
usus esse ait: Plinius autē tradit in vino albo
potum, profluvia femininarum sistere, quod
verò rotunda est radice, ejus radicem re scieu-
tibus se ab imbecillitate, utilissimam.

CARYOPHYLLATA MONTANA.

CAP. XI.

GEVM radículas tenues habere, nigras,
benè olentes, tradit Plinius. Recētiore,
qui non inselicitè in Plantarum cognitione
versati, nō abs re vulgare Caryophyllatam
esse censent. Ad illius genera referri debent aliæ etiam stirpes in montanis nascentes, qua-
rum qui-

rum quidem radices, o'loris gratiā cum illius radicibus non sunt comparandæ, sed reliquis notis satis coveniunt. Illarum huiusmodi hoc capite describemus.

Caryophyllata montana. i.

Caryophyllata montana 11.



PRIMUM radicem habet digitali, aut pollicari, interdum crassitudine, summā tellure crescentem, crasso & purpurascēte corrice rectam, impensē adstringentem, nodorum vestigijs quemadmodum in Acori radice alternis distinctā, auterius (illius instar) progredientem, & multis nigricantibus fibris, non inuicendi prorsus odoris, sed aliquanulum ad Vulgaris radicis odorem accedentibus, firmam, supremā parte in aliquot capita diuisam: & quibus longæ, ut in Eupatorio, emergunt foliorum alæ, multis minoribus virentibus & in ambitu serratis folijs, modò æqualiter, modò inordinate nascēntibus, utrinque constantes, extremā alā in majora tria folia, aliquanulum per oras laciniata, & instar aliorum in ambitu serrata, semper desinente, quorum tertium (quod & postremum) reliquis majus est, & magis orbiculare, gustus exsiccanis: inter has alas, emergunt pedales, interdum etiam majores caules, firmi, rotundi, brevioribus minoribusque foliorū alis latā sede eos amplectentibus obliquis, supremā parte purpurascētes, in aliquot ramulos simili colore præditos, & dorsum inflexos sive nuanres diuisi, qui propendentes sustinent flores, quinque, ut plurimum, folijs, nonnumquam etiam senis aut seprenis, suauiter rubentibus & orbiculatis ferè, constantes, oblongiore tamē & angusto ungue, numquam se explicantibus, aut caliculum superantibus, sed quodammodo ipso inclusis, medium occupante villosā congerie luteis staminibus obliquis, quæ paulatim purpurascētem colorem contrahit, & tandem sese erigens & explicans, maturitate semē cui inhaeret, ut in vulgari Caryophyllata ostendit. Tota planta cum suis enam caliculis lanugine pubescit.

Crescit media ferè montium regione, locis udis & riguis, cum eo Saniculæ montanæ genere, cui lactes sunt flores, veluti sanguineis maculis aspersi, & Ranunculo illo platyphylo, sub ipsis arboribus. Floret istic Iunio, in hortos transflata, Maio, aliquando etiam maturius.

SI MLT etiam propemodum ratione serpit Alterius radix, superiore non minor, at raro in tam multa capita extuberans: quibus similiter multæ foliorum alæ nascuntur, superioribus non breviores, sed frequērioribus minoribus folijs, in ambitu serratis, utrinque ornata, unico duntaxat, & quodammodo circinato folio, in tres ramos plerumque laciniis diuiso, & in ambitu serrato, extremam alam occupante, quæ implēdet, & dilutius viret quàm in primo genere: nascuntur etiam inter eas foliorum alas pedales caules, graciliores quàm in superiore, minoribus, magisque laciniatis folijs orati, qui singulares plerumque, nonnumquam etiam plures, caliculos sustinent, in quibus flores autē, quinque folijs vulgari majoribus

i.
Caryophyllata montana
sua flora.

Natalis.

11.
Caryophyllata
sua flora.



majoribus præditi, floris Cistii feminæ amplitudinem interdum æquantes, medium occupant multa lutea stamina, inter quæ latet villosa quædam congeries, quæ excusso flore sese explicans mollior est superiore, & semen planum adnatum ostendit, quod maturitate fulcum fit. Tota etiam planta lanugine obsita, & adstrictionis particeps.

Hoc genus in summis duntaxat Alpium jugis, nec in omnibus tamen, sed inter gramen, vel sub fruticibus nascitur. Floret istuc Iunio, semen Augusto maturum: in hortis maturius omnia cum superiore.

Matthioli.

MERITO his conjungenda est elegans alia planta, quam quidem nascentem nunquam conspexi, nec is qui iconem suis colonibus depictam mihi communicabat Penninus noster: sed ex C. V. Conradi Gesneri depicto herbario desumpsisse fatebarur.

Geum aquaticum Gyneri.

Folia quidem Caryophyllaræ sunt, sed an lanugine pubescent, ex picturâ colligere non licuit, quemadmodum nec quâ sit radice prædita, nec qualia sint quæ ex eâ prodeunt folia: soli enim caules cum floribus unôque aut altero folio cauli inhærente depicta tuere: flores sanè elegantis & sanguinei sunt coloris, veluti Byzantinus Ranunculus. Duorum autem videtur generum: nam alterius flos multiplici foliorum texturâ & serie constat: alterius vero, simplici tantum: utriusque tamen medium occupat villosa congeries, non secus ac in aliarum Caryophyllatarum floribus.

Nomencl.

NULLVM vulgare nomen istarum stirpium intelligere potui: sed secundû genus à Matthiolo, Commentariis in 111. lib. Dioscoridis, Caryophyllaræ montanæ nomine describitur: picturâ tamen non valde feliciter expressâ. Tertius iconi adscriptum erat, Geum aquaticum flore simplici & multiplici. Vulgarem autem Caryophyllatam, officinæ Caryophyllaram appellant, quod ejus radices Caryophyllos aromaticos nonnihil redoleant, nonnulli Benedictam, ex qua voce Galli suum *Benedict*, Germani *Benedictkraut* & *Benedictenwur* mutuati sunt.

Dioscoridi.

QVAS habeant facultates binæ illæ hoc capite descriptæ à montanis pastoribus nō licuit intelligere. Geum autem scribit Plinius nō modò pedoris doloribus aut lateris mederi, sed & cruditates discutere jucundo sapore. Similibus præne facultatibus præditam ajunt Recentiores suam Caryophyllatam. Ejus decoctû ex aquâ, aut vino aquâ diluto, grumos sanguinis dissolvere, inrenâque vulnera curare prædicant, si bibatur, externa etiam vulnera si eo eluamur. Decoctum ex vino, ventriculorum roborare, concoctionem juvare, jecoris obstructions aperire, pectus mundare & purgare ab humoribus crassis & pituitosis. Radicem siccam ex vino sumptam adversus venena, & colici dolores utilem esse.

QUINQUE.

COPIOSÆ nascuntur per Pannoniam & Austriam varia Pentaphylli genera, multis alijs Provincijs etiam vulgaris, quæ, cum ab alijs descripta essent, supervacaneum ducimus, Pannonicarum Stirpium observationes scribentes, eorum historiam illis inferre. Propterea de ijs peculiari capite duotaxat egimus, quæ à nemine (quantum quidem intellexissemus) adhuc erant evulgata. Nos igitur, ea quæ tum commentati sumus, hoc capite repetemus.

Quinquefolium. I. majus albo flore.

Quinquefol. II. minus albo florâ.



VNUM, multa folia habet Quinquefolium vulgari familia, in quinque partes usque ad pediculum divisa, in ambitu minimè serrata ut illa, sed extremis duntaxat foliorum oris, subtus incanâ quadam lanugine pubescētia, gustu initid gummoso & emplastico, deinde nonnihil amaricante: aliquot sub his exoriuntur cauliculi, exiles & tenues, dodrantes, humi procumbentes, in summo ternos aut quaternos flores proferentes, Pentaphyllo vulgari similes, sed prorsus albos: quibus excussis, apparet calix lanugine obductus, semen continere planum, seminis ranunculî ferè æmulum, in rudimentum fragi congestum: radix crassiuscula, nigricans, in ambitu sese diffundit, & multis fibris hirsuta est.

Provenit non modò in colle illo nemoroso supra Mandersturt oppidulum tepidarum aquarum scaturigine nobile: sed etiam in omnibus illis mœtosis silvis, quæ à Danubio procurrentes, ad Alpes usque pertingunt. In silvis item supra Nemethwywar, & Zollonock, apud Entzeistorf, & plerisque siccioribus pratis, uno ab urbe Viennâ miliarium Moraviæ præterea, atque in montibus ultra Dravum amnem, Pannoniâ Interamni. Floret Aprilis & Maio, interdum denum Autumno.

ALIVD, ex eadem radice, quæ nigra est, multos plerumque cauliculos proferre solet, confestim nascentibus, secundùm radicem, incanis foliis, formâ superiori similibus onustos, graciles, non humi fufos & procumbentes, sed rectos, & summo fastigin multos flosculos priores similes. Superioris genus videtur, sed per omnia minus.

Eruebam hoc inter saxa & scopulos, summis Austriacarum & Sciriacarum Alpium jugis. Floret sub finem Junij, interdum etiam Iulii & Augusti, prout juga illa maturius aut levis à nivibus sunt libera.

TERTIVM, ex radice fibrosa & nigricante, ramos præmit humi se spargentes, & subinde oblongas alias fibras agentes: qui summo capite, multa folia proferunt Pentaphyllo vulgatori

I.
Pentaphyl-
lum majus
albo flore.

Natalis.

II.
Pentaphyl-
lum minus
albo flore.

Natalis.

III.
Pentaphyl-
lum vulgare.



Quinquefol. 1111. flavo flo. 11. species.



Natalis.

1111.
Pentaphyl. re-
pente minor
latifolia.

gationi fetē ſimilia, in quinque profundas ſi-
furas diviſa / quarum ſingulae inſtar vulgaris
Quinquefolij per oras ſerratae ſunt) mollio-
ra tamen, aliquantulum ineana & ſplenden-
tia, adſtringētis guſtus: ex horum medio i
auliculi exeunt palmares, multifidi, qui pro ſur-
pis exilitate ſatis magnis floribus præditi ſunt,
eleganti & planē aureo colore, multis intrus
eroceis ſtaminibus: ſemen aliorum Penta-
phyllorum more, in fragi rudimentum con-
geſtum, fuſcum, exile.

Creſcit hoc ſimiliter in ſummis Auſtria-
carum Alpium jugis, quæ tamen herbola
ſont, & ſub Iunij finem floret, in hortis au-
tem Maio.

QVARTO, multa exeunt ab unâ radice
capita ramoſa, humi fuſa, aliquot folijs Pen-
taphylli vulgaris & elationis formâ ſimilibus
prædita, hoc eſt, quæ quinque foliolis in am-
bitu ſerratis, molliſque lanugine pubeſcenti-
bus conſtant, ſed non, ut illa, incanis, guſta
initio exſiccante, deinde nonnihil linguam
vellicante: ex ijs capitibus prodeunt dodran-
tales interdum cauliculi, ſimilibus, ſed mino-
ribus, folijs ornat, geſtantes in ſummo mul-
tos flores luteos elegantiffimos, quinque fo-
lijs, ut ſuperiorum, conſtantes, medium flo-
rem occupantibus multis luteis ſtaminibus:
ſemen in caput, & veluti fragi rudimentum
congeſtum, fuſcum: radix longa, dura, ſatis
cralla, foris nigricans, & tenuibus fibris do-

natae ſit: ſed & rami illi humi fuſi plerumque fibras agunt, & vicina loca occupant.

Nihil.

Nihil illo vulgacius secundum vias, locis siccis & nudis Pannoniæ, Austriæ inferioris, Natural.
Moraviæ, & Bohemiæ. Florere incipit ineunte propemodum Vere.

2. Cum eo nascitur atque etiam floret, minus tamen frequens, aliud hujus generis humi Pentaphyl.
repens minus
arvensis.
similiter fufum, cujus cauliculi non virent sed purpurescunt, & graciliores sunt, folia angustiora, magis villosa, & illorū oræ altius serratæ: flores etiam magis aurei: ceteris cōveniunt.

Quinquefol. v. fragiferum.

Pentaphyl. supin. quorundam Potentillæ facie.



QUINTVM, habet, quinque, sex, aut plures foliorum alas à radice prodeuntes, hoc est, longas costas rubentes, quibus quinque, ut plurimum, folia, interdum etiam septem inhaerent, contrario inter se foliorum exortu nascentia, uno, quod extremæ alæ insidet, imparem numerum faciente: sunt autem ea rugosa, villosa, per oras serrata, supina parte virentia, dorso aliquantulum incano, Fragariæ vulgaris foliorum pæne instar, minorâ tamē adstringentis aliquantulum saporis: assurgit deinde caulis gracilis, firmus, pedalis aut amplior, rubescens, in quo sparsa sunt rara folia inferius minora, quinque tamē ut illa numero, sed archius conjuncta, summo autem fastigio, ubi in quosdam ramulos dividitur, terna tårō uni pediculo inhaerentia: ferunt verò ij ramuli, sive virgulæ, albos flores, vulgaris fragariæ floribus prorsus similes, nisi paulò minores essent, quinque foliolis, ut illa, constantes, & in medio lutea stamina obtinentes: quibus succedit fructus frago nō dissimilis, minor tamen, nec ullâ saporis gratia cōmendabilis, qui in exigua rufescencia, & facile à sterili semina transiti: radix laris crassa, longa dura, lignosa rubescit, & nigro adstringente cortice recta est.

Nascitur in Leytenberg, locis vmbrosis, ad arcem in media silvâ supra Manderstorf sitam, quo loco primū, & aliquot deinde annis dunaxat observabam. Sed anno M.D.LXXI. copiosè nasci videbam inter Rabam, Muram, & Dravum Pannoniæ flumina, omnium autem abundantissimè circa Sakeurnya Ill^m Comitibus de Zrimo arcem munitissimam, quæ sita est inter Muram & Dravum: crevit verò illic non modò in cædis silvis, sed etiam graminosis campis. Anno autem illum sequente etiam reperiebam aliquot ejus stirpes in silvis supra Perelsdorf, secundo ferè à Viennâ miliari. Floret Maio, fructus paulò serius maturefcit, effluuntque, ut dixi, semina, quemadmodum in reliquis Quinquefolijs. Natural.

PRIORIS meminisse videtur diligentissimus Anguilar, opinione XII. Alterum fortè describit nosster Lobelius in doctissimis adversarijs: nostrum tamen flores habet fragariæ floribus magnitudine non inferiores. Poterit autem eodem nomine, quo ille suum vocavit, insigniri, Pentaphyllon minimum & petrzum. Tertio, Pentaphylli alpini flore aureo nomen indidit: hec vir verò pro arbitrio nomē mutare. Cominodè Quartum dici poterit Pentaphyllon repens minus. Quintum Plinio forsitan non incognitum: nam lib. XXV. cap. IX.

Natural.

*Quinquefo-
lium Plinij.*

Natural. Hist. sic scribit. Quinquefolium nulli ignotū est, cum etiam fraga gignēdo com-
mendetur. Vulgaris certe fragaria trina duntaxat folia habet, nec verisimile est ejus stirpis
formam à Pliniano tempore mutatam, quare ad eam plantam, cujus Plinius jam dicto lo-
co meminit, minimè referri posse arbitror: hujus verò fructus ejus nō aptus, facit, ut Quin-
quefolium Plinij esse, nostrum hoc quintum, asserere nō auserim. Nisi fortè eo loco Plinius
lapis sit, & Fragariz historiam cum Pentaphyllo confuderit: quæ enim postea addit, ad
Quinquefolium vulgate proculdubio pertinent. Vtut sit, hoc meum Pentaphyllon fragi-
ferum tantisper appellabo, donec aliud aptius nomen mihi aut alijs succurrat.

*Pentaphyl-
l. supin. Tor-
mentilla facis.
Anserina
Tragi.*

NEMINEM porro existimare velim, hoc meum idem esse cum Pentaphyllo supino Tor-
mentillæ facie, cujus iconem & historiam Lobelius in suis Observationibus exhibet; nam
illud etiam frequens est agro Viennensi, in extremis pratorum marginibus, secūdum silvas:
& nonnihil affinitatis cum Anserinâ Tragi, seu Potentillâ Fuchij, habere potius videret,
quàm cum Pentaphyllo, tametis neque incana sit planta, neque repat, sed humi duntaxat
diffusa sit.

MYLTAS facultate tribuunt Veteres Quinquefolio, quas ex ipsorum libris petere po-
terunt studiosi. An verò quas hoc capite descripsi stirpes similibus viribus sint prædix, me
latet: omnes tamen adstrictionis participes, ex quâ qualitate colligere possumus, in quibus-
dam, cum Quinquefolij facultatibus convenire.

HEPTAPHYLLON.

CAP. XIII.

Alchimilla vulgaris.



*Heptaphyl-
lon.*

B I N I aut terni, huic Plantæ, ramuli ab eadem exeunt radice, teretes, firmi, pedales, ut
plurimum, aliquot geniculis donati, cū quibus etiam folia, sex, septem aut pluribus di-
visuris insecta ad pediculum usque, tota incana, & veluti argentea, adstringētis & resiccā-
tis, ut & tota planta, gustus: ex geniculis similia etiā prodeunt folia, sed minora: circa extre-
mos & summos ramulos glomeratim nascūtur numerosi flocculi, Oleæ floribus persimiles,
parvi, stellati & albi: radix illi satis crassa, foris nigricans, dodrantalis.

Marais.

Provenit in Pyrenæis jugis apud Cantabros: memini & ante in Allobrogum Alpibus se-
rius florentem videre, cum apud Cantabros Maio floreat.

*Tormentilla
candula.*

Q V O nomine aut Veteribus, aut Neotericis, aut etiam à vulgo appelletur hæc planta,
mihi incognitum est. Heptaphylli nomenclaturam indidi, quod plerumque septenis foli-
is ex eodem pediculo dependentibus, aut folio septifariam vel in septem lacinias diviso
constet. Historia illa universalis Plantarum, quæ post mearum Hispanicarum Observatio-
num evulgationem in lucem prodijt, Tormentillam candidam vocat. Ego ad Alchimillæ
vulgo

vulgo dictæ (quam etiam albo flore variantem aliquando videre memini) genus aliquod ^{aut simile} potius referendam esse censebam, tamen Alchermilla folia non habeat tam altè dissecta: ^{anonym.} qualitates tamen non sunt dissimiles.

PLANTAGO.

CAP. XCII.

PLANTAGINES varia sunt genera, facies vulgaris nunc notitiæ, quorum cum ab alijs tradita sit historia, ab ijs describendis abstinere viximus: quædam tamen videre memini, quorum mentione, nemo, quod sciam, hæcenus fecit. Ea hoc capite comprehendere volui.

Plantago major incana.

Plantago peregrina latifolia. Gareti.



IN collibus Salmanticæ vicinis, alijs item Castellæ locis aridis, dum illic vivebam, Primum genus observabam, vulgari minus, folijs incanis, multaque lanugine obductis, humistratis, maximâ anni parte caule viduum, & floribus expers: inter multas tamen plantas, nonnullas animadvertēbam Maio mense ferentes exiguum spicam Plantaginis instar, minorem, plenam florum palleſcentium. Ejus radix tenuis, longa, & nigra erat.

ALTERA multa sunt lata folia, nervosa, illis ferme similia quæ in eo genere Plantaginis conspiciuntur, quæ à capite numerosis foliolis sibi invicem quasi imbricatis incumbētib; constante, & rosam plenam quodammodo emēnente, Rosæ vulgo cognominatur: inter quæ, quini aut semi progrediuntur nudi pediculi, capita mirum in modum variantia sustinentes: nam quædam Rosæ plantaginis capita æmulantur, alia spicæ instar sunt efformata, nonnulla ex mediâ rosâ brevem veluti spicam producunt, in quibusdam, ex infimâ spicæ parte, alia capitula dependent, alia aliter sunt efformata. Tota aurem planta magis incana est quàm vulgaris rosæ.

TERTIUM multa similiter ex radice promit folia Angustifoliæ plantaginis folijs non dissimilia inter quæ emergunt nudi etiam, ut in præcedente, pediculi, sive potius cauliculi, summo fastigio sustinentes capitula multis longiusculis folijs (minoribus tamen & angustioribus, quàm quæ ex radice nata) constantia, deinde interdum ex illis foliosis capitibus plures alij pediculi, quorum fastigio innascentur, spicarum loco, alia foliacea capitula, prodeunt tamen, & alij ex radice pediculi, foliacea dumtaxat capitula sustinentes.

Secundi & tertij iconem ad me mittebat Londino, honestissimus vir, & idem rei herbariz studio valde se oblectans, Iacobus Garētus junior mihi amicissimus, anno M. DC. XCII. Tertijs tamen plantam ipsam virentem ante conspexeram Londini in exculto orto N. V.

K K

Edwardi

1.
*Plantago
Salmantica.*

11.
*Plantago la-
tifolia. Gareti.*

111.
*Plantago an-
gustifolia
virens.*

Pede nudi.

Plantago angustifolia. Gareti prolifera.

Cynogloss.
Dixi. f. 174.

Plantago
aquatica
maior.



Holostium Salmanticense majus.

Holost.



H.
Holostium
Salmantic.
prostratum.

simile, theculis inclusum: radix est longa, tenuis, dura, & quodammodo lignola.

Ardis

Edwardi Points Angli, anno M. D. XCI. An verò utrumque genus semen ferat, ignorabam dum hæc scriberem. Tertium tamen pangi posse puto capitibus foliosis in terram depactis, & foris an etiam Secundum. Vtrumque genus deinde alui Lugduni apud Batavos, & larifolium semen præbere observavi.

Id porro, cujus primo loco memini, nō semel legitimum Dioscoridis Cynoglossum esse suspicatus sum: etenim si spicam florum (quā Dioscorides fortè non observavit, cum, ut dixi, maximā anni parte sine caule & flore conspiciatur) demas, nullam hæcenus ejus descriptioni exactius convenientem, inter tam varias plantas, videre memini.

Ceterum huic capiti, non incommode forsitan adnecti poterit, Plantaginis aquaticæ elegans genus, Plantagini aquaticæ humili Lobelij congenet, quod observabat & legēbat Doctus. Gulielmus de Mera Medicus, dum ex Italiâ rediret M. D. XCIII. mihi quæ Francofurti donabat.

Tota autem bumi fusa est hæc plantula, & foliola producta à radice, longiuscula & angusta, longo pediculo innixa, atque inter illa multos tenues cauliculos, humi jacentes, uncialis, aut paulò amplioris longitudinis, in capitellū destinantes, quod, exiles fibras (spargens, ijs se telluri figit, aliæque minora folia profertur: nec quæ, quin aut sem (florem non cōspexi) orbicul, tenuissimis petiolis innixi, qui in binas partes hiantes, semen valde exile ostendunt: ex ijsdem capitellis nascitur & alter capitellorum ordo, folia & orbiculos adhuc minores proferens: radices nil nisi exiles fibræ sunt.

Nascitur, ut apparet, uliginosis locis, vel ubi interdum lacunæ, ab imbris subito cadentibus, exorta fuerunt.

HOLOSTEUM SALMANTICENSE.

CAP. XV.

NON ignoro varias ostendi stirpes pro Holosteum, sive Holostio, quarum nullam adhuc offendisse puto, quæ Holostij veri descriptioni exactè cōveniat. Quæ tamen inter reliquas proximius veterū descriptioni accedant, illam esse arbitror, quam cum Mompeliiani tum Salmanticensis eo nomine donabant.

ILLARVM autem priores. Herbula est folijs ferè Plantaginis angustifoliæ, verum, longè & minoribus & angustioribus, crebris, pectatâ stratis, incanâ lanugine obstitis, subadstringente gustu: inter quæ quin aut sem cauliculi, seu potius pediculi nudi exiliunt, palmum alti, qui se à medio ad summū usque fastigium, nultis & sese mutuo contragentibus flosculis ex herbaceo candicantibus ornati sunt uti Coronopsis: quibus deinde succedit semen Plantaginis femini valde

Aridis collibus Salmanticæ vicinis provenit. Nusquam tamen majorem aut candidiorem observabam, quàm juxta Valentiam Hispaniæ secus vias. Flores proferebat Salmanticæ Maio: Valentiniæ autem Martio & Aprili initio. Natalis.

Holosteum Salmaoticum minus.



Crescit iisdem locis aliud ejus genus mollior minus, cujus folia Psyllij foliorum latitudinem obexcedunt, longiora tamen, & villosa quidem illa, sed minus incana superiore, ceteris prorsus illi simile, eodemque tempore flores. 17.
Holosteum minus.

Id genus etiam olim observare memini Mompe-
liano agro locis ineultis & aridis.

UTRAQUE hæc planta Salmanticensibus Holo-
steum dicebatur: posterior etiam apud Mompe-
lianos hoc nomine insigniebatur: mihi utraque Plan-
taginis angustifoliz genus potius viderur, licet (ut
dixi) nullæ proximius ad Holosteum descriptionem
accedant.

Holostei porro meminit Diosc. lib. IIII. Holes-
tion, inquit, herba est pusilla, tribus quatuorve digi-
tis extra terram supereminens, folijs viticulisq; Co-
lonopo aut Gramini proximis, gustu adstringentibus: radice albâ, præterea, usque in capil-
lamenti speciem, longitudine quatuor digitorum. Nascentur in collibus terrenis. Holestion
Diosc.

PLINIVS lib. XXVII. cap. X. Holosteon herbam esse dicit sine duritiâ, ex adverso (sive per
ἀντίρροπον) appellatum à Græcis, sicut fel dulciter reliqua, ut Dioscorides.

VSVS ejus ad rupta, in vino potæ, nam & carnes coguntur decoctionibus additâ. Holostion
Plin.
Fasculum.

LEONTOPODIUM CRETICVM.

CAP. XVI.



FORSTAN & ad Plantaginis angustifoliz, similitudineque elasse, referenda
ea planta, quam Fracorsurti à duobus ami-
cis ex Italia accipiebâ, diversa appellatione
insignitam. Amplissimus enim vir Iacobus
Aotonius Cortusius mittebat eam adhuc
tenellam, vestigia autem capitum adhuc
rerineotem, unâ cum icone, ipsam stipe-
m satis scitè referente, addito Catanances no-
mine. Iosephus verò à Casa bona ipsam
plantam maritima & aridam, ac recensè
Creta delatam, Leontopodij appellatione.
Diligenter autem conferens utramque cum
Leontopodij & Catanances descriptione,
animadverto notas aliquot habere satis
inter se convenientes. Nam quantum ex
tenella illa planta & icone, à Cortusio mis-
sa, colligere licet, herbula est statim à tet-
rà profertens quaterna aut quina folia, lon-
ga, angusta, tenella admodum & lanugi-
nosa, inter quæ multi emergunt pedicelli,
breves planè lanuginosi, ad terram inflexi,
summo fastigio subinfrèes aliquot capita-
la, multa lanugine obstita, in quibus flos, nò
satis còspicuus, ut, qualis sit, describi queat:
radicis summû caput quodammodo squa-
matum, à quo deinde ipsa radix descendens
paulatim gracilescit, & in multas fibras de-
sinit, fusco colore prædita. Planta autem
matura & sicca à Casa bona transmissa, in-
firmam foliorum partem duntaxat retine-
bat, cum crassiore radice parte fibris orba,
pediculos deinde breviores, crassos, maximâ ex parte lanugine suâ destitutos, capitula fe-
rentes crassiuscula & brevia in quibus apparebant quidâ albicantes flosculi nigricante um-
bilico præditi, quandam foraminum speciem præbentes: pediculi autem illi aded incurva-
bantur & contrahebantur ad ipsius radice caput, ut leoninum quodammodo pedem re-
ferrent (unde forte Leonopodion nomen) aut milvi exaomari contractis articulis pedem ex-
primerent, quâ postremâ notâ affinitatè cum Catanance primâ haberet, reliquis verò notis
KK 2 plotinum

Catanances
Cortus.

Leonopodion
Cortus.

Leontopod. Creticum aliud.

Leontopod.
Dreje.Catanance
prima Disf.Leontopodum
Pung.Catanance
Pung.Leontopodum
Bello.Tussilago al-
pina cano-
scens folio.

plurimum ad Leontopodij descriptionem accederet. Vtriusque autem historia ex Dioscoride proferam, addita tabellâ in qua utramque plantam recentem videlicet & aridam exprimi curabam, ut Leostores utriusque adminiculo facilius iudicium ferre queant.

DIOSCORIDES igitur lib. iiii. Leontopodium sic describit. Leontopodion duorum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine trium quatuorve digitorum, villosa, & juxta radicem majore lanx flocco incana: capitula in summo caule quasi perforata: in quibus flores nigri: semen usque ad spissâ lanugine involutum est, ut sæpe fallat: radice parvâ nititur, quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

CATANANCE autem primam tertio subsequente capite, hoc modo. Catanance una, folia Coronopi habet, longa, radicem junci instar tenuem, capitula sena aut septena, in quibus semen orobo simile. Arescens curvatur in terram, & similis sit unguibus mortui milvij.

PLINIVS etiam utriusque meminit: Leontopodij quidem lib. xxvi. Nat. Hist. cap. viii. Leontopodion, alij Leuceoron, alij Dorypetron, alij Thorybetron vocant, cujus radix alvum sistit, purgatque bilem, in aquam mulsam addito pondere denariorum duum. Nascentur in campestri, & gracili solo. Semen ejus porum, lymphatica somnia facere dicitur.

LIBRO autem xxvii. cap. etiam viii. Catanances mentionem facit. Catanancen Thessalam herbam, qualis sit, à nobis describi, supervacuum est: cum sit ejus usus ad amatoria tantum. Illud non ab re est dixisse, ad detegendas Magicas vanitates, electam ad hunc usum conjecturâ, quoniam arescens contraheret se ad speciem unguium milvi exanimati.

Tussilago alpina i. flore aperto.

HÆC cum de Leontopodio commentatus essem, misit ad me Dodis vir Honorius Bellus Cydoniâ, Cretæ insulæ urbe, Leontopodij suis coloribus expressam iconem, cum aliquot ejus plantis sicis multo veluti tomento obductis, quarum nonnullæ folia adhuc retinebant angusta, trinervia, capita florû inflexa & incurva, ad speciem milvinorû unguium, & unicâ spicas florum integras uncialis longitudinis nec cōtractas aut inflexas habente: ex quibus notis apparet hanc plantam è generibus Plantaginis angustifoliz esse. Iconem quam ad me mittebat, sculpsedam curabam, additâ in eadem tabella ejus plâtz figurâ, quæ spicas integras habet. Sed leostorem moneo, ne ipsum pigeat consulere primam Honorij ad me epistolam, quam ad horum Commentariorum calcem reperiet.

TUSSELAGO ALPINA. CAP. XVII.

B ECH I I Alpini perelegantia duo genera in Austriacarum & Striacarum Alpium jugis observabam, quorum descriptionem hoc capite dare voluimus.

QVI NA aut sena habet Primum folia, circinatæ ferè rotunditatis, Chamæcisso vulgari non valde dissimilia, in ambitu nōnihil sinuosa, & crenata, supernè rugosa, & nigri ætè viriditate splendentia, infernè candida & multo quasi tomento obfusa, exsiccante initio gusto, dcinde

deinde amaro; cauliculus nudus est, palmaris, concavus, in caoà lanugine pubescens, unicum florem sustinens mucosum purpurascens, maturitate in pappum evanescentem: brevi postea arefcit & perit iscauliculus, ut reliquo anni tempore, sine caule planta conspiciatur: radix fibrosa serpit, & in latum se diffundens, multas propagines agit tenuibus fibris sese firmantes.

Oritur in summis Austris & Scithæ jugis, & totos interdum cespites, cum Soldanellâ Alpina, cujus Tertio libro memioi, occupat. Sub Iunij finem ut plurimum floret, interdum vero tantum Augusto mense, pro aëris ratione & constitutione: in horis, maturius, Aphnâ videlicet, in quibus etiam cauliculus magis adolefcit.

Tussilago alpina i. flore evanido.

Tussilago alpina etc.



11.
Tussilago al-
pina glabra
folio.

SECUNDVM à Primo non multum dissidet, figurâ coim foliorum eadem est, sapor idem, flos similiter purpurascens, radix etiam summa tellure serpens, novâque plantas subinde producens: folia dumtaxat paulò ampliora nonnumquam conspiciuntur, neque ad eò splen- dent superoà parte, aut aversâ candicant: sed tantum modò nonnullis villis obsita sunt.

Invenitur id in superiore collis parte post Monasterium Neuberg ad radices cellissimi jugi ejusdem nominis. Postea etiam observabam inferioribus jugis aliarû Alpium, graminis locis. Initio, Afarinam esse existimabam, frustra tamen requirens flosculorum quos Matthiolus suæ Afarinæ adpingit, vestigia: sed flores in nonnullis deinde plantis conspecti, omnem dubitationis ansam præciderunt, ut certo statuerem possem Tussilaginis mootanz genus esse. Maio floret in horris translata & Aprilis, ubi formam non immutat, quemad- modum nec superiot: hujus etiam cauliculus paulò longior est superiore.

Sed subibat mentem cogitatio, eam stirpem quam Matthiolus Afarinam appellat, hoc bechium secundum esse posse, & illius iconem oco satis fideliter fuisse expressam, in qua for- sitan pictor ex arida plantâ, & ante quàm in florê abiret lectâ, emergentis primum floris ca- pitulum discernere non potuit: certè natales satis coveniunt. Sed nihil pronuntio: hæc dun- taxat monere volui, ut Lectoris occasionem præberem, de hac re accuratius cogitandi.

GALENVS Tussilaginis (cujus has plantulas genera esse non dubito) meminit libro vt. simpl.med. his verbis: Bechium ideo sic occupatum est, quod *βήχας*, hoc est, tussis, & or- thopnæas juvare creditur, si, qui quis videlicet folia atida sumens, aut radicem in ptanis ac- cendens, ascendente inde fumum inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, ut sine mo- lestia, ooxave, omnes rhoracis abfcessus rumpere credatur. Sanè vitentia folia partes crudâ in inflammatione obfessas, illitu extrinsecus adjuvant, propter aqueæ humiditatis admistionem, qua omnia viridia, renereque participant, alia plus, alia minus.

MATTHIOLVS potè suam Afarinam asserit, modicam abstergendi vim habere, sed at- tenuandi, incidendi, aperiendi que magis præstantem: potam drachmæ pondere ex multâ, si- ve oxymelite alvum exolvere, ducereque crassam pituitam & atros humores: ideo novos quosdam herbarios præferre ad luis veneres dolores & articulorum morbos: dari utili- ter hydropicis, & morbo regio laborantibus, nec deesse, qui ad comitiales & resolutos eam propinandam consolanar, nempe aut herbam per sese, aut ejus decoctum: urinam ciere & menses, & vermes intestinorum necare.

CALTHA palustris quorundam, sive potiùs CHAMÆLEYCE pleno flore. CAP. XVIII.

PLANTAM illam circa rivos aquarum & uliginosis pratis nascens, quam vulgus Herbariorum Caltham palustrem, nonnulli Chelidonium aquaticum appellant, Do- ctissimus Anguilara Opinonum lib. xti. Chamæleucem Plinii esse existimat, ipsèque ad- huc

Caltha pa-
lustris.
Chamaeleu-
cis.

Caltha palustris vulgaris.



Caltha palustris pleno flore.



adhuc nominibus cognitam dicit Patavino agro, quibus Plinius Lib. xxiii. cap. xv. eam donat, nempe Frani (Plin Farrani) & Farfugy. Cl. Matthioli commentarijs in Lib. r r r. Diosc. cap. de Tuffilagine, ejus opinioni assensitur, assensuuntur & alij.

Cum verd illa (ut quæ in singulis regionibus nascatur) omnibus nota sit, & à reliquis qui Styrpium Histórias evulgarant, delcripta, supervacuum esset ejus historiam hic repetere: iconem tamen subijcere necessarium duximus, ut conspici queat, quale discrimen sit inter ipsam, & aliam quam observabam, ejus nunc historiam dabimus.

MULTA autem habet, Aliud illud genus à me observatum, folia, circinate fere rotunditatis, succulenta, venosa, in ambitu nonnihil, vulgaris foliorum instar, serrata: prodeunt inter illa palmares caules, interdum etiam (si udo pinguique solo nascatur) pedales & majores, obliqui, in aliquot alas divisi, quæ, ut plurimum, vulgaris more, ex summo geniculo binos proferunt flores, uncialibus petiolis innitentes, multiplici foliorum texturâ constantes, coloris plane autei, quorum quina inferiora, reliqua veluti sustentimenta & amplectentia, majuscula sunt: radix, non minus quàm vulgaris, multis candidis crassiusculisque fibris prædita est. Floret eodem, quo vulgaris, tempore, interdum etiam denuo Autumno.

Ex Salzburgernsibus pratis (in quibus copiosè nasci intelligebam) primum Viennam Austriæ delata, Nobilibus Matronis cepit esse in delitijs, cum istic viverem: postea, etiam ex Augusta Vindelicorum acceruita: verum non adeo elegans ut prima, sed paulo humilior: ejus item folia minus vegeta, & quasi palleſcentia: flos etiam dilutior, & magis palens. Augustanz fere similes plantæ paucæ, inventæ sunt pratis quibusdam uliginosis, Francoforto ad Mœnum vicinis, anno M D xci. aliquot etiam flore quidem pleno, sed rarioribus folijs constante, quæ in hortum illatæ, sequente anno, simplici florum textura præditos tulerunt flores, instar vulgaris. Abijcere tamen nolui: nam experiri volebam an anno M D xciii. simplices flores porro ferre pergent: verum per infortunium non licuit: quam autem Lugdunum Batavorum detuli, ut istic etiam observare liceret, simplum forem mihi semper præbuit.

CETERVM Plinius Chamæleuces radicem imponi scribit carbonibus Cupressi, atque cum nidorem per infusum bulum imbibi in vetere tulli.

CACCALIA.

AD Tussilaginis etiam genera, haud dubie referenda est planta illa, quæ, in omnibus Austriacis Satriacisque jugis obvia, à nonnullis Cacalia appellatur, cujus duo genera observabam.

Cacalia incano folio.

Cacalia glabro folio.



VNUM multis præditum folijs, Tussilaginis vulgaris folijs pæne similibus, majoribus tamen, mediisque inter illius, & alterius majoris, Petasitis vulgo creditæ, folia, quodammodo magnitudinis, circinatæ ferè rotunditatis, in ambitu serratis, superne dilutius virentibus, inferne incanis, in quibus multe apparent venæ sive nervi, gustus ingrati, amariusculi, & calidi, innituntur autem purpurascens & striatis pediculis: caulis illi bicubitalis interdum, striatus, purpurascens, non secus ac foliotum pediculi, cui per intervalla innascuntur alia folia oblongis pediculis prædita, supra dictis minora, magis angulosa, etiam in ambitu serrata: supremus caulis extremique ramuli purpurascens in capitulorum congeriem instar umbellarum setunt, in quibus terni plerumque flosculi quaternis foliolis, bifidoque stilo constantes, purpurascens coloris, odorisque valde tenuis, non tamen ingrati, qui deinde in pappum seu lanuginem abeunt (perinde fere ut Eupatorii aquatici flores) in qua oblongum semen latet: radix in multa capita extubet, frequenterbusque candidis, longis fibris donata est, singulis annis novos caules ad latera proferens.

1.
Cacalia vul-
garis incano
folio.

ALTERIVS folia magis cutacea sunt (si sic loqui licet) & duriora, superne saturatius virentia, nec subius incana, nec antetiorre parte, qua pediculo inhaerent simul coeuntia ut in priore, pediculisve striatis innixa, sed rotundis & levibus, petinde tamen ut illa frequentibus venis ornata, & in ambitu serrata, ingrato similiter gustu, amariusculo & calido: caules etiam leviores, & flosculi dilutiores: in ceteris conveniunt.

2.
Cacalia gla-
bro folio.

Nascuntur commemoratis jugis ad silvarum margines, inter frutices, & umbrosis locis.

OBSEVAVAM & aliam quandam plantam in montanis pratis nascentem, secundum villarum stabula, cujus folia postremæ Cacaliæ folijs valde erant similia: neque radix etiam erat dissimilis. Verum & eandem illam semper deprehendi: nec unquam ab illis montanis hominibus intelligere potui florè mne ferat, an non.

Cacalia rub-
ra plant.

TAMETSÏ porrò dubitari possit, an quæ Cacaliæ nomine vulgo agnoscitur, cum Cacaliâ Dioscoridi descripta, & Plinianâ (quæ & utrique Leontice nuncupata) conveniat: facultates

Cacalia
Diosc.
Ca. alia Plin.



Pyrola l. vulgarior.



facultates tamen uterque suæ Cacalix tribuit à Tussilaginis (cujus haud dubiè hæc nostra Cacialia genus est) facultatibus non alienas. Scribunt enim Dioscorides Lib. 1111. cap. De Caciali ejus radicem in vino madefactam ut Tragacanthia, delinctu & manducatu per se tussibus, & arteriæ scabritijs mederi. Plinius autem Lib. x. xvi. Nat. Hist. cap. v. i. radicem Cacialis commanducatam, & in vino madefactam, non tussitantum, sed & faucibus prodesse.

Abundat etiam in Pannoniâ, Austriâ & Sciriâ sponte crescentem reperiobam plantam illam quæ vulgo Petalites credita est, doctiorum tamen omnium judicio, inter Tussilagines referendam, & à foliorum amplitudine Tussilaginem majorem nuncupandam. Eam albo flore variantem aliquando videte memini.

PYROLA.

CAP. XX.

VULGARIS Pyrolæ binas observabam differentias: unam, satis amplum molleq; folium habentem: alteram, minus & durius, Solidanellæ alpinæ minoris folio termè æquale, nascentem utramque plenisque Pannoniæ, Austriæ & Sciriæ locis, cum paulo edulioribus inter frutices, tum herbis ad quorundam sicciorum pratorum umbrosos margines: omnium autem copiosissimè silvosis quibusdam pratis ad Maubach Cartusianorum conobium in Viennensi saltu situm, atque etiam in silvâ arcis Entzessorf im langhe thall proximâ, quinto ab urbe Viennâ germanico miliari, sive unius fere diei itinere. Sed cum vulgarioris historia, à

Petalites
vulg.

Petalites
albo flore.

Pyrola
vulg.
differens.



pleurisque

plerisque alijs fit prodita, eam retexere non est operæpretium, ejus duntaxat mentionem facere volumus, ut prolata ejus iconē, tria alia genera ipsi subiceremus, à nemine ante quàm Pannonicarum Stirpium Observationes in publicum emitterem, adhuc descripta.

Pyrola II. tenerior.

Pyrola III. fruticans.



DIFFERT autem Primum genus à vulgari, cauliculorum gracilitate, & foliorum florumque tenuitate: hujus enim folia non adeo crassa carnosaque sunt, sed tenuia admodum, mucronata, in ambitu tenuissimè serrata, atriora, pyriq̃ue folium referentia: flos in cauliculis vulgaris pyrolæ flori similis, minor tamen, & frequentior: ei succedunt pentagona, ut in vulgari, capitula stilo prominente, tadix etiam serpit, non minus quàm vulgaris radix, & subinde nova germina è longis pediculis sub musco latentibus prosert.

11.
Pyrola
tenerior

Crescit in Alpium Austriacarum & Siniacarum jugis, loco umbroso inter frutices muscumque terrestrem, sed uberrimè in silvâ illâ jam memoratâ arcj Entzelltorf vicinâ. Memini etiam olim colligere in jugis Lausannæ Allobrogum ad Lemannum lacum proximis. Florer Junio & Julio, interdum etiam Augusto.

Mutabil.

Miror autem quid Dalechampium moverit, ut hanc inter Ambrosias collocet, Ambrosiamque montanâ nuncuper, quàm si degustasset, non dubito, quin sententiam mutasset, nam longè aliud hujus temperamentum quàm Ambrosiæ.

ELEGANTISSIMUM est Alterum genus, interdum quodammodo fruticans: nam novelli brevèque ramuli, singulis annis succrescentes, aliquot annos firmi viridèque permanent, & supra tellurem eminent, donec tandem pondere suo depressi, humi procumbant, & musco se condant, fibræque interdum agant: folia ut plurimum ad singula internodia, ubi novi ramuli succrescunt, bina, terna, aut quaternaria habet, carnosâ, superne saturatius virentia & splendentia Chamædaphnes (quàm vulgus Laureolam vocat) folijs, formâ & magnitudine propè similia, in ambitu ramen serrata, gustu admodum exsiccante, deinde amaricante, ut reliquarum Pyrolarum folia: ex horum medio solent Aprili nova germina prodire, quæ foliis veluti squamulis prædita, in virgulas tandem desinunt, quibus terni, quaterni, interdum etiam quini insident flores, vulgaris Pyrolæ floribus similes, paulo tamen majores, ex albo purpurascetes, quibus excussis, succedunt pentagona capitula, tenui semine instar scobis plena, quæ cum suis virgulis hieme exarescunt: radix, siue potius cauliculi sub musco latentres, longè lateq̃; summâ tellure sparguntur, & subinde fibras agunt.

111.
Pyrola
fruticans.

Abundè provenit in silvis Entzelltorf, generosi Dn. Wolffj Christophori ab Entzelltorf arcj ante memoratæ vicinis, vulgari & Primo permixtum interdum, ubi anno M D LXXIX. primum observabam, & ab incolis Wintingum (quod hieme vireat) communi cum vulgari nomine

Mutabil.

1177.
Pyrola minima.



Natalis.

Lunaria botrytis, minor.

Facilis.



Lunaria minor botrytis.

nomine appellati intelligebam. Audiebam & in Bohemicis silvis frequentem, mihi tamen illas penetranti, dum eodem anno Viennâ irer facerem Pragam, & inde Nonbergam, videre non licuit. Sed & in Silesiâ nam similem plantam, iconem etiam addidit, sequente anno ad nos mtrebat doctus. vir Fridericus Sebizi, Ducis Brigenfis Medicus.

MVLTRIS etiam ferpit Tertium sub summa terrę cute viticulis, quæ terna aut quaternæ eodem ortu nascuntur interdum gerunt foliola, Pyrolæ primæ, non vulgaris sive illius tenerioris quæ ante hanc tertia est, folijs formâ serè similia, sed longè minora, tenuiora, magis orbiculata, & in ambitu, etiam setata: inter quæ pediculus eminet binas serè uncias longus, nudus, tenellus, summo fastigio sustinens unicum florem satis magnū, quinque mucronatis folijs constantem, Graminis Parnassi, vulgo vocari, quod Cordus Hepaticam albam appellat, florem, propemodum formâ referentem, decem reflexis staminibus medium orbem exornantibus, & capitulo in medio protuberante, stilūque exerente coronulâ quinque radijs cōstante ornatum: sunt ea capitula temporis successe satis crassa, pentagona, quæ matura, copiosissimū semen minutissimum, scobis ligni à veribus erosi instat, continent. Tota planta amaritudinis manifestæ particeps.

Nascitur umbrosis locis in Alpibus Sneberg, Hochbergerin, Durrenstein & alijs vicinis circa radices summorum illorum jugum. Florer sub finem Iunij & Iulio: semen Augusto maturum.

Non dubium est quin omnes hæ plantæ similibus cum vulgari Pyrola facultatibus sint præditæ, quandoquidem eadem qualitates habent.

DESICCAT autem, adstringit, & glutinat vulgaris Pyrola: Foliorū succus illius, recentia vulnera sanat. Idem etiam præstant folia. Eorundem ex vino decoctum, si bibatur, interna vulnera sanare creditur, propterea vulnerarijs potionibus addi solet.

LUNARIA MINOR RAMOSA.

CAP. XXI.

CRESKIT etiam in Pannonicis, Noricisque, ex veterum Geographorum descriptione jugis, præsertim verò in pratis quæ silvis cinguntur, ante quàm suprema Alpium supercilia attingas, Lunaria illa minor, quæ & botrytis cognominata, cujus histonâ plectique descripserunt, & facultates mirè commendarunt in internis vulneribus: quamq; C. V. Fab. Columna Epimedium Diosc. esse censet. De illa autem hic agere non est animus, sed de alia ejus specie tantissima, quam quidem nullibi nascentem vidi; sed in Silesiæ quodam monte natam, & erutam, ad me mittebant Viennæ Austriæ Doctissimi Viri Fridericus Sebizi & Achilles Cromerus

Medici, fidâ amicitia mihi conjuncti, cum Pannonicarū Scirpium Historiam describerem.

DODRAN.

Lunaria minor ramosa.



DODRANTALIS autem est planta, statim à radice, unam aut aliam foliorum alam, sive folium ramosum & multifidum, frequenteribus folijs, vulgaris Lunaræ minoris folijs ferè similibus conitans, sed longioribus & crassiusculis, crebrèque incisurà divisis, colore, ut in vulgari, viridi dilutiore & quodammodo palliescente: secunda ala, ut quæ tenerior, & postremo nata, tenui quadam, sed rarè admodum lanugine pubescente videtur, succulentiorque est prima: ex ejus quasi utero, secundum radicem emergit cauliculus pinguis & succulentus, sustinens multifidam & majorem uvam (florise an fructus dicere debea, hæreo) quàm vulgaris, alioqui admodum similem, quæ an in albam farinam, quemadmodum in vulgari resolvatur affirmare non auiam, quandoquidem nondum maturæ cruræ fuerant, quas accipiebam plantæ, inter quas una fuit quæ ternos botros protulerat: radix vulgari instar, multis fibris latè in ambitum sparsis, crassioribus tamè, constat.

In alnis Silesiæ montibus gignitur: apparere autem & florere eodem cum vulgari tempore nobis significabant. Ioannes Nicholitzius Medicus Viennensis, ad quem etiam mittebatur ab iisdem amicis aliquot recentes ejus plantæ, sæpe in hortum suum intulit: sed comprehendere noluerunt, omnem enim culturam respicere videntur, quemadmodum plerique aliz montane.

LYNARIA minoris aliam elegantem speciem etiam ramosam exhibet C.V. Ioachimus Camerarius.

Camerarius Ioseph. F. Archiatros Noribergensis ex Anglià allatam, in Epitome Matthioli ab ipso diligenter auctà & locupletatà.

Ceterùm Silesij suam illam ramosam *Rechter wibberhans* appellant, hoc est, Trichomanes legitimum. Vulgatem verò Itali *Lunaria del grappolo*: Germani *Wintanten* & *Wintant* nominant.

VULNERARIAM autem esse plantam, omnes Recentiores rei herbariæ scriptores tradunt: poram, in tinnitibus corporis fracturas curare, & extrinsecas illitam: mirè etiam commendatur ad puerorum enterocelas: tota planta in pulverem contrita ex vino austero pota utilis esse perhibetur dysentericis, & albas uteri fluxiones, simul etiam tubercles, sistere.

DENTARIA, vulgo dicta.

CAP. XXII.

EIVS Plantæ quæ à dentatà radice, apud Recentiores rei herbariæ scriptores, Dentariæ nomen obtinuit, varia sunt genera, à me quidè varijs in regionibus observata: sed non omnia descripta, quia ex his nonnulla etiam ab alijs prodita memoriæ. Singulorum tamen quæ observabamus, mentionem hoc capite faciemus, ab ijs exordium facientes, quæ radicem maximè dentatam habent, & æquallæ sunt.

PRIMA autem sit illa, quæ Cordo, quæ Matthiolo, fuit cognita, longà & crassà radice, ex multis veluti dentibus squamatis compactis, constante, nullum caulem, nullum folium ferens, sed succulentum pediculus duntaxat promens, pedalem, leimodati pediculo ferè æqualem, floribus etiam illis formà similibus onustum, coloris carnei elegantissimi, illis in semen abeuntibus, marcescit eaulis, nulloque alio plantæ vestigio relicto, radix reliquo tempore sub terra latet.

Multis locis nascitur, frequentem tamen reperiebam in Leytano saltu, sive Leytenberg supra ocpidum Manderstorf, & Viennensis silvâ, inter frutices umbroso loco nascentem, & Aprili florentem. Postea illius radices forè etiam eruebam lunio anni M. D. XC. in nonnulis Francosurtoad Metenum vicinis & ei urbi ad Septentrionem objectis (cùm alias stupres exire vellem) sub arboribus & fruticibus crescentem.

ALTRA tota tenella est, radicemque habet caudidam, è multis veluti denticulis congestam, cauliculum, seu potius pediculum proferentem dodrantalem aut paulò ampliorè, fusci plenum, & quasi transparentem, candieantem, foliorum expertem, quibuldam tantùm velut articulis distinctum: qui flores summo fastigio gerebat binos aut ternos alternatim



ternatim dispositos, ex albo purpurascētes, nigrae violae, aut verius orchidis seu leimodari
florum amulos, & valde tenellos.

Heracle. Florentem Augusto mense inveniebamus ad radices Etscheri jugi (dum illud anno re-
paratae salutis humanae M. D. LXXVIII. per silvam conscenderemus) sub abietibus, alijque
hujus generis arboribus, quod sol vix unquam penetrat, nullaque prope aliae stirpes nascun-
tur. Similem porro etiam Augusto mense florentem pedalis altitudinis cauliculo succu-
lento, plures flores omnino niveos ferente, simili formâ praeditos, prominentibus ex hauri
purpurascētibz villis, majore copiâ sub abietibus & fagus umbroso admodum loco repe-
riebam, dum quinquēnio post, ex Sneberg, comite ibicum venatore itineris duce, per aliud
jugum in Rehenaw descenderem. Sed & illa amplior adhuc, plurimibzque floribus onusta,
anno M. D. LXXXIX. eruebatur in silvâ Francofurto ad Moenum vicina, Junio mense.

Heracle. TERTIA flores sunt quinque aut sex, minores, orchidis pumilz floribus pares, simili-
ter ex herbaceo pallēscētes (labro tamen propendente exalbido, & circa umbilicum pur-
pureis radijs insignito) in odori, spicæ in specie in palmari cauliculo enascentes, folijs caren-
te, & subfuscis veluti vaginulis recondito: radix illi ramosa, coralij instar, porius alba, succi
plena, nullis fibris cohaerens, amariusculi saporis.

Heracle. Hanc duntaxat observabam Maio mense florentem, anno M. D. XXX. in silvâ recens casâ,
paudâ supra Entzestorf in langhe thal ante memoratâ.

Heracle. OB LONGA serpit radice Quarta, dentatâ quidem, sed veluti ex multis nodis constan-
te, albâ, interdum etiam pupurascēte, subinde ex lateribus novas propagines generante,
ingrato, & linguam primum siccâe gustu, deinde acutæ cujus lateribus prodeunt oblon-
go pediculo, sive costæ (quæ secundum terram pupurascit, postea viridis est) inhaerētia fo-
lia, quina plerumque, interdum plura, magnâ ex parte inter se opposita, alteroq. latere tan-
tum crenata, eo, quod imparem numerum facit, & extremâ alæ insidet, duntaxat utrimque
crenato, gustu initio acido, postea acri & fervente: caulibus cubitalis est, gracilis, nudus, quem
circa medium binæ aut ternæ alæ, interdum plures, ex tribus tantum modo folijs, jam de-
scriptis respondentibus, constantes ambiunt, superna verò pars oblongis angustisq. folijs,
nunc le viter, modò nihil crenatis, confuso ordine obrita est: extremo cauli insident quater-
ni, quini, aut plures flores, Leucoij, aut Hespēdis florum quidem amuli, sed minores, qua-
tuor folijs albis aut ex candido leviter pupurascētibz, praediti: quibus succedunt silique
seu cornicula, Sinapi corniculis similia, breviora tamen, quæ, una cum suis pediculis mar-
cescētia, plerumque decidunt & pereunt, nonnumquam tamen crassefunt & matura, se-
men fe-

Dentaria tri. baccifera.

Dentaria v. tri. follos.



men ferunt Hespēdis semini ferē par, quod dissilientibus corniculis excutitur. Sed præter id semen, aī singulorum ferē foliorum, quæ caulem ambiunt alas & exortum, tubercula quædam adnascuntur, bulbulis Lilij cruenti illius quod Marragon bulbiferum vulgo appellatur, haud absimilia, ac velut ē squamis compacta, initio viridia, deinde pulla, ingrati admodum gustus, quæ facillimē decutuntur, & præmatura sponte decidunt, terræque sepultra, novellas plantas gignunt.

Reperitur, ut puto, hoc genus in omnibus Germaniæ mōtanis silvis. Nam memini crue- Natalis.
re suis bulbulis onustum anno M. D. XLVIII. comite C. V. Andrea Hyperio, in silvis Hassiæ non procul Martpurgo, & doctis vir Ludovicis Ioachimi F. Camerarius, plantam aridam ad me mittens Viennam, in Misniā inveniri significabat, ego verò, dum illic agerem, aliquones vicinis Viennæ saltibus, opacisque silvis Austriæ, Stiriz, Carinthiz, Pannoniæque observabam, demum etiam vicinis Francoforto ad Mœnum montanis silvis cum illā primā ἀφύλλω sed & anno M. D. XCII. vir doctissimus idēque politissimus Ferrantes Imperator Francofurtum ad me mittebat Neapoli Apuliz cum alijs elegantibus stirpibus. Florere autem solet Aprilis: bulbuli nigricantes Maio conspici, alarum cavis inhaerentes.

CAULEM profert Quintæ pedalem, firmum, rotundum, lævem, quæm, in summo ferē, v. Dentaria tri. follos.
ambiant terni pediculi (rarissimē plures) singuli terna folia sustinentes, ampla, mucronata, in ambrū ferrata, sarura ē virentia, gustu fervido: summum caulem exornant quini auriferi flores, quatuor folijs constantes, Dentariæ Heptaphylli florum æmuli, decursum spectantes & propendentes, colore ex herbaceo pallescēte: flores sequuntur oblonga cornicula, corollā, mucronatā, qualia sunt Dentariarum Pentaphylli & Heptaphylli cornicula, & in his etiam simile semen, hoc est, Hespēdis ferē, sed crassius atque virescens, quod dissilientibus corniculis exilit, antequam potē maturum videatur: alia præterea folia à radice profert, terna tantum in singulis oblongis pediculis nascētia, superioribus multo ampliora, sed breviora: radix novellā albā est, crusta nigricat, multis articulis sic distincta, ut ē plurimis dentibus coagmentata videatur, Dentariæ ἀφύλλω radici non valde absimilis.

Exit in umbrolis Austriæ, Stiriz, Carinthiz, Pannoniæque silvis, non modò ad montium Natalis.
radices, sed etiam circa mediam eorum regionem, ubi præ altarum arborum silvæ ut plurimum, in Alpibus hujusmodi, detinere solent. Inveniebam & ultra Dravum, in monte Grebén imminente, cum Quarto genere bulbifero: atque etiam Heciniā silvā Bohemiam ambiēte.

Floret Aprilis, vicinis Viennæ Austriacæ silvis, & alijs humilioribus: semine prægnans est, Tempus.
Majo. At in montibus, hæc omnia feruūt.

Dentaria vi. πενταφύλλος ι.

Dentaria vii. πενταφύλλος ιι.



vi.
Dentaria
pentaphylla.

vii.
Dentaria
pentaphylla
aurata.

viii.
Dentaria
leptophylla.

Katala.

SEXTAE à radice nodosâ, & in plurimos articulos distinctâ, tenuibusque aliquot fibris ex articulorum distinctione prodeuntibus donatâ, exeunt aliquot folia, longis pediculis nixa, in quinque profundas & ad pediculum usque sectas lacinias, in ambitu erenatas, divisa, scabra & tactu aspera, saturè virentia: caulis pedalis aut amplior, rotundus, quibusdam ex intervallo folijs, alijs paribus, donata, summo fastigio quinos aut tenos flores bulbifera floribus similes gerens, colore tamen paulò magis saturatè purpurascente, qualis scèrè in floribus Violæ latifoliæ non vivacis, quam nonnulli Lunariam Græcam appellant: succedunt longiora cornicula, s: mine, quales Quarta & Quinta habent, plena.

M A C I S est dentata Septimæ radix, sive inæqualis, & pluribus crassis squamis, quemadmodum propè Primæ radix, exasperata, & raris fibris inter illas nascentibus, prædita, ex qua prodit caulis rotundus pedalis, in quo per intervalla quina folia longiusculo pediculo subnixa, lœga, in ambitu ferrata, molliora quàm in superiore, neque adeò saturâ viriditate prædita: flores in summo fastigio Sextæ floribus per similes, quatuor videlicet folijs, Leucij florum instar, constantes, colore Sextæ floribus non dispari.

O C T A V A E aliquot è radice exeunt folia, quina in rerdum, sed maximè ex parte septena, longè costæ in hærentia, foliorum fraxini instar digesta, hoc est, ut ex adverso bina semper respondeant, solum impar extremam alam occupet, omnia in ambitu ferrata, dulcius virentia quàm Sextæ folia & tubus candicantia: caulem etiam pedalem, rotundum, binæ aut ternæ foliorum alæ, ijs quæ à radice prodeunt non dissimiles, ornant, ejus autem summum, flores Superionis floribus pares, quatuor videlicet folijs constâtes, candidi tamen coloris: cornicula quæ succedunt, etiam paria, simile semen continentia: radix minus squamata, quàm præcedentis, Quintæ radici fermè respondens, & paucis crassioribus fibris firmata.

Sextam & Octavam ad Allobrogicarum Alpium radices supra Lemanum lacum, sponte nascentes observare memini, ante quadraginta annos, dum per Helvetios, è Galliâ Narbonensî, in patriam redirem, præclusâ per reliquam Galliâ viâ, fruente bello inter Imp. Carolum V. & Galliæ Regem Henric. II. Septimam autem Machliniæ nascentem conspicebam in cultissimo horro Ill. Vm Ioannis de Brancion, mihi semper carissimi fratris loco habiti, ex Allobrogibus aut Italiâ acceptam. Quin & doctissimus Vir Ferrantes Imperator, in eo catalogo stirpium bulbosarum & tuberosarum, quæ Neapolitano regno nascuntur, quæcumq; mittebat ad Ill. Virum Ioan. Vinc. Pinellum (qui meo nomine hoc ab ipso petierat) enumerat Dentanas Quinquemfoliam, Septemfoliam & Corallinam, quam vulgo

Dentaria VIII. *ἡν ἀφύλλος.*

nuncupari ait *Segueta Romana*, & à levibus quibusdam mulerculis usurpata ad amatoria. Illas verò nusquam in Pannoniâ aut vicinis regionibus conspiciere licuit.

Segueta Romana.

A. v. porro vetenbus fuerint notæ hæ Plantæ, nondum mihi constat. Priorem Cordus Anblatium cognominavit à Germanica voce *anblis* quasi dixisset foliorum expertem, quia nulla in caule sive pediculo flores sustinere, nec ex radice exeunna conspiciuntur, in hac planta, folia: Marthiolus, à radice détata, Dentariam majorem appellavit: mihi non incommodè Dentaria *ἀφύλλος* major dici posse videtur: à rhizotomis mulerculis *Θ. Γεωργίου* / hoc est S. Georgij radix nuncupatur, quod fortè circa diem D. Georgio nuncupatum, interdum germinare conspiciatur. Alteri Dentariæ *ἀφύλλος* secundæ sive minoris nomē dedi, vulgare nullum nomen intellexi: quemadmodum nec Ternæ, quæ Dentaria *ἀφύλλος κοραλλοειδής* (à radice corallini rami speciem referente) à me cognominata est. Quartam, Dentariam bulbiferam sive bacciferam appellari posse arbitror: ea autem esse videretur, quam Cordus lib. Hist. Stirpium II. cap. CXI. Coralloidem appellat: Austria vicinarumque regionum incolæ *Βαννίου* / id est, Sanieulam albam, rhizotomæ autem mulietculæ, quæ multas stirpes in Viennensi foro venales proponere solent, *Βαννίου* / à facultatibus quibus eam polere putant, vocant. Quintam inirio Dentariam

Nomina.

ἡν ἀφύλλος cognominaveram, quia tres illæ foliorum alæ contrariis inter se pediculis in summo ferè caule nascentes, & singulæ ternis folijs præditæ juvenarium numerum explebant: nunc *τρίφυλλος* appellare magis placet, quoniam terna duntaxat in singulis pediculis folia nascuntur. Sextam, Cordum, Coralloidem alteram, dixisse, nonnulli arbitrantur, Marthiolus Dentariam minorem? mihi Dentaria *κοραλλοειδής* prima à foliorum uni pediculo inhzerentium numero, non inèptè *κοραλλοειδής* dici posse videretur: quemadmodum nec sequens Dentaria *πενταφύλλος* altera. Octavam similiter, si quis à foliorum numero quæ in eodem pediculo nascuntur, *ἡν ἀφύλλος* nominaverit, non erabit, meo judicio.

Coralloid. Cordi altera. Dentaria minor Marth.

SEPTIMAE, & OCTAVÆ meminit Iosias Simlerus ad finem Commentarij de Alpibus, his verbis. *Wilder Gass* / herba ejus nominis duarum specierum reperitur. Prior uno pediculo septena habet folia, supremo caule multos flores purpureos & partim albos [*albos ego duntaxat conspexi*] post quos cornicula subnascuntur semen continencia minutum [*non satis exactè observasse videtur, nam Hesperidii semini dissimilissimum est*] compressum: radix subest alba, alabastrini modo splendens, squamea. Altera quinque folia habet uno pediculo, [*florem qui Hesperidii purpurascens flore, vel Lunaria græca inodora est, non vidi se existimo*] aliàs superiori non dissimilis: tota substantia utriusque acris est, sinapi æmulans, aut raphanum. Ad cubiti altitudinem crescit, umbrosa loca amat & latice, primo Vete statim emergunt. Aliqui Pulmonariam hanc vocant.

Hæc Simlerus, ea Gesnero, Joanni Fabricio, & Benedicto Atetio, veteti meo amico, accepta referens.

CETERVM nullas istarum Plantarum, quæ hoc capite descriptæ sunt, facultates compendi, præter eas, quas Viennenses mulerculæ Quarto geneti artibunt, nempe, quod ejus radices decoctum, pueris tormina parientibus propinarum, utile esse credant, unde nomen ab illis plantæ inditum: & quas Marthiolus Dentariæ pentaphyllo adscribit Commentarijs in Diosc. lib. II. cap. de Symphiro, nempe in porionibus ad enterocelas, internæque vulnera, præferunt ad ea quæ in thoracis cavitatem penetrarunt, radices prodeste.

Facultates.

PLUMBAGO quotundam.

CAP. XXIII.

MYLOS ab una radice caules emittit cubitales, aut ampliores, plurimis ab infimâ parte, ad summum usque, ramis lentis & sequacibus divisis: folia habet Lepidij, minora, stitidis ferè, viridia, siccule, acerrimi gustus, & urentis facultatis: flores in summis ramulis confertos, membranaceo, & hispido glutinæque quodam obfuso caliculo inclusos, quinque foliolis constantes, ex purpurâ cæruleos: semen nigrum, exiguo avenæ deglubæ

Plumbago.

L. L. 1 grano

Plumbago quorundam.

Natalis.



Leidum
Anton. Mo.
brisen.
Molybdana.

Draba i. vulgaris.

I.
Draba vul.
gana.



Natalis.

II.
Draba al.
tera.

bus adnumeranda, qui terrâ obruti, aut sub illâ sese condentes, atque etiam summa tellure, serpente

grano simile: radicem albam, longam, digitatis crassitudinis, unicam, in novellâ (qualem hic exhibemus) plantâ: sed, ubi adolevit, multitudine, longè latèque sese spargentem, atque ad ipsum, unde propagines illæ dependent, caput, novos caules sapenumero proferentem.

Provenit pleticis Hispaniæ & Lusitanie locis calidioribus, juxta vias: varijs item Gallie Narbonensis, & ejusquam vocat Provincie, observabam. Serius autem floret: in Belgicâ certè, tarò admodum, & non nisi Septembri: eaque de causâ, tametsi floreat, semen ad maturitatem nunquâ illi pervenire porcèst. Vientis autem de unâ atque alterâ, quam semine natam alebam, plantâ (cum ætatis fervida) maturum colligere memini.

ANTONIUS Nebrissenfis hanc plântam Lepidium vocavit. Sunt qui Molybdenam, hoc est, Plumbaginem Plinij putent: vulgo Herba S. Antonij dicitur. Mompellianis meo tempore Dentilaria appellabatur, quòd dentium dolori mederi crederetur, etiam manu retenta. Granatenses vulgò Belesia vocant.

PLINIO, Molybdena commendata, si oculus subinde elingatur, vel (ut alij malunt) liniatur, plumbum (quod est genus vitij) ex oculo tollitur.

DRABA.

CAP. XXIIII.

SATIS vulgaris notitiæ est Draba, & ab alijs etiam descripta: quia tamen in Austriâ valde frequentem observabam, nò potui ejus historiam alijs cõgeneribus stirpibus non adjicere, præsertim cum duæ aliz species sese mihi obtulerint, sub ejus classem, meâ opinione, referendæ.

PEDALES igitur habet Draba caules, striatos, tenues, firmos, quos inæquali ordine ambiunt uncialia folia, in ambitu dentata, circa pediculum latiora, ex viridi cineracea, gustu acrisculo: quæ autem secundum radicem nascuntur, frequentia sunt & majora: supremi caules in multos ramulos æqualis lûgitudinis divisi, & strobilus quatuor albis foliolis constantibus onusti, sambuci umbellam quodammodo refertunt: floribus succedunt exigua capitula, turgidula, & veluti duobus utriculis constantia, mœrone, qui eos separat, prominente: in singulis utriculis unicum semine continetur: radix candicans, tenuis, longè latèque serpit, & quibudam sibi prædita est.

Nulli serè agrorû margines circa Viennam, totique adeò inferiore Austriâ, hac plantâ non sunt obfiti, quæ subinde in ipsâ etiam arvâ latè intrepit. Floret Maio & Junij initio, semen sub Junij finem maturum est. Memini etiam hanc planram legere in insula illâ quam facit Rhodanus in duo cornua divisus inter D. Egidij phanum & Arelatam, dum Massiliam proficisceretur.

MYLTOS ex eadem radice ramulos humi fusos; profert Prior illa planta Drabæ generibus adnumeranda, qui terrâ obruti, aut sub illâ sese condentes, atque etiam summa tellure, serpente

Draba II.

Draba III.



serpentes, subinde fibras agunt: ij deinde summo capite numerosa folia producunt villosa, Drabæ folijs formâ & colore similia, sed minora, nonnihil in ambitu dentata, subacidi initio gustus, deinde acris: ex horum medio cauliculi exeunt palmares, nonnumquam majores, recti, teretes, virentes, hirsuti, aliquot minoribus folijs latiore basi eos amplectentibus donati: flores in extremis cauliculis spicæ in speciem nascentes, quatuor albis foliolis constant, quibus decidendis, plantæ oblongæque, ut in Sinapi, succreant filiquæ, duplici serie, pusillum, rufum semen continentes: radix candida fibrosa que est, ex qua, ad cauliculorum exortum, alij enascuntur ramuli, similibus folijs præditi, in latera sese diffundentes.

Invenitur in Tauro monte: memini & Ferrariâ in Belgicam nobis missam ab Alphonso Paneio, Leucosij montani nomine. Floret maturius superiore, nempe Aprilis.

FREQUENTIVS etiam ramulis, prædita est Alirera, ex eadem radice prodeuntibus, tenuibus, dñide in caput extuberantibus, ex quo aliquot folia quasi in orbem disposita prodeunt, crassa, succi plena, atrâ viriditate splendentia, Auneula: urti Quartæ (quæ flore est carnei coloris) folijs magnitudine & forma ferè respondentia, sed nonnihil in lateribus dentata, acris gustu, & illico linguam vellicant: ex horum medio pedalis aut major exit caulis, gracilis, quem per intervalla ambiunt & amplectuntur folia superioribus minora, & ad petiolum latiora: flores spicæ instar supremum caulem ambiunt, ut in Priore, & quatuor albis foliolis constant: quibus succedunt rereia & oblonga cornicula, duplici ordine, rufum, pusillum, & planum semen continenria: radix tenuis & repens latè sese diffundit, & novas plantas singulis annis producit, viua, & totâ hieme virens.

Crescit in declivi montis Hernalben, supra Zeehof, villam Cœnobij Gamingensis: ubi fero floret: at in hortos translata, maturius, cum præcedente, nonnumquam etiam ante hiemem. Ea forsitan est, quam Lobelius in Appendice exhibet pag. 463.

HIS adjiciendum est genus illud Drabæ minus, quod multa promitt, à summo radicis capite, foliola, longis pediculis nixa, aliquanrulum angulosa, villis quibusdam obsita, inter quæ gracilis exilit cauliculus, palmaris, paucis foliolis longioribus præditus, qui à medio ferè ad summum, orbicularibus capirellis onustus est, membranulâ in binas partes divisus, semen exule, fuscum, continetibus: radix, pro plantæ exilitate, satis crassa, paucissimis fibris donata: vivax, ut arbitror, nam præcedentis anni cauliculum adhuc retinebat ea planta, quam Gulielmus de Mera Medicus, in itinere observaram, & inter chartas repositam, floribus tamen earentem, mihi Franeofurti donabat anno M.D.XCIII.

Natalis.
Lencosium
montanum.
III.
Draba ter-
re junctis
1674.

Natalis.

Draba mi-
nor.

Nomen. GRÆCIS ἀπέλιος πέλιος: Latinis Arabis & Draba dicitur: nomen vulgare nullum novi: Sed tamen qui Germanis Turdijst hōss dici scribunt.

Varietates. CORYMBIFERA Draba cum Ptsana, ad pituitosā pectoris vitia. Semen aridum, pro pipere oblongis misceri, scribit Dioscorides.

TURRITA.

CAP. XXV.

ILLI congener videtur Planta illa, quæ vulgo, apud eos qui Stirpium cognitione & studio delectantur, Turrītæ nomen obtinet, ab extremorum caulium forinā, qui in metæ aut pyramidis effigiem desinunt. Ejus autem binæ observabam genera.

Turrītæ vulgarior.

Turrītæ major, Plateau.



HABET verò Prima, quæ & frequentior, & vulgarior, conferta circa radicem folia, binas uncias longa, succulenta, hirta, & aspera, saturatione colore viridi prædita: inter quæ pedales, aliquando etiam cubitales promit caules, quos inordinata ambiunt folia, circa pediculum latiora, deinde in mucronem desinentia, succulenta & hirsuta: summo caule confertim nascuntur multi exigui flores, quatuor foliolis albis constantes: quibus discusis, alij apparent, caulis fastigio sensim, veluti in metæ formam, sese attollente, ut tandem frequentibus longiusculis corniculis cinctum conspiciatur, quæ pusillum, rufum, acre semen continent: radix illi alba, multis fibris prædita, quam tamen vivacem esse non puto.

Natalis. Sponte provenit, in plerisque Austriæ collibus lapidis & salebrosis. Floret Maio, semen maturum est Junio.

MULTA etiam promit Altera secundum radicem folia, Prioris folijs majora, in ambitu nonnihil crispâ & sinuosa, minus tamen aspera, & colore dilutius virente: inter quæ caulem promit, interdum plures, bicubitales ut plurimum, in aliquot ramos divisos, per quos inordinata nascuntur folia, valde latâ sede eos complectentia, foliorum Brassicæ campestris (de quâ proximè sequente capite) propè instar: summo caule multis similiter fert flores, superioribus floribus paullo majores, quatuor etiam folijs constantes, coloris ex albo interdum pallentis & æxpidiæ, aliquando omnino nivæi: quos subsequuntur conferta, ut in priore, longa cornicula, semine altero aliquantulum crassiore, plena: radix est alba, prioris radice crassior & durior, paucioribusque fibris donata, nec vivax: nam altero plerumque à satione anno, caules prolato semine exarescunt, & tota planta perit.

Natalis. Rarius invenitur priore, & umbrâ magis delectari videtur, quare facilius in caduis silvis, quàm apertis collibus (quibus prior gaudet) nascitur. Floret April & Maio. Huic valde similis (nisi eadem sit) nata Iacobo Plateau, semine nescio unde accepto. Illius ad me iconem

Brassica campestris 1.



Cardamine alpina 1. trifolia.



iconem etiam cum varijs alijs mittebat.

N O N videtur ablimilis *Brassicæ virgatæ* ^{*Brassica virgata* Cordi.}
Cordi, *Hist. plant. 1. cap. xxxi.*

BRASSICA CAMPESTRIS. CAP. XXVI.

P E O A L E S habet hæc Planta caules, can- ^{*Brassica ca-*}
dicantes, rotundos, aliquor ramis præditos, ^{*pestis alba*}
folia, ex intervallis, Perfoliatæ folijs non valde ^{*flore.*}
dissimilia, albicantia, & colore ferè *Brassicæ*
usualis, caulem sic amplectentia, ut tenellæ
plantæ ad Perfoliatam plurimum accedant, gu-
stu fervido: ramuli è lateribus prodecuntes, su-
stinent aliquot flores albos, *Brassicæ* floribus
similes, deinde cornicula longa, quadrangula,
in quibus continetur semen *Brassicæ* semine
minus, ex rufo fulcum.

A L I V D eius genus est firmioribus virgis, nec ^{*Brassica ca-*}
adeo ramosis, cuius folia in summo aliquantu- ^{*pestis purpu-*}
lum serrata, reliquis notis à Prioris folijs non ^{*reoflora.*}
differunt, & fervido etiam sunt gustu: flores
Prioris floribus similes, majores tamen, Leu-
coijs aut *Hesperidis* floribus magnitudine pa-
res, colore autem *Lunariæ* græcæ flori, purpu-
reo videlicet: cornicula succedentia prioribus
similia & simile semen continentia. Radix tam
in hoc quàm in alio, licet dura fibrisque qui-
busdam prædita sit, vivax tamen non est, sed
prolato semine perire solet.

Frequens est utrumq. genus *Murciano* re- ^{*Natalis.*}
gno, ad *Ehocrotam* urbem, vulgo *Lorca* di-
ctam, in arvis & secūdum vias ubi *Martio* flo-
rebat. Sed & primum genus sponte erefcens
observabam magnâ copîâ, in arvis *Viennensæ*
agro, Maio florens.

BRASSICAM campestem hanc plantam ^{*Nemica.*}
nuncupavi, tum quia in agris & campestribus
nascentem conspiciebam, tum quia, apud quos
nascitur *Murciani*, *Collejon* appellabant, id est
Brassiculam. *Cordus* primam speciem non igno-
ravit, nam *Brassicam* agrestem vocat, quam ve-
ritimile est apud suos in agris sponte nascentem
observasse, propterea agrestis nomen indi-
disse: non defunt qui *Brassicam* semine qua-
drangulo vocent, ineptè: à corniculo potius, in
quo semen, nam semen quadrangulum non est.

Hujus plantæ acrimonia, proximè ad *Brassicæ*
facultates accedere indicio est, & illâ va-
lentiorē forsitan esse.

CARDAMINE ALPINA. CAP. XXVII.

P R A E T E R *Cardamines* *Vulgaris* genera,
quæ in *Pannoniâ*, *Austriâ*, vicinisque regio-
nibus, non minus sunt obvia, quàm in reliquis
Provincijs quas ante peragraverim: aliquot
non *vulgaria* etiam observabam, quæ silentio
minime premenda duxi.

V N U M, nigricantibus ex purpurâ ramulis
per terram serpit, in quibus, oblongo ejusdem
coloris pediculo, terna perpetuo folia innitun- ^{*Cardamine*}
tur, circa pediculum angustiora, per oras lato- ^{*alpina*}
ra & quasi orbiculata, in ambitu non nihil ere-
nata, initio tenella & vitidia, deinde dura, nigre antea, acidulo primum gustu. postea acri:
cauliculi

cauliculi teretes inter folia et impunt ex purpura nigricantes, palmates, nullis aut rarissimis (quæ terna etiam eidem pediculo inhaerent) folijs præditi: flores extremis ramis insident candidi, quatuor foliolis constantes, Cardamines præfens, quam Fuchsius Iberidem nuncupavit, floribus perisomiles, his succedunt torulæ & oblongæ filiquæ, five cornicula, Denariatum corniculis penè simplia, sed minora, semine etiam simili, hæc et minore, plena: radix summâ tellure serpit, & subinde parvas candidasque fibras agit, hæc ut faciliè ramulis terræ obrutis pangi possit.

Natalis.

Invenitur in silvosis montibus, nudo solo potius quàm herbofo, ad Abietum & præalrarum arborum radices, totâ hieme etiam virens. Floret Iunij initio, in cultis verò, etiâ Aprilis.

11.
Cardamine
alpina minima.

ALTERVM, habet folia elegantissimo ordine in orbem disposita, duarum ferè unciarum longitudine, profundionibus crenis incisa, & laciniata, ut Sisymbrij cardamines, five Nasturtij aquarici vulgo vocati, folia, hirsuta & asperata, superne veluti cinereo colore aspersa, inferne autem viridiora, gustu initio aliquantulum acido, deinde acriusculo: ex quorum medio prodit cauliculus dodrantalis, tenuis, albos flosculos in summis ramulis ferens: deinde cornicula teretia, parva, semen observare non licuit: radix longiuscula est, alba, quibusdam fibris capillara.

Natalis.

Nascitur in Stiria inferioris scopulis ad Cornobium Neuberg, quod Alpium ejus Provinciae jugo ipsi imminente nomen imposuit. Florebat Augusto.

Cardamine alpina 111. minima.

Cardamine altera simplici flore.



111.
Cardamine
alpina minima.

Natalis.

MINIMA & tenerissima est Tertij plantula, cauliculis unciam longis, in quibus umbellæ flosculorum candidorum, quatuor foliolis constanrium: folia alata, ex ternis, quinis, aut septenis foliolis uni costæ adherentibus conflata, viridia, gustu acro & fervido: radix alba, satis longa, quibusdam fibris capillara est.

In ipsis scopulis summi jugi Sneberg, dum per nivem glaciali duritie constrictam, ferreis uncis ad pedes alligatis delabor (istic enim, quemadmodum & in reliquis vicinis jugis, perpetuæ sunt nives à multis seculis collectæ, ex quæ, radijs Solaribus summam superficiem resolventibus, adeò lubricæ, ut sine uncis per eas ingredi nemo queat) inveniebam florentem Augusto, ubi nives jam primùm dissolvi incipiebant. Invenitur etiam in Tyrolensibus atque Saltzburgenfibus montibus, teste D. Ioachimo Camerario, qui eam siccam ad me mittebat. Ex C. V. Gesneri Epistolis apparet etiam in Helveticis alpebus nasci.

Sanicula tri
folia.

VULGARE nullum nomen istarum plantarum accipiebam: sed non dubium est, ad Cardamines five Sisymbrij alterius genera referendas esse. Priorè memini nobis Machliniam ifsam ante multos annos ab Altonso Pantio, Saniculæ trifoliæ nomine: à quo tempore in nonnullis Belgicis hortis perdurare arbitror. Eam commodius, meo iudicio, Matthias de Lobel noster

noſter inter Cardamines recensuit, trifoliamque cognominavit. Tertiam Geſnerus, quantum ex ipſius verbis colligere licet, in Epitholis Naſturtium appellat.

CETERVM plantam illam Cardamines, ſive Siſymbrij alterius Dioſcoridis æmulam, paſſim uliginofis locis & humidioribus pratis, interdum etiam hortis fructiferà arbore conſiſtis naſcentem, quam Fuchſius Iberidem arbitratuſ eſt, prato quodam ſicciori, nonnullis tamen depreſſionibus locis humente, colligere memini floribus multiplici glomeratæque foliorum ſerie conſtantibus onuſtam, anno M. D. LXXIII. Maio menſe, trimēſtri videlicet ante quam Belgicâ excederem Viennam Auſtriæ profecturus.

Cardamine altera pleno flore.

Plantula Cardamines alterius æmula.



Similem nunc in Belgicis hortis à diligentioribus rei herbariæ cultoribus ali, me monēbat ante biennium Iacobus Plereau, qui ejus etiam iconem manu propriâ delineatam ad me mittebat Francofurtum. Eam poſtea in lignea tabellâ exprimi, & ſculpi curabam, ut cum vulgaris, quæ ſimplici eſt flore, iconē hoc capite infererem.

Cardamine
vulg. pleno
flore.

OBSERVABATUR porro à me alia plantula in Erſcheriano jugo ſcopulis inhærens, quam an ad Cardamines alterius, an ad Sinapi potiùs claſſem, referre deberem, hærebam, necdum apud me conſtitui in quam claſſem referenda: ne tamen nullum locum in his Commentarijs obtineret, huic interea capiti adijciendum cenſuimus.

Sena verò aut ſeptena, humi ſecundum radicem expanſa, habet illa foliola, Bellidis foliis non diſſimilia, teneriora tamen, & levi acrimoniâ prædita: è quorum medio, tenelluſ & graciliſ prodiit cauliculus, rariſ folioſiſ ſeptus, palmaris aut paulò altior, in cujus ſummo ſeni aut ſepteni erant ſtoſculi, quatuor albiſ folioſiſ conſtantes, in quibuſdam plantuliſ totidem ſine flore ſiliquæ ſive cornicula ſariſ magna pro plantulæ ratione, duplici ſerie, quemadmodum in Cardamines alterius & ſimiliuſ corniculiſ, ſemen continentia exiguum, planum, ruſcens, nonnullâ acrimoniâ præditum: radix ſummâ tellure ſerpens, nova gemitina ſubinde proſert.

Sinapi pend.
lum alpeſt.

NAſTURTIVM SILVESTRIS Valentinum,

CAP. XXVIII.

VNICO hæc planta aſurgit caule, ſed ſtatim à radice, ſupra ſolum, multis aliſ diſiſo, hiriſuto & aſpero, virente, rotundo, pedaliſ longitudiniſ; inferna folia qualia ſunt, pronuntiare non poſſum, quia jam in ſemen magna ex parte evaſerat planra cum obſervabam: quæ tamen ſub aliſ cauliſ inhærebant, tenuia erant & multiſida, Naſturtij vulgaris, & legitimi, folio.

Naſturtium
ſil Valentini.

Nasturtium silvestre Valentinum.

Nasturtium.



Thlaspi montanum 1.

Thlaspi
montanum
multiflorum.

Thlaspi
montanum
palustre.



mi, foliorum præ æmula, tenuiora tamen & viridia, ac gustu, ut Nasturtium: extremis ramis fert multos, spicæ in speciem, congestos floculos, quatuor foliis palleccantibus constantes, in quibus torridè flamina, quibus evanescentibus, succedunt siliquæ breves duabus valvulis sive utriculis constantes cum linguâ prominente, non quidem sursum erectæ, ut reliquarum congenerum, sed decursum inflexæ, in quibus Nasturtij æmulum semen: radix est singularis, candicans, satis crassa, nõ tamen vivax, sed quæ singulis annis perit.

Eodem loco, eodemque tempore, nempe Martio, florentem hanc plantam & semine jam plenam inveniebam, quo Alysson Galei, Valentino videlicet regno: & quia plerisque notæ eum Nasturtio communes habere conspicebam, Nasturtij nomen indidi: cui (quantum ex gustu judicare licet) per similes facultates habet.

Huius, meâ sententiâ, nomen immutare non debuerat Lobelius, qui ipsam stirpem nunquam conspexit: nam plantis mihi antea ignotis & primùm observatis, festinanter, & tumultuario quodammodo impetu nomina dare non soleo, sed prius omnes illarum notas & reliqua necessaria maturè perpèdo, antequam aliquam stirpem certo nomine donare adgreddiar, ut facile animadvertent, quotquot meas lucubrationes diligenter & sedato animo legent: malo enim interdum ipsas plantas æmulas relinquere (ut mihi adhuc usu venit in his Commentariis) cum in commodo nomine applicando mihi ipse non satisfacio, quàm temerè nomen aliquod, naturæ plantæ nõ satis respondens, donare. Sed quam quæso majorem assiduitatem habet hæc planta cum Eruca, quàm cum Nasturtio? Si quis utramque stirpem sano iudicio conferet, inveniet profectò me, non sine probabili causâ, Nasturtij silvestris nomen huic plantæ dedisse.

THLASPI MONTANVM.

CAP. XXIX.

EX illarum numero est hæc Planta, in quatuor generibus maxima varietas conspicitur, ut ex eorum Lucubrationibus colligere licet, qui Stirpium Historias scripserunt: Ejus etiam quædam genera observabam, in Pannoniâ, vicinisque regionibus, nusquâ alibi mihi conspecta.

PEDALI assurgit Primum genus caule, nunquam altiore, gracili, firmo, folijs præne Brassicæ campestris, ipsum amplectentibus, minoribus tamen, mollioribus, superne virentibus, inferne candicantibus, odore propemodum allij, quali sunt etiam ea quæ statim à radice prodeunt: flos in extremis ramulis nascitur copiosus, albus, quatuor foliis constans, odoris expers: quo decedente, latæ, planæque propendeat siliquæ, sive thecæ, non bifidæ, in alijs Thlaspi generibus, sed circumatæ ferè rotunditatis, & in orbem, peltæ instar, efformatæ, uni-

Thlaspi montanum II.

Thlaspi III. pumilum.



tz, unicum in ipso centro continentes semen, flavescens, gustu amaro & acris radix alba, fibrosa, tenuis, summa interdum tellure serpit, & nova ad latus germina profert.

Invenitur umbrosis locis ad arcem Stichenstain, & quâ iter est ex eâ arce ad Sneberg, *Natalis*, nusquam alibi mihi observatum: nunc verò meâ operâ, missis Viennâ ejus Plantis & semine ad amicos, Belgicis & Anglicis hortis inquilinum factum. Floret Junio, semen Julio & Augusto ad maturitatem pervenit.

Illius iconem in Belgicâ expressam, vel ex plantâ eâ missâ, aut semine istic natâ, tamen si non adeò feliciter, ut necesse erat, retinere libuit & hic inferere, ne Typographum nimis expensis gravaremus.

Numerosa sunt Secundo folia, bumi strata, parva, crassa & succulenta, saturâ viriditate nitentia, quasque cespj coloris, Globulariz, quam Anguillara Aphyllantem appellat, folijs proxima, cuspidè orbiculatâ, acris gustu: caules plures, rotundi, pedales, aut etiam minores, paulo brevioribus & magis viridibus folijs stipati: onusti verò albis floribus ex quatuor foliolis compositis: quibus marcidis succedunt compressæ thecæ, Thlaspi vulgaris vasculis similes, in quibus semen subrotundum, Thlaspi Cretici semini par, nisi minus esset: radix candidans, fibrosa, lateribus in propagines sese explicat, & diffundit.

Provenit in declivi montis illius glabri, qui urbi Badensis (in qua calidarû aquarum sunt *Natalis*, scaturigines) imminet, quarto à Viennâ miliari. Floret Aprili, semen fert Maio & Junio.

Atque quartum habet Tertium foliola, per terram sparsa, Brassicæ campestris foliorum formam & colorem præ se imitantia, sed longè minora, quæ verò per caulem sparguntur, qui singularis est, & palmaris altitudinis, rarè major, rara sunt, latioreque pediculo ipsum quodammodo amplectuntur, Brassicæ campestris foliorum instar, & gustu aliquantulum acris: flores pusilli, albi, quatuor foliolis constantes, summis cauliculis insident, quos subsequuntur compressa vascula, ijs quæ in Cretico Thlaspi conspiciuntur similia, superiore parte fissâ, duobus utriculis planis prædita, in quorum singulis bina aut terna granula flavescencia, acris saporis.

Crescit in pettis, & siccis quibusdam, umbrosis tamen, Austriz collibus. Floret Aprili, *Natalis*, semen Maio maturum.

Vulgare nomen an obtinuerint apud illius Regionis incolæ, & porro in medicum usum apud eisdem receptæ sint, non intellexi.

MEMENTI olim in Allobrogibus, cum per Helvetios mihi esset iter in Germaniam Thlaspi

Thlaspi iuss. parvum odorato flore.

Thlaspi v. Hispanic. albo flore.



Thlaspi incanum Machliniace.

III.
Thlaspi Al-
bivirg. Co-
rrip. alba
flore.

V.
Thlaspi par-
vum alvire.
sigillat.

VI.
Thlaspi Hi-
spanic. cau-
dale flo.



N. 1111.

Thlaspi genus invenite, Cretico valde simile, cujus tamen flores nō essent purpurei, sed omnino nivei: foliorum tamen acrimoniā, Cretico respondens.

SED & Thlaspi bina genera Iacobo Platau semine nata, ut ipse ante biennium ad me scriberet, & utriusque iconem ad me mittebat.

VIVVM humile, singularibus virgis assurgit, totūdis, in plures ramos divisīs, per quos, ut per caulem, sparsa erant angusta & extremo mucrone serrata folia, Cretici foliorū xmula, acri gustu prædita: summo caule & extimis ramis, nascebantur veluti quædam in unū caput congestæ umbellæ florum niveorum, odoratorum, quibus successerunt thecæ Cretici Thlaspi vasculis similes, in quibus semen: radix enīam Cretici instar, non vivax.

ALTERVM statim à radice multas emittit virgas inæquales, frequentibus ramis donatas: folia illius angusta, mucronata, nullo servato ordine, caulem & ramos ambiunt, satis manifestæ acrimoniæ: extremi rami multos albos flosculos in caput congestos ferunt, quibus excussis, subsequuntur planæ thecæ in spicæ speciei nascentes, superioribus similes, duobus utriculis constantes, in quibus semen: radix crassiuscula, dura, non vivax.

Prioris iconi adscriptū erat, Thlaspi parvum flore niveo, odorato: Alterius autem Thlaspi Hispanicum flore cædido: quod, an affinitatem aliquam habeat cum Thlaspi fruticoso altero

Lobelij,

Thlaspi clypeatum.



Alyssum minimum.



Lobelij, ex iconibus iudicium ferre nequeo: ejus tamen quam expressam hic damus icon, vascula bifurca habet, qualia ferè in Creticos fruticulosi verò, simplicia sunt & mucronata.

NASCITVR etiam pletisque Austriæ & Moraviz locis, secus vias & agrorum margines, gramineisque incultis locis, non minus quam in Belgicâ, Thlaspi genus illud quod nonnulli Machliniense cognominant, quia juxta Machliniam Belgicæ celebrem urbem, in quâ supremum omnium illarum Provinciarum Concilium, plurimum nascatur publicâ viâ quâ Antuerpiam itur.

*Thlaspi in-
cana sive
Machliniense
cognominatur.*

Habet verò folia unciam longa, dimidiam lata (inæqualiter & inordinatè caule amplectentia caulem pedalem aut ampliorem) cineracei coloris & acris saporis: caules in ramulos divisi, extremis albos flores proferunt, quatuor bifidis folijs còstantes, in caput congestos & quasi umbellatim nascentes quibus decussis, paulatim illa capita succrescunt & producantur, vasculique ostendunt mucronata, brevia semen còtinentia: radix albicans, fibris quibus prædita est, sub terrâ latè serpit, Drabæ instar.

SVPRÀ Baden ses etiam Thermas vicinissimæ collibus, adeoque rotâ illâ Collium (montes enim appellare nò possum, si ad alios longè celsiores in illis Provincijs còferantur) catenâ, quæ deinde per Leytenberg & supra Maderthorff ad Danubiũ usque versus Orientem excurrit, copiosè nascitur illud Thlaspi genus, hirsutis & veluti circum erosis folijs, quod in summis cauliculis & extimis ramulis, flores ex luteo pallescentes proferit, deinde bina vascula orbiculata, plana, clypei instar efformata, medio turgidula, in quibus semen, quale nosset Lobelius in Adversarijs describit.

*Thlaspi cly-
peatum.*

CETERVM Thlaspi bilem per superna & inferna purgat, acetabuli mensurâ potû, ischiadicis in clystere infunditur, potum sanguinem ducit, & interiores abscessus rumpit, mensescit, &c.

Facultates.

ALYSSVM MINIMVM. CAP. XXX.

THLASPI generibus quodâmodo congener esse videtur ea Plantula, de qua huc capite nobis institutus est sermo.

MULTOS ex eadem radice (interdum unicum tantum) profertur solet illa caulicos, dorante minores, tenues, magnâ ex parte purpurascentes, per quos sine ullo ordine sparsa sunt numerosa foliola, hinc foliolis haud majora, incana, subacidi gustus, sed & salivam quodâmodo cientis: summi tamuli, comâ floculorum exornantur, quinque perpusillis luteolis foliolis constantium: ea coma paulatim deinde veluti in spicam explicatur, floribusque succedunt orbiculatæ & compressæ quidem, sed in medio turgentes peltulæ, sive parmulæ, initio virides, deinde subflavæ, exiguum rufum

*Alyssum mi-
nimum.*

semen continentes: radix candicans & fibrosa est, arcamen annua.

MM

NVSQVAM

Eruca peregrina.

Notula.



Androsace altera Matthioli.

Notula.

*Leucium
feminum.
Leucium ma-
rinum. Paravin.*



*Androsace
altera Mat-
thioli.*

nonnihil etiam dentatorum, & lanuginosorum, unde quini aut plures emergunt pedicelli,
caliculum

NVSQVAM non crescit Viennensi agro, ad arborum, vinetorumq; margines, quibus à publica via separantur, quinquem ficeis & graminis agris non modo Aultrici sed etiam Moravici, & Pannonici. Floret toto Aprili, interdum etiam Maio.

AN oomē aliquod vulgare obtineat apud eos populos ubi nascitur, non intellexi: affinitatem autē habere videtur, cum eā plantā, quæ à vulgo Herbariorum, Dioscoridis Alysson esse creditur: aliud enim est Galeni Alysson, de quo libro superiore egimus.

ERVCA PEREGRINA. CAP. XXXI.

ALIVOT caules ex unā radice prodeuntes, habet hæc planta, sesquipedales interdū, rotundos, graciles, & in his multa folia, oblonga, angusta, costā prominente, incana, nōnihil in ambitu veluti circumrofa, acris gustu prædita, ut & quæ humi secunda radicem fusa sunt, quæ plerūque ampliora sunt: flores in summis caulibus simul congestos, luteos, quatuor folijs bifidis constantes, Eruce sativæ floribus minores, Leucoij silvestris Tertio libro descripti floribus, magnitudine quidem respondentēs, forma tamē dissimiles: ijs succedūt vascula seu folliculi subrotundi, tumentes, in binas parres divisi, prominente in extremo, mucrone, seu stilo, semen subrotundum, acre, continentes: radix ad minimi digiti crassitudinem exsertit, candida, nonnullis fibris prædita.

Crescit quibusdam Castellæ locis incolitis, & juxta vias: ubi Maio floret. Semine in Belgium misso nara, non nisi Iulio & Iulio.

SVNT qui, Leucoium femine rotundo, vulgo vocant; alij Paravinum marinum Leucoion, ob aliquam, ut puro, quam ejus folia cum Leucoij folijs similitudinem habent. Sed mihi inter Eruce genera potius referenda videtur. Vulgare nullū nomen novit.

ANDROSACES ALTERA MATTHIOLI. CAP. XXXII.

ISTAM Plantam in Commentariis nostros inferre animus non erat, cum à Matthioli sit exhibitā. Verū cum illius duprat iconem, & eam quidem non faris scire expressam, nullā ejus historiam additā evulgat: eam describere non pigebit, ut rei herbarie studiosi pleniorē ejus cognitionem consequi possint.

MLTA sunt illi folia, humi expansa, foliorum Plantaginis æmula, sed minora, trinervia, colore ex viridi pallescēte, in ambitu dentata, llicis foliorum ferē instar, mollia tamen, succulenta, gustu aliquanrulum acris: inter quæ feni, interdū plures assurgunt cauliculi, palmares, herbacei coloris, aliquando purpurascētes, nudi, aliquanrulum villosi, qui summo fastigio, corollam sustinēt, quinque, ut plurimum, orbiculatorem foliorum,

caliculum ferentes herbaceum, lanuginosum, quinque etiam foliolis donatū, siue in quinque lacinias desinens, & in ejus medietullo, flosculum album, in quinque crenas sectum: bascula deinde tumescunt, & semen continent, inæquale, rufum, primulæ veris semini non dispar, sed majus: capitella cum folijs præmansa, adstringentis initio gustus, paulò post amari & acris deprehenduntur: radix illi unica, tenuis, paucis tenuibus fibris capillata, non vivax: nam prolato semine tota planra perit.

Hanc plantam pro Androsace altera exhibet Matthioli, ab amico acceptam, qui ex Syria allatam referebat. Verum non necesse erat illam tam procul petere, quandoquidem Austria in qua vixit, abundè subministrasset: copiosè enim nascitur inter segetes circa Badenenses thermas sæpius memoratas, atque adeò locis Viennensi urbi vicinis. Aprilis flores, semen verò Maio & Junio maturum est.

Nullum vulgare nomen illius intellexi: negliguntur enim pleræque ejusmodi stipes à rusticis, nisi eorum aliquas vires exploratas habeant.

An porò hæc similes obtinere possit facultates quas Dioscorides suæ Androsacæ tribuit, me fugit, & Medicis id dicendum relinquo. Dioscorides autem Androsacem, drachm. 5. duabus ex vino poram, hydropicis copiosam urinam ciete: eundem effectum præstare, & semen potum, & herbe decoctum: præterea podagricis utiliter illini, scribit.

ATRIplex SILVESTRIS baccifera.

CAP. XXXIII.



LEGANS est hæc Planta, à me quidè in Hispanijs non observata, sed ante bienium arida ad me missa Francofurtum, à Jacobo Placæo, cum icone ipsius manu delineatâ, cui paucas notas adscripserat, è quibus qualècunque illius historiâ concinnavi.

ASSURGUNT à singulari radice, paucis fibris prædictâ (quæ vivax non videtur) terni aut quaterni caules, interdum unicus, statim à summo radice capite divisus in aliquot ramos pedè aut circiter longos, inæquales, angulosos, in tetram procumbentes, minoribus alijs ramis donatos, in quibus, ut & in majoribus, singularia alternis nascuntur folia, modò in unum lacus, modò in alterum disposita, angulosâ, qualia in Atriplicis quibusdâ generibus, incana: ad quorum exortum, multi in unum caput congesti orbiculi, fructus mori rudimentum quodam modo referentes, qui, maturitate, rubellum colorem contrahentes, exiguum morum et mentiuntur, atq. magnam toti plantæ addunt venustatem & gratiam: singuli autem illi orbiculi semen continent exiguum, rotundum, cineracei coloris, quale fete in Papavere ceratite, violaceum florem ferente.

Qui mittebat, Hispanico semine ipsi nam adscribebat: quo autem tempore, flores & semen daret, nullam mentionem faciebat.

SIMILEM porò plantam in Tyrolensi comitatu reperisse se affirmabat Doctus. Vir

Gulielmus à Mera Medicus, dum ex Italiâ rediens per eam regionem iter faceret anno MDCXIII. sub extremum Augustum, magis fruticantem, & suis fructibus onustam adeo elegantibus, ut ipsum etiam ad vescendum invitarent.

Sed mihi etiam Lugduni Baravorum natæ plantæ anno MDCXV. semine quod ex sicca illâ plantâ, quam Francofurti accipiebam excusso, quæ hiemem superantes, insperante anno valde luxuriantes frequentes cubitalesq. caules in multos ramos divisos protulerunt, plurimos fructus rubentes in unum caput congestos ad foliorum exortum nascentes habuerunt totâ fere ætate, denique sub Autumni initium contabuerunt.

RUTA MONTANA.

CAP. XXXIII.

MONTANA, eademq. silvestris Ruta, non ea quam Dioscorides peculiati capite describit sed cujus, capite de Rutâ, mentionem facit, herba est multis folijs per terram stratis, multifidis, tenuissimèq. divisit, ex pallidâ vitiditate câdicatibus gravissimi acerrimiq. odoris: ab radice, quæ longi est, candida, lignosâ, & minimi interdum digiti crassitudine, hi-

Ruta montana.



Natalis.

Harmala.

Ruta silvestris.



Harmala.

Rutaceae.

Harmala.

nos aut tecto aliquando fert caules, in ternos aut quaternos ramulos se se superiote parte dividentes, qui florem sustinent, hortenii similem, minorem tamen, & ex luteo pallidicentem: deinde capita quadrangula, in quibus semen continetur exile, nigrum, acie.

Tota planra gravissimi odoris est, tantæque acrimoniae, ut per triplices cluthecas ad legentis manus penetrare, non semel expertus sim: & si quis, quædam decerpserit manu, faciem de mulcear, hico vehementer inflammationem excitat, quemadmodum testissimè scripsit Dioscorides. Memini sane, dum Mompellij vivebam, Germanum studiosum, qui in herbarione comitem se mihi adjunxerat, monere ne eâ leclâ faciem tradaretis quidem à facie abstineret, sed cum vehementer esset æstus, & veriatemur loco aperto, à solanibus radijs valde illustrato, stetitq; & deserto, ubi nulla alia frondium copia, ne non animadvertente, ramorum hujus rutæ tenetiorum, manum plenam legit, capiti imponit, deinde petalum inducit, exillmans hac ratione, Solis ardore à capite arceare posse: verum brevi sensit suo damno quænam esset Plâta acrimonia. Nam & caput illi vehementer æstare cepit, & ea partis frons, quæ sudore defluente tacta fuerat, tota veluti eiyssipellate corripit, excitatis multis rubentibus papulis, ut in urbe tediens, aptis remedijs fuerit curandus.

Siccis autem petiosisq; & Sole adultis locis sponte nascitur, cum in Hispanijs, tum Galliâ Narbonensî, alijsq; fervidis regionibus floret Junio & Julio, Augusto semen maturum est. In Belgio aliquoties lata, alteto tantum à satione anno floruit, atq; ferius, & cû frigoris sir impatissima, plerumq; prolatis floribus cõstabuit.

A hac differre non videtur, quæ semine è Ceterâ allato nata est amico, anno m d xci. floruit sequente, nisi quod vegetior fuerit & magis luxurians, quia in culto loco natæ: nâ & folia valde tenuiter incisâ, & gravis admodum odoris, flores pallidi, quatuor foliolis cõstantes, capitum rudimenta (floruit enim sub Augusti finem) tetragona. Missum verò semine Rutæ silvestris nomine.

Hanc Dioscorides *ῥήγανον ἔριον* & *ῥήγανον* vocat, id est Rutam mōianam & agrestē, ejus verò radicem *ῥαλὸν ἔριον*, hoc est, Moly montanum: forte Ruta nias Pythagoræ apud Plinium. Hispani ab hortensii non discernunt, sed communi cum illâ nomine, *Ruda* appellant.

Cibus damnatam refert Diosc. etenim si copiosius edatur, interficere: cutem, dum colligitur, inflare, & tubore quodam inficere cum pruritu & vehementi inflammatione: in Antidota autem ejus semen commodè addi.

RUTA SILVES. HARMALA. CAP. XXXV.

FERTICOSA hæc est plâta, multis ab unâ radice emittens cauliculos, pluribus tamis donatos. pedales, ex viridi nigricantes: in quibus folia oblonga, densâ, sive pinguiâ & carnosâ, saturè virentia, multifida, Napelli tenuisfolij (quem quidam Antitoram vocant) folijs non valde dissimilia, gustu lento, gûmoso, amaro, aliquætrulum tamen mordaci: flores in summis ramis caodidi, quinque foliolis constantes, mul-

tes, multis in medio fibris luteis præditi: deinde capitula horrensis rutæ capitibus majora, molliora tamen quàm illa, & triangula, semine referta inæquali, anguloso, ex rufo nigrescente: radix dura est, minimi interdum digiti crassitudinem æquans, fibrosa, colore ex luteo pallescente. Tota autem planta graveolentis, atque adeo ingratæ, odoris est.

Plurima in Castellâ novâ, circa Madritum & Guadalajara, collibus & læto solo provenit. Floret Julio & Augusto, semen Septembri maturum colligebam. Sed & florentem & semine pregnantem etiam Octobri istuc reperiebam. In Belgicâ lata, aliquot nonnumquam annos perduravit, sed vix, aut raro admodum ad florem pervenit, utpote quæ non secus ac superior, frigoris sit valde impatiens. Viennæ autem aliquot etiam annos semine natam alui, sæpissime egregie florentem; aliquando etiam deciduo flore trigona capita proferentem, quorum tamen inane esset semen.

Hanc etiam, *πράσιον ἄγριον* appellari, testis est Dioscorides: Cappadocibus autem *μύδλυ*, Nominis alij *ἀρμαλα*, Syris *Βεσαδσί*: Latini Rutam silvestrem & Harmalam vocant. Castellani *Gamarfa*, & *Cogambrillos amargos*, id est, exiles Cucumeres amaros nuncupant.

SEME cum melle, vino, croco, sceniculi succo, ægallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem, referente Dioscoride.

BELLONIVS lib. II. Observationum cap. XXI. ait, arenosis circa Alexandriam Ægypti locis nasci, & apud Arabes, Ægyptios, Turcos vario in usu esse: præsertim verò hanc apud eos invaluisse consuetudinem, ut ejus fumo singulis diebus mane suffiantur, sibi persuadentes, noxios spiritus hac ratione abigi. Quæ adeo res illi herbæ, & ejus seminis, tantam celebritatem peperit, ut nullæ sint adeo viles Institorum officinæ, quæ eam non habeant tamquam pretiosum aliquod medicamentum.

SCORFONERA.

CAP. XXXVI.

TRAGOPOGIS adnumerandas esse eas plantas, quas vulgò Scorfoneras appellant, nemo est, ut arbitror, in re herbariâ mediocriter versatus, qui dubitet, cum totâ facie illis respondeant. In eo tantum differe videtur, quod illorum radix minimè sit vivax: sed seminis partu subsequente hieme perire solet: Scorfonera verò petennî sit radice, vel saltem multos annos (licet singulis florem & semen proferat) perdurare solet.

Ad hujusgenera referendas esse exultimo nonnullas stirpes, quas in Pannoniâ & Austriâ observabam.

Scorfoneta major Hispanica 1.



PRIORI, angusta sunt folia, Hispanicæ angustifoliæ, quæ odorato flore est, proxima, sive Bohemicæ adeo vicina, ut ab illa differe non putem: caulis, flores, radices lacteo succo turgentes, foris nigricante cortice tectæ, intus candidæ admodum, conveniunt. Huic iconem Latifoliæ Hispanicæ præposuimus, ut quæ sit inter utramque differentia, facilius observari possit.

LATIORE brevioraq; habet Altera folia, Bupleuro latifolio, sive Elaphobosco Mompeliano non valde dissimilia, crassiora tamen & duriora, quinque nervis, seu venis per longitudinem excurrentibus, distincta, cærulei quodammodo viridi permixti coloris, gustu verò aliquantulum amaro & feruido: caulis inter hæc assurgit gracilis, pedalis altitudinis, striatus, raris folijs septus, cui insidet flos superiori similis, luteus, magnus, quo marcido nascitur in calicibus semen oblongum, asperum, Tragopogo simile, sed minus, in villosâ materiâ albâ latens: radix pollicaris est crassitudinis, interdum major, longa, nigro rugosâq; cortice tectâ, intus albâ, quæ contracta, lacteo succo manat, successu temporis flavescente, superiore parte, hirsutâ veluti cæsarie donata est, & in plura capita plerumque extuberat, ex quibus folia prodeunt.

TERCIA, firmatur crassâ radice, longâ, nigro, denso, rugoso cortice præditâ, lacteo succo plenâ, quæ nonnumquam superiore parte in plura capita, quæ admodum præcedês extuberat, cras-

titudine minimi digiti (novellarum plantarum instar) villosâ: ex quibus multa nascuntur

folia

Tragopogon
ex Scorfonera
radice

1.
Scorfoneta
major

11.
Scorfoneta
humilis latifolia

111.
Scorfoneta
humilis angustifolia



Scorfonera humil. angustifol. Pan. 111.



1112.
Scorfonera
maior angustifol.
Pan.

folia Tragopogo similia, firmiora tamen, breviora, & ejusdem, cum præcedentis folijs, coloris: inter ea excrefcit humilis, palmum vix excedens caulis, aliquot brevibus foliis septus, cavus, florem in summo fastigio ferens flavum, alteri ferè similem: Semen deinde in longioribus caliculis Scorfonerae Hispanicae semini par, minus tamen, quod maturitate, levissimo autæ flatu excutitur, & ejus arbitrio fertur.

FREQUENTIA sunt Quarta folia, longa, Tragopogi folijs minoræ & angustiora, inter quæ cubitalis affurgit caulis, cavus quidè ille, sed firmus, durus, viridis, aliquot oblongis folijs septus, & supremâ parte in binos aut plures ramulos divisus, ferentes in longioribus calicibus, florem Scorfonerae Angustifoliae floribus non dissimilem, nisi quod paulò minor sit, & coloris ex caeruleo purpurascens, jucundi odoris, pastillorum è benzoino confectorum nidorem quodammodo æmulantis, sed fugacis admodum: sena deinde, octona, aut plura in singulis calicibus semina, Scorfonerae feminum æmula, quæ matura, cum suo pappo à vento excutuntur: radix singularis, minimi digiti crassitudine æquat, densoque, foris nigricante & rugoso cortice obducta, supremâ parte hirsuta, & villosa, quæ vulnerata, succum exstillet nigro lacteum, deinde fulvescetem, gustu primum gummoso, postea aliquantulum acri: vivax est, ut

Scorfon. angustifol. elatior Pan. 1111.



Hieracium t. latifolium.

est, ut reliquarum radices, vetustate crassiores evadēs, & superiore parte io plura capita subinde extuberans.

Similis plantē ea est, quæ in colle oppido Stampfen vicino, duobus ultra Posonū Vngariæ celebrem urbem miliaribus invenitur: nisi Stampfiana angustiora folia haberet, calices breviores, semen crassius, brevius, Cnici fermē semioi æquale.

PRIMUM genus, in Hamburgensi monte, *Natalis* octo infra Viennam miliaribus herboſo quodam loco & arboribus circumſepo obſervabam. Alterum, in monte Badenſibus thermis imminētē viciniſque alijs. Tertium & Quartum, non modò in Hamburgensi monte, quā parte glaber est, & tenui gramine duntaxat rectus, & quā Aultriam ſpectat, ſed etiam in vicino Prellenbergo, Leytenbergo, catenā illā montium à Calenberg ad Alpes excurrentium & plerique Vngariæ locis, naſcuntur. Florent Aprili & Maio: ſemen interdū Maio, aut ſub Junij initium matureſcit.

SECUNDUM porro genus, Scorſoerā h. *Natalis* milem latifoliam appellare licebit: ut Tertium humilem anguſtifoſiam: Quartum autem, Scorſibnera elatior anguſtifoſia purpureo flore cognominari poterit.

An verò ſimilibus facultatibus prædiæ ſint hæ Scorſoneræ, quibus celebrē illam, & adeò decantatam Hispanicam polſere aiunt, neminem adhuc periculum feciſſe arbitror.

HIERACIUM PANNONICUM.

CAP. XXXVII.

INSIGNIS etiam in Hieracio obſervatur *Magna hiſpanica varietas.* varietas, per Paſſoniam, Aultriam, viciniſque regiones: eam præter ea quæ cum alijs Provincijs aiunt genera, nonnulla obſervare me nioi, quæ ouſquam alibi ſeſe mihi obtulerant.

PRIMUM autem locum Latifolio dabo, cui quina aut ſena ſunt folia, humi ſtrata, *Natalis* lentybo ſativo latifolio, non multum diſſimilia, in ambitu nonnihil ſinuoſa, interdum etiam laciniata, mollia, hirsuta, nigricantibus maculis ſæpiſſimè infecta, aliquando nullis, lacteo ſucco turgeſcit: inter quæ cauſis exit cubitalis, cavus, raris folijs ſeptus, in quo plerumque unicus (nonnumquam alter & tertius) hoſ ex craſſi uſculo nigraq; lanugine hirsuto calice emicat, Hedipnoidis flori ſimilis, ſed pallidior, plenus, nonnihil odoratus: ſemen deinde oblonguſculum, comā incanā pappi inſtar præditum, ut Tragopogi ſemen, quod maturum leviſſimo ſtatu diſpergitur: radix illi minimi digiti craſſitudine, nigro atque craſſo cortice obducta, lactei ſucci plena.

Invenitur plerique Vngariæ, Aultriæ ſuperioris & inferioris, atque Moraviæ montibus gramineis & ſimul apicis locis, ſiccioribusque pratis. Inveniebam etiam & maculis lividis, & oullis maculis inſignito folio, ſiccioribus



cioribus circa Franeofurtum pratis. Floret Maio, ſemen plerumque maturum Iunio.

77.
*Hieracium
maius latifolium.*

CVBITALES atque etiam bicubitales interdum ſunt Alteri caules, firmi, rotundi, quadam lanugine obſiti, quos inordinata, ſive conuſo ordine naſcentia, multa ambiunt folia, tres uncias aut amplius longa, unam lata, mollia, in ambitu dentata, lacteo ſucco plena: ſummus caulis in aliquot ramulos ſinditur, ſuſtinentes imbricata capricula, è quibus prodeunt flores lutei, denis, duodenis, aut pluribus foliolis, æſtimâ parte incifis, conſtantes, medium occupantibus multis luteis fibris: radix minimi digiti craſſitudinem æquat, multiſq; tenuibus fibris capillata, ſingulis annis augeſcit, & ad latera novos, frequenterq; caules proferit.

2. Ejus genus invenitur graciliore caule, anguſtiſſimis, & vix ſemunciam latis folijs, in reliquis conveniunt.

Hieracij 111. genus alterum anguſtiſol.

111.
*Hieracium
maius anguſtiſol.*



Natalis.

111.
*Hieracium
Britannicum.*

TERTIO cubitales etiam affurgunt caules, rotundi, ſuperioribus minus craſſi, frequentioribus durioribusq; villis obſiti, quos ſimiliter conuſo ordine ambiunt multa folia, ſuperioribus anguſtiora, breviora, duriora, non minus tamen lacte turgentia: ſummus caulis etiam ſinditur in ramulos, imbricata capitula ferètes, è quibus exoriuntur flores, ſuperiori ferè ſimiles: radix ſuperioris radice minus craſſa, perinde tamen fibroſa, & in novis prolihus educandis fertilis.

2. Illud etiam genus obſervabam anguſtiſſimis folijs, & multo longioribus, licet non minus duris, quod alioqui, totâ quodammodo facie ipſi reſponderet.

Magnam verò affinitatem hoc genus habet cum grandiore Hieracio apud Belgas ſecundum publicas vias inter frutices naſcente.

Naſcuntur omnia in extremitatibus ſicciorum pratorum inter vepres, etiam ad cæduarum ſilvarum margines.

PLANTARVM ſimilitudo facit, ut duobus poſtremis generibus, Quartum ſubijciam, non in Pannoniâ natum, ſed in Britanniâ anno M. D. XXXI. obſervatum.

CVBITALES verò habet id genus interdû caules, ſtriatos, digito graciliores, ex viridi purpureſcentes, quos nulla ſerie diſpoſita, ſed inordinata ambiunt folia, Comyzæ majoris folijs non diſſimilia, non adè tamè pingua, latâ ſede caulem amplectentia, in circuitu dentata, extremo mucronata: caliculi ſummo caule ex foliorû alis emergentes, oblongis pediculis inſident, villoſi, qui in luteos flores reliquis Hieracij ſerè ſimiles ſeſe explicant: ijs ſuccedit ſemen oblonguſculum, ſtriatum, candicans, quind cum pappo levi aurâ diſpergitur, ut in congeneribus plantis: radice eſt vivace, multis longis, craſſiſculis, nigricantibusq; fibris conſtante, quæ ſingulis annis numeroſiorem caulium ſobolem procreat.

Impenſè amara eſt hæc planta, nuſquam ſponte naſcens mihi conſpecta: ſed Londini duntaxat, in hortis doctiſſimorum viro- rum Ioannis Richzi & Hugonis Morgani Pharmacopolarum Regionum, qui Cichoreum montanum nuncupabant, ex borealibus Britanniæ regionibus, in quibus ſponte creſcit, delatam. Floret Iunio & Iulio, ſemen Auguſto maturum.

Cichoreum
montanum.

7.
*Hieracium
alpinu hirſu-
re folio.*

ALIQUOT Quinto ſunt folia è radice prodeuntia, uncialis ſerè latitudinis, oblonga, molli crifpae lanugine admodum hirſuta, & quodammodo incana, lacteo ſucco prædita: inter quæ prodiit caulis, pedalis ut plurimum, villoſus, quem per intervalla ambiunt folia, ijs, quæ ad radicem naſcuntur, breviora quidem at triplo latiora, & in mucronem deſinencia, non minus quàm illa villoſa, aut lacteo ſucco turgentia: unicum fert ſummo falſigio capitulum, è multis hirſutis & inanis foliolis compactum (nonnunquam autem in lateribus alterum & tertium) quod ſeſe explicat in ſtorem Hieracij floribus ſimilem, multis folijs luteo colore tinctis conſtante, & tandem in pappum cum ſuo brevi, nigro ſemine evaneſcentem: radix nigricat, multis tamen candicantibus fibris prædita, ſingulis annis novos caules producit. Tota planta valde amara eſt.

Natalis.

Invenitur in herbolijs Alpium jugis, ubi Iulio, interdum tantum Auguſto floret: in hor-

tis au-

Hieracium v. villosum.

Hieracium vl. montanum.



is autem, Maio, semen Iunio perficit. An porro ea planta quam Dalechampius Sonchum lanatum appellat?

Se x r i radix digiti crassitudinem interdum æquat, longa, nigricans, tenuibus fibris prædita, summâ parte, in plura nonnunquam capita, extuberans, quæ summâ cellure senu aut pluta oblonga folia, semunciam ferè lata, & nonnihil incana proferunt: è singulis radicis capitibus, prodeunt inter folia, singulares cauliculi, duri, nudi, dodrantes, aut palmares tantum, unicum florem sustinentes, è multis oblongis, extremo infectis foliis, luteoque colore præditis, constantem: quo defluente, semen oblongiusculum cum pappo levi auzze flatu excutitur.

In omnibus illis montibus à Calenberg (Danubio imminenti binis miliaribus supra Vienne) ad Alpes excurrentibus nascitur. Floret Maio.

z. Aliud ejus genus invenitur, cujus folia nonnihil in lateribus lacinia sunt, ferè instar foliorum Leucoij marini, minus incana: flos aureo colore magis rutilat, aliqui per omnia simile. Vtriusque planta lacteo succo plena, & amariuscule gustu est.

SEPTIMUM genus, in Pannonicis Observationibus, quarto loco inter Scorfoneras teposueram, nunc, propter radicis cum illis dissimilitudinem, inrer Hieracij genera commodius referendum cenſco. Angustis autem id constat folijs, Tragopogo aut Scorfonetz angustifoliz proximis, carinatis, colore cinereo, digitalis lógitudinis, lacteo succo plenis, amariusculis: ex quorum medio exilit tener cauliculus, dodrantis, per quem sparsa sunt rara folia, alijs minora: is in aliquot ramos divisus, sustinentes capitula, aliorum more, squamata, quæ in luteos flosculos Tragopogo similes, sed minores explicantur, maturitare in pappum evanescentes: radix nigra est, multis fibris albis capillata, lateribus propagines quotannis agens.

Copiosè nascens illud duntaxat observabam in faxis ad Gamungam Carthusianorum cœnobium, Julio flores proferens.

E x radice obliquâ & rugosâ, minimique digiti crassitudine, multis etiam fibris donatâ, aliquor extuberant Octavo generi capita, unde senu aut plura enascuntur folia, unius, duarum, & trium unciarum longitudine, semunciam lata, crassiore nervo per mediam longitudinem excurrente, mollia, brevi incanâque lanugine prædita, infimâ parte valde lacinia- ta & angustiora, supernâ verò latiora, sed densata duntaxat, candido succo turgentia: è quorum medio, bini aut terni emergunt cauliculi, palmares, enodes, foris læves, intus concavi, sustinentes flores luteos, Quinti generis floribus similes, quibus tamen color paulò saturatior, semen maturum, renue, longiusculum, nigrum, pappo involutum, à vento abripitur, Crescit in Leytenberg, Floretque Iunio.

QVATER.



Hieracium
22.

QUATERNIS aut quinis à radice prodiit Nonum genus folijs. Hieracio vulgari formâ non dissimilibus, sed mollioribus. luteinè magis villosis, infernè præne glabris, lacteo succo plenis, & subamaris, inter quæ prodiit caulis pedalis aut amplioris longitudinis, gracilis, hispida, ferens in summo veluti umbellam quandam caliculorum etiam villosorum, qui dehiscentes, ostendunt flores Hieracij vulgari floribus præne similes, sed colore longè elegantiores, nempe impensè flavos, & quasi aureos, multis foliolis extremâ cuspide crenatis cõstantes, inter quæ flava stamina, odoris non ingrati: semen in pappum aliorum congenerum instar evanescens: radix pereuntis, multis candidis fibris prædita, & tubinde adnatis virgulis humi sparsis sese propagans. Flores promit Iulio & Augusto.

Natum hoc est apud Batavos, semine Viennâ Austriæ accepto.

Hieracium
intybaceum
quod effig. 21.

ALTERA etiam planta istic mihi nata semine ex Italiâ misso Hieracij intybacci appellatione, quæ, mea opinione, verius ad Cichorij genera referenda videtur.

Ea ex singulari radice statim multa promit folia Cichorio silvestri similia, cruce modo inter lateribus divisa, & veluti erosa, deinde inter illa multos breves cauliculos minoribus folijs, minutiq. incisils cinctos, & in frequentes ramulos divisos, dodrantes aut longiores, nudos, summo fastigio sustinentes calicem sive capitulum septem aut octo squamis hirsutis constans, è quo stros exit dens aut duodenis folijs exterioribus, totidem internis, minoribus præditus, coloris elegantis ex purpurâ rubentis, cui succedit pappus, in quo oblongum & gracile semen sulcum.

Annua videtur planta, subinde tamen novos flores proferens, ut totâ æstate, imò etiam in medium usque Autumnum, florida conspiciat.

21.

IAM descriptis conjungendum est puëllum illud Hieracij genus, cujus iconem & ipsam descriptionem etiam Londini mihi communicabat anno M. D. CXCI. Thomas Pettenax V. C. his verbis:

Hieracium
minimum.

Hieracium minimum planta dodrantis, aut paulò altior, radice singulari, tenui, albâ, paucis fibris vestirà: folia ab radice quinque sex, septem, quandoque plura, bellidis ferè, sed paulò longiora & sertiora: eorum medio caulis exit unicus, quadoque duo, vel tres, folijs omnino vidui, fistulares, juxta radicem rubentes, interdum vertus summum ramulorum ramis juxta exortum rubentibus: caules omnes versus capitula, contra ferè quàm in alijs plantis exutubant crassioresque sunt, singuli singula capitula globosa sustinentes, ex quibus flores parvi, lutei, ex apicibus constantes, & tandem pappicentes exoritur. Lactescit & amarifcula est.

Provenit

Provenit inter segetes, locis parum arenosis, & terrâ friabili: frequens in Angliâ multis in locis, aliâs, nusquam nisi in agro Heidelbergensî, unico tantum loco, me vidisse memini. *Natalis.* Julio & Augusto flores. Hæc Pennæus.

Hvvs portò siccam plantam, aut certè valde similem, adferebat anno M. D. CXII. & mihi communicabat, Gulielmus de Mera Medicus, monens, flores in pappum non evanescere, sed sine pappo, in caliculis (ut etiam in sicca plantâ observabam) semè oblongiusculum, maturitate nigricans, relinquere. Animadvertēbam præterea, tenuissimos esse caules, palmum altos, lignosos, supremâ parte laxiores, & concavos, octo aut decem interdum, simul à capite radices inter folia prodeuntes, qui, circa summum, ubi laxari incipiūt, aliquando gracilem ramulum, summo etiam saltim laxiorem, & foliolum ferentem flavum, adnatum habebant: radix tenuis erat, & candicans.

CETERVM Dioscorides Hieracium (cujus haud dubiè hæc sunt genera) vim refrigerandi, & modicè subadstringendi habere auctor est, eam ob causam stomacho æstuantî, & inflammationibus prodesse, impostum: succum, et osiones stomachi forbitione mitigare. Herbam cum radice impostam, idus à scorpione auxiliari.

CONDRIILA.

CAP. XXXVIII.

Dvo Condriillæ genera in Hispaniâ meâ peteginatione observabam: quorum Primum nunquam ante mihi conspectum, ad Dioscoridis primum Condriillæ genus, meâ opinione, plurimum accedere videtur: Alterum multis alijs regionibus, & ante, & post etiam, obvium.

Condriilla prior Diosc. legitima.



LATA Primo generi sunt folia, Cichorij foliorum instar divisa, omnino incana, & densâ lanugine tomentoque obdusa: inter quæ caulis emicat pedalis aut amplior, rotundus, candidus, in aliquot ramulos fissus, folijs minoribus, angustioribus, inordinatis septus, quibus (ut etiam ipsi ramulis) plerumque inhærent grumi fulvescentes gummi istuc concreti: flos extremis ramulis sustinetur, anthemidis flori ferè par, lutei coloris, maturitate in pappum evanescens: radix longa, nigricans, minimi digiti crassitudine, tarsu fibrâ prædita, & summâ parte in aliquot capita interdum divisa, è quorum singulis folia, qualia dixi, prodeunt. Tota (ut diximus) planta incana est, & succo prægnans, qui siccatus fulvescit, & acris est.

Invenitur Salmanticensî agro locis incolitis, & multis alijs Hispaniæ, Augusto florens, vel etiam serius.

Nihil autem commune habet cum Zacyntho Matthioli, seu *Matza di Cavaliero* Italorum, ut quidam censent, qui hanc meam iconem, ex sicca plantâ, quam in sportulis ex Hispaniâ attuleram, à perito pictore expressam, Zacynthæ, sive Cichorij verrucarij descriptioni accommodarunt, illius fortè iconis quæ apud Matthiolum ineptè expressa est, facie decepti: nam Cichorium verrucarium alia habet folia, quàm nostra, intubacea ferè, non incana, sed viridia, ramos valde striatos, & in frequentes ramos divisos, quorum lateribus, & cavis alarum, inhærent brevi petiolo, parvi cichoracei flores, flavi non in pappum abeuntes, sed in capita angulosa & dura transeuntes, octogona plerumque, & clavæ ferè instar efformata, in quibus semen, ut in plantis (semine ex Italiâ misso) mihi Viennæ sæpius natis, non semel observavi. Quæ res sed me cogit, ut Cichorij verrucarij legitimam iconem meæ Condriillæ Primæ subjungam, quòd, utriusque collatione factâ, facilius studiosi discernere nanimadvertant.

ALTERVM planè viminale est, & longis, lentis, flexibilibus, candicantibus, sesquicubitalibus, & veluti visco oblitis, virgis constans, quæ frequentibus angustis, brevibusque foliolis oblitæ sunt: quæ secundum radicem nascuntur majora sunt, longiora, in multas lacinias altè divisa Cyani ferè foliorum æmula: sed plantâ flores jam proferente, flaccescunt ea folia & pereunt,

Hieracium incanum alijs fortè.

Familiam.

Condriilla l. Diosc.

Natalis.

Zacyntho. Matza di Cavaliero.

Cichorium verrucarium.

Condriilla viminalis.



& pereunt, ut magnâ ex parte maioribus folijs orba conspiciatur: extremi rami flosculos exiguos flavos, maritantes in pappum evanescences sustinent: radix oblonga, lacteo succo manat, si vulneretur, quemadmodum & tota planta. Floret quo superius tempore.

Notula. Conspicitur Salmanticensi non modò agro, post messis in arvis, & ad eorum margines, sed plurimis alijs regionibus. Nascitur & copiosè per universam Pannoniam, & varijs Germaniz locis.

Remina. NONnulli Hispani Primum genus, eodem nomine appellant, quo Phyllum ab illis vocari dixi, videlicet *Terna de S. Guiera*: nullum aliud vulgare nomen novi. Græcis autem καρόφιλον καὶ καρχαλοποιὸν ἢ σίριον nuncupatur.

Alterum Condillæ genus vimineum, Salmanticenses *Inguerrina* vocant: alij *Ajnjera*. Non prætermittenda est etiam elegans illa planta Cichoracea, cujus iconem suis coloribus egregie expressim, cum resiccata planta ad me mittebar anno M. D. XCIII. Iacobus, Plateau, cujus in his Commentarijs frequens mentio. Eam propter viminales ramos proximè Condillam viminalis collocare placuit.

Condilla viminalis. At quor autem illi è summo radicis capite prodeunt folia humi fusa, Cichorij foliorum facie, sed angustiora, longiora, in ambitu circumrofa, qualibus etiam sunt prædite, infima parte, tenues vimineæ virgæ, inter illa statim à radice prodeuntes, pedalis aut amplioris longitudo, nodosæ, quarum ramuli bifurci in cuspidem desinunt; nodis superioribus virgarum, inhærent breviora, minoræ, nec circumrofa folia: in ipsi autem virgarum alis nascuntur longi imbricati calices, è quibus prodeunt singulares flores quinque folijs summa parte leviter incisus constantes, cærulei coloris, aliquot flavis staminulis medium florem occupantibus: radix illi crassiuscula densò cortice tecta foris albicante, longiuscula & raris fibris prædita. Tota planta lacteo succo turget.

Facultates. Semine peregrè accepto natâ sibi scribebar: sed an semen porro dedisset, nò adscribebat. Priori, easdem facultates tribuunt Hispani, quas Phyllo: nimirum, illius decoctum præmorbis à cane rabido utiliter exhiberi.

CONDILLÆ gummi cum myrrhâ tritum & linteo appositum, instar olivæ, seminarum mensis trahere auctor est Dioscorides, & inordinatos pilos replicare. Ipsius radicem in vino potam contra vipersas proficere: quæ facultates cum ijs conveniunt, quas sunt Scorfonetæ tribuunt Hispani.

Bellonius lib. II. Observ. cap. xci. scribit Condillæ gummi in Syriâ vulgare esse, eodè mulieres uti Mastichus loco Libro item I. cap. xxxi. ait fabris lignarijs glutinis vicem præbere.

Alterius

Condillæ genus elegans cæruleo flo.

Condilla altera Diosc. putata.



Alterius generis nullus usus est apud Salmanticensēs, quā ad scopas conficiendas: & pueris, ad parandum ex ejus radice cum nigro melle, viscum, carduchibus alijsque aviculis capendis idoneum. Arbitror tamen ipsam cum priore facultatibus pollere. Et Fabius Columna Condril. 1. Diosc. effecenset.

CETERVM Doctissimus vir Ferrantes Impetratus Neapoli ad me mittebat, superiore Autumno, aliquot tubera seu bulbos Cichorij illius renclis & gracilibus cauliculis, parvis folijs & flavo flore, quod à plerisque, etiam ab ipso Imperato, Condillæ genus alterū apud Dioscoridem censetur: tametsi non desint, qui Perdicion, cujus meminit hb. 1. Hist. Plant. cap. xi. Theophrastus (Perdicion enim in eo Auctore legere non memini) esse judicent. Pleraque etiam, inquit, herbaccorum ejusmodi radices habent, ut Aspalax, Crocus, & quod Perdicion appellatur: nam ei sunt radices crassæ, & plures quā folia.

Condilla altera Diosc. Imperato & alijs.

Perdicion Theophr.

Istam autem Condillam nasci senbebat Imperatus in scipibus, via qua Neapoli Putcoliter est: ithe Scrofularia minore, ab alijs *Herba delatte*, à Pandectario Stridula dici.

Namque.

Illam etiam anno M. D. xcvi. Hispali accipiebam à Doctissimo viro Simone de Tovar ejusurbis Medico.

DOCTISSIMVS tamen Leonhardus Rawwolffius, duo alia Condillæ alterius Dioscorid. genera observabat vicinis Halepo locis, ut è cap. ix. lib. 1. itinerarij ejus apparet. In arvis, inquit, satis abundanter invenitur alterum Condillæ Diosc. genus radice lævi, ex fusco flavescente, supernā parte citreæ minimum digitorum crassa, quinque vel octo transversos digitos longa, infimā parte tenuiore, cui inhaeret rotunda alia radix castaneæ magnitudine, lacteo succo adeo plena ut turgat. Superna radice pars qua se in tres cauliculos dividit, flori æqualem, flavum. Non procul inde, asperioribus tamen, magisque petrosis locis, nascebatur aliud insuper Condillæ alterius genus, radice & floribus cum superiore conveniens, cujus tamen folia latiora, magis villosa & cineracea, Holostici Mompelliani folijs ferè similia.

Condilla altera Diosc. Rawwolff.

CONDILLÆ alterius cauli & folijs concoquendi vim tribuit Diosc. ejus verò succo, ut Facolinis, inconvincidos palpebrarum pilos reflectat,

NON minus copiosè nascuntur in Pannoniâ, Austriâ & vicinis Provincijs; vulgata Sonchi genera, quàm in alijs regionibus: aliquot tamen lævioris generis istic præterea observabam, quæ silentio minimè premenda existimavi. Ea serie quadam hoc capite describemus: illorum autem Historiæ, lævioris vulgarissimi, qui valdè lacinosus habet folia, binas icones præfigendas esse censuimus, ut commodius inter se conferri possint.

Sonchus lævior vulgaris 1.

Sonchus lævior vulgaris 11.



1.
Sonchus lævior vulgaris 1.

CYBITALI autem vel ampliore excrescit Primus, quem non vulgarem observabam, caule rotundo, striato, lanugine obdito, intus cavo: quem ambiunt multa folia, ampla, aliquot profundis lacinijs utrinque divisa, extremo mucronata, latiore pediculo caulem amplectentia, in ambitu nonnihil dentata, subtus aliquantulum incana, lacteo succo plenæ plurimos, in summo caule, flores profert, purpurascens & villosi periculis inhzentes, vicenis subje, ut plurimum, constantes, Sonchi lævis vulgaris 1. (cujus icon præfixa) Floribus non dissimiles, sed elegantissimi coloris cærulei, qui per maturitatem in pappum cum semine cinereo eximio evanescunt: radix pollicatis est crassitudinis, oblonga, non in profundum acta, sed obliqua, candicans, dura, veluti inter nodos distincta, multas circumquaque fibras crassas agens, & vivax, singulis annis novos ex latere caules profert.

Matulis.

Abundè nascitur in Durrenstein locis umbrosis, in Etsero jugo, paulò supra Gamin-gam, in Sneberg & Snealben, apud retortidum & pumilionem illum Pinastrum.

Floret istic Julio & Augusto, quo mense etiam semen ad maturitatem pervenit. In hortis translati, maturus multò, imò interdum mense Julio denuo fleret.

11.
Sonchus lævior vulgaris 11.

ÆQUALIS ferè altitudinis sunt Alterius, aliquando, caules, graciliores tamen, nequè striati aut villosi, vel intus cavi, sed pleni & firmi, satis tamen fractu contumaces: quos ambiunt minora quàm superioris folia, nec adèd in laciosas divisa, angustiora præterea, in medio latiuscula, deinde sensim in mucronem desinètia, in ambitu dentata, lacteo succo prægnantia, gustu amaro: è summis foliorum alis, exeunt tenues firmiq; ramuli, quaternos aut quinnos flores in oblongis cauleis serètes, quinis foliolis per extremum laciniatis constan-tes, colore purpureo, medium occupantibus aliquot staminibus, qui deinde in pappum cum suo semine abeunt: radix fibrosa, vivax, prioris radice minor, non pauciores tamen, quotannis novos caules producens.

Matulis.

Crescit cum superiore, paulò supra Gamin-gam abundanter: crescit & alibi, velut in Pan-noniâ

Sonchus lœvior Austriac. 111. cœruleo flo.

Sonchus lœvior Pannon. 1111. purp. flo.



Sonchus lœvior Austriac. v. altiss.



netis, juxta piscinas, & stagnantes aquas, supra Badam Austriæ urbem, via quæ Neapolim

NN a

Austriæ

noniâ & Hirciniâ silvâ, sed minor. Floret plerumque Julio, vel interdum paulò maturius.

HYMANAM altitudinem superat Tertius, caule pollicaris crassitudinis, firmo, striato, lœvi, nec ullis spinis aspero, quem frequenter folia, quatuor aut aliquando binis tantum lacinijis æqualiter respondentibus divisa, latâ basi & utrinque appendices habente amplectuntur (de ijs loquor quæ in infimo & medio caule sunt, suprema enim nullas lacinias habens) omnia spinis in dorso, sive costâ, carentia, dura tamè, & in ambitu ereberrimis asperisq; denticulis ferrata, supernè viridia, inferoè subcinerea, lacteo succo plena: supremus caulis vilis aspersus est, & in aliquot ramulos dividitur, qui flores æquali altitudine, & quasi umbellarum ritu nascentes, sustinet, non magnos quidem, pro stirpis amplitudine, sed Sonchi vulgaris lœvis luteo flore, vel ejus qui cœruleû fert florem, pares, similiter è caliculo villosoprodeuntes, multis luteis & per extremum incisissoliolis medium orbem cingentibus constantes, numerosis in meducillis flammioibus aureis, qui maturi io albâ lanuginem resolvuntur, in quâ later semè, ejus, qui cœruleum fert florem, semini, valde simile, striatum, cineraceum, quod cum suâ lanugine à vêtô rapitur: radix crassa, eandicans, fibris donata, singulis annis novos stolones profert, & adnatis ad latera se propagat.

111.
Sonchus lœvior
altiss.

Invenitur in paludosis salicetis & harundin.

Natalis

Austris ducit, & supra Triebswinkel pagum, quibus duntaxat locis observabam. Floret Iulio.

Cum porro hæ plantæ Sonchi sint haud dubiè genera, iisdem etiam facultatibus prædita esse, verisimile est. Dioscorides autem, Vtriusque Sonchi vim refrigerare, modicèque adstringere auctor est, propterea æstuanti stomacho & inflammationibus illitu prodesse, succum, Stomachi rosiones, sorbitione mitigare, lac elicere, in lanâ appositum, sedis ac vulvæ collectionibus, opitulari; Herbam autem & radicem, emplastrum modo impositam, scorpiionum idibus subvenire.

CIRSIVM

CAP. XL

SEd & plura inveniuntur Cirsij genera, quorum (quæ ab alijs non descripta comperiemus) historiam hoc capite pertexemus.

Cirsium Pannonic. I. pratense.

Cirsium Anglicum ti.



I.
Cirsium praten-
se.

II.
Cirsium Bri-
tannicum.

QVINA aut sena Primum genus statim à radice promit folia, circiter tres uncias longa, unam lata, sensim in mucronem desinentia, latiore verò circa pediculum basi, subhitta, & crebris spinulis per circumferentiam prædita, cæsisque coloris: ex horum medio, caulis emicat pedalis, aut etiam cubitalis, tenuis, firmus, lanugine quadam oblitus (per quem sparsa sunt folia jam dictis minora) unicum in summo plerumque ferens caput, nonnunquam altetum & tertium, multis squamulis imbricatum compactis, nonnihil purpurascens & acutis asperum, quod in flammæum florem expanditur, vulgare Cirsiorum modo, colore putpurco: semen etiam illorum semini non dissimile, multâ lanugine involutum nascens: radix multis nigricantibus & duris fibris prædita est, eamque supremo capite hirsutam, vetustorum foliorum nervi remanentes efficiunt.

Nascitur inter arbores in declivi montium supra Pannoniæ urbem Sopronium: sed montanis pratis quæ secundum Danubium extenduntur, multo abundantius. Iunio floret, & subinde semen etiam profert.

PROXIMUM locum dabimus Alteri Cirsij generi non minus eleganti, cujus descriptionem & iconem mihi anno M. D. XXCI. communicabat Londini C. V. Thomas Pezæus Loodinensis medicus.

Singulari caule est hæc planta, cubitali aut ampliore: folia per caulem alterna, longa, in ambitu spinulas minimè pungentes habentia, quorû supina partes virent, pronæ albicant, & canâ

& carâ lanugine obducuntur: in summo caule capitulum unum carduorum modo est, quasi ex squamis mucronatis compactum, florem sustinens satis magnum, ex multis apicibus, colore ex rubro purpurascens, ac tandem in pappum abeuntem: radix est nigricans, fibrata, quandoque per magnas fibras se propagans.

Provenit in pratis ad tadicem montis Engleborow totius Angliæ celsissimi in Comitatu Eboracensi. Florer Julio & Augusto.

Cirsium ite. montanum.

Cirsio v. congener, Card. bulbos. Monsp.



MULTA etiam profert Tercium, folia, oblonga, Centaurij majoris non laciniata, foliorum propemodum æmula, brassicæ foliorum colore & viriditate, satis carnosa, in ambitu crebris aculeis prædita: inter quæ medius exit caulis, cu bitalis aut amplior, striatus, quem alternè ambiunt folia superioribus minora, lanioe pedicelo eum amplectentia, & veluti membranaceas quasdam alas, ad proxima folia, secundum caulis, cui adnatæ sunt, longitudinem producentia, eâ de causâ caules quodammodo alati apparent: summus caulis in hispidum, multisque squamulis imbricatum caput desinit, quod tandem in flamineum florem purpureo colore rubentem explicatur, & propendet: in superioribus alis nascuntur interdum ramuli quadam lanugine obsiti, similes sustinentes flores, qui deinde, ut alij, in pappum & lanuginem resolvuntur, semenque in eâ reliquis simile occultant: radix minimi interdum digitæ crassitudine, aliquot fibris donata & vivax, singulis annis propagines è lateribus fundit.

1110.
Cirsium montanum 1.

Crescens hoc genus observabam in montanis quibusdam silvis Pannoniæ, ut supra Pannonum & Memethwywar, alijs etiam ad Alpes tendentibus, supra Badenses videlicet Thermas, & vicinis. Florebat Junio.

Natalis.

Hujus meminit Dodonæus in Appendice ad Purgantium Stirpium Historiam, quam fecit, ante quàm Pentades evulgaret, publici juris, fecerat: & primo postea loco descripsit cap. xix. Lib. v. Pemptadis v.

VULGARE isdem locis etiam est montanum aliud Cirsium, quod aliquando in Belgicæ hortis ali memini, caule striato, folijs paululum laciniatis, mollioribus quàm in superiore genere, similibus tamen floribus, radice etiam fibrosa & vivace.

1112.
Cirsium mont. 11.

AD Cirsij proculdubio genera referendum est id Cardui, sive Spinæ molle genus, quod in cibuitalem, & majorem interdum altitudinem excrevit pollicaris crassitudinis caule, striato, incanâ tomentaceaque lanugine obsito: folia illi majora quàm in superioribus generibus, magis carnosa, succi plena, viridia, in ambitu dentata, molliusque spinis hirta: capra in summo caule summisque ramis majora jam descriptis, quæ in flamineis purpureo colore nitentes flores expansa, maturitate in pappum resolvuntur: ra-

v.
Cirsii max.
mont. 11.
bulb. radem.

Natalis.

Nardo mil-
laria Mon-
speliensi.

Nemina.

Cirsium
terreum
Dedonai.
Varietas.

tur: radix multis crassis fibris, Alphodelinos bulbos fete referentibus, & oblongis fitmatur. Nascentur in montanis pratis, etiam ad piscinarum ufos margines, inter salices ameri- nas quoque, & harundines. Floret Iulio.

Similem plantam, sed longè minorem in pratis utbi Mompellianæ vicinis olim crue- re memini, quam tum nonnulli, qui in Sturpium cognitione egregie versati esse crede- bantur, pro montanâ Nardo nobis obtudere volebant: noster Lobellius postea Carduum bulbosum Monspelienſium appellavit.

Kyprie porrò nomine Græcis, Cirsij autem, Latinis, commodè, meo iudicio, hæc stirpes nuncupari possunt: nullum verò nomen vulgare illarum intellexi.

A N verò Cirsij veterum facultatibus respondeant, ignorare me fateor: & iudicium de ijs ferre difficile. Nam neque Dioscorides suo Cirsio ullas vites tribuit, nisi quas ex Andrea descriptit.

CETERVM non minus vulgaris agro Viennensi, multisque Pannoniæ locis & apud Francofurtum, est, quàm in Zelandia, Flandriæ Hollandiæque maximis, Spina illa quam Clariss. Dodonæus inter Cirsij genera tertio loco recenset, magno, valde spinoso, nutan- teque capite, è quo flos multis purpureis elegantissimisque staminibus constans emergit & explicatur: Floret cum Cirsij generibus Iunio, & Iulio, quibus etiam persimile semen habet. Id niveo flore variare aliquando memini.

CARDVVS MOLLIOR.

CAP. XLI.

CARDVI nomine has stirpes appello, tametsi inter Acanacei generis plantas recen- sendæ non videantur, cum nullo spinarum vallo munita sint: propter similitudinem tamen, quam cum mollioribus quibusdam vulgaribus notis cardus habent, in illorum classem rejeci.

Carduus mollior t.

I.
Carduus
mollis la-
ciniosus fol.

Natalis.

II.
Carduus
mollis La-
pathi folio.

PRIMVS, multa secundum radicem habet folia, cum humi sparsa & jacentia, cum surrecta, infernè canâ mollique lanugine ob- sita, supernè virentia, valde laciniosa, & ad medium usque nervum dissecta, Calcitrax, sive cardui muricato capite, mollioribus & tenerioribus folijs præne similia, nullis tamen spinis horrentia, gustu primùm exsiccante, deinde amariuscule: è quorum medio unus aut alter caulis assurgit cubitalis aut amplior, teres, rotundus, striatus, purpurascens, & molli quadam lanugine obtusus: inferiora fo- lia per infimum caulem sparsa, etiam lacinio- sa sunt, licet jam dictis minora, quæ verò su- premum caulem ambiunt, oblonga, angusta, nullis lacinijs divisa, mucrone ut plurimum purpurascente: extemi caules in aliquot ra- mos interdum dividuntur (magnâ tamen ex parte singulares sunt, unicùmque sustinent caput) qui capitula sustinent, ex multis tenui- bus squamis imbricatis dispositis compo- sita, molliter echinata, quorum medium, oc- cupat stamineus & villosus flos, coloris pur- purei elegantissimi: flori flaccido & evanido succedit semen angulosum: radix digiti cras- situdinem nonnunquam æquat, subfusca, longa, aliquot fibris donata.

Invenitur totâ illâ montium catenâ, quæ à Calenberg & Danubio, cui imminet, ad Al- pes usque extenditur, & deinde per Leyten- berg, rursusque per Prellenberg & Ham- burgerberg ad Danubium duobus supra Po- sonium miliaribus reflectitur. Floret Maio, semen perficit Iunio & Iulio.

PEDALI assurgit Alter caule, utcumque crasso, striato, nonnihil lanuginoso: folia illi circa radicem maiora, Lapathi folijs ferè similia, aut potius illius plantæ, quam vulgo To- tam bonam, sive Bonum Henricum cognominant, quâ pediculo adhaerent, latiora, & quo- dammodo angulosa, extremâ verò parte mucronata, in ambitu aliquantulum sinuosa, & mollibus veluti aculeis obdita, supinâ parte virentia, pronâ verò, omnino incana, solum albe

Carduus mollior II.



albæ Populi instar, & densâ lanugine obfita, gustu initio exsiccante, deinde amariuscule, quæ vetò caulem amplectuntur, minorâ sunt & angustiorâ, ex quorû sinu circa summum caulem ramuli exeunt, teroâ, quateina, aut plura sustinentes capitula squamata, Cyani, aut laccæ capitulis respondentia, quæ, dū expanduntur, florem præmunt ex cæruleo purpurascetem, & semen deinde continet lanugine involutum, cyani semini non valde dissimile, sed paulò majus, candicans: radix nigra, aliquot teousibus fibris prædita, dura, vivax, è lateribus propagines spargit.

Hunc ericbam, circa secundum Sneberg, ^{Natalis.} excelsi admodum montis, jugum inter saxa nascentem cum Auricula urti flavo flore incano folio: deinde etiam in Eschero. Florebat utroque loco mense Julio. Viennam relatus & in horto repositus semig tulit Augusto, deinde perijt. Vbi tamen spore nascitur, vivax est: nâ superioris anni caules aridos retinentem, cum floreret, deprehendebam.

HVMILIOR hic est, neque palmarem altitudinem excedit, caule nò minus crasso semè quàm superioris, multis longis folijs exornato, superne etiam virentibus, inferne canâ (non tamen adeò densâ, ut superioris folia) lanugine vestitis, & molles quâdam spinas in ambitu obtinentibus, gustu seriâ amari, initio autem adstringentis: summo cauli insidet singulare capitulû squamatum, majus quàm præcedētis capita, ex quo flos mul-

III.
Carduus
mollis ha-
mili or-
gustul.

tâ lanugine ex cæruleo purpurascete pubescens exoritur: semen observare nò potui: nam tamen aliquot stirpes in horto magnâ diligentia excoluerim, quas loco natali & florentes & nondum florentes erucram, ad frugem tamen non pervenerunt, sed paulatim flaccescentes, prorsus tandem contabuerunt & perierunt: radix nigra, & frequentibus subnigris fibris prædita, subinde nova germina è laretibus producit.

Crescit in summis Snealben jugis, cum Auricula urti quarta, quæ glabro & splendente est folio, carnei coloris flore. Floret verò Julio & Augusto.

Natalis.

GESNERO atque Benedicte Aretio notus fuisse videtur Prior, ex relatione Simleri ad ealceum Commentarij de Alpibus, qui cum sic describit.

Obtulist! Carduus inter Carduos speciosissimus, folia habet mollia, ab una radice, per caulem rara, quæ referunt folia herbæ quam *Strophium* nominamus: alititudine cubiti in altum assurgit caulis: capita in summo sunt singula, interdû bina, cærulea, quâdoq; alba, interdum purpurea, color collucet mixtus viridi tû in capitibus, tum in supremis foliis. Mollis est tota, & etiam spinis quas æmulatur, nam non pungunt. Radix subest longa & bifida.

Edelweiss
Gefam.

Illam florum varietatem in meo non observabam, sed toto illo, quem dixi, tractu & circulo, unius duntaxat coloris ferentem florem, nempe purpureum elegantissimum.

CAROLI etiam mollioris genus elegans, præ altum, & radice serpente, videre memini in cultissimo horto C. V. Ioachimi Camerarij Reip. Nonbergensis Medici primarij: cujus descriptione cum plenique alijs sum mâ diligentia observatis in studioforum rei herbariæ gratiam brevi in lucem emissurum speramus, tamen in adornâdis Matthioli Cômmentarijs quos Germanico sermone loquētes fecit, & valde illustravit, & iisdem in Epipomen contrahendis latine scriptam egregiam jam collocavit operam, & multas novas icones intulcrit.

Carduus
mollis Ca-
merarij.

De istarum Plantarum facultatibus nihil pronuciare possum, cum de illis, neque à rusticis, neque à montanis venaroribus quidpiam intellexerim. Ex earum tamen qualitatibus & temperamento, peritiores medici facile judicabunt.

C N I C U S.

CAP. XLII.

LEGITIMVS Cnicus vulgaris est notitiæ, atque illius usus, omnibus satis cognitus: de eo ut Laganus, non est opere pretium: nam quotquot de re herbariâ scripserunt, & ejus hистoriâ dederunt, & iconem proposuerunt. Eam tamen huc inulimus, quia de alio Cnici genere, quod in Hispanijs observabam, sumus acturi, cum quo hujus icona conferri possit.

VNICVS

Cnicus vulgaris.

Cnicus alter Clusij, caeruleo flore.



Cnicus alter. VNICVS plerumque, Alteri Cnico est caulis: interdum statim à radice dividitur in binos, ternos aut quaternos ramos, cubitales, firmos & lignosos, perinde ac ipse caulis, nullis tamen, aut quàm paucissimis alijs ramis præditos: folia parè Cnici vulgaris, candidiora, paulò longiora, & pluribus venis distincta: capitula Cnici, è squamis, imbricatum instar, sibi invicem impositis, conflata, è quibus flos colore diversus: nam luteus non est, sed ex multis staminibus caerulei coloris constar: semen Cnici semine minus & subrotundum: radix pollicaris crassitudinis est, carnosa, succulenta, foris fusca, non annua, ut vulgaris radix, sed aliquot annis interdum permanens.

Matris. Circa Cordubam in segetibus & agro Hispalensi invenitur. Floret Maio & Junio.
NOMEN vulgare, quod sciam, non habet: sed cum totà propemodum facie vulgarem Cnicum referat, Cnicum alterum nuncupavi.

Herminæ. CNICVS autem legitimus Græcis *κνικόν*: Mauritanis, *Kartan*, à qua voce Officinæ Cartamum appellantur; Italis, *Saffarano Saracinesco*; Gallis *Saffran baslard, graine de Perrequet*, quòd ejus semine Pistacis alere soleant: Hispanis, *Algar*, *Açofran salvaje*: Germanis *Wilder Gessan*. Alterius nullum nomen vulgare novi: neque ejus facultates còpertas habeo.

Facultates. DIOSCORIDES verò scribit, Seminis tui, & expressi succum, cum aquà mulsa, vel jure gallinacei, alvum purgare, sed stomacho advertari: lac cogere, & magis ipsum resolvendæ alvi facultate donare.

SCOLYMVS THEOPHRASTI.

CAP. XLIII.

Scolymus Theophrasti, à Scolymo Dioscoridi differt.

THEOPHRASTI Scolymus à Dioscoridis Scolymo valde differt, ut peritiores omnescerent: nam Theophrasti Scolymus ignotus fuisse videtur Dioscoridi: Dioscoridis autem Scolymum probe novit Theophrastus, qui Cacti appellatione eum donat. Nos autem de Theophrasti Scolymo hoc capite agemus, & sub ejus finem, Dioscoridis Scolymi mentionem subijciemus.

Scolymus Theophrasti.

ALIQUOT autem profert ab eadem radice, Scolymus Theophrasti, caules, cubitales, ramosos, spinis horrentes, ad quorum singulas alas nascuntur saturè virentia folia, sinuosa, & albis spinis horrida: flos illi luteus, Cnici floris fermè instar, è spinosis capitulis emergit: quibus succedat semen larum, foliaceum, squamatum coherens: radix autem longa est, digitalis crassitudinis, carnosa, dulcis, qua fœces non minus libenter vescuntur, quàm Eryngij vulgaris radice, ut ego aliquoties confexi, dum, Salmantica vivens, observandarum stupium



Scolymus Diocor. Caños Theoph.



stirpium causâ, vicina circa eam urbem loca peragrarem. Tota verò planta, recens adhuc, lacteo succo manat.

Salmanticensi agro, totâq; adeò Castellâ, frequentissima est hæc planta. Integra estate florescit, interdum etiam Autumno, subinde semen proferens.

ILLI similem videre memini circa Mompelium, sed multò magis luxuriantem, longioribus ramis, minus tamen frequentibus floribus, & cui folia veluti lacteis maculis aspersa sint.

THEOPHRASTI σκόλυμος esse putatur, cui radicem tribuit lacteum succum emittentem, eamque velendam tum decoctâ, tum crudam scribit lib. VI. Plant. Histor. cap. IV. Anguillara Eryngium Vegetij esse arbitrat, quæ, ni fallor, causa fuit, ut à nonnullis Eryngium luteum appellaretur. Salmanticenses Silybum nuncupabant (Silybum tamen Diocoridis non est) vernaculâ linguâ Cardon lechal, sive lechal, id est, carduum lacteum. Bellonius lib. I. Observationum cap. XVIII. & XXV. à Cretensibus vulgari Græco sermone σκόλυμος dici tradit: agro autem Romano Spina barda: atque veteribus latinis Græco nomine Glycyrrhizon nuncupatum æstimat.

SALMANTICENSES, tenellam adhuc plantam, & primum germinantem, cum ipsâ radice elotam, crudam, aut cum carnibus coctam edunt: ipsius lacteo succo omne lactis genus coagulant: etiam ejus flore crocum adulterant (tamenâ vicinis locis laudatum crocum abunde nascitur) ut quædam alix nationes cnicî flore.

CATERVM

Narbo.

Eryngium
Vegetij
Silybum.

Cardon le
chal.

σκόλυμος

Scolymus
Dioscoridis
scilicet Theophrasti
prosp.

CETERVM Dioscoridis *σκόλυμος* Scolymus qui Theophrasti *καλατος* est, magnā copiā sponte nascitur pinguibus Lusitaniae arvis, praesertim ad Anam, veteribus appellatum Numen, vulgo *Cardus-ana*, & plerisque etiam Batice locis.

ILLIUS radix Diosc. teste; graveolentiam alarum, totiusque corporis emendat, illita, item si decocta, in vino bibatur. Copiosam autem urinam ex tunc quoque expellit.

CARDVVS ERIOCEPHALVS.

CAP. XLIIII.

Cardus
eriocephalus.



Natalis.

HVC Carduo multa initio sunt folia, humisparia, magna, longa, valde laciniola, spinis horrentia, pronā parte canescentia, in pinā autem, viridia quidem, sed tenet quadam lanugine obrita: inter quae, cubitalis, nonnumquam longē amplior excrevit caulis, crassus, striatus, in multos ramos divisus, folijs aut similibus ijs quae per terram sparsa, aut minoribus, inordinatē cum & ramos cingentibus: summis tamis innascuntur crassa capita, multis aculeis praedita, & adeo densa lanugine involuta, ut spinæ paululum donatae emineant: apertentibus scilicet capitibus, flos emergit multis purpureis staminibus constans: cui succedit pappo involorum semen, splendens, longiusculum, quale in multis carduis: radix longa, paucis fibris praedita, pollicarem crassitudinem excedit, & foris sulca est, quibusdam in quibus sponte nascitur: locis vivax, in alijs minime.

Observabam primum hanc plantam anno m. n. 1511. Salmanticensi agro locis apertis & non cultris nascentem, cuiusque semen amicis in Belgium mittebam, additā inscriptione, forte *Corona fratrum*, quia multis nutus respondere videbam, cum ea plantā, quam Monachi, Commentarijs in Mcsven, sibi in Hispaniā conspectam, Coronam fratrum appellassent, quoniam tam aequali panē alioquin nascentes, & suis capitibus criorhoris onusti, medium caput, reliquis majus, summo cauli innatum, quodammodo in orbem cingerent, ut monachi suum Abbatem aut Priorem solent. Ex quo tempore dia apud Belgas (ubi feliciter provenit, & in maiorem amplitudinem evasit, nullā servatā tamorum extremorum aequalitate) Coronae fratrum nomen obtinuit: postea tamen à capitibus candicante lanā involutis, convenientiore appellatione Carduus eriocephalus dici coepit.

Favos.

Eum deinde non minus vegetum & luxuriantem, quā in Belgicis hortis, sponte cre-
scentem reperi multis Austrae & Stitiae locis, praesertim verò ad Neuberg & similem Al-
pium radices, ubi interdum florem variantem, & albis staminibus constantem fere
conspexi.

QUIBUS porro facultatibus peculiaribus sit praeditum, neque ego intellexi, neque
quonquam fecisse peticulum arbitror.

CHAMÆLEON SALMANTICEN.

CAP. XLV.

Chamaeleon
Salmantic.

EX Acanaceorum genere est hae planta: caulem autem pedalem habet, interdum etiam cubitalem, multis alis sive ramis concavum, striatum, & quasi *φωλλωδης*, durum tamen & firmum: folia numerosa, longa, angusta, candicantia, spinis horrida: summis ramis veluti umbellae quaedam ex quinis aut senis caliculis sive capitellis spinosis constantes innascuntur, in quibus flos putpureus dilutior, qui (maturo semine) subinde in pappum evanescit, reliquorum Acanaceorum more: semen est enici feminis forma, sed minus, foris subnigrum aut cinerei coloris, intus candidum, dulce: radix nigra, dura, si gustetur, dulcis. Tota planta *ακανωδης* est, & fituatum spinarum vallo munita.


Natalis.

Agro Salmanticensi frequens in arvis, cum Scolymo Theophrasti. Flotet Iulio, semen Augusto maturum est. Apud Belgas natus, semine ex Hispanijs à me missio, alius assurgebat, neque adeo candicabat, & semen tardē ad maturitatem perveniebat.

VOCABA -

Chamazleon Salmanticensis.

Chamazleon alb. Diosc. & Theoph.



Carlina elatior, Chamazleon alb. vulg.



VOCABATUR à Salmanticensibus Chamazleon, tamen si historia prorsus tetragetur: asinitatem tamen habere videtur, cum eà plantà, quam Anguillara pro Chamazleone nigro Dioscoridis exhibet.

CETERVM, Chamazleon albus Dioscoridis, sive & Theophrasti existimatus, in Pannonia, Austria, & Stiria montium declivibus à me observabatur, capite amplo, ectynato (ex quo flos multis albis folijs circa orbem medium nascentibus constans) siue caule è medio foliorum humi fulorum, longorum & in ambiru tinuolorum, atque spinis armatorum emergente: radice crassa, denso cortice obducta, foris fusca.

Chamazleon alb. Diosc. & Theoph.

SED multò frequentior invenitur Altribile, qui pedalem caulem acquirit, angustiora habet folia, in multas laciniis divisa, non paucioribus tamen, quàm superioris folia, aculeis horrida, caput in extremo caule minus amplum, florè inque minorem: radix perinde crassa ac superioris, foris etiam fusci coloris.

UTRAQUE Carolinz, à Carolo Magno, nomen adepta, sive Carlinz, qui illius usum primus demonstrasse creditur, Germanis Elma dicitur.

Carlina alb. Diosc. & Theoph.

ALIA verò est planta à quibusdam Carlina minor appellata, humilis & ut plurimum caulis expers, folia habens, Secundè Carlinz folijs non valde dissimilia, saturatius tamen vi-

Carlina minor.

rentia,

Carlina minor, purpureo flore.

Cardus Te-
pentinus-
ham.Chamaem
Theop.Carlina fl.
Acarna
Theop.Eryngium
strigosum

Carlina silvest. vulgaris.

Carlina fl.
minor.

Natalis.

Natalis.

Natalis
Theop.

reotia, & mollioribus spinis prædita: capita mul-
tò minor, & purpureum florem. Hæc frequẽs
in pratis montanis & siccioribus, etiam io ac-
chivratibus herbidorum collum.

LOBELIVS Carduum Septentrionalium
sine caule, Chamæleonem album Cordi &
Chamæleonem exiguum Tragi appellat: Ger-
mao: *Ruin Ehemuntj*: Ex quorundam autem opi-
nionẽ, non videtur dissimilis esse Chamæleoni
Theophrasti, cujus meminit lib. Histor. Plan-
tar. vi. cap. lti.

CARLINA SILVESTRIS.

CAP. XLVI.

SI quis diligenter conferat vulgarissimam il-
lam spinam, quæ circa publicas vias in arvo-
rum marginibus & ægribus, ubique ferẽ na-
scitur, cum Acarnâ Theophrasti, cujus memi-
nit Plantarum Historiæ lib. vi. cap. l. l. i. his
verbis: *ἡ ἀκάρνα ἀροσσυμένης ὡς ἀσπλάγχεσσαν, κατὰ τὴν φύσιν τῆς κίκου τῆς ἡμετέρας· ἀρῶμα δὲ
ἰσχυρὸν, λυγρὸν*, hoc est, Acarna, quantum
simpliciter exprimere licet, aspectu cnico do-
mestico similis est: colore flavescens & pin-
guior: non valde dissimilis forte reperiet: aut
saltem ad Eryngium illud referri posse oco ne-
gabit, quod Aënus de Archigenis sententia de-
scribit, folijs Attrachylidis, durioribus, & ex
candido pallidioribus, multistamnis ab uoâ ra-
dice cubitalibus: floribus euphralmo simili-
bus, sed oculi formam flamina in medio na-
scentia perturbant.

ILLIVS autem Historiam hoc capite
non repetimus, est enim non modo ab alijs
descripta, sed etiam ipsa planta omnibus no-
tissima. Iconem tamen subijcimus, quia ele-
gans aliud ejus genus in Hispaniâ meâ pere-
grinatione observabam, cujus historiam hic
adponendam operæ precium esse duxi, licet
ante in Hispaniis Observationibus fuerit & vul-
gara.

PALME verò altitudinem ea planta non
superat, cauliculo tenui, unico, canâ lanugi-
ne obfuso: folia illi Carlina silvestris (cujus mo-
do meminimus) foliorum æmula, minora,
incana, spinis horrida, summo cauliculi fasti-
gio, bina ut plurimum, fert capitula spinosa
(oonnunquam etiam in alijs) in quibus flos lu-
reus orbem oculi imitans, media lanugine pal-
lida, quam ambiunt rigidiuscula & exflacca
foliola, coloris flavi: radix tenuis, rufesceos,
vivax non est, sed singulis anois perit.

Nusquam hanc inveniebam, quàm aridis
quibusdam petrosisque & desertis circa Sal-
manricensem urbem locis, promissuẽ nasce-
ntem cum thymo duriorẽ, & Augusto mensẽ
florentem.

VULGARE ejus nomen noo intellexi,
imò ipsis etiam medicis islic ignora. Priorem
verò, Carlina silvestrem nonnulli vocant, alij
ὀκράγος Theophrasti esse censent, ejus inter
aculeata

Carlina silvest. minor Hispan.



Eryngium campestre, vulgare.



tum à C. V. Paulo Fabricio Medico & trium Cass. Mathematico.

aeuleatas meminit, Plantarum Histor. lib. vi. cap. 111. Germani *Ösep distel* & *Sow distel* appellant: Viennenses thizotomæ: & alii *triant* nominant ab effectu, quia non modò illius seccæ sive recentis gestatione, sed etiam intuitu, *dem fat* (sic) & faucium accensionem ex nimâ crapulâ & bilis regurgitatione ortam esse puto) sibi, vulgus istie sibi persuadet, & experimento probatum asserit. Certè aliquando observavi, Nobilium virorum famulos in equis heros suos præcuntes, hujus herbam in pileis gestantes, ut perpetuò nimirum illam heri in conspectu haberent, & si corripere eo vitio, ab illo liberarentur.

ERYNGIUM. CAP. XLVII.

PRÆTER vulgare Eryngium singulis notum, & in omnibus, quas adij Provincijs, frequenter obvium, observabam etiam peculiaria quædam alia genera, quorum Historiam hoc capite dabimus.

BICUBITALEM autem, vel ampliorem habet Primum altitudinem, caulem firmum, striatum, medullâ albâ plenum, ac veluti nodis distinctum, præsertim quâ parte cum amplectuntur latâ & membranaceâ sede folia, tres aut plures uncias longa, duas lata, viridia, venosa, in ambitu serrata, & aspera nonnihil, subamaro, acrisculôque gustu: quæ verò circa radicem nascuntur, longiora latioraque sunt, & oblongis pediculis innituntur: summus caulis in aliquot ramos divisus, breviora folia habet, eaque in profundas lacinias divisa, & mollibus spinis prædita: summæ deinde alæ in aliquot ramulos desinunt, echinata capitula ferentes, sphericæ ferè rotunditatis, in quibus multi carulei flusculi albicantibus staminibus præditi, sub ipsis autem capitulis novem aut plura oblonga, angusta, aeuleata foliola, stellæ instar expansa: ipsa porò capitula cum summis ramulis, supremæque caulis parte, interdum vetustate cæruleum prorsus colorem adquirunt: radix in novellis plantis digiti crassitudinem & longitudinem æquat, aliquot fibris donata, foris subfusca, intus alba, carnosa, gustu dulcicula, perinde ac Eryngij marini radix: vetustate subinde grandescit, & in plures alias radices extruberat, singulis annis ex lateribus frequentiores caules proferens: aliquando tamen hoc in ista plantâ observabam, ut producto semine, subsequens hiems illam prorsus corumperet, præteritum cultionibus locis.

Frequens nascitur in pratis ad Danubium su. *Natali.* pra & infra Viennam sitis promiscuè cum Asparago, & in hortos illatum feliciter provenit. Floret Junio & Julio.

Simile planè in Silesiacis montibus sponte natum ad me mittebat Viennæ Achilles Cromerus Medicus: nec huic forè abssimile quod Pena & Lobelius in Adversarijs describunt. Idem verò profuse est cum eo quod Matthiolum planum nuncupat, ipsi primum demonstra-

Ejus

Eryngium Pannonicum latifol.

Eryngium pulillum planum Moutoni.



Facies.

Ejus autem formam variare, mihi testis est N. V. Ioannes à Hoghelande, qui anno M. D. XCII non modò scribebat, habere se plantam femine ipsi naram, cujus flores non cærulei, sed albi essent; caulis non purpurascens, sed ex viridi pallescens, verum etiam caulis supremam partem aridam, & semen, eodem anno Francofurtum ad me mittebat.

111.
Eryngium
planum Moutoni.

ALIVD etiam est Eryngij (plani cognominati) genus, non à me quidem natali loco observatum, sed in exculto horro Ill. viri Ioannis de Brancion crescens conspectum, quod Ioannis Moutoni Tornacensis Pharmacopæi doctissimi, & in Scirpium cognirione exercitissimi, munere acceperat.

Id autem humile erat, statim à radice in plures ramos divaricatum, teretes, rotundos, procumbentes, ad quorum singula veluti genicula nascebantur inordinata folia, extremo laticuscula, circa pediculum angustiora & crenata: quæ verò circa radicem, formâ quidem illis similia, sed ampliora, unciâ lata, binas aut amplius longa, ex viridi pallescentis coloris: frequentes ex alis ramuli nascebantur, ad quorum singulos nodos foliola, & echinata virentiaque capitula exoriebantur. Florem observare non licuit, qui nondum se prodebat, cum subsequenter Autumnum Viennam evocarer: radix satis crassa, & aliquot fibris donata: quin & procumbentes cauliculi plures, secundum radicis caput, crassiusculas fibras agunt, quibus subinde sese firmant.

111.
Eryngium
pulillum
Moutoni.

TERTIUM genus quod in Hispanijs observabam, passim agro Salmanticensi in collibus nascitur, palmi, nonnunquam pedis altitudine, caule gracili, multiramis, ex adverso ut plurimum nascentibus, prædito: folia circa radicem in rotæ speciem humi sparguntur, majuscula, laticuscula, & molliora: at, quæ in ipso caule sub alis nascuntur, multida sunt, tenuia, in ambitu serrata & aculeata: ramulorum summitatibus globosa insident capitula, octo plerumque spinosorum foliorum ambitu stellæ instar circumvallata, ipsa etiam spinosa: flos & tota capitula cum suis foliis ea ambiens cærulei sunt coloris: succrescente plantâ, folia secundum radicem in orbem nascèntia marcescunt, deinde alia caulem ambiens exsiccantur & decidunt, ut rard plantam (cum defloruit) cum folijs, præsertim inferiuribus, reperire liceat: radix dura quidem & lignosa, sed quæ non vivax sit, & singulis annis semine maruto pereat, semineque deceduo renascatur.

Natalis.

Post menses plerumque invenitur, quo commemoravi loco: nusquam alibi videre memini: se mine quidem inde relato, narum est apud Belgas, sed serius flores protulit, qui nulum semen dederunt, deinde color ille cæruleus longe fuit remissior.

1111.
Eryngium
pulillum.

CÆTERVM Eryngij genus natum memini Ill. Viri Joanni de Brancion, cujus hoc cap. mentionem

Eryngium pumilum Hispanic.

Eryngium maritimum.



mentionem feci, semine à Gallia misso Eryngij montani nomine à Doddis, viro eodemq; Regis Galliz Chirurgo pentissimo Nicolao Rasso, quod nullà in re d. ftebat à vulgari & passim obvio, præterquam summorum ramorum & capitulorum colore, qui elegans cæruleus erat. radix etiam non minus crassa, longa, sub terra 'e condens. & repens.

Quod verò maritimis locis nascitur Eryngium, amplis & crassis folijs, minimè laciniosis, sinuosis tamen in ambitu, & spinosis (nisi cum novella sunt) rō modò in calidiori regionum, quales sunt Hispania, Italia, Gallia Narbonensis & similes, sed etiam frigidiorum & ad Septentrionem vergentium, ut sunt Anglia, Belgivm. Hollandia, atque alix ijs adhuc frigidiores, maritimis frequens sponte nascitur, & radice sub terrā vagatur.

Eryngium porro, Græcis ἑρύνγιον: Italis, Iringe. Gallis, P. n. c. : Hispanis, Cordo coroder, quia caulis resiccatus & abruptus, à vento impelli & provolvi solet, præsertim locis planis & apertis: Germanis Raschen büschel & Mianen non dicitur: vulgare vocant officinar, Iringum: nonnulli Centumcapita.

Dioscoridi, radices Eryngij ruse, præcis nervis, & vulneribus glutinandis illinuntur: decoctum, etiam nervorum affectibus prodest. Camerarius addit è tenellis Eryngij folijs aquam stillatitiam fieri, ijs apprimè utilem, qui morbi Gallici ulceribus laborant, si diutius quotidie eā utantur in poro: Multas præterea alias facultates recenset, quas ex ejus Plantarum Epitome petere licet. Memini autem C. V. Guhelmmum Rondeletium, marina radices (quas potissimum usurpandas censebat) saccharo conditas præscribere solere, mulieribus frigidiore uteri intemperie laborantibus, ad juvaodum conceptum, prius tamen purgato, ut decet, corpore, & reliquis necessarijs præmissis.

A L O E.

CAP. XLVIII.

Vulgare Aloë sponte proveniente observare memini, in veteribus muris arcis Vlyssipponensis, quā descensus est ad proximum templum iodeclivi situm. Iotelligam etiam Valentiz, in vicinā Sagunti vetustis muris & macerijs abundanter provenire. De illā tamen hic nō est nobis institutus sermo: verūm de Americanā, cujus descriptionem ante multos annos in nostris ad Aromatum historiam scholijs polliciti sumus. Tameris autem hic non suo ordine reponi videatur, quodd, eum crassa admodum radice sit, tuberosis potius fuisset adijcienda: rigida tamen ejus facies, à vulgari Aloë planè diversa facit, ut Aculeatarum classis eam accommodasim.

Aloë.

Aloë Americana.

Aloë Ameri-
cana.

MVLTA sunt illi folia, humanam longitudinem attingentia, saturatè virentia quidem, sed quibus inspersus videatur cineracei quidpiam coloris ut in Tuliparum quarundam folijs, lævia, circa infimam sedem trium aut quatuor digitorum transversorum crassitudine, quodammodo carinata, valde lata, mutuo se amplectentia, instar foliorum vulgaris Aloës aut Asphodeli, sensim in mucrone desinentia, qui nihil aliud est, quàm spina, fustes, crassa, unciam eum fuisse interdum longa, & adeò firma, ut Americani pro subula uti soleant, & cuspidis ferreæ loco ad sua tela adaptarent: foliorum latera tenuiora sunt, & spinis ejusdem coloris aspera, sed brevioribus, latà basi præditis, & deorsum incurvis ut in Rhamno tertio, interiore parre fibrosa sunt hæc folia, & succi plena, sed nõ amari. Ex eorum medio caulem enasçi intellexi (nullum enim vidi) brachiali crassitudine, & brevioris lanceæ altitudine: radix est crassa, longa, curva, veluti internodijs articulata, è quibus ad latera nascuntur alternis alix plantæ, ut in Arundinum nodis germina seu gemmæ sunt dispositæ.

Primum mihi hanc plantam demonstrabat C. V. D. Ioannes Placæ medicus & professor in Valentiniâ Hispaniæ Academiâ, primo ab urbe Valentiniâ miliari, in ecenobio D. Virginii sacro, cui cognomen de I e s v inditum, eodem quo Persea crevit hortulo: postea alijs etiam locis observabam: erutam autem, omnium maximâ radice conspiciebam in suburbanis ornatissimè viri Petri Alemanni civis Valentini, ejus hospitio exceptus eram, duorum videlicet cubitorum fere longitudine, ad cujus latera circiter triginta pumilæ plantæ enasce, ex quibus binas detraxas in Belgicam deferrebam, & unam quidem donabam Generoso Dn Catolo à Divo Audomaro, viro rei herbariæ, & omnium Naturæ miraculorum studiosissimo & penitissimo, quam secunda subsequens hiems corripuit: alteram verò Petro Coudebergo Pharmacopolæ doctissimo, Antuerpiæ ad Campanæ symbolum commoranti, quam diu in siccibus conservavit: nam ex illâ hanc iconem exprimi curabam. Vivax est, multotiesque annos durat, radice multipliciter se propagans, cujus rei gratiâ, & propter spinarum rigiditatem sive a spernitatem Indos seu Americanos, circa agros eam ferere consuevissent, ad eos communiendum, & fures arcendum (ut apud nos sepibus spinosarum stirpium fieri solet) memoriæ proditum invenio. Nunc à multis alitur in siccibus: adeò autem prolifica est, ut alternis annis (Viennæ agens) eximere cogeret, ad folios detrahendum, non secus ac legitimum Aloë, quæ etiam prolium valde ferax, sed circa radicis summum caput duntaxat.

Hæc.

VALENTINI Filij agulla vocabant, id est, filum & acus, quia foliorum extremitates spinæ, acus:

na, acus: fibræ autem interiores fili vicem præstent. Americani *Magney* & *Meil* appellant nonnihil. Sic Hispani *Cardon*, ab aculeorum, ut opinor, frequentia.

FREQUENTÍ autem in usu fuisse apud Indos, testat Gomara ad calcem Mexicanæ historiæ, cuius verba, quia integram hujus plantæ historiā continent, latine facere, & hic adscribere volui.

METU, nonnullis *Magney*, alijs *Cardon*, arbor est duorum hominum altitudine, aut majore assurgens, humanæ coxæ crassitudinem æquans, inferiore parte crassior & densior, deinde paulatim in pyramidalem formam desinens instat Cupressis: quæ adragena illi folia, regularum amplitudine prope modum, & eodem modo caninata, sed inferiore crassa, deinde in mucronem desinentia, lateribus tenuiora, crassâ autem spina mucronem occupant.

Tantâ istic (videlicet circa Mexico) copiâ nascitur, quantâ apud nos vites facit spicam, florem, & semen. Ex ea ignem struunt, ejus cineres parando lixivio idonei truncus ligni vicem præbet, folia regularum aut imbricuum.

Cadere eam solent ante quàm nimium adolescat, ut radix in majorem crassitudinem exerceat: ea enim excavatâ, quandam liquorem colligunt, qui serapij instat siccò decoctus: levi decoctione mel fit: deputatione, saccharum: dilutione, acetum: & addito *de pasta* (radix ea est, quæ à præstantiâ, vini medicina vocatur) vinum: illis quidem in usu, sed parum salubre: etenim valde caput renrât, & iocubiat: nullum autem cadaver, nulla impura seorina alicui foret, ut illorum anhelitus qui eo viuo iocubriati fuerint. Ex hujus germinibus & renellis folijs fit conserva. Foliorum prunis aflatorum liquor, rectoribus vulneribus aut ulceribus instillatur, brevi ea curat. Germinum & radicum succus, cum abinthij illius tegioois succo, mixtus, viperarum moribus utiliter instillatur.

Illius folijs paratur charta in usum vulgatem sacrificiorum & piscorum: ex ijs (lini vide licet aut cannabini modo paratis) sunt alpergates (calcei genus Hispanis admodum familiarē ex funiculis coextremis) storiæ, chlamydes, cingula, capistrâ, & fustes: denique cannabini fili vicem illis præbent. Horum foliorum culpidēs seu spinæ, adco firmæ sunt, ut illis acus aut subula loco sint, fibræ autem fili vicem suppleant. Ijsdem Sacerdotes illius regionis pun gere & vulnerare se solent in sacrificijs, earum enim culpis non iofringitur, & quantum opus est penetrat, exiguo foramine facto. Non contemnenda sine planta, quæ ad tam varios effectus hominibus utilis est. Hactenus Gomara.

ADDUNT quidam, Americanos venerat lucem hujus plantæ usu eutare solitos hac ratione. Ejus fragmentum, in minutas parres sectum, deinde ollæ, canthari aquæ capaci impositum, trium horarum spatio decoquebant, ollâ prius luto obstructâ decoctione factâ, ollam apud ægrum collocaram aperiebant, copiosus inde fumus exhalans, multum sudorem excitabat. Aur, Folium hujus plantæ prunis impositum assabant, cuius fumum æger excipiebat: sed adeo vehemens sudores hujus remediij usu excirabantur, & vites collabebantur, ut æger vix ferre posset, licet triduo duntaxat uteretur.

Hv t v s plantæ foliorum fibris, contextum à mei Hospitis sorore reticulum, mihi ostendebatur, cum Valentis esset. Intelligebam etiam, indusû ex ijs paratâ, Hispani urbe Bæticæ & celebri Emporio, venalia inveniri.

CYNOGLOSSVM.

CAP. XLIX.

VULGARE illud Cynoglossum, quod doctiores & in Stirpium cognitione egregie exercitati non sine probabili ratione legitimum esse censent, ut quod cerenis noris satis convenientibus, mulorum etiam sit annorum interdum, antè quàm caulem proferat, in omnibus quas percurri regioibus mihi fuit obvium. Id cum à nemine eorum qui Stirpium historiâ scripserunt, sit prætermisum: illius descriptionem à me expectare non est necesse. Tria autem alia genera observabam: quorum Primum natali loco cretens nunquam vidi, sed in quorundam horris femine narum duntaxat, quod ipse etiam sæpius in meo alui, atque oñc adhuc alo: Secundum, etiam in hortis raorum: Tertium verò, frequenter sponte nascens coospexi. Singulorum historiâ qua poterimus perspicuitate & facilitate, hoc capite dabimus.

PROFERT igitur Primum à summo radice capere multa folia, longa, vulgaris folijs multò angustiora, veois aliorum seu undâ longitudinē excurrēbus prædita, ex viriditate causentia: inter quæ nascitur caulis inæqualis, minimi digiti crassitudinē non attingens, per quem, in ordinato situ, nascuntur folia, ijs quæ à radice procedūt breviora & angustiora, ipsi quo dâmodo amplectēdēria, ex quorum alis circa summū caulem nascuntur ramuli, aliquot cavis flosculis, in quinq. laciis per extremas oras divis, onusti, vulgares quidē floribus formâ similibus, sed minoribus, & dilutioris coloris, in quorū medio quinq. flaminula saturē rubentia: singulis floribus succedunt, quemadmodum in vulgari, quatuor tugosa & aspera semina simul conjuncta (prominulo ex illorum medio stilo) vulgaris ramem seminibus mioora, sed non minus quàm illa, vestibus attingeotium in hærentia: radix est longa, singularis, candicans, crasso & succulento cortice obducta, summâ tameo cute subfusâ, minimi digiti crassitudine, fractu contumax, racis tenuibus fibris per totam longitudinem prædita.



Nobis primum hæc planta nata est in Belgicâ, semine ex Italiâ misso Cynoglossi Cretici nomine, deinde sponte deciduo conservata: Floret Maio, atque etiam Iunio, quo similiter mense maturefcit semen.

ET.
Cynoglossi
Cretici 1.

SECVNDVM, primo anno, ex radice longâ, infra digiti minimi crassitudinem consistente, rarisque fibris per longitudinem sparsis præditâ, crassiusculoque cortice foris fusco amictâ, multa promixta folia, palmum aut amplius longa, unciam lata, humi fusa, mollia & tenui brevique lanugine tecta, nervo satis crasso illa per longitudinem æqualiter secante; inter quæ altero anno prodit caulis cubitalis aut amplior, striatus, firmus, rectus, molli lanugine obsitus quæ confuso ordine vestiunt folia jam dictis similia, sed quæ breviora sunt, quo propius ad summum caulem accedunt, ex viridi pallefcencia: summus caulis in multos graciles ramos dividitur summo fastigio Scorpiuri aut Heliotropij majoris iustar inflexos, in quibus plurimi caliculi quinque lacinijs constantes, unde flores emergunt Primi floribus breviores, illis tamen ampliores, in quinque lacinias orbiculares divisi, candicantis initio coloris, sed multis tenuibus purpurascenibus venis (quæ vetustate in cæruleum colorem transeunt) ornati: defluentibus floribus, conspiciuntur in caliculis quatuor semina conjuncta, ut in Priore Cynoglossio Cretico, rugosa & aspera, è quorum medio prodit stilus.

Tota stirps ingrati odoris est: Iunio floret: ejus radicem vivacem nõ esse arbitror, sed hujus profusivum feminis infrequente, corrumpi, & semine sponte deciduo renasci.

Hoc genus in suo horto alebat Francofurti ad Mœnum Ioannes Mylerus illius urbis Pharnacopæus, quod semine Cynoglossi Cretici nomine ad se misso natum assererat.

III.
Cynoglossum
paulinum.

INTRA pedalem altitudinem plerumque consistit Tertium, tamen nonniquam superet, cauliculus illi singularis, tenuis, firmus, rotundus, subhirsutus, infernè purpurascens, superne virescens, per quem sparsa sunt inæquali situ foliola uncialia, angusta, eminente dorso, molli lanugine tecta, colore ferè cineraceo, gustu aliquantulum exalfaciente: summi cauliculi in aliquot ramos dividuntur, qui Scorpiuri modo contorti, stilos ex foliorum adverso profertunt, Buglossio vulgari, aut Cynoglossio jam descripto similes, minores, extranei coloris: quibus succedunt quaternæ etiam simul juncta semina, in umbonem protuberantia, admodum echinata & aspera: radix longa, tenuis, raris fibris donata, quæ annum duntaxat superesse, & post semen maturum perire solet.

Matalus.

Crescit ad viarum & agrorum matgines circa urbem Viennem, in nudis & salebrosis jugis huic ubi vicinis, plenisq; andis Pannoniæ locis ad arborum sublevatos margines, tum etiam Motaviz, præsertim verò ad arcem vrbis Brünz in eâ Provinciâ sitæ. Floret Maio & Iunio.

AN 10.

Cynoglossi. pumil. sive Austriac. alterum.

Lithospermum repens majus.



Echium vulgare.



AN verò hoc postremum Cynoglossum, plantae sit, quam Plinius Natur. Historiz. lib. xxv. cap. viii. scribit Cynoglossum similem & quæ ferar lappas minutas? cuiusq; radix ranis & serpentibus aduersetur?

VULGARÈ Cynoglossum appellant Itali, *Cynoglossa* & *Lingua canina*: Galli, *Languè de chien*: Hispani, *Lengua de perro*: Germani, *Hundstumpf*: Belgæ, *Emmerhonde-tonghe*.

CYNOGLOSSI porrò folia, cū fuisse adipe veteri, canum moribus, alopecij, & ambustis medentur: alvum emollit decoctum herbæ, ex vino potum.

ADMOOVM etiam frequens est in silvula ad Lachn primo ab urbe Viennâ militari, & Viennensis saltus aliorumq; moniū urbi vicinorum radices, inter frunces Lithospermum illud majus vulgo nuncupatum, cujus sarmenta humi fusa subinde fibras agunt, & mirè se propagant.

Nec minus frequens varijs Pannoniz, & Austriæ locis, aliud illud Lithospermi genus legitimum, semine cādido, cujus in officinis usus est.

ECHIVM.

CAP. I.

VARTA, præter vulgare subæruleo flore, quod Viennensi agro & vicinis locis frequentissimum, etiam variante in subcinereum, vel omnino album colorem flore, interdum reperitur, nascuntur in Austriâ Echij genera, eaque elegantia.

PRIMUM

Echium pullo flore.

Echium rubro flore.



1.
Echium pullo
flore.

PRIMUM pedalem habet caulem, striatum, villosum, folijs Echij, aut Buglossi silvestris, molli lanugine præditis, & inæquali situ ipsum ambientibus ornatum, superiore parte in multas alas divisum, quæ deinde in breves ramulos sese findentes, multis floeculis concavis, extremâ parte in quinque crenulas divisis, coloreq; ex atro purpurascente præditis, onustæ sunt, quæ vasculis molli lanugine hirsutis & inter folia latentibus prodeunt: semen ut in hujusmodi generis plantis, viperino capiti simile: radix oblonga, minimi digiti crassitudinem interdum æquat, foris fusca, paucisq; tenuibus fibris prædita, capite, unde caulis prodit, exuberante, & præcedentis anni caulis vestigia servante: præmanita folia, nullum initio manifestum saporem peculiarem præbent: sed postea nonnihil acrimoniz habere videntur.

Natalis.

Crescit multis locis Viennæ vicinis, totâ etiam inferiore Austriâ, & Pannoniz parte siccioribus pratis, & graminosis locis ad collum radices, atque in ipsis collibus nudis, & tenui duntaxat gramine obstitis. Floret Maio.

11.
Echium rubro
flore.

OBLONGA & angusta habet Alterum folia, villosa, vulgaris Echij folijs ferè similia, paulò tamen laniora, humi strata: caulem modò pedalem, aliquando cubitalem, firmum, striatum, lanuginosum, maculisq; purpureis conspersum, quem incognito ordine multa ambrut folia, inferius breviora & angustiora, non minus tamè hirsuta: summum caulem exornant multi breves ramuli in se veluti convoluti, atque Scorpiuri instar inflexi, pleni florum vulgaris Echij floribus similibus, sed colore rubro elegantiori, qui proximè caulem primum aperti incipiunt: ex cuncto flore, semen, ut in alijs Echij generibus, apparet in callculis nigrum, viperino capiti simile, sed minus: radix satis longa, dura, & lignosa, nigro cortice tecta, summo capite multos interdum caules promens, sed maximâ ex parte duntaxat unicum.

Natalis.

Abundè admodum, siccis pratis supra & infra Sopronium Vngariæ urbem, nusquam vero alibi, hanc plantam observabam Maio florentem, nunc saturatè rubentem, modò dilutior colore præditam.

BINA porro alia Echij genera, Cretico semine, quod mittebam, nata, creverunt Ioanni ab Hogelando anno M. D. XCIII.

111.
Echium Creticum.

AMPLA, initio habuisse, dicebat Primum folia, mediæ, inter plantaginem & buglossum substantiæ, humi strata, inter quæ nascébantur caules rotundi, scabri & asperi, frequentibus alis donati, quos ambiébant inordinata folia, minora, hirta, extremi rami circumvolvebantur & infledebantur, Echij & aliarum Anchusarum instar, gestabantq; calculos quinque foliolis angustis & hirtis constantes, ex quibus cavi flores, Echij floribus non dissimiles prodibant,

adibant, coloris rubri diluti elegantis, in quinque lacinias summis oris divisi (quos successu temporis, purpurascens colore contrahere, observabam) è quorum umbrilico exiebant staminula ex rubro purpurascens, apicibus pallidis, & medius gracilis thilus, ex albidus, & bifurcus: flori succellit semen, echij semini non dissimile. Flores de stirpe lilio & sequentibus mensibus.

CAULES Alteri magis scabri erant, quàm Priori, rotundi, parvis maculis rubris distincti, Serpentinae ferè ritu: folia promebar quaternas aut quinas parè uncias longa, unam lata, pallidioribus maculis aspersa: flores extremis ramis nascuntur egregie rubentes, narium rubedine, etiam adulti retinentes, è quorum umbrilico majora duo staminum lilia prodibant, & tria minora, quorum tertium, reliquis minus, omnia autem apicibus albis prædita. Flare incipiebat sub extremum Iulium.

Accipiebam autem semina, ex quibus hæ plantæ nate, non Echij appellatione, sed Anchusæ, cujus semen è Crætæ allatum esset: cum verò Echium magis reterant, quàm Anchusam, ad Echij caput rejiciendas has plantas esse duxi.

GRÆCIS hæc planta *ἔχινος*; Latinis, echion; Italis, *Buglossa salvatica*: Gallis, *Buglosse Nomine*, *sausage, ou Herbe aux vipères*: Hispanis, *Lengua de buey, salvaje*, & *Terva de las bruorcas*: Germanis, *wild Ochsenjung*: Belgis, *wilde Disten-moghe*.

ECHII radix, teste Dioscoride, percussis à serpentibus, non modò ex vino pota, prodest, sed eos qui ante bibent, feriri non pautur: Folia & semen, similes habent facultates.

ANCHUSA.

CAP. LI.

DIOSCORIDES & Plinius tria Anchusæ genera describunt, quorum Asterum genus, illis Onochilus dictum, mihi dunraxar cognitum esse, ingenue fateor: id autem cum in Gallia Narbonensi frequenter legere memini, cum plerisque Hispaniæ & Lusitaniæ locis observare. Sed cum ab alijs hujus ævi De re herbaria scriptoribus ejus icon sit exhibitæ, & historia tradita, ad eos Lectores ablegabimus.

Anchusæ exalbido flore.



ALIUD verò genus observabam, cui numerosa folia, palmaris longitudinis, valde angusta, & pægentè lanugine hirsuta: è quorum medio caulis assurgit secundo anno (primo enim *ἀνυμυδός* est) pedalis, interdum etià cubitalis, crassiusculus, firmus, hirtus, in multos ramos divisius, in quibus breviora multò, hispidaq; folia: extremis ramis prodeunt, è vaginulis hirsutis & aspersis. Flores Symplicis majoris floris quodammodo similes, albi, aut ex albo nonnihil pallascentes, sive *ἀνὶ πύλωτοι*, in angulos quinque divisi, quibus diffusis, semen in vaginulis conspicitur viperino capiri aut Echij semini simile: radix minimi digiti crassitudinem æquat, nigraq; cute tecta est, qua sublata, omnino rubet, & elegantissimo colore inficit: addò autem carnosa est, ut radicum Buglossi vulgaris instar condiri possit, dulcis tamen & insipida.

Nascitur arido & salebroso solo, ut in monte Badenibus thermis imminente & alijs vicinis, apud Carnunrū præterea, Pannoniæ olim amplissimam urbem, nunc autem vile oppidulum, Petronella vocarum, maximè copiatum plerisque alijs Pannoniæ, Austriciq; locis & aridis locis. Florer Maio, & semen Iunio profert: deinde perire arbitror, ut Echij genera.

GRÆCIS potè Anchusam Latinis distam *ἀνυστον* & *ἀνυστον* & *ἀνυστον* appellant, secundum genus Dioscorides *ἀνυστον* & *ἀνυστον* & *ἀνυστον* quibudam dici scribit. Nullum nomen.

men vulgare novi, nisi quod Secundum genus, nonnullis Hispaniæ locis, *Argemula* vocatur. PRIORI generi radicem adstringentem tribuit Dioscorides: ad ambusta, & vetera ulcera, ex oleo & cerâ, efficitur: acem esse aut igni sacro cum polentâ mederi: lepris & vitiliginibus illini ex aceto, partus extrahere, vulvæ inditam: ejus decoctû renum rigi, lieni, & bile fusus da-

fusus dari, & si febris sit; ex aquâ multâ: folia alvum sistere in vino pota. Radice pigmentarios uti ad unguentorum in spissamenta. Similes ferè facultates tribuit etiam illi Plinius. Secundum autem genus vim habere quæ contra virus reliquorum serpentum, præsertim autem viperarum auxiliatur; sive cibo, sive potu, sive alligatu. Verisimile autem est similibus huic secundo generi facultatibus pollere, quam hoc capite describo Anchusam.

Cum Granatæ cistem, venales conspiciebam pyxidulas unguento plenâs ex Anchusæ, quæ in eâ Provinciâ frequens nascitur, radice tubâ parato, ad tucandam faciem (quod istuc usitatum est) idoneo.

Anchusæ
gustum.

CETERVM, non ineptè ad Anchusæ genera forsan referri possit quædam planta, aridis locis circa fruces & dumeta nascent, in Lusitaniâ à me observata. Tres verò aut quatuor ab una radice producebat virgas, pedes altas, ter ues, duras, & lignosas, quas ambiebant frequentia folia, Anchusæ folijs similia, nigricantia superinâ parte & hirtula sunt: mis virgis, quæ Scorpiuri instar incurvantur, innascuntur oblongi flores, Anchusæ floribus similes, intensè cærulei, aspectu pulcherrimi: radix dura est, lignosa, detraclâ summâ cute nigricante rubescens, temperati gustus. Florebat istuc Ianuario inter Scinty arcem Regiam & scopulum cui nomen *Nostre Schora de la Peña*, ad cuius radices frequentior. Ab incolis *Tamar-guera* nuncupabatur.

Tamar-guera.

Non ab similibus ei videtur quam Doctissimus Lobelius Anchusam lignosiorum angustifolium appellat, nisi fortè eadem sit.

SYMPHYTVM TUBEROSVM.

Symphitum tuberosum majus.



Symphitum
tuberosum ra-
dix.

CAP. LIII.

Symphitum tuberosum minus.



ANGELIOSVM & quodammodo pentagonum habet caulem, rarissimè pedalem altitudinem superantem, succi plenum, per quem rariorâ, quàm in Symphito maiore, sparsa sunt folia, illisq; minora, teneriora & minus aspera, inspicio ferè gustu: flores in summis ramis pallidos, oblongos, Symphiti majoris floribus forma similes, cæcavos, inodorous, extimâ parte in quinque crenas divisos, quinque flaminibus in medio flore, veluti in umbonem tendentibus, protuberare in medio stilo: caliculos den de majoris Symphiti instar, in quibus semen, Echij semine non dissat: radicem longam, tamosam, teneram & fragilem, minimi digiti crassitudine, tubinde in tubera excrecentem, exiguâ fibrâ capillatâ pediculi, calices, caules angulosi, & folia hirtula sunt.

Radix.

Invenitur in omnibus Pannoniæ & Austriæ silvis, umbroso loco, præsertim verò sub fruticibus.

tibus: reperiebam etiam in Pannoniâ interamni, ultra Dravum flumen, in Grebén arcis sæpius memoratæ montanis. Primum verò innotuerat Belgicæ incolis anno M. D. LXXIII. planta ipsa viride Machliniam ad nos missa à C. V. Alphonso Pancio Ferrandi Professori.

Eius historiam & iconem minimè dedissem, nisi aut minus diligenter ab alijs descripta fuisset historia, aut icon non satis scire expressa: tamen & in eâ quam exprimi iussi, pictor ostentatæ merito accusari possit. Nam radicem nimis tenuem illi dedit, & rubra omisit: utramque tamen hic subjecimus.

De facultatibus, nescio an quipsam peticulum fecerit: verisimile autem est, ejusdem polere, quibus Symphitum majus.

CERINTHE QUORVNDAM.

CAP. LIII.

HVIS stirpis, quatuor inveniuntur genera, fortitan etiam plura, tria observabam, quartum ab amico accipiebam. Nos singula ordine describemus.

Cerinte quorundam major viridicol. flo.

Cerinte quorund. major flavo flo.



11.
Cerinthe
quorundam
major viri-
dicol. flo.

12.
Cerinthe
quorundam
flavo flo.

QUATVOR aut quinque ramos sive caules habet Primum, à summo radice capite prodeuntes, rotundos, succulentos, interdum cubitales, quos amplectuntur numerosa folia, oblonga, circa pediculum latiora, mucrone obruta, colore ex viridi ad caeruleum quasi tendente, candidis maculis aspersa, nonnihil villosa: è foliorum sinu nascuntur alij ramuli, Heliotropij majoris ramulorum instar sese intorquentes, pleni florum secundùm ramulorum longitudinem dispositorum, longiusculorum, concavorum, à medio in extrinsecam partem, flavorum, alterâ, quâ caliculis inhaerent, ex rubro purpureorum, quibus apes, valde delectantur: his de eidentibus bina plerumque in eodem caliculo semina conspiciuntur, nigra, Ervi magnitudine, seminis Echij, aut Cicernis arictini forma: radix alba, oblonga, & satis crassa est, an verò perennis, ubi sponte nascentem observabam, ignoro.

Crescit aurem nonnullis Lusitanæ locis, sed copiosè per totam Bæticam. Floret novo Natalis. Vere & Martio. Apud Belgas in hortis sata multo seriùs, videlicet sub æstatis finem, & subinde floribus scaret in hiemè usque, tum perit, & deciduo semine singulis annis renascitur.

ILLI non abssimile est Altherum genus, habet enim medium caulem surrectum, & frequentes ramos, à summo radice capite prodeuntes, & humi fufos, quos, uti & caulem amplectuntur alternis, folia qualia in superiore, non adeò tamen ampla circa pediculum, sed perinde maculis albis infecta, & veluti tenellis spinis obfita, atque mollibus villis in ambra prædita: caulis in aliquot ramulos supernè dividitur, è foliorum sinu prodeuntes, qui extima parte

ma parte nutant, & è singulis foliorum alis flores proferunt priori formâ & magnitudine pares, sed omnino flavos, semen præcedenti simile: radix crassiuscula, alba, æqualis cum superior longitudinis, frequentioribus tamen fibris donata, quam subsequos etiam hiems corrumpere solet in Belgicis hortis.

Nata in.

Sponte nascentem observabam Valentino Regno, & florentem Martio, atque Aprilis initio. Semine tamen ex Italiâ misso nata in Belgicis hortis, non nisi Iulio & Iulio, atque etiam serius florēbat, & subinde in hiemem usque.

111.

TERTIUM genus neque sponte nascens, neque in hortis cultum conspexi: sed honestissimum & in stirpem cognitione verissimum, Iacobus Plateau Tornacenſis civis, in cuius orto cultissimo crevit, iconem misit, additis notis, ex quibus, hanc descriptionem concinnabam.

Cerinthæ minor quædam rubro purpurea vasa.

IN bipedalem, aut tripedalem, ut plurimum, assurgunt altitudinem caules, sive tami, statim ab radice divisi, quos ambiunt etiam alternis folia, jam descriptis paulò minora, ex viridi & cæruleo quasi commixti coloris, superne maculis etiam albis conspersa: supremi rami nutant, florēque singulos inter folia proferunt in calicibus purpureiscentibus saturis, ex rubro purpureos, quibus alperſa videtur quædam albedo, longos, cavaos instar præcedentium: quibus deciduis, semen in caliculis nigrum, Borriginis semini formâ simile: radix similiter alba, brevior tamen & minus fibrosa, quàm præcedentium.

Sentur, teste qui ad me iconem mittebat, Februario, Martio, Aprilis, pro aëris verni temperie: humido solo delectatur, propterea, cum æstivi decipiunt, & arscit solum, crebris rigationibus iodiget ut augmentum sumat: nam ut plurimum Autumno duntaxat flores profert, cum videlicet de celo crebri imbres cadere incipiunt. Annua est.

Cerinthæ quorundam minor flavo flo.

1111.
Cerinthæ quorundam minor flavo flo.



Nata in.

Memoria.

GRACILIOREM modò descriptis, habet Quartum genus caulem, cubitalcm, aut ampliorcm, rotundum, iō plures ramos divifum: folia etiam alternis per caulem sparsa, minora quàm Tercij, & angustiora, albis similiter maculis conspersa: summi rami inflectuntur & nutant, frequentibus folijs magis mucronatis testē, quorū alis singulares propendunt flores suis caliculis iohazcotes, superioribus longè minores, extremis oris dēticulati, profus flavi: quibus deciduis, semen in caliculis constrictur nigrum, altero minus, formâ tamen non dispari: radix etiam alba, & aliquot fibris prædita, non tamen vivax.

Alcatur etiam in Belgicis hortis, quando Viennam evocatus sum: nec ante sponte nascentem hanc plantam conspexeram, quàm in Austriam venirem, in cuius agris atque etiam Sisiræ copiosè crevit, interdum etiam hieme in suâ viriditate permansens.

DE huius nomenclaturâ, variz sunt inter Neotericos sententiz: Nam alij Cerinthæ, esse volunt, eâ ratione, ni fallor, ducti, quod apibus grata sit, & id de Cerinthæ testatur Virgilius in Georgicis, tum Plinius lib. xxx. cap. xii. Vulgus barbariorū Memitham magno errore vocavit. Memitha enim Arabum nihil aliud est quàm Glaucium Græcorum. Nec defunt qui Maru, sive Almaru Avicennæ lib. ii. cap. ii. descriptum putant, præsertim quartum eius genus, quo nomine etiam

Secundi semen aliquando ad nos missum ex Italiâ. Sed, meâ sententiâ, nihil eo loco videtur Avicenna describere, quàm vulgare nostrum Buglossum, aut Borraginem, quibus hanc stirpem, cuius genera descripti, temperamento proximam existimo.

PULMONARIA.

CAP. LIIII.

1.
Pulmonaria maculosa fol.
Varietas.

QVÆ Pulmonaria vulgo nuncupatur, & folia candicantibus maculis notata habet, copiosè multis Pannoniæ & Austriæ silvis spore nascitur, cum inter Krumpach & Glicſfeld, cum in Viennensibus Leytanique saltus varijs locis: huius florem niveo colore variantem aliquando conspicerem memini. De eâ autem, quandoquidem ab alijs descripta est, sententiam

Pulmonaria vulgaris maculoso fol.

Pulmonaria 111. Austriaca.



monem instituerere non est animus: sed de alijs aliquot generibus, quæ ante quàm in Austriam pervenirent, mihi conspecta non fuere.

PRIMUM igitur quod observabam genus, sed inter Pulmonarias Secundum, ex radice nigra, minimi digiti crassitudine ferme æquante, obliqua, & multis crassioribus fibris, quales sunt vulgaris fibræ, donata, plura fert capita, è quibus prodeunt folia longis pediculis innixa, vulgaris folijs non valde dissimilia, minus tamen ampla, aspera etiam lanugine tecta, sed, quod magnum discrimen facit, nullis albicanibus maculis superne infecta, prorsus viridia, inferne autem dilutiora: deinde caules pedales, angulosos, folijs angustioribus, nõ minus tamen villosis, inæquali situ inhzrentibus præditos, qui summo fastigio in breves ramulos dividuntur, sustinentes cavos calices in quinque lacinias divisos, è quibus emergunt flores longiusculi, cavi, oris in quinque crenas divisi, coloris iniño rubescentis, postea ad cæruleum tendentis, perinde atque Pulmonariæ vulgaris flores: illis cadentibus, apparent in loculis vetustate jam laxioribus, femina caput viperinum referentia, maturitate nigra: radix vivax est, & singulis annis augetur, non minus quàm Pulmonariæ maculose radix.

Nascitur in Viennensi saltu mixtum cum vulgari, & multis alijs Germaniæ locis: in silvis etiam Francofurti vicinis frequens. Floret Aprili, semen extremo Maio maturum est.

EX ILLIS Tertium novo vere, florumque congestorum thyrsum ferè ante folia promit, quæ sunt angusta & villis obfusa, Buglossi silvestris, Echivæ, aut Anchusæ folijs non absimilia, molliora tamen, neque tam aspera villo hirsuta, nullo pediculo prædita, sed medium caulem amplectentia, qui paulatim succrescens, angulosus & hirsutus, interdum nonnihil purpurascens, in pedalem tandem altitudinem excrevit, in cuius fastigio multi pentagoni caliculi, in quinque purpurascens lacinias divisi, & subhirsuti nascuntur, continentes oblongos, concavos flores, Buglossi hortensis, aut Pulmonariæ vulgaris floribus formâ similes, qui per oras in quinque orbiculares ferè lacinias divisi, colore, ante quàm aperiantur, ex purpura rubente, deinde, quando explicati sunt, cæruleo adedè eleganti nirent, ut Gentianellæ vernæ floris venustatem, si non superare, attamen proximè æmulari videantur, odore autem nullo grati: ij marui decidunt integri, quemadmodum Buglossi hortensis & siminum flores, atque caliculum inanem cum stilo, & quatuor seminum rudimentis relinquunt, quod maturitate nigrum vadit, Echij aut Buglossi vulgaris semini respondens. Adnascuntur deinde secundum caulis pedem, alia hirsuta folia, angusta, palmata aut amplioris longitudo, Echij aut Anchusæ folijs laria, mollioraque, inter quæ (licet sicca sint) subsequente vere prodit caulis suis venustis floribus ornatus: radix crassiusculis fibris præ-

PP

dita est,

111.
Pulmonaria
se in non maculosa.

Hortens.

111.
Pulmonaria
angustif. l.
carnulose.

Itala.

ITAL.
Pulmonaria
ruraria.V.
Pulmonaria
en-antica-
rula flon.

Itala.

Noma.

Pulmonaria
Gallorum
Hieracii
fara.

Trachelium vulgare.

Trachelii &
Rapunculi
varia ge-
nera.

Cervicaria.

Cervicaria
Pherocypio-
la.Rapunculi
atropurula-
tes.

per caules graciles sparsa, angustioribus, spica longiore aut brevior florum, coloris vel albi,

dita est; ut Pulmonaria prima maculoso folio, initio candicans, deinde vetustate foris nigricantibus, dulci sapore.

Nascitur passim per Pannoniam & Austriam inferiorem, in montanis & caduis silvis, & diutissime floret.

INVENTUM & quibusdam Pannoniae locis, Quartum quoddam genus, jam descripto fere simile, nisi crassior, majoremque caulem, & latiora folia haberet, flores similiter, non, ut illud, caeruleos, sed pulcherrime ruberos: aliqui & radice & temperamento conveniunt.

Est praeterea & Quintum genus, forma & amplitudine Quarto respondens, cujus flores initio rubent, ut in Terno genere, deinde caeruleum colorem saturatiorem contrahunt.

Crescunt postrema haec duo genera ad caeduarum silvarum margines, umbrosius locis, & eodem cum tertio tempore florent.

Quo nomine dicta fuerit Veteribus haec Planta, me ignorare, ingenuè fateor; ad Buglossi tamen genera referri posse arbitror. Recentiores Pulmonariam appellarunt, quia nimirum Pulmonum vicis auxiliari credatur. Italis Pulmonaria dicitur, Germanis *Pungms traut*, *Stechtraut*, *Hein Wolwurz*; Gallis, *Herbe aux pmons*; Belgis, *Pongtschropt*; maculosa autem, *Ousep d'owen* nuncupatur.

CVM Lutetiae vivebam, mihi pro Pulmonaria demonstrabat (folia enim albis maculis conspersa habebat) Hieracii quoddam genus, in Vivario illo Madritano, ad silvarum ingressum, quā iter in arcem. Noster Lobelius iconem dedit, Pulmonariae Gallorum Hieracii facie appellatione: sed maculas in folijs non expressit pictor.

TRACHELION & RAPUNCULUS ALPIN.

CAP. LV.

TRACHELII & Rapunculi varia in Pannonia, Austria, vicinisque regionibus sponte nascuntur genera. Nam nulla montosa sunt silva, quae Trachelium illud urticis folijs, quod nonnulli Cervicariam, alij Vvulariam appellant, subcaeruleo flore non alant: sublimiora jura, ut Sneberg & alia similia, idem quod albo flore est: aliud praeterea genus, mollioribus folijs, oblonga minorū florum, in anteriorem partem vergentiū & spectantium spicā, cujus radix alioqui crassa & scintil praecedentis edulis, tenuibus fibris mirè serpit, & novas plantas subinde generat, cujus rei causa, illis qui selediores flores & coronarias stirpes duntaxat colunt, satis exosa: genus item illud floribus summo caulis & ramorum fastigio confertim & quasi pilae instar in orbem nascentibus, cujus etiam secundum genus est paulò minus, flores singulares per caulem sparsos habens, praeter sphaeras illas summo caulis fastigio innascentes: & omnibus prope silvis familiares rapunculos latioribus inferioribus folijs, quae

vel vio-



Campanula Persicz folio.



panoliz instar efformatum, in quinque angulos desinentem, quemadmodum vulgaris Trachelij, aut Campanulæ vulgo dictæ flos, cinereo colore præditum: floribus succedunt capi-

vel violacei elegantis & satuti: tum rapunculos vulgares, cum Campanulâ illâ, malî Persicz folio quibusdam cognominatâ, quam C. V. Matthioli Phyteuma esse censet, nunc cæruleum, modo album florem proferentem.

Campanula Persicz folio.

OMNIVM porro illarum stirpium historiam hoccapite dare nō est animus: quemadmodum neque Trachelij illius, Belgis majoris appellatio- ne cogniti, neque Violæ Marianæ quibusdam Medium creditæ, quæ ut plurimum violacei coloris flores gestat, sed ramen etiam albos, interdum exalbidos, nonnūquam cineracei coloris, atque etiam versicoloris, hoc est, ex albo & violaceo, vel maculatis, vel radiarim commixtos; neq. Campanulæ illius majores lactescen- tis dictæ, quâ Pyramidalem nonnulli appellant, cujus folia & ipse etiâ lacteus succus virus olent, & radice fragmentis faciliè pangitur, quas quidem tres sponte nascentes nunquam observavi, sed in hortis culras duntaxat cōspexi: sunt enim ab alijs aut jam descriptæ, aut illarum icones exhibitz. Sed eas tantum stirpes describere statui- mus, quas ab alijs proditas non arbitramur. Ante quàm tamē earum descriptionem adgrediar, non abs re futurum existimavi, si jam dictarum aliquot icones initio hujus capituli insererem.

Trachelium minus Belg. Viola Mariana cuius magna varietas.

Campanula latifolia Pl. caerulea.

PRIOREM autem earum quarum mihi tradenda est historia, dodrantalis est plantula, cauliculo striato, in plures ramulos diviso, quorum singuli sustinent florem satis magnū, cavum, cam-

Trachelium Fanculum alpinum.



Campanula lactescens fortior.



Natalis.

11.
Trachelium
Belgarum.

Natalis.

rola satis magna, trigona, nutantia, seu deorsum spectantia, quæ continent semen vulgaris trachelij semini nõ dispar, sed minus & exalbidum: folia quæ per cauliculum sparsa sunt, latiusculâ basi cum amplectuntur, & in oblongum mucronem desinunt: quæ verò summâ tellure stirpi inhaerent, latiuscula sunt, & longiore pediculo innixa: radix pro plantæ exilitate satis magna, candidans, supernâ parte in plura capita extuberans, & quibusdam fibris hirsuta. Tota planta lanugine pubescit, lacteisque succo abundat.

Nascitur in Sneberg, aliarumque vicinarum Alpium jugis. Flores profert Iulio.

M V L T A habet Altera folia, angusta, hirsutaque, Echij folijs ferè similia, inter quæ exoritur pedalis caulis, firmus, minimi interdum digiti crassitudine, striatus, & multis angustis, oblongis, hirsutisque folijs septus: à cujus medio ad summum, thyrius, seu potius florum inter foliola latentium pulcherrimo ordine dispositorum, Trachelij aut Rapunculi floribus similibus, sed minorum, pallescentisq; coloris, crassa spica nascitur: evanescentes flores in capitula transeunt, exile subflavumq; semen continentia: radix crassa est, digiti amplitudine, rugoso cortice recta, candidans, & aliquot crassioribus fibris donata. Tota planta lacteo succo turget.

Oritur in Sneberg & alijs vicinis jugis: observabam etiam in ascensu Neuberg ad silvalem quæ in editiore tumulo est supra cœnobium: sed anno M D LXXXV. maximâ copiâ in amplo quodam montano prato, *Silv. Canis* appellato, quâ è Niveo

Niven mōte descensus est in Rehenaw, Abbatis Neubergeris aſce m. Floret Iunio & Iulio.

Videtur eam poſita exhibuiſſe Dalechampius ſub Echij montani appellatione: Verum quidem eſt, ejus folia ad Echij foliorum ſimilitudinem proximè accedere, ſed icmen exle Rapuncolorum ſemini paxnè reſpondens, floris forma, radix lacteo ſucco abundans, & quæ trachelij radicem inſtar mandi poſſet, reſragantur.

TRACHELIJ porrò aliud genus elegans obſervabat N. V. Fab. Col. in D. Virg. mon-
te natum, Tragopogi folijs.

Trachelium
Tragopogon
ſolij.

Campanula minor alpiſa rotundioribus iſtis folijs.



ALVNT etiam ſumma illa juga, præſer-
tim in cupibus & præcipitijs, Campanulæ vel
Rapunculi genus, cujus radicales tubæ valde
ſerpunt, & vicina loca occupant, ſubinde ger-
minantes, & novas ſturpes procreantes: ha-
bent illæ initio orbiculata ferè folia, deinde ſta-
tim alia anguſta conſertim naſcentia, Caryo-
phyllei ſecundo loco ſuprà deſcripti folijs adeo
ſimilia, ut incautos plerumque fallat, qui in-
terdum cum ſuo ceſpite eruant, Caryophyl-
lazum collegiſſe exiſtimantes. Emergit deinde
ex horum medio gracilis cauliculus, in mul-
tos tenues ramulos diſiſus, oblongioribus fo-
liis, nullo ſervato ordine naſcentibus, ſeptus,
floſculos è ſingulis ramulis dependentes pro-
ferens Campanulæ, ſive Rapunculi vulgaris
floribus formâ ſimiles, vel eleganti cæruleo
colore præditos, vel ſaturato purpuræ colore,
ſive violaceo nitentes, vel dilutiore purpureo
colore & quaſi cineraceo conſpicuos, inter-
dum etiam niveos: capitula deinde Rapun-
culi vulgaris capitibus ſimilia, aut potius illi
Campanulæ minori quæ cum in Belgicâ, tum
plerique Germaniæ locis, ad agrorum ſub fru-
ticibus, aut ſilvularum margines, ſecundum
profundiores & convexas vias, in umbrâ pro-
venit. Floret Iulio, interdum etiam Auguſto.
Tota etiam lacteſcit.

Campanula
minor alpiſa

ſua va-
rietas.

CETERVM, deſcripto hoc capite, ex Ita-
licâ ſuâ peregrinatione rediens Gulielmus de

Mera, Medicus, mihi Francofurti communicabat duo Rapunculi genera elegantiâ, quæ in
itinere obſervaverat: eorum hiſtoriam, quoniam commodè ſuo loco reponere non licebat,
ad capitis calcem addere volui.

CVBITALI Primus aſſurgebat altitudine, caule ſaris gracili, parte inferiore purpura-
ſcente quodammodo, ſupernâ viridi, cui inhærebant aliquot folia, quatuor uncias longa,
in ambitu ſerrata, dodrantali pediculo innixa, & ea quide o quæ iſtimæ parti caulis adnata
erant, ſecundum pediculum, unciam aut pollicem lata, deinde ſenſim in mucronem deſi-
nientia, quæ verò medio cauli, & ſummæ ejus parti inhærebant, longè erant anguſtiora, &
breuiore petiolo ſulta, non minus tamen longa: ſummum caulis falſigium deſinebat in bre-
vem & quaſi orbicularem florum ſpicam, quæ ſolis ſtaminibus ex purpurâ cæruleis, conſta-
re videbatur: quibus deciduis apparebant caliculi pentagoni: radicem non adſerebat, qui in
itinere obſervabat, quia etuere non potuerat, inter ſaxa & confraguloſis locis naſcentem. To-
ta autem planta lacten ſucco abundabat, non ſecus ac reliqua genera.

Rapunculum
A. prænun-
diæ orbiculati
pentagoni.

ALIVO quod adſerebat genus, nunquam ante mihi conſpectum, abruptum ſimiliter
erat, & ſine radice, quam eximere non potuerat. In pedalem autem id exceverat altitudi-
nem, vel etiam brevior: plura, quâs Primum, habebat folia, brevior pediculo, coque
plano ſubnixa, ſupernè viridia, infernè exalbida, inſtar foliorum Sonchi, quibus valde for-
ma reſpondebat, erant enim, ut illa, in ambitu dentata, ſed minora: ſummo cauli, innite-
batur velut umbella, longiuſculorum caliculorum ſtriaturum, in quinque angulos deſi-
nientium, in quibus floſ, coloris mihi non comperti, quia neque ipſe Mera reſerebat, neque
ullus, in totâ plantæ umbellâ, reſtabat, ex quo conjecturam facere poſſem.

Rapunculum
Sonchi folia.

Ceterum rapunculos, Fabius Columna, in doctiſſimâ illâ ſuâ Plantarum Hiſtoriâ, Eri-
nium Nicandri, & Dioſcoridis eſſe ſuſpicatur.

Cris Gal-
ban & Mi-
paurum.

Natali.

Nemine.

Juncaria Salmanticensis.

Symphy-
trae Mar-
it.

Tasulm.

Juncaria
Salmant.

MVLTI fruticarum palmaribus ut plurimum, interdum dodrantalibus, firmis, rotundis, purpureiscentibus, qui densis folijs stipantur Ericæ (majoris scilicet) crassiusculis, succulentis, amariusculis, serie quadam interdum dispositis, aliquando autem inordinatis & incôditis: spicæ aut capitula extremis ramulis inhaerent, ex innumens caliculis in quinque mucrones divisus, & totidem maculis nigris, in singulas divisiones impressis, còstantia, è quibus flos emicat non inodorus, purpureus, aut ex purpureo cæruleus, elegantissimi & quasi immarcescibilis coloris, quatuor foliis bifidis còstans, quorum duo superiora reliquis majora sunt: semen deinde in caliculis nonnullis pungentibus continetur rotundum, nigricans: radix crassa est, pro plantæ proportionem, palmatis longitudinis, foris rubra, ut quæ interdum lineæ panni etiam infici possint.

Flor. Maio mense, nonnunquam etiam Martio, sicis quibuldam circa Salmanticam & Mompellum locis, maritimis itea Valentia & Gallia Narbonensis, ubi tota major, et assior & succulentior nascitur, ut ferè solent omnes maritimæ stirpes, si cum eis, quæ macro & arido solo proveniunt, comparentur.

Hanc Mompelliani meo tempore Corin vocabant, eamque esse existimabant quæ Græci *ῥόζον* appellant, cujus sanè descriptioni multis notis respondere videtur: Dioscorides enim, Cori folia Ericæ tribuit, Plinius, Tamaricis, pinguis sive crassa, deinde suavem esse dicit & odoratam (de flore id intelligendum puto) Plinius aculeatam esse addit, quales sunt hujus caliculi qui semen continent.

Dodisimus vir Ioannes Plaça Medicus & Professor Valentinus apud Hispanos, dum una varias stirpes in illius urbis maritimis legeremus, Alypum esse censebat: Hispani vulgari nomine *Pincel* appellabant: Alterius alicujus nationis nullum scio, nec quenquam prodere memini.

Ad hanc plurimum accedere videtur, quam Clarissimus Matthiolus Symphyti Petrei nomine exhibuit, nisi mea me fallit opinio.

CETERVM Coridis semen potum, menses & urinas trahit: contra Phalangiorum motus, ischiadicis, & opisthotonicis ex vino potum auxilio est: horribus ex pipere, opisthotonicis ex oleo, utilissime illinuntur.

IUNCARIA SALMANTIC.

CAP. LVII.

FOLIOLORVM quædam similitudo facit, ut eam Herbam quam Salmanticenses à juncorum cauliculorum formâ & gracilitate Juncariam appellant (tota enim juncea est, sed Equiseti modo aspera & geniculata) proximo capite describendæ præfigam. Habet autem in singulis geniculis bina folia ex adverso sita, Alperulæ odorato flore folijs quodam.

quodammodo similia, breviora tamen, & Lini farivi folijs non ab similia: frequentes tamuli ex alarum sinu prodeunt similibus folijs præditi, copiosos, paleaceos candicantesq; proferentes flores: semen deinde exile, nigricans: radix tenuis est, candicans, nõ vivax, sed singulis annis semine deciduo, novellæ plantæ enascuntur, illo ipso anno etiam sub finem mensis Augusti.

Provenit lacis arenosis, inter vineta, secundo à Salmanticâ militari. Floret Julio, semen *Natalis* Augusto maturum est.

GENERALIS illa Plantarum Historia quæ ante paucos annos Lugduni Galliz celebri Emporio typis expressa est, hujus iconem à meo Observat. Hispanis desumptam, inter Syanchices species refert: Syanchices autem historiam legere non memini.

GALLIUM RUBRO FLORE.

CAP. LVIII.

Asperula odorato flore.



PRORSVS novum, & à nemine, quod sciam, adhuc descriptum est hoc Gallij genus: *Gallium ru-*
tencius est vulgari, pedalis aut majoris altitudinis, cujus cauliculi in multos ramulos *breves*
alternatim utrinque nascentes, dividuntur, prodeuntibus sub singulis alis, ad genicula, quaternis, quintis, aut senis angulis foliolis, viridibus: flores in summis ramulis nascuntur quini, seni, aut plures, tenelli admodum & pusilli, quatuor foliolis rubris mucronatis constant, micante in medietate aureo vel flavo puncto: ijs succedunt vel singula, vel gemina, rotunda parva grana, immo viridia, maturitate nigricantia: radix vulgaris Gallij radices instar rubescit, quæ etiam confusa rubrum succum reddit, multis aurem tenuibus villis prædita est, & vivax.

Hanc stirpem primus in Italiâ observabat eruditissimus adolescens Stephanus Sigif. *Natalis*
mundus Sprengerus, Philippi Stephani Sprengeri Aule Palatinæ Hædelbergæ Pharmacopœi F. ipsamque plantam cum semine in patriam referebat. unde merito Gallium Sprengerianum cognominari possit. Floret æstate, semen sub Augusti finem maturum est.

QUANDOQVIDEM porro novum Gallij genus descripsimus, & ejus iconem exhibuimus, non abs re erit, si binas icones stirpium, Gallioolorum similitudine quodammodo affinium, illi subijciam, Asperulæ videlicet odorato flore, & Molluginis, quas licet plurimis Germaniæ locis sponte nascentes observaverim, non minus tamen frequentes in Pannoniâ, Austriâ, vicinisque Provinciis: in silvis quidem Asperulam odorato flore, *Asperula odorato flore.*
eam Francforti ad Mœnum (ubi etiam plurima) vulgus & viciam appellat, in ædibus verò *Asperugi-*

Mollugo.

Rubia ma-
rina

Rutula.

Rubia marina.

Rubia sive
Aparine spi-
cata Creta-
na.

Asperuginem, & Molluginem, cuius genus quod pluribus geniculis constat, foliaque habet ceteris mollura, Rhizomata illic à nodorum non modo frequentia, sed etiam à facultatibus, *Chelidonium* cognominant: nam eius decoctum, ad fovendos & firmandos artus, valde utile esse ferunt.

RUBIA MARINA, ET SPICATA.
CAP. LIX.

QUADRANGULI sunt huic plantæ caules, palmares magna ex parte, interdum pedales, geniculati, duri & lignosi, ad quorum singula genicula, quaternaria folia, inferne, quæ cauli inhaerent, latiuscula, extremâ parte mucronata, rigidiuscula, candicantia, stellæ instar in orbem adnascuntur, & subinde in alis ramuli numerosis folijs brevioribus & valde confertum nascentibus ornati, in quibus oblongi flosculi, radiati, pallidi: radix crassa, dura, foris intensius rubet, intus rufescit.

IN Mediterranei maris, quod Hispaniam & Galliam Narbonensem alluit, littore, frequens nascitur, præsertim vetò circa Calpen & Valentiam, ubi eam in peteginatione meâ Hispanicâ colligebam, & sæpius etiam antè, litore illo quod supra stagnum ad Peraul est, ac in montem usque Setium extenditur: ubi florebat æstatis initio.

Habui eam aliquâdo in Belgicâ semine mihi prognatam, ex qua hanc subiectam iconem exptimi iussi, tamis aliquot humi sparsis, pedibus, medio caule assurgente cubitali, infirmiore tamen quàm ut se sustentare posset. Præterea lógè tenerior erat & minus incana, quàm locis ubi sponte provenit: & cum secundo anno senus flores protulisset, subsequens hiems corripuit.

Huic conjungendâ existimavi semine Cretâ allato natam, quam Iosephus De Casa bona qui plantam ipsam in Creta nascentem observabat à similitudine quadam quam ejus folia cum Rubiæ folijs habere videntur, Rubiam nominavit, & spicatæ cognomen addidit, quia summi cauliculi & rami in spicæ formam desinunt. Cum autem tota planta non nihil aspera sit: non ininus commodè fortè sitan Aparine, vel Asperugo appellati potuissent.

A radice porro, quæ crassiuscula est, subrufa, & frequenter tenuibusque fibris capillata, ex eunt multi cauliculi, nodosi, quadranguli, asperiusculi, statim ab infimâ parte, frequentibus ramulis, ad singulos nodos ex aduerso nascentibus, præditi, quos etiam in orbem in ipsis geniculis ambiunt, quaternaria, quina, interdum senaria folia, brevia & non nihil aspera: summi caules & ramuli desinunt in longam, tenuem, spicam, virentem, speciem quadrangulam, quia flosculi exiles & vix conspicui, color eque subvirescentes, alternatim contrario inter se situ nascuntur. Annua est planta, quæ prolato semine perire solet.

Florebat



Corruda prior.



Florēbat in hortis in quibus nata, Augustio: *Temper.*
femen observare non licuit, quia sub exitum
mensis Septembris sequentis dum Francofur-
to discederem, nondum erat marurum: tenue
ramen & oblongiusculum id esse postea de-
prehendi.

RUBIAM marianam vocabant priorem il- *Nemina*
lam Mompelliani & Valentini, quia ad Rubi
legitimæ formam quodammodo accedit: qui-
bus autem facultatibus sit prædita, nihil com-
pertum habeo.

RUBIAM porro legitimam sponte nascen- *Rubia lu-*
tem observabam in quibusdam pratis ad Da- *pratis.*
nubium sitis præsertim inter Posonium & Tu-
ben opidulum ad cõfluentes Moravæ Fl. Mo-
raviam perlueris, & Danubij, sicutum.

CORRUDA. CAP. LX.

VNUM silvestris Asparagi genus à Vete- *Tris Aspa-*
ribus descriptum invenio: ego tria per *ragi si ge-*
Hispanias observabam. *nera.*

PRIOR fruticosa est planta, duabus, tri- *r.*
busve aut pluribus virgis candidis, lignosis, fir- *Corruda*
mis & ramosis prædita, circa quas quina aut se- *prior.*
na foliola simul semper conjuncta nascuntur,
brevia, rigidiuscula & pungentia: flosculi lutei
ē senis foliolis constantes sub alis inter folia e-
nascuntur, odore jucundo, uti violæ martiæ:
baccæ initio virescunt, deinde cinereum colo-
rem contrahunt, semenq; continent nigrum,

durum, radices ab uno capite multæ, crassæ, instar Asparagi alius, sed breviores, nascuntur.

Abundè



Natalis.

Abundè crevit agro Salamanicensi locis petrosis, totaque ferè Castellâ & Granatensi regno, non modò in sepibus, sed plerumque etiam in arvis cultis: vidi etiam Narbonensi agro, inprimis autem juxta sepes. Floret uva maturescen- te, hoc est, Augusto: semen Orobri maturum est.

Alebatu- apud Belgas à quibudam rei herbariæ studiosis, ante quàm inde excederem sed fructum non protrebar.

II.
Corduba
altera.

FRACTICOSVS etiam est alter, in viridibus & mollioribus ramis, sive virgis ramosis, tres aut quatuor spinas ab eodem ferè exortu prodeuntes hinc inde sparsas pro folijs ferens, vindes itidem un- rami sunt: florem nullum in hoc conspiciebam, sed frequen- tes baccas rotundas, ut in superiore, initio virides, deinde per maruritate nigricantes, succo & pulpa virente plenas, qua semen includitur durum, foris nigrum, intus candidum, ut plurimum unicum, interdum bina: radices habet plures, crassas, longas, superioribus non valde dissimiles.

Natalis.

Frequens est ad Tagum flu. in Lusitaniâ, atque etiam in Bæticâ, solo petroso, in colli- bus & sepibus. Novembri semine onustum inveniebam. Crevit & iste quibudam Belgis, semine à me è Lusitaniâ delato.

III.
Corduba
tertia.

TERTIVS cubitales habet virgas, ramosas, candidas, lignosas, Priori similes, candican- tibus, firmis, deorsum spectantibus spinis alternatim, & secundum virgarum ramorumque inæqualium inflexionem horridas: ad quas quina aut sena folia, ex eodem capite simul pro- deunt, ut in Latice, Prioris asparagi silvestris folijs longiora molliorâque. Lægnis folijs non dissimilia, quæ commandacata, subdulcia, & aliquantulum gummosa deprehenduntur: flos inter folia ex alarum sinu longo tenuique petiolo dependet, ex viridi pallescens: deinde fructus parè rotundus, sed qui tncoccus viderur (tameti unicum granum magna ex parte continet, rarò bina. foris nigrum, intus candidum, firmum, ut in superioribus) initio vire- scens, maturitate rubescens & carnosus, sive succum & pulpa- continens lentam & visci- dam: radice firmatur multiplex, instar aliorum silvestrium asparagotum, longâ, crassâ, intus albâ, foris flavescente. Fert initio veris aliquot turiones, instar altius asparagi, qui illorum modo manduntur crudi & cocti, cum oleo, aceto & sale.

Natalis.

Nusquam abundantius, quàm supra Olyssipponem salebrosi locis juxta vias, non procul à Tago fl. etiam sub eâ urbe, publicâ viâ Tago imminente, ante quàm in Oceanum se ex- oneret. Nascitur tamen & alijs Lusitaniz locis, & totâ ferè Bæticâ Novembri cum fru- ctu maturo in Lusitaniâ legebam, tatis aliquot floribus hinc inde per ramulos sparsis etiam onustum.

Nullâ

Nulla verò culturâ aut diligentia facere unquam potuimus, ut istius semen apud nos in Belgicâ nasci vellet. Sed duo superiores, ut dixi, in Generosi & verè nobilis vini Dn. Ioannis vander Dilsy cultissimo vindario conspiciuntur, cum multis alijs rarissimis stirpibus, quarum, uti etiam omnium Naturæ miraculorum, erat studiosissimus.

DICITUR hic Asparagus Græcis *ἀσπράγος*, *ασπραγος*, *ασπραγος*, id est Asparagus pe- Remissa.
ticius, sive silvestris, & Murina spina. Plinius etiam à Latinis Corrudam, ab aliquibus Lybi-
cum, ab Atticis Orminium vocari tradit. Corrudam quidem nonnulli dictam voluit teste
Ruellio, quod, ubi adolevit, facile corruat decidatve: sic Horminum *ἀσπράγος*, quod est
ruo; Lybicum autem à patria. Hispani indifferenter *Esparago*, cernit mitem *Esparago*
triqueter (quia in agris frumento consociis apud eos plerumque crescit) appellant. Galli,
Asperges sauvages, Itali, *Asparago salvatico*; Germani, *Wilder Espargm.*

Asparagus marinus.



SECUNDUM genus intelligere videtur
Theophrastus (quem sequutus est Plinius)
cùm ait lib. vi. histor. Plant. cap. i. Aculeato-
rum alia ex toto aculei sunt, cœu Asparagus
(corrudam intellige) & Scorpius sive Nepa:
hec enim nullum, iuxta aculeum, folium
gerunt.

TERCIUM videtur in Cretâ observasse
Bellonius. Nam Lib. i. Observationum cap.
xvi. sic scribit. Vix tota Cretâ invenias
Asparagum altilem: silvestrem duntaxat ha-
bent, Corrudam vocatam, quæ passim nasci-
tur. Præteream tamen, aliud genus istuc in-
venitur, nomine vulgari & antiquo Polytyncha
dictum.

QUAM Matthioli exhibet, Corrudam non
est, sed Asparagi altilis genus, quod nos (quia
maritimis declivioribus & herbidis locis spon-
te provenit) marinum vocamus, caule brevio-
re, firmiore, folijs crassioribus, firmioribus, ex
caeruleo viridibus: baccis majoribus, quàm
vulgaris hortensis, non adeo corallij instar in-
tensè rubentibus. Forte is erit quem Galen.
lib. de Aliment. facultatibus i. *ἄσπρος*, id est pa-
lustrum nominat.

Similem observasse videor in pratis ad Da-
nubium sitis cùm Viennæ Austriz in aulâ Cæ-
saris versarer, una cum eo qui istuc etiam fre-
quens nascitur, altili respondens, cujus etiam
magna copia, & crassioribus quidem teneriori-
busque germinibus, in quibusdam zeditioribus

pratis invenitur, paulo supra Clement, & Entzeshor im langhe thal Generosi Dn. Wolfj
ab Entzeshorff.

POREO Corrudæ cauliculi in cibo cocti, ventrem emolliunt, & urinam cient: radicis *Tarabum*
decoctum contra urinæ difficultates, regium morbum, renum vitia, & coxendicum cru-
ciatus in potu proficit: cum vino autem, phalangiorum moribus. Breviter hujus effica-
cias vis quàm domestici.

FINIS LIBRI QUINTI.



CAROLI CLUSII RARIORVM PLANTARVM HISTORIÆ

LIBER SEXTVS.



VINTO Libro absoluto, superest Sextus (sex enim libris rariorum stirpium historiam comprehendere habemus in animo) à miscellaneis plantis, quas in commodum ordinem redigere nequivimus, illius initium facturi. Eas subsequenter lacteo succo manantes: deinde umbellifera, atque alia quædam tenui foliorum incisurâ prædita. Addentur præterea gramineis & arundinaceis folijs donata, legumina, trifoliorum genera, & aliarum stirpium farago, cum nonnullis pelagicis, & in aquâ nasci gaudentibus.

CENTAVRIUM PARVUM flavo flore.

CAP. I.



Centaury
parvum
flavo
flore.

Radix.

TAMETSI Centaurij majoris historiam cap. v. lib. iiii. nostrarum Observationum dedimus, & hæc planta ob nominis affinitatem conjungi potuisset, quia tamen pleraque notas illi dissimiles, & cum proximò capite describenda magis communes habet, eam sejungere libuit, atque ab illa Rariorum stirpium à nobis observatarum lib. vi. comprehensarum historiam incipere.

MULTIS porò folijs Saponariæ vulgari non dissimilibus, minoribus tamen & candicantibus, per quæ terram sparsis, hæc planta prædita est: inter quæ caulis exit rotundus, pedalis altitudinis, genicularis, & ex singulis nodis folia Centaurij minoris, aut Hyperici æmula, bina semper inter se opposita, & sic conjuncta, vel simul coherentia, ut caulis ipsa trajicere videatur: summi ramuli aliquot flores Hyperici floribus ferè similes, Saturationis lucei coloris, & planè aureos, sustinent, semen deinde in vâculis tenuissimum seobis inftar, nigrû: radix candida est tenuisq.

PROVENIT leto solo in collibus juxta Tagum, ubi ab incolis *Semper nova* dicitur, quòd toto semè anno floreat, quasi quæ renascens conspiciatur. Observabam etiam alijs Hispaniæ locis, atque olim agro Mompeliano; sed & anno deinde lxxi. supra millesimum & quingentesimum in Angliâ, Essexiensis comitatu, in Hornamienâ vivario, juxta Thaliæstadium, florentem Septembri: decennio verò post copiosam colliculo quodam, inter Gravefendam & Carcè sive Dn. de Cobham quinq; Portuum Præfecti, in eadè Angliâ, Julio floribus onustâ conspicebam.

MEDIOCRIS caloris particeps est, & aliquantulum amara.

HYPERICUM SPINVM.

CAP. II.

VLGARIS Hyperici historia à multis prodita est, ideòque illam hic repetere non est necesse: sed aliud genus in Hispaniâ meâ peregrinatione observabam, cujus historiam non negligendam esse duxi.

EST VO.



Hyperic. supin. III. minimum.



EST verd illud multis ramulis hirsutis hu-
mi stratis præditum, numerosis confertisque
folijs illos ambientibus, alterius seu vulgaris
Hyperici folijs similibus, sed planè tomento-
sis & iocanis (piùor in villis exprimens ne-
gligeos tuit) ejus stotes secundum ramulos
lutei, pallidiores tamen & minores aliquan-
tulum, quàm in vulgari: quibus succedūt ca-
pitula seu vascula vulgaris capitulis similis:
radix est dura & lignosa: sed ipsi etiam tam
per terrâ sparsi, subinde fibras & radices agūt.

Hypericum
supinum 1.

In conuallibus quibusdam non procul Sal-
manticâ crescit, ubi Julio mense florescentes
plantas inueniebam, adeò lae sparsas & dis-
fusas, ut ampli petali othrem æquare possent:
Martio verò sequēte, in maritimis Regni Va-
letini locis, etiâ floribus onustas conspicebā.

Hyperic.

INTER Hyperici genera referendam esse
hanc stirpem, non est dubium: nam plurimas
notas illi respondentes habet: imbecillior ta-
men est, & vulgari minus odora.

Vt & doctissimus Ioannes Plaça, medicus

Homina.


celeberrimus & Professor in Acaemiâ Valentiniâ, rutam silvestrem Dioscoridis esse cen-
sebat, quæ à Ruellio inter notha rejecta est, unde descriptionem ejus petere licet: Salma-
nicenſibus vulgo *Caraçançillo* dicitur, perinde ac vulgare Hypericum.

ALTERVM est Hyperici supini genus, etiam tomento oblitum, à nostro Lobelio obser-
vatum Mompelliano agro, quod palmo non majus esse aſſetit: meum autem, modò descri-
ptum, esse quod cenſeat, mihi injurius est: nam plantæ dissimiles, & meum esse aſſero, quod
in Observationibus pro minimo supino Septentrionalium perperam vsurpauit.

Hypericum
supinum 11.

DIFFERT enim plurimum ab isto Hypericum illud supinum Belgicum, siue Septentrio-
nale, quia tota planra valde tenella est, raros habet ramulos, rarique folia, nec illa incana,
quæ tamen trita, sanguineum succum, per oras nigris punctulis distinctas reddunt, ut ple-
rumque observate memini, illam in agrotum aggeribus post menses legens.

Hypericum
supinum 12.

Paronychia
Hisp.

Natalis.

Hermin.

LONGE elegantissima est hæc planta, multas viticulas humi stratas spargens, dodrantes magnâ ex parte, interdum tamen etiam pedales aut longiores, nodosâs, quibus adnascuntur folia Polygoni maris, minora, & viridia quidem in novellis plantis, successu autem temporis numerosa & confertissima, eâq; acerosa & membranacea, prorsus alba, sic ut tota planta argenteis squamis constare videatur, gratissimo spectaculo: flos illi candidus Polygoni vulgaris floribus instat, sed adeo exilis, & inter membranas istas latens, ut vix appareat: semen Polygoni: radix oblonga, gracilis, candicans.

Hujus iconem, quia vetustas & perfectiores plantas, inter chartas repositas, ad manum non habebam, ex novellâ, & semine mihi recens natâ, quæ paleaceas illas membranas nondum adquisierat, exprimi curabam, atque apud Belgas, ubi multum de candore suo remittit.

NUSSIVAM abundantius, quàm in perosis & siccis collibus Salmanticæ vicinis observabam, trans flumen Thormum, ubi & Colchicū montanum cap. XL. lib. 11. descriptum copiosè provenit: tum etiam circa Valentiam & Murciam: observare etiâ memini lapidoso illo campo supra Arelatem, non procul à Divi Martini diversorio, quâ iter Massilâ est, sed multò minorem, & unciales ramulos seu viticulas vix habet. Florebat Maio & Junio, semineque proferebat.

SALMANTICENSIS & Valentini *paronychia*, Paronychiam, vocabant: meo tamè judicio nihil aliud est, quàm Polygoni maris genus peculiare, etenim cùm semine recens nata prodit, à Sanguinariâ vulgarî nihil aut quàm minimùm differt: & commanducata, eodem gustu deprehenditur: itaque viribus multum absimilis Paronychiæ, quæ teste Galeno lib. VIII. Simpl. tenuium partium est, exsiccatória & moisu vacans: talia enim sint oportet, quæ paronychias sanant. Murcianorum vulgus *Afrilla* vocabat, ab exsuccorum foliorum, uti conjicio, asperitate.

ANAGALLIS.

CAP. IIII.

Anagallis
flavo-fl.

Natalis.

Anagallis
purpurea.

ANAGALLIDIS, præter vulgarem phœniceo & cæruleo flore, duo alia genera observabam floribus colore inter se differentia.

DODRANTALES sunt Priori ramuli, rubetres, teneri, succi pleni, humi sparsi, in quibus multa folia, Anagallidis phœniceo flore folijs majora, bina semper inter se opposita, acidiusculi saporis: ex aliis prodeunt flores Anagallidis vulgaris formâ similes, quinque folijs constantes, flavo colore præditi: capitula deinde turgentia altius Anagallidis capitulorum æmula, minora tamen, semen etiam non dissimile: tenui & latâ serpente est radice: quin etiam ipsi ramuli humi sparsi fibras agunt.

Nascitur in Hogebergerin summo ferè jugo inter arbores, alijsque montium Etlicher, Durenstain, vicinisque jugis, sed locis opacis. Floret Junio, Julio, & Augusto.

ALTERVM, tota facie vulgare illud, cui phœnicei aut cærulei sunt flores, refert, quos etiam quinque foliolis stellatim ex partibus constantes habet, cum totidem in umbilico staminibus: floribus tamen color diversus, nam obsoletè purpureus est,

Anagallis purpurascens flore.



Alfene repens major.



reus est, cui phreniceum quidpiam permistum conspicitur. Floret lunio eum vulgari.

Id mihi sponso natum Francofurti anno redemptæ salutis humanæ nonagesimo supra millesimum & quingentesimum: subsequen-
tibus deinde annis, suum genus deciduo semine conservavit, cum illic, tum Lugduni apud Batavos.

ALSINE REPENS.

CAP. V.

SARMENTIS vetius quàm caulibus, ijsq; *Alfene repens.*
numerosis, prædita est hæc planta, geniculatis, flexilibus, humanam altitudinem plerumq; superantibus, præsertim si frutices, quos scâdere possit, vicinos habeat, alioqui, propter infirmitatem, humi diffusis: bina singulis geniculis & internodijs adnascuntur folia ex adverso sita, Alfinæ vulgaris folijs figurâ & colore similia, longè tamen majora, & ad Helixines foliorum amplitudinem accedentia, mollia: flores ex calicibus, seu foliiculis prodeuntes ex herbaceo candidi sex folijs constant, quibus succedit acinus Piperis nigri, aut granorum lupineri vulgaris magnitudine, folliculo illo inclusi, initio virides, per maturitatem nigri, semine exiguo & plano pleni: radix candida, valde fibrosa, longa & sarmentina: quæ singulis annis novos caules promit, alijs per hiemem marcidis & corruptis.

Copiosa invenitur Salmanticensi agro, umbrosis locis & citra sepes. Nostis etiam nunc in hortis frequēs & pergulas scandens. Aliquot verò post annis abundè observabâ pone arcem Ebreitorum Magnifici ac Generosi Dn. Hieronymi Beck à Leopoldstorff, Cæsari à Consilijs, & Annonæ olim per Vngariâ Præfecti, loco paludoso inter arundines. Floret torâ æstate.

SUNT quibus *κυλάμνος ὀνίγη*, Cyclaminus altera Dioscoridis (quam nonnulli *καραὶ Σκουρὶ* & *καραὶ Σκουρὶ* vocant) dicatur, quoniam multis eum Dioscoridis descriptione notis convenire creditur: gustus tamen insipidus & herbaceus facit, ut eam ad Alfinæ genera referendam putem. Lectori tamen liberum relinquo, ut ad quam volet classem referat.

CYCLAMINI potè alterius acinis, drachmæ unius pondere cum vini albi cyathis duobus potos per quadraginta dies, licet, per urinam & alvum absumere testis est Dioscorid. ad orthopneam bibi, & reliquias à partu repurgare.

ALSINEN autem, vim refrigerandi adstringendi, obtinere, oculorum inflammationibus eum polenta illini, succum aurum doloribus infundi, & omnia, quæ Helicone, emendare.

ALSINE CORNICULATA.

CAP. VI.

PALMARIS hæc est herbula, unico caule, qui in aliquot ramos dividitur, constans, eoque geniculato, tenero, subhirsuto, ut Alfene vulgaris: folia Alfinæ foliorum æmula, paulò longiora, subhirsuta etiam, inter se opposita, & ex intervallis gemina: alarum cavas infident pusilli flores, eandemque, quibus succedunt membranacea & transparentia cornicula

Alfne corniculata.

Natalis.

Alfne Ba-
tica.

Natalis.

Auricula
maris pœ-
nœ.

Venulatus.

Ajuga
pœnœ.Chamæpitys
Austriaca.

gallinaceorum calcarium forma, quæ lento quodam conspersa humore à tangentibus deprehenduntur. semen in illis exiguum, maturitate nigrum: radix inutilis & annua. Tora insipida est.

Inset segetes frequens Salmanticens agro, ubi Maio mense flores producit, & semen maturum præber.

Seo & aliud Alfines genus non vulgare, circa Xerez de la frontera, alijsque Bæticæ locis observabam, caule simplici ut plurimum & singulari, interdum multiplici, geniculato, pedis dodrantem alto, subrubente, aliquot ramulis prædito: folijs satis angustis, secundum petiolum tamen latoribus, & extrema parte mucronatis, dorso magis eminente, nulla lanugine obstitis alterius instar, sed lævibus & saturatè virentibus, geminis semper ad singulos nodos ex adverso nascentibus: extremi ramuli veluti capitis instar Symphyti petrei, onusti erant, quæ oblongis & purpureis floribus referret: radix mediocris, candida.

Nusquam alibi quàm ennumerato loco mihi conspecta est hæc planta, Ianuario mense flores proferens.

Ao Auriculæ maris historiam, quam Græci *μυδὸς αὐτῆς* appellât, multum accedere mihi visa: solus flos, qui non est Anagallidis, neque cæruleus, refragari poterat. Si cui ea opini

nio non placet, certè Alfines genus esse non diffinebitur, quæ Dioscoridis testimonio, nonnullis etiam *μυδὸς αὐτῆς* dicitur.

Porò radix Auriculæ maris illita, æglopiæ sanat Dioscoridi. Galenus eam desiccare ordine secundo refert: ceterum nullam evidentem caliditatem possidere. At Plinius vim ei septiciam tribuit, & exulceraticem: quam sanè, in eâ quam propono planta, non invenias, cum potius ejusdem cum Alfine sit temperamenti.

Hic capiti adjungendum putavi Alfines quoddam genus pelagicum & littorale, anno m. d. xcv. primum mihi conspectum & observatum in sabulosis illis Hollandiæ collibus Oceano objectis, & qui marinis undis interdum alluuntur, ad Pagum Egmund op. t. s. vulgo dictum.

Longè latèrque summâ arenâ id serpit, multisque ramis humi jacentibus præditum est, tenuibus, lentis, flexilibus, quadrangulis, quos multa ambiunt folia, Anagallidis vel Alfines folijs non dissimilia, sed crassâ admodum & succi plena (ut sunt pleraque pelagicarum stirpium, foliorum portulacæ pœnæ instar, bina semper ex adverso alternatim nascentia, valde viridia & falso gustu, inter quæ extremis ramulis flosculi virentes quinq; solis constantes, & in his quinque stamula pallida.

CHAMÆPITYS AUSTRIACA.

CAP. VII.

TAMETS MEUM institutum non erat, de Ajuga quidpiam commentari, quandoquidem à plerisque alijs ejus historia est prodita: quia tamen ejus genus, ab alijs neutiquam observatum, deprehendi, illius historiam non negligendam duxi, sed hoc loco esse proponendam.

CETERVM præmonere Lectorem volui, Ajugam luteo flore totâ Austriâ adeoque Pannoniâ, frequentissimam esse in agris & graminis campis: quinetiâ & illud genus multitudine folijs & rubescere flore, quod Cl. viris Fuchsio & Dodonæo tertium est, multis eorum Provinciarum, & aliarum Regionum locis inveniri.

EST autem id genus, cujus historiam describere hic constitui, elegantissimum: numerosos, cum adolevit, proferens caules, pedales, nonnquam etiam duntaxat palmares, quadrangulos, firmos, lanugine (quampidiot non expressit) onustos, frequentibus nodis cinctos, quibus utrinque sibi opposita innascuntur folia Chamæpityos vulgaris folijs similia, latiora tamen, & in quatuor aut plures interdum lacinias divisa, superne viridia & splendennia, subtus nervosa & nonnihil incana, odoris non injucundi, gustus calidi, non ingrati: ramen: ex singulis alis nascuntur ramuli similiter quadranguli, frequentibus folijs Ajugæ similibus septi,

Chamxpitrys Austriaca.

Pseudochamxpitrys.



sepi, durioribus tamen, qui deinde alia oblonga in alis foliola, angusta, mucronata, Libanoridis coronariz senescentis foliorum pæne æmula gerunt: summos ramos verticillatim ambiunt rigidiusculi caliculi, è quibus exeunt flores Ajugæ tertiz floribus formâ non dissimiles, sed longè majores & elegantissimi, colore saturæ purpuræ, & violaceo, inferiore tamen & propendente labro nonnihil candicante, & sanguineis guttis resperso: femina in singulis caliculis plerumque quaterna, oblonga, angulosa, colore nigro & splendente prædita: radix nigra, dura, multis fibris capillata, & singulis annis novos caules proferens.

Satis frequens nascitur in summo jugo montis illius, qui pago Radaun imminet, non *Natalis*, procul à Peterstorff, sesquimiliari ab urbe Viennâ distante, tenui nigroque solo, quale ut plurimum est vicinorum montium, atque etiam Alpium illius regionis: nec usquam alibi aliquot annis mihi observatum. At anno M. D. LXXXV. & sequente, in alio quodam jugo, non procul à Starberg copiose nasci deprehensa est, multò vegetior, atque inter multas illius stirpes, nonnullas rubri dilutionis & floridi, unam etiam cineracei coloris floribus præditas, qui alioqui nec formâ, nec magnitudine, ab ejusquam modò descriptis floribus differrebant.

Flores profert sub finem Maij & Iunij initio, quo etiam mense semen plerumque maturitatem acquirit. *Tempus.*

INVENTUM porro in Hispanijs pusilla quædam planta Ajugæ valde similis, cum cauliculis, tum foliorum trifidorum formâ, hirsuta tota, subfalso gustu, & inodora, nisi ingratum quidpiam & herbaceum oleret: flores extremis ramis ex alis prodeunt Ajugæ floribus non dissimiles, majores tamen paulò, & albi: femina subsequuntur quaterna in singulis caliculis seu utriculis, cineracei coloris, majuscula & ferme orbiculata: radix crassiuscula est, subalbida, & perennis, quantum conjicere licuit.

Pseudo Chamxpitrys.

Provenit locis incultis, æstate flores producens.

Natalis.

HISPANI ob formæ similitudinem inter Ajugas referebant: sed cum ejus temperamentum non respondeat, Pseudo-Chamxpitrys potius censenda erit, donec legitimum nomen invenias.

Anthyllis
altera.

Hortus.

Ad. 1616
1617.
H. 1618. 1619.
Yra 1620. 1621.

Yra 1622.



Anthyllis Valentina.

AIVGÆ congener est hæc planta, propterea proximum illi locum dedi. Habet autem ramulos humi expansos, teneros, villis obfatos, digitalis longitudo, folia oblonga, viridia, villosa, extimâ parte in ambitu serrata, & Chamæpityos foliorum quodammodo emula, bina semper ex adverso serie quadam disposita, gustu nonnihil servido, & odore satis gravi: florem in singulis foliorum alis Ajogæ floribus persimilem, putepetei tamen coloris: semina in singulis vasculis quaternis simul conjuncta, oblongiuscula, cineracei coloris: radicem crassam, subalbidam.

Nascitur læto solo ad Tagum flumen in Lusitaniâ, Granatenâ etiam regno, & Galliâ Narbonensi, ubi, dum istuc vivebam, illam sæpe legere memini. Floret æstate & Autumno, Granatenâ tamen agro maturius.

GRÆCIS, hæc ἀνθύλλη ἑρπία; Latinis; Anthyllis altera: Lusitanis, *Herva crina* dicitur. Mompelliani meo tempore *Tvam mescatam* appellabant.

BIBITUR hæc, teste Plinio, in duritiâ vulvarum, & in torminibus, in comitali similiter morbo, cum melle & aceto, quatuor drachmis.

Lusitani & Granatenâs mihi referebant ejus decoctum, ad repurgandum sanguinem impurum propinari.

ANTHYLLIS VALENTINA.

CAP. IX.

LICET hæc planta eodem nomine quo superior sit insignita: quia tamen facie illi dissimilis est, peculiari capite ejus historiam describere volui.

Ex unicâ verò radice multos profert cauliculos sive viticulas dodrantales humi stratas, ramosas, subrubrenes: foliola lentis exigua, seu potius Chamæfyces (cui tota planta adeo similis est, ut primo aspectu Chamæfycen putarem, illam tamen diligentius considerans, lacteo succo carere deprehendi) & plerumque cum suis ramulis veluti quadam salagine aspersa, sed etiam ipsa salis gustus: flores inter ipsa folia enascuntur pusilli, quatuor foliis constantes (licet pictor siccam plantam exprimere volens, quinque foliola habentes depinxerit) ex albo purpurascens: radicem singulatam habet, nigricantem.

Hanc plantam nusquam alibi conspexi, quàm ad fossas urbis Valentiz in Hispanijs, juxta eam portam quæ Regiam arcem spectat, eam mihi demonstrante Doctore Ioanne Plaça ejus urbis Medico & publico in eâ Academiâ Professore. Florebat Aprilis initio.

Ανθύλλια, Anthyllidem idem Plaça vocabat, eamque ad primum genus Dioic. descriptum referebat. Etiam autem inter Anthyllides

Anthyllis
Valentina.

1. 2.

Hortus.

Anthyllis al-
tera Plaça.

Chamæsyce.



lides procul-dubio recensenda sit, prima tamen esse nequit, quæ rectis ramulis assurgit, cum hæc repentes, uti dixi, ramulos habeat, totaque facie Chamæsyceen propmodum referat.

CHAMÆSYCE. CAP. X.

FACIE perquam similis est (ut diximus) *Chamæsyce*. proxime descriptæ hæc planta: nam & supina est, & humi etiam procumbens, numerosisque ramulos, teretes, quaternum digitorum transversorum, sive palmi interdiu longitudine, vel etiam longiores, nodosos, seu geniculis interceptos, purpurascens, qui in orbem diffusi humi iacent: folia habet pusilla, Lenti aquaticæ formâ persimili, Peplidis folijs minora & teneriora: flos illi Peplidis aut Tithymali Cyparissie: fructus tricoccus, Peplidis fructu minor, sub folijs teconditus: radix tenuis & inutilis.

Lacti similem succum emitit hæc herba vulnerata, non minus quàm subsequenteribus aliquot capitibus describenda.

Copiosa ubiq; agro Salmanticensi, squal. *Natalis*. lidis & petrosis locis, atque etiam inter ipsa vineta (quemadmodum & circa Mompehium) & plerisque alijs Hispaniæ locis. Apud nostros Belgas semel sata in hortis, præsertim macro solo, maturo semine sponte decidente singulis annis renasci solebat.

Χαμαίσυκος appellât Græci, & *συκή*, ut *Pe-* *Xanorhis*. plum: Latini, Græcam vocem retinentes, Chamæsyce: Salmanticensis *Negundo*, *Negundo* quasi pusillam nucem exprimere vellent, à seminis nimirum, uti puto, formâ.

ABSTERSORIA & acri facultate pollet, uti & Tithymali.

PEPLIS. CAP. XI.



Peplis.

LACTARIIS stirpibus congener est *Peplis*. Peplis, rota enim lacteo surco turget, illarum instar, non tamen assurgit ut illæ, sed comam humi diffusam habet quemadmodum Chamæsyce: ramuli sunt ei digitales, teretes, nunc purpurei, nunc herbacei coloris: folia inter Portulacam silvestrem & Chamæsyce media, his crassiora & majora, illis verò minora & tenuiora: flos ex herbaceo purpurascens: semen pusillum in triangulis valvulis sub folijs latentibus: radix pusilla.

Abundè hæc nascitur in omnibus Medi. *Narina*. terraneis maris littoribus tum Hispaniæ, tum Narbonensis Galliæ: in Oceani littoribus nunquam observavi: imò ne in cultissimis quidem Belgicis hortis mihi conspecta.

DIOSCORIDES hanc *πεπλίδιον* vocat, & ab aliquibus *διὰ πύχην ἀγρίαν*, ab Hippocrate verò *πέπλον* dici scribit: & viribus *πεπλον*. Pepto respondere.

TITHYMA-

QVANTVM nunc plura Tithymali genera inveniuntur, quàm Veteribus prodita sunt, eorum tamen historia confundenda non est, sed quàm commodissime fieri potest, ad illorum descriptiones referenda.

Tithymali
genera.

CHARACTÆ, quemadmodum & reliquorum Tithymalorum varias species observare memini, quas, cum ab alijs descriptæ sint, eas repetere non est necesse. Vnus tamen Characiz, qui piz ceteris descriptioni Dioscoridis convenire videtur, historiam hic adjicere libuit, cum alreta specie, quæ in Pannoniâ & Austriâ mihi duntaxat conspecta.

Tithymalus characiaz 1.

Tithymalus characiaz 111. Austriac.



Tithymalus
Characiaz 1.

VNICVS porro Characiaz primo generi, magnâ ex parte, est caulis, interdum plures, cubitales, amphiores, rubente cortice recti, minimi digni crassitudine æquantes, infimâ parte glabri, foliorum duntaxat vestigijs insigniti, veluti in secti & vulnerati essent, quales illi Dioscorides ex ipse de Sedo tribuit, supetnâ verò, folijs duris, lævibus, viridibus, majoribus quidem longioribusque quam sint Oleæ folia, minoribus tamen quam Amygdalæ, ornati, deinde in plures junceos & firmos ramulos umbellæ in modum divisi, quos ambiunt veluti acerabula aut caveolæ folijs balnearum similes, & in his flos, non subluteus, aut pallidus, quemadmodum in alijs, sed niger: postea fructus tricoccus, in quo semen per maturitatem exiliens reliquarum Ladanarum seminis instat: radix dura est & lignosa.

Natalis.

Nascitur id genus in asperis montosisque per Hispanias, Valentino regno, & circa Malacam, atque etiam supra Arelatem itinere Massiliensî, & quibusdam alijs Narbonensibus Galliarum locis. Tota plania lacteo succo prædita est, & Marnio flores profert.

Characiaz
111.

ALTERVM genus est ei ferè simile, cui tamen plures caules ab unâ radice prodeunt, folia molliora & lanugine pubescentia, flores pallidi.

Natalis.

Crescit id etiam in Hispanijs, deinde tam in Narbonensî, quàm reliqua Galliâ, tum etiam apud Helvetios ceterosque Germanos. Apud meos Belgas in hortis semel solum, copiose provenit.

Characiaz
112.

MULTOS ab unâ radice profert Tertium genus, in Pannoniâ observatum, caules, pedales, nonnunquam etiam cubitales, firmos, læves, infimâ parte nonnihil purpurascens, & foliorum, quæ deciderunt, vestigijs notatis, ut in Primo genere: hos deinde ambiunt confuso ordine nascenna folia, crassiuscula, lævia, duas interdum uncias longa, mucronata: summi caules in multas virgulas inter folia emergentes dividuntur, quæ bina suborunda seu qua-

Tithymal. myrtilites legitimus.

Tithymal. myrtilites Valentinus.



seu quodammodo circinata foliola, & quasi vasculum seu labellum imitantia sustinent, in quibus flores reliquorum Tithymalorum floribus similes, qui cum suis virgulis & vasculis pallido sublucido colore præditi sunt: succedunt triangula capitula semine plena: radix longa, digitalis crassitudinis, infimâ parte in aliquot fibras divisa. Maruro semine caules singulis annis emoriuntur: novo autem vere recentes aliæ radice germinant, qui subsequente anno flores ferunt.

Nascitur plerisque Pannoniæ locis: sed Viennensi agro tantâ copiâ, in graminis & siccioribus pascuis, ut Junio mense (tum enim floret) omnino pallefcere videantur. Tota planta lacteo succo turget perinde ac reliqua Tithymalorum genera. Natalis.

MYRTITEM legitimum Hispaniæ & Gallis ignotum esse arbitror: nam Valentinorum Myrtitem, non desunt, qui inter Characiz genera referre malint. Sed legitimus in hortis semel satas, semine deciduo satis fecundè nascitur.

LATIFOLIUM Tithymalum verum legitimumque in Hispanicâ meâ peregrinatione etiam observasse puto: nullum enim genus amplioribus folijs uspiam videre memini.

Est autem Platyphyllus Tithymalus mihi creditus pedali, interdum majori altitudine, in aliquot à radice divisus ramos, nonnunquam simplici caule adurgens, quem ambiunt ampla folia, rotundiorè & quasi orbiculato mucrone prædita, ad istatis novellæ foliorum formam accedentia, viridia, crassiuscula & aliquantulum carnosâ, pallefcunt & acri succo turgentia: flos ramulis insidet ex flavo purpurascens, ac veluti acetabulum sive balinearum foliolis comprehensus, ut in reliquis Tithymali generibus: radix crassa est & candida.

Vno Valentinio regno inter Biar & Huenniniente, viâ salebrosâ, inter medios frutices Martio mense florentem duntaxat observabam. Tithymalus latifolius.

CETERVM sub meum Francofurto discessum, ad me mittebat Iacobus Plateau vir in stirpem cognitione diligenter versatus, Tithymali cujusdam plantam siccam, de qua in epistola addita sic scribebat.

OBSERVABAM etiam in meo horto plantam Tithymalo Cyparissiz Dodonzi non valde dissimilem, quæ non inlegans mihi visa est, nec à quopiam hæcenus descripta. Vni cum illa promittitur ex radice caulem, rectum, cubitalem, satis firmum, in frequentes ramos divisum, ut parvum fruticem emulati videatur: radix non serpit Tithymali Cyparissiz Dodonzi radices instat, sed superveniente aspero gelu penit: semine tamen sponte deciduo singulis annis renascitur. Tithymalus cyparissiz.

Non incommode forsitan (mea quidem opinione) ad Pepli genus aliquod referri posset,



incondito ordine eos ambientibus præditi illi deinde in minores & graciliores dividuntur, bina folia paulò rotundiora, & contrario situ nascentia sustinentes, in quorum medio exarctur flos ex flavo rufescens, cui succedit capitulum trigonũ, ut in Tithymali generibus, tugosum & tuberculis oblitum, in quo semen.

Quo tempore flores proferat non adscribebat: sed semine peregrinè accepto sibi natam duntaxat aiebat.

FACULTAS & temperamento reliquis Tithymalis responderet hæc planta, ac perinde humano corpori molesta & noxia est.

UMBELLIFERÆ.

LACTARIAS Umbellifera sequentur, quarum nonnulla lacteo etiam succo prægnantes sunt. Magnam autem in varijs Provincijs earum est præsentia: nam præter plerasque ab alijs descriptas, nonnullas alias peculiares in illis regionibus, quas peragravi, observabam, quarum historiam, subsequens aliquot capitulis, quam accuratissimè posero, tradere conabor, initium à valde peregrinâ faciens.

TATARIA VNGARICA.

CAP. XIII.

NON vulgaris est hæc planta, quæ radicem habet crassissimam & longissimam: nam brachialis crassitudinis, & cubitalis longitudinis, aut etiam ampliores aliquot accipere memini ab Ill^{mo} Dn. Balthasare de Bathyan, qui in meam gratiam ex Vngaria trans-Danubianâ adferri iusserat, ut in meum hortum Viennæ transferrem. Illis autem folia emerserunt rapi folijs non valde dissimilia incisuris & lacinijs, breviora tamen, & verius ad Panacis Heraclij foliorum formam accedentia, rudi atque asperâ lanugine prædita, ex viridi pallescencia, alia deinde paulò minoribus incisuris divisa, nec minus aspera, inter quæ assurgens caulis cubitalis aut amplioris longitudinis, pollicaris verò crassitudinis, striatus, concavus & nodosus, perinde asper ac folia, quem lato pediculo amplectebantur minora folia & multifida, aspera etiam lanugine obfusa: summus caulis in umbellam desinebat, Panacis Heraclei umbellis similem, in quibus flores & formâ pares & colore, quibus evanidis, succedebant rara (nam singuli flores non sunt fecundi) semina, valde crassa, nec valde ab similia semini illi magno & striato Libanotidis cachryfetæ. Biennio quidem eas radices alui, ante quàm una illarum & caulem, florémque & semen proferret: deinde corruptæ sunt, tamque fœtidum odorem exhalarunt, ut ex horto fuerint ejiciende.

Huius portò radice Vngari Agriæ vicini, atque etiam ulteriores Daciæ contermini, in annonæ caritate & inopiâ, vescuntur alterius panis penuriâ, ut mihi assererebant non modò Heros ille Illustris, sed etiam alij nobiles viri qui in eâ Provinciâ vixerant. Quæ ad res effecit, ut dubius essem, an eadem esset cum Baltracan in Tartariâ nascente, cujus meminit Iosaphat Barbarus Patricius Venetus in epistolâ ad Petrum Barocci Episcopum Patavinum, quæ adjecta est ad calcem ultimi capitis Narrationis ipsius quæ divulgata est. Do ejus in Persidem profectio.

BALTRACAN, inquit, folia habet Rapo similia, æ quorum medio caulis assurgit pollicaris crassitudinis & brachialis altitudinis, cortice obductus è viridi flavescente, qui per maturitatem siccatur, & à ligno recedit, ut in vitis palmitibus, per quem rara sparsa sunt folia: semen fortiaeli, sed majus, validi odoris, iucundi tamen saporis, quæ de causâ sine sale edipotest: unica constat radice. Tartari folia ejus decoquant in aqua, decoctum in vasculâ infan sunt, refrigeratum instar vini bibunt, atque refrigerandi facultate prædictum aiunt.

Maximo est in usu apud Tartaros hæc planta: nam absque eâ, per magnas illas solitudines, in

Tataria Persica.

ejus usus.

Baltracan.

ejus usus.

dines, in quibus nihil edule repetitur, iter facere non possent: itaque ea nata, suis peregrinationes instituere solent.

A Tartari forte hujus radice usum edocui sunt Vngari, propterea *Tataria* nomen illi dederunt: *Tarten* enim (ut & Germani) vulgo appellant, qui nobis Tartari dicuntur.

AN verò huic similis, radix *Chora*, quâ lacti admistâ, Cæsaris milites inopiam levassè legimus?

THAPSIA.

CAP. XV.

Thapsia L.



Notula.

Sursum quam
eandem non
gignit.

FERVACEA habet folia, viridia, villosa, seu lanugine quadam obducta, humi veluti in orbè diffusa, ingrati saporis, inter quæ cubitalis, interdum etiam bicubitalis exultat caulis, digitalis crassitudinis, nodosus, intrusævus & fungosus, raris folijs præditus, summo fastigio magnam & latam sustinens umbellam luteorum seu flavorum florum, quæ dum maturuit semen, quod latum & acerosum est, germenq; habet longû & angustum, sphericam & orbicularem figuram quodammodo refert: radix crassâ, longa, summâ parte capillata, ut perleg. ferulacei generis, crassiore libro vestita, foris subnigro vel fulco, interiore parte candicante, lacteo succo plena, gustu amarissimo & acri, nauseam tamen movente, aded ingrata est, medius ejus nervus fungosus.

Gaudet collibus petrosis, quales sunt non procul ab ostio Tagi supra Vlyssipponem, & multis alijs Lusitaniz, Hispanizq; locis editionibus & incultis. Floret Augusto, nunquam maturus.

Verum mirari subit quosdam inveniri, qui aded proelives sunt, ut non expensis probè stirpium singulis notis, sed ex levibus duntaxat picturæ cõjecturis, statim de illâ judicium ferant, quod usu venisse ijs video, qui hujus mex Thapsiz iconem, ad Selsi Peloponensis historiam accommodare non sunt veriti, & illi quidem, qui hanc nunquam crescentem viderunt: ut raceam utriusque plantæ facultates esse dissimiles.

Thapsia L. Idem potest, quibus dixi, locis aliud Thapsiz genus invenitur cubitali caule præditum, graciliore tamen quàm superioris, umbellâ etiam simili florum & seminis, sed minore: folia illi multo tenuiora quàm illius, Fœniculi pæne foliorum instar, nullam insignem qualitatem habentia: radix longa, digitalis crassitudinis, foris nigra, intrus candida & fungosa, acris summo capite villosa.

Thapsia L. Tertium præterea Thapsiz genus observabam in Hispaniâ meâ peregrinatione, longè majus superioribus, utpote caulem habens trium aut quatuor digitorum crassitudinem æquantem, iustar caulis ferulæ, & sexpissimè humanam altitudinem superantem: florem & semen Primo generi non dissimilia: folia, antequàm planta in caule assurgat multò ampliora, in orbem ramen non secus ac illa humi diffusa: radicem etiam crassiorē.

Notula. Nasctur ea non solum agro Salmanticensi, sed circa Pinciam, vulgo Valladolid dictam, & totâ vetere Castellâ, ad Pyræneos usque montes.

Sed nec parum hallucinantur, qui hanc plantam, Cicutariam maximam & feridissimam Lobelij esse censent.

Thapsia L. Eodem Salmanticensi agro & vicinis locis nascitur ferulacei generis quædam planta, folijs Libanotidis, per terrâ similiter expansis, lento quodâ & glutinoso rore semper aspersis, sarurâ viriditate splendentibus: radice crassâ, longâ, tenerâ & fragili, foris nigra, intrus albâ, lacteo succo plenâ: caulem nullum observabam, sed eum ferre diebant rectum, tenuem, & in eo umbellam florum pæne in globum coactam.

Tota planta teterrimi odoris est: unde verisimile esse conjeicio non minus esse noxiam, quàm sir Thapsia, ad ejus genus referenda viderur.

Notula. CETERVM *Scaphia* Graecis, Latinis etiam Thapsia dicitur: Prima à Murcianis & Valentinis *pumila*, à succi, ni fallor, abundantia dicitur: reliqui Hispani *Carahija*, appellant, quam vocem omnibus ferulaceis plantis (quarum summa varietas per universam Hispaniam) tri-

niam) tribuunt: nam Ferula, & Libanotides illisetiam *Cañabeja* dicuntur, quia videlicet harundinaceum caulem habent. Tertium genus Salmanticensibus etiam *Cañabeja* est: Quartum aurem *Taura*.

Tueso.

Foeniculi.

Granatenses imperiti Pharmacopœi, prioris radice loco Turbith magno errore utuntur: peritiores autem discrimen observare norunt. Vetula Salmanticensis medicinam istic ex-
ercentes, Tertia radice utuntur ad provocandos menses, aliisque dejectiones molindas.
Tanta autem vicum supernè, tum infernè purgat, ut fumens in maximum periculum
expennero conjiciat.

SESELI MONTANVM.

CAP. XVI.

TRIA hoc capite describere constituimus generà in montanis Austriæ & Pannoniæ
oblectara, planè inter se differentia, quorum

Seseli I. montanum Pannon.

Seseli II. montanum Pannon.



P RIMUM ampla habet folia humi sparsa, & in multas alas divisa, Seseli Peloponensi
ferè similia, superne viridia & splendentia, infernà parte minimè, ferulæ odore, acri nec ad-
modum grato sapore: caulem deinde sesquicubitalem aut amphorem, crassum, striatum,
inrus fungosum, nodosum, & multos ramos in ambitu ex singulis geniculis, seu nodis fe-
rentem, per quem sparsa sunt folia superioribus respondentia, sed minora: extremi rami in
magnas umbellas fasciculorum quinque foliolis candidis constantium desinunt, odoris ferè
sambucini: flori succedit semen gemellum, striatum, flavescens, aromatico & fervido gu-
stu: radix crassa est & foris nigra, quæ (ut in plerisque ferulaceis contingere solet) semine
prolato perit, nec nisi altero aut tertio à satione anno florès producere solet.

Crescit in celis Sneberg & aliarum Austriæ Alpium jugis, ubi lætiora sunt pascua: floret
sub fine Junij, aut Julio: semen verò Augusto, vel etiam serius maturefcit.

B RACHIALI interdum nritur Alterum radice, præsertim si planta vetusta sit (recentio-
res & juniores pollicarem habent) in aliquot ramos inferiore parte donata, crasso, rugoso,
nigròq; cortice septa, gummoso primum lentòque sapore prædita, deinde acri & salivam
cient: quæ summo capite in multà capita extubet villosa, quemadmodum ferè omnes
ferulacei generis stirpes, unde exeunt magnæ & satis amplæ foliorum alæ, aliquot folijs per
ambitum serratis & nonnulli incis, uni costæ inhxerentibus, sed ex adverso nascentibus
constantes, colore suprà parte dilutus virente, & aliquantulum splendente, pronà subci-
neraceo præditi: inrer quæ sesquicubitalis nonnunquam emergit caulis, stratus, pollicatis
interdum crassitudinis, geniculatus, in aliquot ramos divisus, quem ambiat ad singulos no-
dos siq;

R R

dos live ghecula minores foliorum alz; summum caulem atq; extremos ramos exornant umbellę palleſcentium floſculorū, quibus ſuccedūt ſemina Silens montani ſemini ſimilia.

Natalis.

Invenitur ſerē in omnibus Pattoniz & Auſtriz inferioris montibus, aſpero ſolo ventifque perſilato, Julio & Auguſto florer, & ſubinde ſemen profert. Simile aliquando legere niemini ad Allobrogicarum Alpum radices.

*Sefeli mont.
1114.*

TEXTIO multæ ſunt foliorum alz, Fœniculī foliorū inſtar in multa folia tenuia, illis tamen craſſiora & breviora diviſæ, virides admodum, mucrone omnium foliorum candicante & duro, calidi guſtus: inter quas enaſcuntur cubitales caules aut ampliores, digitalis craſſitudinis, ſtriati, geniculati, in aliquot ramos ſecti, quos ſecundū nodos aliz minores amplectuntur foliorum alz: flores in extremo caule & ſummis ramis in umbellas diſtributi naſcuntur albi: deinde ſemina gemina conjunctim, ut in omnibus umbelliſeris, ſtriata, Angelicę ſemini non diſparia, guſtu ſervido: radix multis craſſis & oblongis fibris latē & oblique parſis conſtat, quę ſingulis annis ſummo capite novas propagines ad latera facit.

Natalis.

Naſcitur in plerique Auſtriz inferioris & Stiriz montanis pratis, atque Julio florer.

*Sefeli Sylve.
Libanotis
altera
Fuchij.
Daucus l.
Matthioli
Sefeli Maſſi
lino, v.*

INTER *noſtra*, Sefeli genera reſeiri poſſe has ſtirpes, omnino exiſtimo. Prima quidem, proximē accedere videtur ad Peloponēſe Dioſcoridi deſcriptum, quod illi ordine tertium eſt. Altera plurimum ſimilitudinis habet cū Libanotide altera Fuchij, ſive Dauco ſecundo Matthioli: & *Ptero wartyd* quidam ruſtici vocant, tamenſi aliam umbelliſeram ſtirpem frequentius etiam hoc nomine donent. Tertiam (quę Maſſilienſis Sefeli piſturam apud Matthiolum aliquantulum reſert) nōnulli fortalle alteram Libanotidem Dioſcoridiſ fructiferam potius eſſe contendunt, à qua ſanē non multum diſſerre videtur. Nullum vulgare nomen illa, quemadmodum nec prima, apud earum Provinciarum ruſticos, in quibus obſervabam, quod equidem ſciam, obtinuit.

Sefeli *Æthiopicum* Matthioli.

Aſtrantia.



*Sefeli æthio-
picu Matth.*

SESELI porro æthiopicum Matthiolo nuncupatum, uberrimē naſcitur per omnes Vngarię, Auſtriz, & Stiriz ſilvas, ubi illius folia in tantam amplitudinem interdum evadunt, ut palmum æquare poſſint: habent verō magnā ex parte ſingule foliorum alz quina duntaxat folia, uno extremam alam occupante, per ambitum ſerrata, ſuperne atrovirentia, infernē ſubcineracei quodāmodo coloris: caulis cubitalis eſt, aut amplior, geniculis interceptus, & ſuperiā parte in aliquot ramulos diviſus, ſuſtinētes exalbeſcentiū floſculorum umbellas, qui in oblongiſculū & anguloſum ſemen tranſeunt, cum inū aut ſileris montani ſemen odore & ſapore referēs: radix pollicaris aut amplioris eſt craſſitudinis, craſſioribus aliquot fibris prædita, & craſſo cortice, ſapore initio dulci, deinde amaricante, ſupremo capite hirsuta (veſerū foliorum, quę marcida evanuerunt, fibris eam hiſſutiē faciētibz) perennis.

VERVM

Siler montanum.

Oreochlinum.



Archangelica.



VERVM huius Sefeli aliud præterea genus est satis vulgare in illis ipsis Provincijs: quod nusquam tamè abundantius invenitur, quàm in Calenberg. Majores id habet foliorù alas, hoc est, in plura folia, nempe bina & vicena plerumque, superioribus magnitudine longè cedentia divisas, quæ supernè splendentia minus virent, & pronâ parte cineracei prorsus sunt coloris, omnia in ambitu non modò ut superioris serrata, sed etiam lacinijs dissecta: æqualem eum superiore habet caulem, nodis similiter interceptum, florum umbellas similes, semen par, radicem non dissimilem.

Hoc Getmani Schwartz Wurtz/ hoc est, nigram cervi radicem, illud autem Weiss Wurtz/ id est, albam cervariam appellant. Sunt qui inter Libanotidis genera recensent. Floret utrumque Junio, interdum etiam seriùs, semen Augusto maturum est.

Producunt etiam prata ad radices mœtium Alpius Austriaci & Striaci viciniorù magnâ copiâ plantam illam acri & aromaticâ radice præditam, quam vulgus Herbariorum Astranciam sive Imperatornam appellat, Germani Weisswurtz/ à facultatibus quibus pollet, nominant.

FRÆQVENS etiam est montibus Austriacis Siler: at nusquâ abundantius crescere meminì, quâ in eo qui Badënsibus thermis imminet. Vbi, & in alijs vicinis collibus, atque urbi Viennæ proximis, vulgare etiâ est Oreochlinum.

ARCHANGELICA autem à nonnullis appellata, amplioribus, quàm Angelica, foliorum alis, & dum teneræ adhuc sunt, subpurpureis, caule

Peucedanum.



Saxifraga Pannonica.



didorum bosculorum umbellam sustinentes: radix Peucedani radici non multum abstin-

caule humanam altitudinem superante, brachialis aut amplioris crassitudinis, frequentissima est in montibus vicinis arci Greben III. Hetero Balthazaris de Bathian, sitæ in interamni Pannoniâ, quâ Germani Wimbethland appellant: expansa enim est inter Dravum & Savum flumina. Solet ea, quemadmodum & Angelica, perducto ad maturitatem semine, perire, atque illo in tertio sinum sponte recepto, renasci.

PEUCEDANVM PANNONICVM.
CAP. XVII.

QUia Peucedani historia prodita est ab omnibus qui de Placis commérati sunt, illa hic repetere non est necesse: volui tamen illius mentionem facere, & ejus iconem oculis subijcere, ante quàm alterius Peucedani, quod in Pannoniâ observabâ, descriptionem darem: nam in omnibus, quæ adij, locis mihi confecta est, nusquam tamen frequentior quàm in pratis ad Danubium sitis infra Ratisbonam, & Straubingâ anno M. D. LXXXVIII. cum ad verso flumine velherer Ratisbonam.

Sed Peucedanum quod in Pannoniâ observabam, radicem habet pollicaris, ut plurimum crassitudinis, interdum minore, nonnunquam etiam majorem, lægem, crasso cortice, modò candicante, modò fusco & nigricante rectam, gustu inirio Pastinacæ, deinde nonnihil acri, transversis & obliquis aliquot crassioribus fibris donatam, supremo capite hirsutam: ex qua quinq; vel plura exeunt folia, Peucedano vulgari & legitimo ferè similia, sed minora & breviora, colore ex viridi cæruleo, non, ut illa, nigricante, subamaro sapore, & odore ferè ignavo. nihilque singulari referente: caulis inter illa assurgit cubitalis, torundus, gracilis, in multos ramos divisus, in quibus umbellæ candidorum florum: semen Selini ferè, breve & crassiusculum, geminum ut in omnibus penè umbelliferis, cineracei coloris, saporis verò aliquantulum amari & acris.

Provenit multis Ungariæ & Austriæ interioris locis, montium acclivitatibus petroso, & salebroso solo, ubi Junio florer: at in illarum Regionum Alpibus (ubi etiam nascitur) Iulio & Augusto, & subinde semen ferre nō desinit.

Non multum differre videtur à Saxifragâ secundâ Marthioli.

SAXIFRAGA PANNONICA.
CAP. XVIII.

MULTO minor Peucedano est Saxifraga Pannonica, & brevioribus folijs prædita, capni foliorum ferè æmulis, quorum sapor & odor, Peucedani Pannonici foliorum odorem & saporem quodammodo referunt, paulò tamen acriora sunt: inter quæ cauliculi exeunt pedales, graciles, geniculati, aliquot exiguis folijs exornati, summo fastigio candidorum bosculorum umbellam sustinentes: radix Peucedani radici non multum abstin-

Peucedan.

Peucedanum Pannonic.


Natalis.

Saxifraga st. Martii.

Saxifraga Pannonica.

Saxifraga, Pimpinella German. major.

Saxifraga, Pimpinell. German. minor.



Pimpinella Italica major Sanguisorba.



lis, sed brevior, acrior salivamque ciens, multa hirsuta capita (supernè parte producens, è quibus folia & caules emergunt.

Invenitur iisdem locis quibus Peucedanum, præsertim verò in apetto & glabro illo monte quimedius quasi spaciū inter Hamburgum, & Altenburgum Vngariæ urbes occupat, etiam è medijs saxis plerumque erumpens. Sed & colliculo juxta Zimmerin, itinere ad Phasionorum, juxta Lachn, & plerisque alijs circa Vienne locis crescit. Floret Julio.

CETERVM vulgaris admodum est per Vngariam, Austriam, Sariam, vicinâque Provincias Saxifraga vulgaris, à Germanis Pimpinella nuncupata, major & minor, & utriusque varietate inveniuntur differentie foliorum formâ inter se discrepantes, præsertim in minore, quæ interdum singula folia laciniata habet, aut angustioribus & oblongis incisuris divisa. In majore autem, tametsi magnâ ex parte foliorum forma non variet (omnia enim in ambitu serrata sunt, & per alas ordine disposita) unum tamen genus ex atro virentia ea obinet & splendens, alia minimè: genus aliud invenitur, cujus folia in lacinias sunt divisa: præterea Erischerus mons alit, cujus flores eleganter ex purpurâ rubescunt, cum reliquorum sint candidi.

Pimpinellarum verò Germanicam ubique tamegenascentem, & Italici Pimpinellam hircinam dictam, Tragium alterum Dioscoridis esse suspicatur C.V. Fabius Columna.

Pimpinella
major & minor
Germanis
varietas.

Pimpinella
hircina.
Tragium al.
inter Diosc.

Vlmaria.

Pimpinella
ital sangui-
feræ Germ.

Vlmaria.

Barba capiti-
na Eur. j.Daucus
nascitur.

Daucus, Meum.

Daucus le-
gitimus.Daucus
vulgaris.

Carum.

Meum vul-
gare.

doniâ ad me misso à Doctis. Viro Honorio Bello, ejus urbis Medico.

Nec minus est frequens, cum in pratis, et in siccioribus illarum ipsarum Provincia- rum locis, Pimpinella Italorum & Gallorum major & minor, quas Germani Sanguifor- bas appellant.

ALUNT etiam earundem Provinciarum prata humidiora & torrentium ripæ, Vlmariam ab ulmaceis folijs vulgo dictam, tem- peramento, atque etiam odore Pimpinellæ majori Italice quodammodo respondentem. At montanæ silvæ Barbam capitinam Fuch- sij & Tragi, ab Vlmariâ divertam.

DAUCUS MONTANUS.
CAP. XIX.

ELEGANS est id Dauci genus, quod in Alpium Austriæ & Stirie sublimibus pra- tis nascitur. Illi enim ex radice ptodeunt quin- x aut senx tenuiorum foliorum alæ, Selseli pratensis (quod abunde in totius inferioris Austriæ pratis nascitur) alatis folijs pæne si- miles, sed longè minores, neque palmi am- plitudinem excedentes, sed proximè ad Acus pastoris vulgaris folia accedentes, admodum virides: inter quas prodit caulis pedalis, nu- dus, striatus, satis gracilis, qui summo fastigio binas aut tetras sustinet parvas & benè con- fertas umbellas flosculorum è rubro dilutè putputantium, sive carnei, vt vulgo loqui- mur, coloris, quinque foliolis constantium, quos excipiunt Selsi hortensis æqualia femi- na: radix digitalis est longitudinis, cortice foris nigricante, rugoso, & multis tenuibus fibris prædita.

Tota planta Daucum vulgarem quodam- modo redolet, & illius gustum etiam refert. Floret Junio, in hortis etiam Maio.

AT legitimus Daucus, Creticus appella- tus in Durrenstein frequens: Et scherus ta- men illo magis abundat: nascitur isthe inter saxa tenui solo aspersa, ut difficulter ejus ra- dix integra erui possit, cinetacei coloris fo- lio, & viribus, cum eo quod in Creta insula crescit, procul dubio conferendum.

VULGARIS autem Daucus, passim in om- nibus his Provinciis jam numeratis prove- nit, & officinis in usu est. Quemadmodum & Carum, quo præsertim sicciora Vngariæ prata abundant, & magnâ seminis copiam, in quotidianum usum singulis annis suppeditant.

ALPVM verò juga, Meum vulgare tenui folio, quale nos hic lectoris oculis subijci- mus, alunt: sed nullibi frequentius observa- re memini, quàm in Durrenstein.

ANTHRISCUS PLINII. CAP. XX.

ANULLO Recentiorum hætenus deseri- ptâ arbitror hujus stirpis historiam, quæ nata Lugduni Batavorum in Acade- mico horto anno M.D.XCV. semine è Cretæ Cy-

DODRAN:

Anthriscus Plinij.



DODRANTALIS est plantula, statim à radice tenui longâ, albâ, paucis fibris donatâ, multa folia in multifidas tenuesq; alas incisa proferens, pæné instar foliorum Scandicis, nō in- jucundi, si teratur, odoris, neque, si gustentur, saporis, qualis ferè Chærefolij vulgaris, inter quæ breues prodeunt cauliculi, quadam tenui lanugine præditi, qui in breues, virides, gracilesque ramulos dividuntur, sustineotes um- bellulas, quatuor, quinque, aut sex flosculorū, quinque foliolis albis præditorum, in quorum medio exile quidpiam ex purpurâ nigricans: flosculis succedūt, seu verius flosculi sustinen- tur, à stilibus quibusdam gracilibus, qui paulatim in uncialem longitudinem succrescentes, for- mam referūt thecatum seminis Pechinis Ve- neris vulgo vocatz plantæ, siue Scandicis sil- vestris.

Anthriscus Plinij.

Flores & semen (sed immaturum) protulit Iunio. De hac stirpe consulenda Honorij prima ad me epistola, ad calcem hujus stirpium Historiæ posita, Plinius item libro XXI. cap. XXII. in Scandice.

SELINVM PEREGRINVM.

CAP. XXI.

VMBELLIFERARVM, præter Thapfias & alias enumeratas, duo genera Salmaoti- centi agro observabam, quæ ad Selini genera commodè referri posse arbitror.

PRIMUM Coriandri aut Elaphobosci fo- lijs similia habet folia, per terram strata, inter quæ caulis exilit cubitalis altitudinis, in mul- tos ramos divisus, flores in umbellis ferens candicantes, deinde semen Petroselino vulgari simile, acre, & atomatium: radix longa, digitalisq; crassitudinis est, candida, odorata, Selini sapore.

Selinum pe- grinum L.

Nascentur in vinetorum marginibus, juxta vias & semitas. Floret mense Julio, semen Au- gustō matutum est.

Natalis.

ALTERVM, multa habet ab una radice prodeuntia folia, Cicutz folijs non dissimilia: sed quæ caulem ambiunt, minora sunt: caulem cubito majorem, sæpe unicum, nonnun- quam plures, & in his umbellas candidorum florum, quibus succedit semen latum, minus tamen quàm ferulæ: radicem digitalis etiam crassitudinis, albam, odoratam, & utcu- que acrem.

Selinum pe- grinum L.

Provenit apricis & à Sole illustratis locis: Julio floret, Augusto semen profert.

Natalis.

Mirum in modum unam eiere plantæ decoctum, aut aquam in quâ radix macerata, mihi istic referebant.

Natalis.

ILLIS non possum non adjungere umbelliferam quandam plantam, quam Salmanti- centi quidem agro cum superioribus observabam: sed multos annos ante, etiam agro Moin- pelliano, & toto illo tractu Massiliam usque, quæ mihi plurimum accedere visa est ad Sele- ni Massiliensis historiam à Dioscoride traditam.

Selinum pe- grinum L.

Constat autem ea folijs Anethi ferè, exilibus & minutim incisiss, Rutæ propemodum colore: caulem habet uocum, interdum cubitalem, sed sæpissimè minorem, io aliquot ra- mos divisum, qui umbellas florum candidorum aut purpureorum sustinent: quibus succedit Apij semen: radix longa erat, alba, digitalis etiam interdum crassitudinis, satis odorata.

Selinum pe- grinum L.

Mompelliani, eum istic vivebam, Fœniculum tortuosum appellabant. Castellani verò Enxalmo.

Fœniculum tortuosum Enxalmo.

SELINVM MONTANVM pumilum.

CAP. XXII.

ALIVD porro in montanis observabam Selini genus exile & pumilum, quod aliquot à radice spargit folia, fœniculi aut pucedini folijs formâ quidem similia, sed longè minora, & rarò pluribus quàm quindenis foliolis constantia, è quorum medio dodrantalem crassamque

Selinum pumilum.



Selinum.

Cicutaria Pannonica.

Cicutaria vulgaris.



Selinum.

Selinum.

crassumque fert caulem, in multos tamen ramulos divisum, sub quibus aliz soliorum aliz minores nascuntur, novenisque duntaxat foliolis constantes, lata basi caulem amplectuntur, pastinacæ sive staphulini gustu & odore: singuli ramuli exiguum florum quinque candidis foliolis prædiorum cum tocidæ itaminulis, & odoris expertum umbellulis sunt onusti: quibus succedit semen Selini semini non dispar: radix supremâ parte in crassura caput extuberat, multisque villis (qui foliorum superioris anni fibræ sunt) hirsuta, brevis, quasi in orbem convoluta est, intus fungosa & alba, exterius fusca & rugosa, infernâ parte bifida plerumque, & in raras fibras desinens.

Invenitur quibusdam siccorum desertorumque, virentium tamen, agrorum marginibus, & in nudis gramineisque montibus inferioris Austriæ & Pannoniæ: florêque Maij initio. Biennalem esse arbitror, uti pleræque sunt umbelliferæ, quæ proloco semine penito solent.

CICUTARIA PANNONICA.

CAP. XXIII.

LICET Cicutariæ quoddam genus in Pannoniâ & Austriâ nascentis historiam hoc capite describere mihi duntaxat fuerit animus, vulgaris tamen, & in omnibus istis, quas adij, regionibus sponte crescentis iconè præfigendam esse duxi, non historiam, quandoquidem à plerisque alijs est descripta.

QUONIAM porrò sena, aut plura promittit radice Pannonica folia, ramosa uti Selinum vulgare, minora tamen & tenuius incisa, multum ad Bulbocastani vulgo nuncupati, folia accedentia, sapore aliquantulum acris: caulis inter illa emergit pedalis fermè, ioterdum etiam, (fecundum solum nactus) cubitalis, circa nodos crassior, umbellam ferens candidorum flosculorû, semen deinde oblongum, Chæresfolij vulgaris serè instar: radix tuberosa est Bulbocastani radices pænè æmula, sed rotunda & aliquantulum internâ parte turbinata, ut Aristolochiæ rotundæ radix quæ albicantem fert florem, sive secundæ, intus alba, sapore & odore Pastinacæ, sive Elaphobosci propemodum, fusco & nigricante cortice tecta, quæ succrescente caule, instar napi longior fit, & magis turbinata, flaccidaq; & rugosa evadit: atque tandem maturo semine perit, è semine tamen sponte deciduo singulis annis renascens.

Novo Vere, in hortis & herbidijs Viennensis agri locis prodit: nascitur & quibusdam similibus Vngariæ locis: eo tempore radices firmiores & magis succulentæ cum novellis fois folijs in Viennensi foro venales reperiuntur: coquuntur enim, & cum oleo, aceto, & sale primis mensis istis vulgo inferuntur, quàm salubri cibo, nescio.

Floris

Floret Aprilē & Maio, Iunio semen plenam maturitatem adipiscitur.

Quo nomine istam plantam donarem, diu ambiguus fui: accuratius tandem notis ejus perpenlis, succurrit, magis proprium (meā quidem opinione) nomen dari non posse, quam Cicutaræ: quia frequens ejus usus non sine noxa est, & capitis gravēdinem doloreꝝque, ut expertus sum, inducit.

Vulgus Austriacum *Peperlin* appellat: Vngari, *Mogiaro salata*: nam & illi ejus radice & teneris folijs in acetarijs vescuntur.

Peperlin.
Mogiaro sa-
lata.

CAUCALIS MAIOR.

CAP. XXIIII.

Caucalis albo flore.



CAUCALIS hæc omnium maxima, multos à radice producit stiones, rectos, bicubitales, & tricubitales, interdum etiam quatuor cubitorum altitudinē attingentes, striatos, intus cavos, geniculis interceptos, & in plures ramos divisos: sub quibus latā sede adnascuntur magna alataque folia, in ambitu ineisa & serrata, instar foliorum Angelicæ, ex atro virentia; summis ramis innascuntur umbellæ candicantium florum, subtus nonnihil purpureæ, & ad carneum colorem accedentium: quibus succedunt lata semina, ferè ut in Sphondilio vulgari, subhiisfuta, & summo mucrone bifida, aculeatāq; instar spinarum: radicem habet albam, duram, lignosam raris fibris præditam.

Caucalis
major.

Qui illam ad me mittebat Iacobus Plateau, scribebat mense Septembri esse serendam: nam illico emergere, viridēque deinde permanere tota hieme, quā per commodē ferre potest: subsequens anni Iunio flores producere, deinde maturum semen, sub exitum Iulij & Augusto tandem perfectō & ad maturitatem perducto semine totam perire. Dubitabat autem, an, propter semen gemellum, Tordilij genus aliquod potius referret.

PROXIMVS autem ad Dioscoridis Caulalidem accedere mihi visū, quæ à Claris. Donzō exhibetur, in arvorum marginibus atque inter segetes vinctaque nascentis, cauliculo pedali, aut majore interdum, folio apij ferè, umbellam ferens florum candidorum, quorum ex tetra folia majora sunt reliquis, deinde semen geminum, hispidum. Similem sed majoribus alatisque folijs, atque ad Pimpinellæ Germanicæ folia magis accedētib; agro Francosurensi abundanter nascentem observabam, florem variantem, qui major erat, & æqualis magnitudinis folia obtinebat, saturè rubente colore.

Caucalis
Disti.

Caucalis fer-
rari ruscus
flore.

A prima harum vulgarium Caulalidum, non valde differt ea quæ semine ex Hispanijs allato

Caucalis
Hispanica.

Caucularis umbello flore.

Anisum vulgare.



Anisi Philippinarum insul. umbella.

Anisi
vulgare
insul.Anisi
vulgare.Anisi
vulgare.

allato nata mihi est aliquādo, eūm apud Belgarūm Vēnæ Auftrix: cauliculos enim habebat striatos & asperos, umbellas verò cādidorum flosculorum minores, & quasi in orbiculare caput coactas: semen etiam crassiusculum, valde striatū, non hispidum. Annua etiā est plāta: nā maturo semine perire solet.

CAVEALIS porro à Græcis καυκαλις dicitur, à nonnullis δαυκος ἀνεως, id est, Daucus silvestris.

EADEM facilitate pollet, quā Daucus, strenuè enim movet urinas.

ANISVM PHILIPPINARVM insularum.

CAP. XXV.

VULGARIS Anisi iconè huic capiti præfigo, non quod ejus historiam post rot alios qui de Planis scripserūt, tradere libeat: sed duxerāt ad demonstrandum, quanta sit inter illud atque aliud genus, ejus mentionem facere instituo, differentia.

PLVRIMUM enim differt à vulgari Aniso, quod è Philippinis Insulis (quæ ducētorum ferè milliarium intervallo à Sinarum regione distant) allatū ante paucos annos à Nauclero Anglo, cui nomē Thomas Candi, eūm è suā navigatione, quā rorū orbem circuevit, rediisset. De hujus autem radice, caule, folijs vel etiam floribus quidquam pronunciare nequeo, quandoquidem nihil horum mihi cōspectum: sed è seminibus & umbellarum particulis, quas Londino accipiebam, paulo post Candi reditum, ab optimis & honestis

neſtis viris Hugone Morgano Regio pharmacopæo, & Iacobo Gareto aromatario, qualemque ſed mutilam ejus hiftoriam concinnare ſtudebo.

Erant porro ex umbellæ ſatis latæ, Archangelicæ umbellis non minores, ſed ut conſpicere licebat, etiam laxiores, aliquot pediculis ſatis craſſis & firmis in orbẽ ex ſummo ramorum faſtigio naſcentibus conſtantes, quorum ſinguli, non geminum ſemen, quale Aniſi vulgaris, ſuſtinebant, ſed plura in orbem unciam latum intetdum, ſerie quadam diſpoſita, videlicet ſena, octona, aut plura, fuiſci coloris, ruſoſa, in binas æquales partes compaſſa, quæ ſuperâ parte diſiſa, ut pluriſimum inania teperiuntur, aliquot tamen plena deprehenduntur, & ſemen unicuique continet, læve, ſplendens, cineracei coloris otobi pæne magnitudine: ſaporidem qui in vulgaris Aniſi ſemine, atque etiam odor: quam ob cauſam, ab his qui mitterebant, Aniſum appellatum: proprium tamen quod natali loco obtinet, eſt *Damon* (addiderat enim Garetus appellationem, unius ex Inſulatibus, quem Candi advexerat manu exararam Sinanis charactetibus) quos imitari nequivi, ſed erant ducti perpendiculariter à ſummâ parte ad inſimam, vulgato in illis Provincijs ſcribendi more, hoc modo, D

*Aniſum Philoſophicarum
hæc Nova
orbis.*

Damon

CHELIDONIUM MAJUS.

CAP. XXVI.

Chelidonium majus vulgare.

Chelidonium majus laciniato flore.



DVo Veteres agnoverunt Chelidonei genera valde inter ſe diſſimilia, majus & minus. De neutro iſtorum, eũdem cuiſlibet ſint ſatis cognita, hoc capite agere conſtituimus: ſed de majoris quo ſam genere, cujus noticiam ante paucos annos adquiſivi Franeofurti ad Moenum vivens, miſſâ id me plantâ à Philippo Stephardo Sprengero Palatinali pharmacopæo, in cujus horro ſponte nata erat Heidelbergæ.

A vulgati autem Chelidonio majore non differt hæc planta, vel formâ, vel magnitudine: ſola varietas deprehenditur in folijs, quæ longe tenuius inciſa & tenella ſunt, & floribus, qui ejuſdem quidem ſunt cum vulgari coloris, ſavi videlicet, & quatuor ut plurimum folijs conſtant, illis tamen non, ut in vulgari, integris, ſed per oras laciniatis. his ſuccedunt longi, quemadmodum in vulgati, cornicula, tenui membranâ diſiſa, exiguo, nigro ſemine plena. Totâ ætate floret, & ſubinde ſemẽ profert, ſemine ſponte deciduo ante brumam renaſcens & genus ſuum conſervantiam ſingulis annis producho ſemine perire arbitror.

*Chelidonium
majus.*

*Chelidonium
majus laciniato flore.*

VULGARIS

Nomen.

VULGARE majus Græcis dicitur, *χελιδόνιον μέγαν*: Latinis Chelidonium majus: Officinis Chelidonia: Gallis *Chelidoine* & *Esclaire* à facultate: Germanis *Echtheim* & *Echtheimwurzt*: Inferioribus Germanis, *Seemo*, *ist ende groote Seemo*.

Illud verò alterum majoris genus: commodè nominari posset Chelidonium majus multifido folio.

Facultates.

DE vulgati autem Chelidonio majore hoc experiebar, illius succum in levia quæcumque vulnera recentia instillatum, mirificè confert.

AQUILINA.

Aquilina pleno flore.



CAP. XXVII.

Aquilina pleno inverso flore.



*Aquilina
majus
pleno flore.*

ISTIVS plantæ non meminisse, nimis enitit vulgaris est notitiæ, nec ullum inveniri hortum arbitror, in quo, ob floris elegantiam, non alatus: nam præter illam quæ simplici est flore, quamque in multis montanis silvis cæruleo flore sponte nascentem legere meminimus, repentur pleno & multis corniculis invicem insertis constante flore, qui vel cæruleus est prorsus, vel violaceus, vel cineraceus, vel blandè rubens, vel saturè ruber, vel albus, vel ex albo & cæruleo, violaceo vel multifariam commixtos, vel alterius coloris, quis enim omnes enumeret: interdum etiam (ut natura ludit) corniculis inversis constant, hoc est, corniculorum comortis mucronibus omnibus ex floris centro prodeuntibus.

*Aquilina
pleno
inverso flore.*

VERVM aliud elegans genus, paucis abhinc annis semine natum observabam, cujus flores colorem quidem instar vulgaris mutant (nam albi, carnei sive blandi rubentis, cæruleique coloris repetiuntur) sed aliam formam habent: carent enim corniculis illis litui instar inflexis, & plana dumtaxat habent folia, qualia sunt ea, quæ in simplici cornicula ab invicem segregant: constant verò flores vel simplici octo aut decem foliorum ordine dispositorum serie, vel ea multiplicata ad senarium aut septenarium numerum, hoc est, ut singulis illis octo aut decem foliorum ordinibus, sena vel septena alia incumbant, interdum etiam plura, elegantis spectaculo, non alternatim cõfusa ut in Rosâ plenâ, paucis staminibus cum corniculis, quemadmodum in vulgatiore, floris mediâ occupantibus, & simili nigro splendente semine plenis. In eadem planta conspiciere licet nonnunquam flores, quorum prima & secunda foliorum series calcari seu corniculo illo consorto caret, interiora reliqua instar vulgaris cornicula inflexa habent. Sed etiam hoc genus mirum in modum colorem variat: nam ejus quæ cæruleo flore est semine deciduo sponte natas plantas habui, quæ cæruleum, album, rubellum, suave rubentem, cineraceum, purpureû remissum vel saturum, pullumque,

Aquilina pleno roseo flore.

Aquilina degener.



pullumque, & quodam modo obsoletum florem tulerint, eumque vel simplici foliorum serie vel multiplici constantem.

Hanc plantam, alioqui vulgata forma respondentem, primum conspiciebam anno nonagesimo quarto supra quingentesimum & millesimum, Maio mense suos flores explicantem, apud Iohannem ab Hogelande, Lugduni Batavorum.

Degener quidem appellari posset hæc Aquilina, quia floris illius forma vulgari dissimilis, malim tamen Aquilinam roseo flore cognominare, licet multiplicata folia alio ordine quam in roseo pleno flore sint disposita. Sed alia est quæ Aquilina degener rectè vocari possit. Eam ante viginti sex & plures annos conspiciere memini exigua rose formam æmulantes flores ferentem, coloris vel omnino viridis, vel ex viridi purpurascens, mutatâ videlicet pristina formâ, sive potius vitio contracto, ex stirpem intempestivâ ex uno loco in alium translatione.

Quo nomine porro Veteribus dicta sit Aquilina, sive Aquilegia, quotquot hætenus de stirpibus commentati sunt, ignorasse video, præter N. V. Fabium Columnam, in eo libro qui *De orthographia* inscribitur. Is enim exactè perperis & examinatis ejus Aquilinæ quæ simplici flore est, notis, *terrores*, lopyrum Dioscoridis esse censet, cujus iudiciû de Aquilinâ, quemadmodum & de multis alijs stirpibus, de quibus in eo libro agit, mihi valde probatur.

Ceterum quæ de Aquilinæ facultatibus ante triginta annos accipiebam à Doctissimo viro Francisco Rapardo, urbis Brugensis in Flandriâ primario Medico (tamen ut medicinam facerem, nunquam in animum induxissem meum) libet hic scribere: nimirum Aquilinæ vulgaris semen tenuissimè contusum, & ex vino propinatum, mulieribus in partus difficultate cum optimo successe exhiberi: si prior tamen haustus minus fuerit efficax, alium similem propinandum esse.

Aquilina degener.

Fabij Columnæ. terrores.

Facultatem.

DELPHINIUM seu Consolida regalis.

CAP. XXVIII.

Hanc stirpem desciperunt plerique, & iconem etiam præposuerunt. Nec ejus meminisse, ne actum agere videar, nisi post evulgatos aliorum labores, quasdam non penitendas circa illam notas observassem.

Duo autem (ut omnibus notum) sunt Delphinij à pletisque vocati, seu Consolide regalis, ut vulgo appellatur, genera. Vulgare in ramos latè sparsum, passim inter segetes spontè nascens cærulei coloris elegatis flore. Alterum majus, in altè se attollens, & multis quidem alij præditum, sed illis etiam surrectis, in hortis cultum: de quo primum agemus.

Delphinij duo genera.

SS

ELATIVS

Melanthium Damascen. pleno flore.

*Melanthium
fumi: seu flore
Cretanum.*



Capnos tenuifolia.

*Melanthium
arvense.*

*Capni
genera.*



*Capnos
arvense.*

Natalis

Invenitur plerisque Hispaniæ regionibus

rem occupant pentagona, interdum etiam hexagona & heptagona capita laxa, in rotidem controrta cornicula delincentia, & semina nigra, rugulosa, inodora continentia.

Florat utrumque genus Iunio & Iulio: semen maturum est Augusto.

Illud ante multos annos in hortis cultum observabam: hoc verò densum anno M.D.XC.I. quibusdam in hortis Fracofortanis, unde semine à me misso amicis, illorum hortos ornare coepit.

Hic adijciendum putavi aliud Melanthij genus Cretico semine natum: cujus prima folia, Delphinij vulgò vocati folijs non multum ab similia sunt, angustiora tamen: caulis deinde brevis emergens, paulò supra radicis caput, in plures ramos dividitur, tenues & teretes, bipedales vel amphioris longitudinis, valde infirmos, & vix sustinere se valentes, quibus innascuntur rata folia, ut plurimum, divisum, è viridi candicante initio, ut Nigellæ vulgaris, deinde exalbida, postremò cærulei nōnihil contrahentia, mucronibus interm (suam viriditatem retinentibus): è floris medio exit caput in quinque, sex, septem, delinens cornua, ut in vulgari Nigellâ, & in ambitu frequentia flumina viridia quorum apices cærulei: infra stamina porò, super ipsius folijs expansa recumbunt octo alia foliola bifida, parè distantia ab invicem sejuncta, quorum petiolus cum suâ basi cæruleus est, binè transverse venæ fuscæ, quod inter venas mediû est è viridi flavescit: radix etiam flavescit instar radicis nigellarum, nec vivax est, sed hieme perit.

Illi non valde dissimilis, si non eadè invenitur in arvis post demessas segetes totâ Pannoniâ, Austriâ, reliquâque Germaniâ & Belgio.

CAPNOS, FUMVS TERRÆ. CAP. XXX.

DVo, præter vulgarem, alteram Belgicam albo flore, viticulis seu capteolis sepius vicinis se implicantem, & tertiam *Splu* Italici dictâ, alia Fumi terræ genera observare memini. Quorum primum quidem, inter Stirpes à me per Hispaniam observatas descriptum fuit: Alterum, Cretico semine mihi postea natum. Vtriusque verò historiam hoc capite trademus.

DOORANTALIS herbula est, Primum illud genus à me inter Hispanicas stirpes descriptum, cauliculis molibus & quodam modo transparentibus, ut in vulgari Fumariâ, firmioribus ramen & surrectis, non procumbentibus, quibus inhærent folia mollicella, capillacea, & tenuissimè incisa, vulgaris folijs candidiora: summos cauliculos exornant majusculæ purpurascētium florum vulgaris floribus minorum & c. ostentum nascentiû spicæ: radicem habet exilè. Tota verò planta amara est.

tas: non-

tas: nonnullis etiam Narbonensis Galliz locis observate memini, præsertim supra Arelatem, dum Massiliâ, per eam urbem, anno M. D. LII. Mompelium redirem.

Hanc quidem in Hispaniâ Sidericin tertiam facere volebant, nescio quibus indicijs ducti: vulgo à nonnullis *Palomilla*, & *Palomina* dicitur, nomine cum Fumariâ vulgari cõmuni.

Palomilla.
Palomina.
Caynes Cr-
ma.

MAIVS est illud genus quod semine Crera allato natum, nec minus succulentos habet cauliculos vulgari, angulos, teneros, procumbentes: folia minutim incisâ & capillacea, ut Hispanica, sed duriora: flores conferum in oblongiusculâ spicâ nascuntur extremis ramis, vulgaris floribus candidiores, deorsum spectantes, extremam vitescentem partem occupante fuscâ maculâ: illis succedit semen quale in vulgari, quod maturum facile decedit: radix tenuis, flavescens. Annua est ut vulgaris, & luio luloque florere, atque subinde semen proferre, quod sponte cadens, novellas plantas producit in sequentem annum.

SCROFULARIA.

CAP. XXXI.

Ruta Canina.

Scrofularia Cretica 1.



PRÆTER duo genera omnibus fatis nota Plantæ illius quæ vulgo Scrofularia appellatur: cujus Vnum tuberculis quibusdam radicem habet oblitam: Alterum nullis grumis ad radicem adnatis præditum est. Bina alia observabam semine nata, quorum historia hoc capite tradetur.

Scrofularia,
five Ruta
Canina.

PRIMO autem generi prodeunt initio folia humi expansa, Scabiosæ primis folijs non valde dissimilia: deinde sesquicubitalis assurgit caulis, quadrangulus, cavus, viridis, angulis purpurascens, interdum etiam totâ eâ parte quæ à Sole illustrata est, purpureus: cujus infimam partem ambiunt longè ampliora folia in multas lacinias divisa, ex adverso nascuntur, deinde reliquum caulem alia, quæ alata sunt & Filicis aut Alektorolophi foliorum instar ferè, multis lacinijs prædita, quæ rursus in alias longè minores & in ambitu ferratas secantur: à medio caule ad summum ex alarum sinu nascuntur rami quadranguli, minoribus folijs præditi, & illi similiter in alios ramulos divisi, sustinentes flosculos instar utriculorum, cavos, Scrofulariæ vulgaris floribus non ab similes, ex flavo virescèntes, sex folijs constantes, quorum bina infima valde sunt exigua, & infernè aliquantulum reflexa, quæ in lateribus sunt paulò quidem altius attolluntur & supremâ parte aliquantulum purpurascunt, sed bina superna majora sunt reliquis & quodammodo reflexa, purpureique ex atrò coloris, paucis & brevibus flavis staminibus ex umbilico prodeuntibus: radix pollicaris penè crassitudinis est, in multas crassas fibras divisa, albicantis coloris: an sit verò perennis, nihil

Scrofularia
Cretica 1.

Scrofularia
1. generis
form.

Scrofularia
Cretica 11.

affirmare possum, quandoquidem sub aëre Francofurti discessum, primum observabam in Ioannis Mulleri orto, nam femine Cretæ accepto, Rutæ silvestris appellatione.

HVIC non valde dissimilem, cum Lugdunum Batavorum pervenissem, ad me adferebat eruditus vir Theodoricus Cluvius Delphensis tum phatmacopola, quam subsequens hiems abstulit.

SEDE & aliud Scrofulariz genus Cretico femine natum sequente anno conspiciebam, aliquot stolones à radice proferens cubitales & amphiores, quadrangulares, ex atro purpurascetes, quibus folia inæquali & inordinato situ innascebantur longiusculo pediculo appendis, urticæ folijs non dissimilia, sed lævia, non mordacia, sanique mollia, supernè saturè viriditate nitentia, infernè nequaquam, ex quorum alis breves emergebant ramuli, quadranguli, in similes alios sed longe minores divisi, sustinentes parvos calices in quinque lacinias sectos, & in his flosculos coloris ex atro purpurei, quatuor lacinijs constantes, supernè bifida & sursum tectæ, infernè ut labellum propendente, duabus alijs latera claudentibus: ijs succedebant vascula sive globuli duobus sulcis tanquam divisi, extrema parte aliquantulum mucronati, in quibus semen vulgari simile. Tota planta vulgarem illam refert, cujus radix nullis grumis prædita est: sed odorem magis foetidum spirare videtur.

ALECTOROLOPHOS ALPINA.

CAP. XXXII.

Alectorolophos
1. generis
forma.

HANC plantam Scrofulariz volumus subungere, propter foliorum quandam cum illius primæ speciei similitudinem. Ejus autem plura genera in Austriacarum & Striacarum Alpium jugis montanisque pratis inveniuntur.

Alectorolophos alpina.

Alectorolophos
alpina
1.



Alectorolophos
11.

Alectorolophos
111.

Alectorolophos
111. generis
forma.

VNUM enim plures ab unâ radice promitt cubitales caules, minimi ferè digiti interdum crassitudine læves, per quos sparsæ foliorum, Filipendulæ vulgaris folijs non valde dissimiles alæ: flores innascentur summis caulibus copiosi, oblongæ spicæ instar, quemadmodum in Orchidibus confertim nascentes, & illarum flosculis persimiles, & caliculis pentagonis inter minutiora folia prodeuntes, exalbido colore: ijs succedunt mucronata capitula, maturitate dehiscencia, semènque ostendètia exiguum inæquale, cineracei coloris: radix crassiuscula est, perennis, ut ex præcedentis anni restantibus caulibus siccat tamen, conjecturam faciebam, in crassas fibras Asphodelinis bulbis penè similes divisa.

INVENTITA & aliud genus per omnia illi ferè simile, sed longe mollius, cujus flores modò pallidi, modò purpurei sunt: radix etiam crassa, & fibras Asparagi radicibus similes agens.

Vtrumque genus in summis Alpibus Durrenstein, Etlicher, alijsque celsis & herbosis jugis nascitur: posterius etiam in inferioribus, uliginosisque pratis. Memini & in Flandriz pratis humidioribus, atque etiam pratis Gentilly pago vicinis, non procul Lutetiâ Parisiorum observare.

TERTIUM in iisdem etiam jugis quibus Primum, crescit: sed lógè humilius, ut quod palmarem altitudinem non superet: illius cauliculi graciles, & raris minoribusque folijs obditi sunt: florum spica brevior, & eleganti rubro purpurascente colore nitens: caliculi flores continentes, lacinia, & veluti è foliolis contexti: quæ floribus succedunt capitula, majora quàm in superioribus, & veluti rostrata, angulosum & inæquale semen etiam continentia: radix minimi digiti crassitudinem interdum æquat, fibrisque candicantibus & satis crassis donata est.

Ad illius genus referri potest renenior alia planta cauliculis angulosis, & lanugine, non secus quàm folia (quæ minora sunt) caliculique (qui breviores & minores) pubescentibus: flores

Alectorolophi 111. genus alterum.

Filipendula vulgaris.



flores simili purpurâ ferè nitent, sed minores & humiliore galea prædicti sunt capitula vix è caliculis emergunt. & radix non adeò fibrosa est.

Eam in graminis locis, ficcioribusque pratis superioris & inferioris Germaniæ, sæpius *Natalis.* observare memini Maio florentem, cum Iulio in Alpibus floreat: Sed & anno M. D. LXXXI. *Variorum.* Aprili florentem, atque vel purpureo, vel blandè rubente, vel albo flore variantem colligebam, ad Groutz prædium C. V. Richardi Garth, supra Londinum.

Vt & hæc à nonnullis Fistularia, à caulis, ut opinor, cavitate vocatur: quidam etiam *Nomina.* Pedicularem appellant, præsertim aliquot Germaniæ locis, in quibus vulgare nomine *Stamm Laufftraus* dicitur, quod credatur, oves quæ pascuntur ubi abundè provenit, pediculari morbo corripit: dicitur etiam illis *Nodel* vbi *Stamm Nodel*. Priorem describere videntur Pena & Lobelius, in Adversarijs Filipendulæ alterius montanæ nomine. Forsitan & illa erit, cuius *Filipendula* *altera.* Iosias Simlerus ad calcem Commentarij de Alpibus meminit his verbis:

Herba folijs Aspleno perisimilis, cauliculis ab una radice quinque vel sex, duos ferè palmos longis, & spicam florum sustinentibus, ut orchis ferè.

Haud dubiè Alectorolophi genus ea est planta (licet folia ejus dissimilia) quæ in omnibus ferè ficcioribus pratis nimis luxuriat, totaque æstate flores producit pallidos, cui *Crispæ galli-* *næcæ.* *Mimulus* *Plinij.* sifz gallinacæ etiam nomen indiderunt Recentiores, inferiores Germani *Santamminio.* Sunt qui Mimulum Plinij esse censent.

FILIPENDULA porrò vulgaris frequentissima est cum in multis Provincijs, tum in *Filipendula* *vulg.* Vngariæ & Austriæ, vicinarumque regionum graminis præsertim campis, & cæduarum silvarum marginibus.

Inveniuntur etiam iisdem Provincijs, varia Oenantes genera, ficcioribus graminis locis, atque udis pratis nascentia. *Oenantes* *genera.*

FILIX PYMILA SAXATILIS.

CAP. XXXIIL

FOLIORVM quædam similitudo & divisura facit, ut elegans hoc Filicis genus, Alectorolopho Alpino præcedente cap. descripto, subjungam: id autem in marem & feminam distinguemus, Theophrasti sententiam lib. ix. cap. xx. Hist. Plant. sequentes.

MAS

*Filix pumila saxatilis 1.**Filix pumila saxatilis 11.**Lonchitis altera Maranthæ.**Filix pumila
mar.**Filix pumila
fem.**Katalin.**Lonchitis al.
tera Maran-
thæ.*

Mas igitur radice serpente nigra, tenui, longa, in obliquum sese spargente, raris fibris tenuibus & duris capillata, valde adstringentis saporis: ex qua prodeunt multi pedales cauliculi, divisi in quosdam alatorum foliorum ramos, sive frondes. Filicis maris majoris (Feminae vulgo Herbariorum creditæ) instar, multo ramen minorum, tenuiusque incisum, & valde tenellum, pronâ parte multis, ut plurimum, nigris maculis, quemadmodum Filicis feminae folia, distinctiorum.

FEMINA quinos aut senos habet cauliculos rectos, inirio virides, deinde temporis succesu omnino nigricantes, palmares, à medio unicam foliorum insectorum alam, unico ad fastigium usque, artu porrectam sustinentes, eadem qua in mare vulgari formâ & facie, multo verò minorum tenuiorumque, sapore nonnihil adstringente, pronâ etiam parte multis nigris maculis (quæ verustate efflorescere videntur) aspersum: radix veluti in caput coacta, sicut in mare vulgari, & multis nigris durisque fibris capillata est.

Prior copiosissimè nascitur in saxis, nõ modò ad Gaminum & Neuberg: sed ad omnium ferè montium radices Austriæ & Stiria. Altera verò in præruptis montibus, inter ipsa saxa invenitur, verum non adeò frequens.

FILICULA porro elegans illud genus quod à C. V. Bartholomæo Marantha, Lonchitis al.

Lonchitis altera Neotenicorum.

Phyllitis vulgaris.



Phyllitis laciniato folio.



chitis altera nūcupatur, abundē admodum tra-
scitur in Striacarū Alpium jugis. Sed quæ vul-
go Lonchitis aliterius nomen obtinuit, valde ra-
ra in illis jugis invenitur, licet per univērsam
Germaniā sit frequentissima.

Lonchitis al-
tera Neoten-
icorum.

PHYLLITIS. CAP. XXXIIII.

N VLLA Provincia mihi est peragrata, præ-
sertim quæ mōstosa sit, in quā Phyllitidem,
vulgo Lingua cervina nūcupatam, non obser-
vavi, vel umbrosis locis nascentem, vel in ipsis
puteis, inter lapidum sive laterum commissu-
ras: cuius mentionem non fecissem, neque ejus
iconem proposuissem, nisi de altero eleganti
eius genere mihi faciendus fuisset sermo.

Phyllitis vul-
garis.

SOLA autem foliotum formā, à vulgari Phyl-
litide differi illa nō vulgaris, alioqui reliquis no-
tis ei per similis: prodeunt verō ipsi ex radice
multis nigris fibris & veluti capillamentis præ-
dita, sēna aut septena folia palmaris longitudi-
nis, ejusdem cum vulgaris folijs lævioris & vin-
ditatis internā parte: at externā, nullis aut rari-
ssimis transversis lineis insignita, extimā verō
parte multipliciter dissecta.

Phyllitis la-
ciniato folio.

Hanc in Cantabris, supra montem D. Adria-
no nūcupatam, quā per ejus specum, & for-
nicem transitus est in Hispaniam, locis umbrosis in ipsis rupibus observabant, raram tamen
inter pleraque alias vulgares: atque ipsius folia, alia alijs per extremum vel pluribus lacinijs
vel paucioribus erat divisa.

ejus Natalis.

Memini & olim plantam unam ē Gebennis montibus erutam, Mompelij in C. V. Gu-
lielmi Rondeletij Medici celeberrimi hortum, huic prænē similem, translatuisse.

Sed & alijs
locis hys.
vatis.

Sed &

Sed & quæ ad nos missa fuit ex Angliâ à Doctissimo Lobelio Hemionitidis nomine, posteaquam biennio, ob teneritatem, in silioli adseruata fuisset, tandem in Phyllitidem folijs laciniatis euaſit: verum non adeo multipliciter dissectam ut hæc est, cuius nos picturam damus, sed tribus duntaxat aut quatuor lacinijs folia in extremo diuisa ferentem: quam quidem metamorphosin, satis mirari non potui. Etenim plantulæ quas ad nos mittebat, totæ tenellæ & mollicellæ erant, & plurimum ad Hemionitidis figuram accedebant.

Anno autem 1611. supra Milleſimum & quingentesimum, cum Bristolij essem, duxit me ad specum illum Diui Vincentij, unde cruerat, idem Lobelius, è quâ aliquor plantulas meis manibus elyellabam, illis quas miserat, similes, hoc est totas tenellas & molles: quibus parës aliquor deinde conspiciebam ex Angliâ in Galliam rediens, puto quodam non procul Bononiâ, dum mihi expectandus est equus veredarius, qui ad proximam equorum mutandorum stationem me veheret: deinde etiam Machliniæ in Brabantia puto illud diverſorij, cui symbolum Galea aurea, frumentatio foro, ut testis mihi tum fuit Illustris vir Ioannes de Brancion, cui eas demonstrabam.

Facilius.

VERVM Phyllitidis folia in vino pota, serpentium morſibus auxiliantur, teste Dioscoride, quadrupedibus verò per os infusa, auxilio sunt, & in dysenteria aut reſolutâ aluo uolenter potui dantur.

HEMIONITIS PEREGRINA.

Hemionitis vera.



CAP. XXXV.

Hemionitis peregrina.



MERITO conjungendam superiori plantæ æstimavi hanc elegantem Hemionitidem quam Romæ ex veteris cuiusdam Theatri ruinis erutam doctissimus idemque summo animi candore præditus Medicus Ioannes Henricus Gandavensis, mihi amicissimus, ex Italiâ redux anno M. D. LXVI. donec dabat, quam diu cum Phyllitide laciniato folio, & plerisque alijs stirpibus, quas in meis peregrinationibus collegeram, ante annum M. D. LXXII. quo Viennam ad Cæsarem Maximilianum hujus nominis II. vocatus sum, repositam habui: sed Belgium relinquens istæ deserui.

Hemionitis peregrina.

HVIUS folia quaternorum digitorum transversorum, vel circiter trium unciarum longitudinem non excedebant, ferrei venabuli mucronis formam explicantia, in fenore base, quâ suo petiolo sustinebantur, duplicem apophysin habentia, & extimâ parte mucronata: parte internâ lævia, & dilutâ viriditate prædita, externâ verò lineis seu versibus obliquis ex utraque nervi parte insignita, quemadmodum Phyllitidis folia, gustu acerbo & exsiccante perinde atque Phyllitis: radices illi nigrae, fibrosæ, quales in legitima Hemionitide conspiciebam Româ usque missâ Illustri Joanni de Brancion à Clarissimo eodemque doctissimo viro Hippolito Salviano Romano Medico, quàmque in silioli adhuc alebat, cum Belgicâ discederem.

Hemionitis vera.

GRÆCIS πορρο ἡμισπένδιον, σπληνιον dicitur, Latinis, eorum nomenclaturam sequentibus, Hemionitis & Splenium: Officinis ignota.

Facilius.

Hemionitis autem ex aceto pota, lienem absumere creditur.


TYPHA

Typha palustris media.

Panicum vulgare.



Panicum Americanum.



TYPHA MEDIA. CAP. XXXVI.

PECULIARE quoddam genus Typhæ veluti medium observabam anno M. D. LXXXI. copiosè nascens palustris quadam fossâ apud Tyburn facellum, nò procul ab eo loco, in quo sepeliuntur, quibus ob maleficia laqueo gula fracta est, primo ab urbe Londinensi miliari, quâ spectat Occidentem.

ERAT verò Typha illa folijs multò angustioribus quàm Typhæ vulgaris folia, & graciliore clavâ, majore tamen quàm minima illa à D. Pennæ inter siccas stirpes quas inter chartaceas paginas adservabar, mihi ostensa, & à Penâ Lobeliôq; in doctissimis Adversarijs expressâ. Alioqui à majore non differt pullo illo tomento in clavam compacto, & florum oblongâ spicâ, tenui flavo polline respersâ, supra clavam enascente. Flotebat Junio.

PANICVM. CAP. XXXVII.

MAGNI per universam Germaniam, Vngariam, & Bohemiam

Panicum vulgare.

Panici usus est: etenim in alimentum cedit, & pulvis ex ejus semine deglutato fuit non ingrati saporis. De illo (tametsi iconem inferam) nihil commemoro, quia jam à multis inter fruges est descriptum: sed de alio genere ex Peruana Provinciâ ante trigessimum annum in Europam primum illato.


HABET autem id culmos longè crassiores, firmiores, altiorem vulgari Panico, & planè harundinaceos, ut quos humanam altitudinem attingere, interdù etiam superare plerumque viderim, crebris geniculis & veluti articulis præditos & lanugine obritos: folia harundinacea

Panicum Americanum.

dinacta è singulis articulis prodeunt, longa, lata, dura, Melicæ folijs non valde dissimilia: inter quæ prodeunt è geniculis alij veluti breviores culmi, similibus folijs obfiti, definenres in spicam digitalis longitudinis, nonnunquam breviorē, & duntaxat pollicarē, densè compactam, & æqualis propemodum ubique crassitudinis: semina oblongiusculis gracilibusq; petiolis innixa profereantem & capillaceis veluti glumis inclufa, quæ extimâ parte è glumis prominere, crassiora, magis rotunda, & quasi orbiculata sunt, lævia, subcærulei coloris, qui in calidioribus regionibus magis satur est, rarè tamen vel in Germaniâ, vel in Belgicâ (in illis enim Provinciis sæpe terræ mandavi ejus semina ex Hispanijs accepta) ad plenam maturitatem perveniunt: radices ejus fibrosæ sunt, validiores & majores, quàm in vulgari Panico.

Panici Americ. sesquipedalis spica.

Lachryma lob.

Panici Americ.
panici spica
granda.

Istius porro generis spicam crassam, valde firmam & benè compactam, non ubique tamen æqualem, sed paulatim & sensim extimâ parte gracilescentem, sesquipede longiorem, nec tamen integram ad me mittebat Londino Iacobus Gareus anno M. D. XCII. à Nauclo-ro quodam Anglo ex sua navigatione reduce emptam, cujus semina, nò multò majora mihi visa, quàm illius Panici Americani, cujus modò meminì, ceteroqui prorsus similia: nisi, plura simul juncta & hispida glumâ inclufa brevi pediculo inniterentur: illius stirpem nascentem videre non licuit, nam ferere neglexi, quia vetustate nimis resiccarum existima-bam, spicam tamen in lignèâ tabellâ Francofurti exprimendam curabam à perito artifice, ut hoc loco infererem, digna enim mihi videbatur, cujus aspectu alij etiam fruerentur. Proximè autem sequente anno scribebat ad me N. V. Carolus de Tassis Veredariorum Antuerpiæ Præfectus, ipsi natus istic plantas semine quod ab eodem Gareto acceperat, non valde dissimiles illis, quæ jam à multis in Belgicis hortis sunt conspectæ: nec dissimiles etiam spicas sive paniculas protulisse.

Lachryma
lob.

Sed & hîc, ac commodiorem quidem loco, nisi me judicium fallit, quàm cùm stirpes per Hispanias observatas describerem, Lachrymæ lobi vulgo vocatz iconem subijcere libuit: tunc enim, licet peculiarem ejus historiam dare decrevissem, quia multis Hispaniæ locis mihi planta observata, & jam multis etiam ante annis, nempe M. D. L. & duobus sequenti-bus Mompehij lecta. Sed cùm illas observationes vulgare, Lobelius & alij quidam ipsam plantam exactissimè descripsissent, supervacaneum videbatur ejus historiam repetere. Quo-niam tamen ipsius iconem iam delineatam & sculptam habebam cum alijs quatuor in eo libro meminì, ante quàm doctissimæ Lobelij lucubraciones, aut ullius alterius qui mentio-nem fe-

nem fecisset, in lucem prodirent, locum dabamus tunc ipsius iconi (quia in ea opella non poteram commodius) inter Graminis genera. Nunc verò cum aliquot harundinacearum stirpium historiam, quā potuimus diligentia, conscripserimus, hoc nostro Observationum sexto libro, ejus iconem ex pite de Panico revocare voluimus.

Ut aurem vulgò ab Herbarijs Lachryma lobi vocatur hæc planta, quia ejus semina lachrymarum ex oculis precedentium formam quodammodo æmulantur, ita Hispani *Lagramas de Moysen*, Narbonenses Galli *Larmes de nostre Dame* appellant.

Lagramas de
Moysen,
Larmes de
N. Dame.

GRAMEN.

CAP. XXXVIII.

VARIA Graminis genera nunc sunt cognita, & subinde alia ab alijs proponuntur & describuntur. Nemo tamen illius Graminis iconem exhibuit, quod in magnâ Europæ parte, præsertim per Hispanias & Gallias, ante quàm Scirpium in Hispanijs observarum historiam divulgarem. Quoniam verò ob illius tum elegantiam, tum usum, cognitu dignum erat, illius descriptionem & iconem tum dabamus: nunc etiam easdem ob causas hic repetimus.

Gramen legitimum.

Iſchæmon Plinij.



PEDALIBVS autem affurgit id Gramen culmis, rotundis, purpurascens, geniculatis: quibus angusta promit folia, in acumen fastigiata, dura: ipsi culmi, sive calami, in quaternas aut quinas desinunt paniculas, mixti ex atro purpureoque coloris: radicibus firmatur longis, nodosis, geniculis interceptis, candidanibus, subdulcis com quadam adstrictione saporis, quæ longè latèque serpentes, subinde plurimis locis germinant, novòque culmos & folia proferunt.

Gramen legitimum.

Hoc gramine nihil vulgatius totâ Hispaniâ & Galliâ, in arvis, vinetis, atque etiam in maritimis, in quibus multo lætiùs & uberiùs crescit: nam ejus radices, interdum digiti crassitudinem æquantes eruere memini.

Natalis.

DICITVR Græcis ἀγροῦν, Latinis Gramen, Gallis *Chien-dent*. Sunt qui Iſchæmonem Plinio lib. xxv. cap. viii. nuncupatum esse putent: quorum sententiam probare non possum. Et multò quidem aptius Iſchæmonis historiz quadrare videtur Mily genus illud silvestre & supinum, in humidis nascens, folijs asperâ lanugine obdus, quod celeberrimus Matthioli Panicum silvestre appellare videtur. Serpit, inquit Plinius, e terrâ Milio similis, folijs asperis & lanuginosis, farietur in nares.

Agroen.
Gramen.
Chien-dent.
Iſchæmon.

Quòd si ad Pliniani graminis ullum aliud genus referenda est hæc planta, aculeatum il-

TT

lud po-

*Gramen,
Dactylus
Rumex.*

lud potius erit, cui, quod in cacumine aculei sunt plurimum quini, Dactyli nomen inditum esse ait Lib. xxiiii. cap. ultimo, & illius aculeos convolutos naribus inferi, extrahi que sanguinis ciendi grana.

Raculum.

R A D I X Graminis, inquit Dioscorides, trita & illita, vulnera conglutinat. Decoctum ejus eporum, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus: calculosa etiam excrementa comminuit.

Gramen amourettes.

Amourettes tremblantes.



*Gramen
Amourettes.*

PERELEGANS etiam Graminis genus inveniti dicebamus nonnullis Hispaniæ locis aridis & sabulosis, quod superiori folijs & culmis non valde dissimile est, sed paniculas habere breviores, crassiores, & numerosiores, ejusdem quodammodo cum superiore coloris, & radicem non nodosam & serpenterem iostat illius: verum fibrosam potius & capillarem. Memini etiam id graminis genus observare & colligere Pansienis agro, non procul à trajectu Sequanæ, qui ferè est ex adverso monasterij vulgo dicti *Les bons homes*, secundum similitudinem frequentissimum, ubi à rusticis non *Chen-dens*, sed *Amourettes* appellatur, ob panicularum, ut opinor, elegantiam.

*Amourettes
tremblantes.*

CETERVM aliud Graminis, seu verius Poæ, genus in omnibus quas unquam lustravi Regionibus, præter (ut ceteræ herbæ) multis locis vestheos, cui similes paniculæ ferè, breviores tamen & ab exortu latiores è summis culmis dependent. Id Galli & Arthesij seu Atrebatibus, mei populares *Amourettes* etiam appellant ob panicularum elegantiam, sed vocem *tremblantes* adjuiciunt, ad Altitius differentiam: quia vel unico vel pluribus ejus scapis manu recentis, omnes ejus paniculæ perpetuo tremulæ sunt.

GRAMEN MONTANVM SPICATVM.

CAP. XXXIX.

*Variagrami-
on generis.*

V A R I A in Austriaciis Satriacisque Alpibus, locisque montanis nasci graminis geneta scripsi in Pannonicarum Scirpium Observationibus: at duorum duntaxat historiam eodem capite dare constituisse.

*Gramen mō-
ntanum spic-
catum.*

PRIMUM autem multis capitibus ex radice digitalis crassitudinis, bifidâ interdum & trifidâ, multisque tenuibus fibris supremâ parte hirsutâ prodeuntibus constare, quorum singula proferrent fœna aut plura oblonga, crassa & nonnihil carinata folia, Cariophyllæz illius, quem vulgo Gramen marinum majus cognominant, folijs valde similia, infusâ sede sese invicem amplectentia, gustu amarissimo & acrisculo: ex horum medio dodrantalem, nonnunquam & pedalem exire cauliculum, firmum, lævem, nudum & enodem, qui summo

Gramen montanum spicatum.

Gramen montanum avenae semine.



summo fastigio, multos flosculos spicae instar congestos, herbaceoque colore praeditos proferret.

Inveniri in montanis quibusdam pratis, duobus, supra Badenses cheramas, miliaribus. Si malem autem in Flandriae mativimis frequenter legere meminisse, quam vulgus, ni memoria labitur, Suden appellaret.

ELEGANS etiam mihi videbatur Alterum genus, quod ante illud tempus nondum fuerat conspectum, eubitalibus culmis constans, tenuibus, geniculatis, qui palmaribus angustisque foliis septi, summo fastigio desinunt in tenue oblongamque & nutantem spicam, in lanuginosis glumis, grana nudae Avenae similima ferentem: radix tenuis est, multisque oblongis fibris praedita, singulis annis antea terpens, uti Spartum & Junci.

Nascitur secundum vias, in montanis umbrosisque silvis Pannoniae, Austriae, & Bohemiae: semen autem Julio mense maturum observabam.

SPARTVM PLINII.

CAP. XL.

IAM Primo libro diximus, Spartum Græceturum fruticem esse, illudque à Plinio Genistam appellari: nunc sumus acturi de alio Sparto, nempe Latinorum, à frutice differente, ut quod duntaxat herba est graminacea folia proferens: eamque ob causam Graminis generibus subjungimus. Ejus autem varia genera observabam.

PRIMUM, quod Plinij est, numerola, tenuia, juncea, viridiâque habet folia cubitalis longitudinis ex eadem radice prodeuntia, quæ, dum novella sunt, latiuscula conspiciuntur, & interiore parte canescentia, successu vero temporis contrahuntur & convolvuntur, suntque juncea, dura, flexibilia tamen, & marginibus ita conjuncta, ut vix rima appareat, nisi diligenter observes. Inter hæc culmi exiliunt ipsi folijs, alio longiores, qui Vitis & Æstivæ parvam arundinaceam paniculam ferunt, simili. Spemodum cum illâ ratione florentem: deinde oblongum semen, ut nonnulla Graminis genera: radicibus nititur fibrosis & perennibus, e quibus multæ simul enascuntur plantæ contiguae, junci modo, ut interdum una planta, sive multarum simul congestarum plantarum cumulus, duorum pedum spatium vel illo etiam amplius in ambitu occupet.

Frequens nascitur collibus à principio Granatensis regni, sive Bæticae limitibus, usque ad Murgim urbem, vul-

Spartum herba, Plinij.

Sparta herba alterum.



*Spartium
campus
Carthago
Spartarius*

*Spartum
Frag.*

*Alperguez,
salera Hispani-
ca genit.*

*Spartum
hæc.*

Martio.

Albardus.

*Spartum
hæc.
Frag.*

Ysa.

latus sit Spartarius campus, quo etiam nova Carthago, vulgo *Cartagena*, uis maritima continetur: hæc etiam à nonnullis Spartaria cognominata est, ob sparti (ut credibile est) eo agro nascentis abundantiam. Nascitur & Valentino regno, atque illud quidem superiore longè uberius & latius.

Est verò Spartum hoc, quod Hispanis apud quos nascitur, etiam nunc *Sparte* dicitur, illud ipsum quod Plinius lib. x. c. 11. describit. Eodem enim in usu nunc est apud Hispanos, quod fuit Plinij tempore. Nam ex crudo & exsiccatò rapies seu aulæa, florias, corbes, rudentes aliisque funes conficiunt: corbes enim illi in quibus ficus & uva passæ advehuntur, ex sparto contexti sunt. Sed ex illo aquâ, instar lini, maceratur, deinde siccat & uulso, calcementi genus, quod ipsi *alperguez* appellant, paratur, funes etiam & alia subtiliora opera. Præfertur autem id quod Valentino regno crescit.

ALIUD Sparti genus nascitur Murciano regno, humidioribus præsertim locis, superiore teneius, cujus valde rarus est usus, ut quod florij aur hujusmodi operibus conficiendis, minime sit idoneum: plurimus autem ejus usus in câ regione, ad lineos saccos, quos leclis subternant, implendos, ut nos stramine uti solemus, quoniam molliore tenuioreq; sit junco, quàm primum: paniculam fert brevem, & pericarpio quodam, sive membranaceo folliculo inclusam, uti Narcissorum & similium ferè flores.

Nascitur eodem, quo superius illud ad multa utile, modo: paulò tamen maturius stotes producit: nam Martio suis floribus onustum legebam.

INCOLÆ *Albardus* vocant, nescio qua moti ratione, nisi quòd fortè illò suas cliellas è crassiore panno cannabino confectas, quas ipsi *albardas* appellant, jumentis imponendas, isto sparto impleant.

SE D transeat nunc ad Oceanum, cui vicinæ aliquot Provinciæ non carè suo sparto, hec non adeò utili ad ea præstanda, ad quæ superiora duo dixi esse idonea, non est tamen ejus usus prorsus inutilis, ut ibi prædicemus.

SPARTVM igitur Tertium, sive Oceanicum Primum, quia nonnullis Galliz, Flandriæ, quæ locis & aggeribus illis sabulosis, quo objectis, invenitur, *Halim* ab incolis, præsertim Flandris vocatum: quod Primi Hispanici valde dissimile est, sed multò majus & tigidius, et rubus eorum, in quibus per eos aggeres, crebris iter est, permolestum: pungunt enim & curim penetrant ejus folia.

Crescit eodem modo quo superiora, magis tamen laetior graminis modo: spicam autem fert Secalis præne instar: ejus usus, ut laris suis cespitiè, valde contortis atque obliquis spargentibus sese radicibus, arenam firmiter reddat & in aggeribus, ne tam facile

Spartum herba 1111. maritima.

Spartum herba 1111. Batavicum.



Spartum Austriacum pennatum.



facile marinis undis & fluctibus eluatur, & facilius resistent tempestatibus, qui in Oceano crebra.

QUARTVM autem ordine, siue Oceanicum Alterum, à Tercio minime differt tota plantæ formâ, radicesque sub arenâ condendi, lateq; spargendi licentiâ: ejus tamen spicæ breviores videntur & Phalacdis potius quàm Secales paniculas imitari. Id Batavis, quibus valde familiare, ipsâdemque usibus servit quibus Oceanicum Primum, etiam *Halm* dicitur.

Spartum herba 1111.

Halm.

IAM superest nobis describendum Quintum spartum, non in locis aurâ marinâ afflatis natum, sed procul à mari, procul ab arenosis illis aggeribus, sponte etiam crescens. Habet verò id folia pedalis longitudinis, gracilia, viridia, numerosa, plana in initio, sed quorum limbi tandem coeunt, junci modo lævia teretiaq; fiunt, Sparti Hispanici foliorum instar, quibus non multum absumilia sunt, sed minora & graciliora: inter ea culmi exeunt graciles, foliorum fastigium non superantes, qui spicam ferunt alijs dissimilem, sed tribus aut quatuor oblongiusculis granis, longa contorta; cauda insignitis, duncaxat constanter, quæ in dodrantalem, imò pedalem interdum veluti penulam, tenuioribus alarum avis illius Mamucodiatæ siue paradisi vulgo nuncupatæ, pennulis ferme respondentem desinit: radix subest multis capillamentis gramineisq; fibris composita, Hispanici sparti radicis instar.

Spartum herba v.

TT 3

Abundè

Rosula.

Abundè hoc genus provenit in monte Badenſibus thetmiſ imminenti, rotæque illa catenâ montium qui inde ad Danubium uſque procurrit, præterea ad ſilvulam Lachn, aliſque apertis & gramineis locis Aſtriæ & Vngariæ: ſed omnium ubertimè in Vivano illo Neapoli Aſtriæ urbi contiguo, in quo uberius lætiusque provenit. Semen maturum lunio, vel à læviſſimo aurtæ ſtat excutitur, atque cum ſua pennula paululum volans, ubi decidit, ſtatim per gramen irrepit, & tertâ ſe condit.

LEGUMINA.

DEScriptis *barundinaceis & gramineis aliquot ſtirpibus, nobis ad Legumina congeneriſque illiſ plantæ procedendum.*

PHASEOLI:

CAP. XLII.

Phaseoli vulgaris varietas.

PHASEOLI vulgo appellati, multa inveniuntur genera, lentis & obſequentibus ſtamentis, foliorumve formâ & reliquo naſcendi modo, non equidem inſet ſe diſcrepantia, ſed quorum flores, licet formâ ſimiles, & Piſi vulgaris florû æmull, colore variant, quippe qui plerumque nivei, interdum pallescentes, nonnunquam etiam purpureſcentes, ſive amethyſtini conſpiciuntur. Ceterum in fructu, ſive ſemine, renum formam quodammodo exprimente, & oblongis ſiliquis, ſive lobis incluſo, longè major coloris varietas deprehenditur. Nam anno M. D. LXXXII. naſcebantur mihi aut priuſ nivei, aut nigri, aut flavi, aut ex flavo obſoleti, aut purpurei, aut amethyſtini, aut cærulei, aut rubri, aut lateritij ſerè coloris, vel albi nigriſ venis & liris diſtincti, atque etiam cinetacei, & carnei coloris, ſimilibus venis inſignes.

Attamen præter jam enumerata genera, aliquot alia, dum Viennæ vixi, obſervabam, ſemine ab amicis communicato mihi nata, nec ante quàm Pannonicas obſervationes ſcriberem mihi conſpecta.

Phaseolus peregrinus 1.

Phaseolus peregrinus 1.*Phaseolus peregrinus 11.*

CAVELIS in Priore, ſtatim à radice in aliquor oblonga ſarmenta dividitur, lenra, vicinos ſtipites & virgulta reliquorum Phaseolorum modo amplectentia: in ſingulis aliſterna folia vulgaris Phaseoli folijs ſimilia, atrota tamen, ex eodem pediculo naſcentia, extremo (ut in vulgaribus) impari: ex iſdem aliſ breves tamuli prodeunt, multis floribus vulgari haud abſimilibus, minoribus ramen, albis, uvæ in modum congeſtis onuſti: quibus ſuccedunt oblonge ſiliquæ, ſeu lobi, vulgaribus multò latiores, continentes ternos aut quaternos fructus, planos, communibus Phaseolis latiores, albos, ſed multis nigris maculis ſive venis, ab hilo in latitudinem ductis elegantiffimè depictos.

VALNE ſerotina fuit hæc planta anno M. D. LXXXVI. ſemine à C. V. Georgio Purkitchero Poſoniienſi in Vngaria Medico primario, mihi pro noſtrâ amicitia communicato nata: quâ de cauſâ ad frugem pervenire non potuit. At ipſi Purkitchero, dū vixit, & poſtea ejus vxoti (nam ad pergulas, aprico loco ſata) ſingulis annis marurum fructum dedit, Mihi deinde anno M. D. LXXXII. & aliquor ſequentibus egregiè provenerunt aliquor ejus ſtirpes, quarum nonnullæ lobos dederunt qui marura ſemina protulerunt: interdum etiam quos ad maturitatem pervenire poſſe exiſtimabam, ob Solis radiorum defectum, ſpem meam fruſtrati ſunt.

TOTA formâ & naſcendi modo à vulgari haud diſſert Alterum genus: valde ramoſa enim habet ſarmenta, quæ vicinis perticis ſeſe advolvunt, eâſque ſcandunt, oblongos pediculos ex foliorum (quæ ſemper terna, ut in vulgari, ſimul naſcuntur) ſinu promentia, in quibus

Phascoli peregrini i. genus alterum.

Phaseolus peregrinus t.



Phaseolus peregrinus t. t.




quibus bini, quaterni, interdum etiam senarii nascuntur flores, ex adverso semper siti, vulgaris Phascoli floribus magnitudine & forma respondententes, initio, dum recens aperti sunt, candidi, postea verò pallescentes: quos excipiunt oblongæ, & propendentes, ut in vulgari, siliquæ seu lobi, quina, septena, & plura interdum candidissima & quali ex ebo- re tornata semina continentes, minora & tumidiora quàm albi vulgares.

Iulio florēt, fructus Augusto nonnūquam Septembri demūm maturus est.

H A B E T & Tertium genus oblonga samenta, ex singulari caule statim secundum radicem ipsam procedentia, & in multos ramos divisa, lenra, obliquè se contorquentia, & humi procumbentia, nisi perticis aut pedamentis sustineantur, quibus sese circumvolvunt, reliquorum Phaseolorum modo: purpureascent ea juxta alas, ad quas etiam adnascuntur terna folia, minus amplā superioris folijs, & dilutione colore virentia, longo petiolo inhxerētia, qui ea parte quā folia sustinet, contrariāque, quā sarmentis inhxeret, ex atro purpureascent: flores in oblongis petiolis plerumque bini, magni, Pisi forma, foris ex candido pallescentes, interiore verò parte ex purpurâ cærulei: his succedunt totidem prælongi lobi, teretes, & quasi cylindracei, in quibus fructus reliquis Phascolis minor, Anagyridis legitimæ fructui pæne similis, rubescentis coloris.

Phasolus
peregr. 111.

Semine



Phascolus
peregr. IIIL.

Semine ex Hispanijs misso natus etiam mihi hic Phascolus anno M. D. LXXVI. scitius quidem, ut fructus plenam maturitatem consequi nequiverit: proximo tamen subsequente anno satius, non modò maturius flores dedit: sed ejus præterea fructus ad frugem pervenit.

DISSIMILIS est Quartus superioribus. Caret enim longis illis sarmentis, quibus illi prædicti, & brevi firmoque caule constar, pedalem longitudinem rariò excedente & in brevissimos ramos diviso, ad quorum exortum folia quidem superiori similia nascuntur, terna numero, sed breviori pediculo inhaerentia, qui non purpurascit, ut in proximè descripto: pediculi ex alis prodeuntes, longi, crassiusculi, firmi, binos etiam flores magna ex parte sustinent, formâ, colore præcedentis flori similes, deinde binos lobos illius cylindraceis si-liquis paullo longiore & teretes, in quibus fructus formâ par, sed colore differens: nam n-vens est, circa hilum nigrâ maculâ insignitus, & quibusdam nigris punctis interdum in lateribus notatus.

Satis præcox hic est, nec ullis pedamentis eget, cum (ut dixi) brevi, firmoque sit caule. Crevit etiam hic mihi Viennæ anno M. D. LXXVI. donatus à C. V. Rembetto Dodonæo S. C. M^o tum Medico, qui ejus fructum præcedente anno, dum Pragæ esset, in Arcis orto observaverat, & legerat.

Idem fructus etiam ex Hispanijs missus fuit Cæsari sequente anno, cum tertio genere, in quo triplicem coloris varietatem observabam: nam aut rubescebat, aut pallidebat, aut pulla nigre dinc nitebat.

Phascolus
peregrin. v.

TENUIA habet Quintum genus sarmenta, ex singulari caule statim proximè radicem enascentia, eaque valde ramosa, ex viridi purpurascencia, quæ vicinis pericis & pedamentis sese convolvunt: folia ex eodem pediculo, ut in aliorum Phascolorum genere, semper terna, longè tamen minora, & Trifolij incaniantis (quod in umbrosis & ubere glebâ nascitur) folijs perquam similia, ex atro virentia, circa pediculum purpurascencia: flores in spica modum congesti, magni, Pisi vulgaris formâ & magnitudine ferè, coloris flavi, in oblongo crassiusculoq; pediculo ad foliorum exortum prodeunte nascuntur: lobos non observabam, quia flores duntaxat produxit ipsa planta, eôq; valde caducos propter advenientia frigora: breves tamen angustosque esse intelligebam ab his qui conspexerant, & terna aut quaterna grana continere: quæ verò accipiebam, parva erant admodum, Laburni grana non majora, utroque tamen mucrone plerumque obtusiore, pulli coloris, seu potius ex nigro subvirescentes.

Pictor nullos lobos in hac planta expressit, sed flores duntaxat quos in illa florente vidit.

vidit: ipsa autem quæ illi dederam semina, ut ad plantæ latus exprimeret, hæc quoque incunabula & negligentia, in eo, qui infra supremam florum spicam est, folio, adpinxit.

Phaeol. peregrin. vi. angustifol.



ANNO autem octogesimo primo supra millesimum & quingentesimum, ipso Autumno dum ex Anglia redibam, elegas aliud Phaeoli genus videbam Coloniz apud nobilem maronem C. V. Ioachim Hoperi, Præsidis Belgici in Hispania Consilij viduam, farmentis perinde atque secundum genus pergulas & perricas scandentem, illisque se advolventem, sed angustioribus folijs, fructu vulgaris Phaeoli fructu minore & planiore, subrubri coloris, semine nudo, ab illa ex Hispanijs accepto *frizoles Guatich* appellatione id mihi est Sexrum genus, cuius postea historiam C. V. Rembertum Dodonæum nobis daturum sperabam, cum hæc scriberem: nam ille hæc dubie ipsam plantam ad frugem pervenisse observare potuit, quandoquidem tum temporis Coloniz vivebat: edita ramen novâ suâ Scirpium Historiâ, quam rû præ manibus habebam, compari illius iconem duntaxat proposuisse cap. vi. l. b. ii. Pemptadis 1111.

IN lucem emissâ porro meâ Scirpium apud Pannonem viciniorq; populos observarum historiam, sex mihi nata sunt Viennæ Austriæ alia Phaeoli genera, semine peregrino accepto, septimum Francofurti ad Moenum: quorum historiam prædictis subijciemus.

MULTA autem habet primus Phaeolus, qui nunc mihi crir ordine Septimus, Phaeolus statim à radice prodeuntia, Purkicheriani, sive in ordine Primi Phaeoli modo, quæ, licet eadem ratione vicinis periculis se circumvolant, non tamen adeo luxuriant, aut alitè assurgunt. Ad horum nodos folia enascuntur ternâ numero, ut in alijs Phaeoli generibus, multo tamen angustiora, Sexu folijs, quem Coloniz apud Hoperi viduam conspiciebam, non valde dissimilia: ex horum alis emergebant digitalis longitudo cauliculi, parvos flores in vix modum congestos sustinentes, albos initio, sed, ubi fenescunt, pallescentes: isti succedebant plantæ latæque vaginæ Primi lobis ferè pares, breviores tamen, initio virides, quæ maturæ, fulvescunt, lenièq; continent planum, Purkicheriani, seu Primi graminis minus, sed similibus coloribus albo & nigro varium, nunc in longitudinem extensis nigris strijs, nunc confuso ordine sparsis maculis nigris majoribus aut minoribus per universum phaeoli corpus: nonnunquam integro fructu nigro, vel exiguis albis maculis confuso, aut dimidiâ duntaxat ex parte. Florebat mihi Julio & Augusto: semen enim maturum præbere incipiebat Augusto.

ALTEA, seu ordine Octavus, pluribus etiam farmentis assurgit, ejusdem cum superiore longitudinis, quæ vicinis palis se applicat, & eos scandunt: ubi sese in ramos dividunt adnascuntur folia Primi folijs similia, ternâ numero, sed paullo minora: flores ex alis profert etiam Purkicheriani, seu Primi floribus similes, albos, versutæ pallescentes, vix instar nascentes: quibus & plantæ ut in præcedente, succedunt vaginæ, illis hæc majores, continent bina, ternâ, aut quaternâ grana, plana, supetioribus magnitudine respicientia, non adeo candicantia, sed colore interdum exalbescente, aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confusè notata, interdum toto etiam præne fructu (ut in superiore) nigricante.

TERTIUM, sive ordine Nonum, adquirebam semine, quod N. V. Ioannes Boissot ex Hispania acceperat, mihi communicato natum: erat verò is fructus Purkicheriano major, sed totus albus, nisi quidam radij spatis varium quodammodo fecissent: terræ creditum semen, prodijt, crevitque Purkicheriani instar, similibus farmentis, folijs, floribus, & vaginis: sed cum ætas subsequeretur tardior, humidior, & frigidiore, neque hic, neque alij quos severam Phaeoli exoni, ad frugem pervenire potuerunt.

QUARTO, mihi ordine Decimo, multi etiam sunt ab una tadice assurgentes rami, superioribus quidem altitudine æquales, & sese circumvolventes, ex viridi purpurascetes, nodosi & geniculati, quibus adnascuntur folia Octavi folijs similia, secundum tamen articulationes

lariones quibus connexa sunt, purpurascens: ex aliis etiam prodeunt digitalis longitudinis ramuli, flosculos superioribus magnitudine & formâ, respondentes, uerè quoque instar congestos ferentes, sed quorum galea seu callos obsoletè purpurascit, bina lateralia folia, coloris sunt floridioris: his succedunt planæ, latæ, fusæ & nigricantes vaginæ, semina continentes plana Purkicherianis, siue vericoloribus Africanis minora, per maturitatem prorsus nigra.

Phaeol. pa.
reg. XL.

NON dissimilia habet Quintus, siue Vndecimus, sarmenta, altè etiam assurgentia, similia folia, & flores in digitalibus ramulis uerè modo congestos, paruos, Oclavi floribus similes, albos, vaginas Septimi & Oclavi generis lobis similes, in quibus semina terna aut quaternaria, plana, diluta rubedine prædita, quæ nigris uenis siue radiolis secundum longitudinem distincta sunt, nonnunquam magnis vel exiguis nigris maculis confusè aspersa: interdum etiam utrinque proflus, vel, altè duntaxat ex parte, nigra, emicantibus sparsim parvis rubentibus maculis, ut ex marmore aliquo *seraphim* tornata videantur.

Phaeol. pa.
reg. XL.

SEXTVS, hoc est Duodecimus, nascendi modo, & reliquis fere notis, illi per omnia ferme similis: sed cujus flores Decimi floribus valde similes, paulo tamen dilutius purpurascens: sunt: fructus autem magis diluta rubedine præditus, regulatimque colorem quoddam modum referat, quem rarè per longitudinem nigra striz varium faciunt, aliquando autem plurius totum pæne atrum reddunt. Hoc genus mihi natum, Medicine quod communibat C. V. Iochimus Camerarius Inclutæ Reip. Noribergeris medicus primarius, reliqua fructu ex Hispanijs misso. Florent autem fructumque profectunt eodem tempore.

Phaeol. pa.
reg. XLII.

HVC Septimus, hoc est, ordine servato, Decimus tertius, addi potest, Decimo, sarmentis, folijs, florum colore & formâ non dissimile: qui tamen succedebant lobis, longiores, & quasi cylindracei, non fulci aut nigricantes, ut illius, sed per maturitatem, nigris duntaxat uenis confusè sparsis insigniti, octo, novem aut plura interdum continentes semina, renis quidem formam exprimentia, sed longiora, tumidiora, atrî omnino & splendentis coloris. Floret paulo maturius superionibus, eam ob causam semen facilius ad maturitatem pervenit. Habebam Francofurti hunc Phaeolum natum semine ex Italiâ misso Phaeoli athiopici appellatione.

Phaeol. pa.
reg. XLIII.

ILLI non valde dissimilis Oclavus, vel (ordine servato) Decimus quartus, mihi Lugduni Batavorum natus anno M. D. XCV. semine ex Italiâ accepto simili appellatione, obnigredinem, ut venisimile est, vel forsitan quòd ex *Aethiopia* prima ejus ongo.

LONGA verò & lenta habet hoc Phaeoli genus sarmenta, reliquorum generum instar, quibus, petticis & pedamëtis (si adponantur) se circumvolvitur & innititur: alioqui adeo infirma, ut humi procumbant, & se spargant: ijs innascuntur folia numero terna, longo pediculo inhaerentia, ut in vulgaribus Phaeolis, & ejusdem cum illis amplitudinis, nervosa, in sarmentorum nodis unde prodeunt folia, nascuntur oblongi pediculi, in quibus flores, bini, quaterni, seni, interdum etiam octoni, ex adverso ut plerumque nascentes vulgarium formâ, hoc est, floris pisi instar pæne formati, coloris purpurascens, seu verius amethystini: quibus succedunt totidem oblongi, teretes lobis, initio virides, deinde maturitate flavescentes, in quibus bina, terna, quina, sena, vel etiam octona grana vulgarium quidem formam referentia, sed minora, & coloris, quando matura, nigri.

Floret cum vulgariis, vel etiam aliquando paulo maturius.

Phaeol. pa.
reg. XLV.

SEDECadem appellatione Nonum, siue ordine servato, Decimum quintum genus accipiam illo ipso anno, à Doctissimo viro Bernardo Paludano, quod etiam mihi natum, facie quidem & formâ non dissimile jam descripto, sed cujus sarmenta purpurascens essent, terna illa longo pediculo inhaerentia folia, pro parvis appendicibus, quæ in alijs generibus, bina interdum foliola adjuncta habent, flos etiam magis satur, & prorsus amethystinus, lobis præterea initio quidem virides, sed paulatim purpureum colorem contrahentes maturitate tandem putpureum saturum, & ferè nigrum: fructus in ipsius comprehensus initio putrescens, deinde atrî omnino coloris ut præcedens: eam ob causam verè *athopius* nuncupari potest.

Phaeol. pa.
reg. XLVI.

HVC addi potest Decimum genus, quod, servatâ institutâ serie, Decimum sextum erit: cujus quidem lobum non conspexi, sed ipsum fructum duntaxat suo lobo exemptum, annosque M. D. XCV. ex Guineâ delatum, qui à plebique illo ipso anno tertè creditus, multis enim communicatus fuit, uni Cornelio Mannio, piz mem. Pharmacopæo Delphensi ad speculi symbolum, crevit ad palmatei altitudinem, cauliculo satis firmo & rotundo, binasque aut ternas foliorum alas protulit, in quibus, ut reliquis Phaeolis, terna folia, sed valde crassa & pingua, longèque minora, trifolij asphaltitis foliorum magnitudinem non excedentia. Ipse phaeolus semunciale magnitudinem non superabat, latis densius & crassus, coloris fulci cum spadice commixti.

Nonum.
Phaeol. pa.
reg. XLVII.
Phaeol.
African.
Excolens bll.
em de Gu.
nucula.

PRIORIS fructum Purkicherus primus in Pannoniam inferebat ex Neapolitano regno delatum, singularique annis colebat, ut illius (ut dixi) genus istuc conservaverit: eam ob causam, apud rei herbariæ illius regionis studiosos, Purkicheri cognomen inditum, & ut Phaeolus Purkicherianus nuncuparetur, obtinuit. Ante multos verò annos similem plantam mihi missum memini phaeoli Africani appellatione: & ex Africâ Italos primum accepisse, venisimile est. Aliter ex Hispanijs anno M. D. LXXXI. missus *frizelos blancas de Guatimala*, hoc est,

hoc est, Phaeoli albi ex Guatimela (quæ novi orbis provincia est) nomine, mihiq; eodem anno communicatus, subsequente vere satas crevit, & ad frugem, quo dixi tempore, pervenit. Proxima duo geneta ex Hispanijs accepta cum hac inscriptione *alaba de Indias*, id est, lobi Indici: quam etiam habuerunt Septimus & tres illum sequentes. Quintus mihi Patavio mittebatur à doctissimo viro Bernardo Paludano Fritio primario nunc urbis Enchusanz Medico, tunc verò ex Syriâ & Ægypto reduce, anno videlicet M.D. LXXVIII. semen terræ committebam anno illum insequente, sed cum serius prodijisset, non potui commodè ipsam plantam observare. Tertio demùm post anno è seminibus conservatis & telluri creditis, natæ aliz plantæ, quarum una Septembri mense flores protulit: qui caloris inopiam ad frugem pervenire non potuerunt: hoc semen à Paludano accipiebam à *robuor*: at deinde ex Italiâ Egyptiaci phaeoli nomine simile missum: & fortè Dolichus est Bellonij libro II. cap. XIX. Observationum. Sextum jam dixi ex Hispanijs missum *frizoles Guateli* inscriptione.

Alabus de Indias.

Phaeolus ægyptiacus. Dolichus Bellonij. Fritioles Guateli.

Phaeolus peregrinus XIII. Leblab.

At vero porro Phaeoli genus cum Quinto mittebat idem Paludanus, cui *Leplap* nomen inscriptum erat: sed nec tum temporis, nec postea aliquoties acceptum & terræ oportuno tempore creditum nasci voluit, respiciens fortè regionum Septentrionalium frigidiorē aëtem. Illius tamen cum suo semine vaginam seu lobum exprimi curabam, ut Lectoris oculis subijcerem. Brevis & lata erat, quaternaque grana oblongiuscula, nigra, hilo nihilominus albo valde longo prædita continebat. Decimo deinde post anno, accipiebam Lugduni Batavorum ab Illi viro Joanne Vincentio Pinello duo Lablab genera à Doctissimo Prospero illi communicata: unum videlicet nigrum ut quod modò descripsi: alterum rufum.

Leplap.

LABLAB autem, seu Phaeoli nigri meminit Prosper Alpinus libro de Plantis Ægypti, capite XX. in hæc verba.

Est arbor sarmentosa, quæ et efficit ad vitis magnitudinem, sarmentisque vitis modo extenditur, ac expanditur folijs, figuræque similis est omnino vulgari phaeolo: flores fert bis in anno. Vere ac Autumno, phaeolorum floribus aliquatenus similes, à quibus silique longæ, instarque fabarum latissime cernuntur, quæ semina nigra phaeolis planè similia continent, quotum alia nigra, alia subrubra cernuntur. Hæc arbor vivit annos centum, & amplius (difficile creditur) yz, quæ phaeolorum & leguminum naturam norant, præsertim mihi quæ Ægyptum non vidi, non eo tamen inficitur, silvestres pleraque resistibiles esse, vivæque radice aliquot annis perdurare, singulis tamen earum sarmenta pertinent ad radicem, & sequente nova repulsi sunt perpetuè viret. Ægyptij phaeolos illos in cibo stquantur, nostrisque non minus gustui suaves existunt. Mulieres utuntur decocto cum croco ad excitandos menses: præterea utile est ad tussim, & dispnoeam, & ad urinam suppressam movendam.

Lablab Fra. Qui Alpin.

CETERVM Londino accipiebam elegantissimum quædam Phaeoli (ut arbitror) fructum à Iacobo Garcto viro humanissimo, cujus iconem & brevem historiam, propter venustatem & raritatem. Lectoris oculis subijcere volui, præsertim cum Phaeoli ex Indiâ Orientali inscriptionem haberet.

Phaeolus peregrinus Indicus.

Phaeolus Indicus alter, Mates.



Is autem Pontica nuce paullo minor est, in medio tumidiore & pulvinatus, lævis, splendens, durus, solidus, in aquâ sublidens, extimâ parte (qua nimirum flux vagitæ aut lobi adhaerit) veluti ducto & hianti osculo superne paullo elatiore & aquilino præditus, duobus duntaxat colonibus cõstans: superior enim pars ab elatiore rostellâ parte, quasi lineâ ad alterius extremitatis infimâ in fructu partem obliquè ductâ, tota utrinque atra est, ebeni nigredine & nitore, inferior verò, omnino autea, cui admixtum sit pauxillû minij, siue præternaturali mali aurei colorem refert, & ut altera nitet. Ejus pulpam describere nequeo, cum confringere noluerim, urpote qui unicuique sit, inter reliquos exoticos fructus etiam servandus.

Phaeolus Indicus.

Hic autem rarisimo fructui, alterum, cui Mates inscriptio erat, adijcere libuit, licet illius meis in Garciam notis meminero, & inter peregrinos fructus decimum ei locò dedetum: quoniam tamen ejus pictura meo judicio istuc probè expressa non fuit, meliorè hoc loco

Lupinus sativus albo flore.

Lupinus flore caeruleo.



Lupinus flavo flore.



loco adponere volui. De varijs autē Phasolis alijs exoticis vel ab amicis communicatis, vel meo arte redemptis, nos, Deo vitam tribuente, inter fructus exoticos, quorum brevem descriptionem meditamur.

LUPINVS.

CAP. XLII.

LONGO jam tempore Belgicis hortis inquilina facta sunt tria Lupinorum genera: unum videlicet sativū, quo diu aquā macerato, ut amaritudinē deponat, pleręque nationes vescuntur, ut Vlysi pone observabam æthiopica mancipia, & tenuis fortunę homines, & vulgo in medicū usum cedit: bina alia silvestria, quę neque vesca sunt, neque ad cō frequenter in medicum usum recipiuntur.

Sativum non nisi cultum vidi: Silvestrium, dum in Narbonēsi Galliā vivebam, alterum genus, id videlicet quod caeruleo est flore, minoribusq; folijs & fructu constat, inter segetes non procul Mompelio ultra flumen Ledum sponte natum observabam: quod verō flavum habet florem, eumq; odoratū, duntaxat cultum in hortis conspexi ob elegantiā & odoris suavitatē. De illis porro non est mihi nunc sermo, quandoquidē ab alijs plerisque tradita est eorum historia. Icones tamen subijcere libuit, quia de quarto quodam Lupini genere agendum mihi est, ante annum M. D. XCV. mihi non conspecto.

Natum id fuit Lugduni apud Batavos semine peregrinē accepto, crevitq; in cubitalem aut majorem altitudinem, satis firmo scapo & in ramos divisō præditum: cui, ut in alijs Lupini generibus, inhærebant folia ex uno longo pediculo

Tria Lupinorum genera Belgicis hortis familiaria



Lupini generis IIII.

pediculo dependentia, septena aut plura, molliora tamen, quam in eo qui flavū proferit florem, paullo etiam latiora, longiorēq; lanugine obfita: flores extremū caulem & ramos, tribus, quatuor, aut pluribus ordinibus ambiunt, verticillarim, aut coronę instar in orbem dispositi, quaterni & quini, ijs qui albi sunt, serē æquales, sed coloris ex cæruleo purpurascētis & elegantis: quibus successerunt siliquę non dispares vulgari sati vo, in quibus fructus illo non minor, verum alrelius coloris Florebat Julio mēse, semen Septembri maturū fuit.

Cū anno M. D. LXV. Ē Lusitanā per Baturiam in Granatensē regnum transirem, memini Februarii mense agros Lupino confitos videre, cujus flores albi, aliquid cærulei commixtum haberent: an hujus fuerit generis, ignoro.

PISUM silvestre.

CAP. XLIII.

Lathyrus silvestr. Dod. Clyn. Matth.



Nec sarmentis, nec folijs à vulgari pīso, quod in arvis seritur, multum differt: numerosa enim & oblonga ex eadem radice profert sarmenta angulosa, striata, fractu conruma- Pisum silvestr.
cia; folia deinde uncialia, membranacea, viridiaque, bina semper, modò hinc, modò illinc ipsa sarmenta amplectentia, è quorum medio ala extrahitur quatuor aut sex foliorum contrario semper firmi nascentium, quę in capreolos, quibus sese vicinis plantis implicar, defini-
t: summa sarmenta in multos deinde ramos dividitur, qui ex foliorum alis oblongas tenuēsq; virgulas promunt, in quibus multi exigui candicantēsq; flores spicę instar congesti nascuntur, Ciceris sil. Marthioli (quod passim in Pannoniæ & Austrię inferioris pratis atque secundum illorum, quibus cinguntur, sepes sponte crescit) florē ulis per similes: quibus excussis, succedunt lobi pīsi vulgari vaginis panillo graciliores, continentes grana Clymeni Marthioli, sive Lathyrī sil. Dodonęi grani similia, fusca, ingrati saporis, meo quidem palato, qui crudis pīsis aut fabis nunquam vesci soleam: radix lignosa, nigricans, minimi digiti crassitudinem interdum æquat, & tenuibus fibris donata est, perennis, & singulis annis nova sarmenta longē sub terram sese condentia proferens, antequam germinet.

Primum mihi cōspecta est hæc planta ultra Dravum flumen in Pannonia interfluvii (cujus Natalis
pars Windischfeld nuncupatur) jugis arcis Grēben vicinis, anno M. D. LXXIX. copiosē inter saxa nascentis: unde postea Ill^{us} Heros Balthasar de Barryan, qui me in eam Provinciā deduxerat (nam ejus ea arx erat, & pagi aliquor vicini) matrum fructum mihi adferri curavit, quę plerisque amicis cūm in Belgicā, tum alibi viventibus communicabam. Subsequente deinde anno alijs locis Viennę vicinioribus observabam, veluri in silvoso illō monte supra Gumpstkirchen, item supra Posenium ad Danubium, & in Leytenberg. Florēt Junio, semen maturum est Iulio.

Clymenum
Matthioli.
Lathyr. fil.
Dodonai.
Ervum sat.
Cordi.

SPONTE etiam gramineis locis siccioribusque Pannoniæ, Austriæ & Scitiz peatis nascitur Clymenum Matthioli, five Lathyrus fil. Dodonæi, vel Ervum sativum Cordi: cujus duo genera observabam, latifolium, & angustifolium; illud quidem in Austria duntaxat, hoc verò Francofurtensi etiam agro.

Quid verò sit Clymenum Diosc. qui nosse desiderat, consulat Plantarum historiam Fabij Columnæ.

OROBUS PANNONICVS.

CAP. XLIIII.

ERVI, five Orobi nomen apud rei herbariæ studiosos obtinuerunt aliquot plantæ, quas per Pannonias, Austriam, Scitiam, aliisque Provincias nascentes observabam, & à nemine descriptas meminerà, cum illarum historiam proderem. Eam hoc capite repetemus.

Orobus Pannonicus L.

Orobus Pannonicus II.



Orobus Pan-
nonicus L.

MULTOS habebat prior caules ab una radice prodeuntes, pedales aut ampliores, firmos, erectos, angulosos, virides, in quibus hinc inde sparsa sunt oblonga & pennata folia, ex senis, octonis aut pluribus folijs mucronatis, trinerviis, uni costæ adnatis, & sibi invicem oppositis, congesta: flores in surculis ex alarum sinu prodeuntibus spicæ instar nascentes, pisi aut vicæ florum æmulos, coloris purpurei elegantissimi, deinde, ubi evanescere incipit, cærulei: quibus succedunt longi cylindracei lobi, fusci, in quibus semen torundum interdum & exiguum, nonnunquam verò oblongiusculum, varium, quo maturo, lobi dissiliunt, ut in plerisque ejus generis: radix vivax est, longa, nigra, dura, per intervalla extuberans, fibrosa, & ex lateribus novos stolones singulis annis producens. Tota planta acrimoniæ cujusdam particeps.

Orobus Pan-
nonicus II.

ALTERA tenuioribus & gracilioribus constabat caulibus, firmis tamē, cubitalibus, angulosis, & in multos ramos divisis: folia alata sunt, hoc est, sena, octona, & interdum dena uni costæ inherentia, Superioris folijs longè minora, & Lenticulæ folijs haud majora, tennella, viridia, gustu amariante & calidiusculo: flores ex superioribus alis numerosi, logioribus petiolis inhaerentes, superioris floribus forma similes, minores tamen, purpurascens coloris, qui vetustate in cæruleum etiam commutantur: lobi sunt longi, nigri, continentes oblongiora majoraq; semina quam habet superior, subfusca, & maturitate similiter dissiliences atque se contorquentes: radix dura, hgnosa, fibrosa que est, in diversa tendens, vivax, & singulis annis plures caules proferens.

Copiosè

Copiose nascuntur in montanâ illâ silvâ Leytenberg supra Manderstorf, similiter supra Medeling, & omnibus montanis illis silvis quadam fere productis à Danubio ad Alpes, varijs item Pannoniz locis. Florent Aprili atque etiam Maio: semen autem profertur lunio.

Orobus Pannonicus III.

Orobus Pannonicus II.



GRACILES promit Tertia cauliculos, rectos, firmos, angulosos, pedales & cubitales: folia per intervalla, uni colitz in hærentia, quaterna plerumque ex adverso sita, crecta, angusta, trium ferè unciarum longitudinis, gustu aliquantulū acido initio, deinde amariusculo, nullis capreolis prædita, quod caules, satis firmi, adminiculis non egeant: flores in longis nascuntur furculis spicæ instar congeſti, florum pisi aut viciz formâ, seni aut octoni, candidi coloris: deinde oblongi lobi, nigricantes, prioris lobis pates, semine nigro, interdum etiam maculoso pleni, qui per maturitatem cum strepitu dehiscences semen abijciunt: radicibus nititur quinis aut senis minimi digiti longitudine, crassiusculis, Alphodeli, aut Prænix feminx minoris, oblongis bulbis ferè similibus, minoribus tamen, fotis nigris, intus albis.

Invenitur magnâ copiâ in pratis non procul Walterstorf, Maupach, Medeling & Thermis Badensibus Austriæ vicinis. Observabam etiam in montosis ultra Danubium locis, ad czeluorum silvarum margines. Floret cum superioribus, semēque perficit lunio.

QUARTÆ, ab unâ radice prodeunt aliquot caules, cubitales, striati, recti, folia alternatim profertentes pennata, quaternis folijs satis amplis & mucronatis constantia (quibus adnascitur aliquando in extremâ alâ quintum) viridibus, per quæ aliquot venæ transversim à medio nervo excurrūt, subacidi quidem initio gustus, sed postea amariusculi: flores ex alarum sinu brevi petiolo insidentes prodeunt quini aut seni, antroorsum spectantes, viciz floribus non dissimiles, albo colore præditi, qui in binis foliolis sursum reflexis pallescit, odoris expertes: lobi quales in primo genere ferè, in quibus semen fuscum, majus quam in reliquis generibus: radix minimè vivax est, sed prolato fructu perire solet, ut plenisque Leguminum generibus accidit.

Raram hanc plantam in Austriâ primùm inveniebam, nec nisi in Alpibus illius Provinciz nascentem, unde delata, & in hortum translata, altero anno flores mihi protulit Aprili, & Maio, deinde semen. Anno verò m. d. lxxix. observabam Maio florentem maximâ copiâ in eâ Pannoniz parte quæ inter Dravum & Savum est flumina in Danubium illabentia, quæq; ob eam causam Interamnis Pannonia nuncupatur, in monte quodam silvoso Greben arci vicino.

SECUNDVM poetò genus in Belgicis hortis aliquando videre memini, & Aphacæ nomine à


mine à rei herbariz studioſis appellari. Quartum autem ad Phaleli ſilveſtris, aut Viciz genus aliquod commodè referri poſſe exiſtimo.

CETERVM Orobi hiſtoria, mihi in memoriam revocat duas alias ſtirpes, quæ ſemine ad nos hac appellatione Vencij primùm miſſo, in Belgicâ priùs, deinde Vicennæ Aultriæ ſunt natæ: quæ quoniã à nemine adhuc deſcriptæ erant, illarum hiſtoriam, Cap. de Orobo in meïs Pannonicarum ſtirpium Obſervationibus inferrebam, quam eodem capite hie etiam repetimus.

Orobis Venetus.



Onobrichis Dodonzi.



Orobis Pa-
net. 1.

MULTOS ex eadem radice Prior fundit ramos, pedales, anguloſos, & ad ſingulas foliorum alas, modò in hanc, nunc in alteram partem inflexos, humique, ut plurimum, diſſuſos: folia in ſingulis alis quaterna aut ſena uni coſtæ inhærentia, bina ſemper ex adverſo ſita. nullo extremo impari numero faciêre, Orobi Pannonici primi folijs parè ſimilia, ſed dilutè virentia: flores oblongi virgulis ex alarum cavis prodeuntibus innafcuntur, numeroſi, in comam inflexi, puſilli, quatuor foliolis ut reliquorum leguminum flores conſtantes, hoc eſt, ſuperiore latiore ſurſumque reflexo & expanſo, binis minoribus ad latera, quarto inferiore cavo, & quodammodo catinato, coloris putpurei: oblongi lobi, mucronati, viciz lorum parè æmuli, rotundiores & magis teretes, maturitate ruſceſcentes, ſemen continent orobaccum, oblongi ſcuſculum, albicantis coloris: radix dura, lignoſa, multis fibris in diverſa tendentibus donata, vivax eſt, & ſingulis annis frequentiores caules proſert.

Orobis Pa-
net. 11.

ALTERA duntaxat diſſert à præcedente foliorum & ramorum colore, qui ex viridi pal- leſcit, & floribus qui prorsus ſunt albi.

Florent Maio menſe, cum alijs plectiſque ejuſdem generis.

PLURIMÆ porrò aliæ ſtirpes ad Leguminum & ſimilium claſſem pertinentes, ſponſe per Pannoniam, Aultriam, Scythiam, Moraviam, Bohemiam, aliâſque Provincias naſcentes obſervabam; quarum licet ſit ab alijs prodita hiſtoria, nomina tamen reccuſere hoc loco volui.

Onobrichis
Dodon.
Glas des her-
b. ſilv.
Pſeudopis
Dodon.
Antheſis la-
gumia ſp.

Gramineis locis, ſiccioribusque pratis naſcuntur Onobrichis Dodonzi, quæ Brabantis ſonantammēt lingua vernaculâ, id eſt, Criſta gallinacea cognominatur: Glandes terreſtres, ſive Pſeudopis Dodonzi flore purpureo odorato, alia ci congener lurco flore Anthiſis leguminofa Lobelij, cuius genus purpuſcente flore Ferrariâ ante multos annos accipere memini à C. V. Alphoſo Pancio.

In ſilvis,

Glaux vulg Glycyrrhiza fil. Gefneri.

Galega vulgaris.



In filvis pratorum marginibus umbrosis, atque etiam interdum in pratis apertis Foenum graecum silvestre Tragi, sive Gefneri Glycyrrhiza silvestris: Cicer silvestre Matthioli, cuius ante memini, exili candicante flore, folliculis tumentibus, in quibus exiguum semen: & Galega vulgaris, quam nonnulli Rutam caprariam, Fracastorius Onobrichin appellant (quo nomine ejus semen nobis etiam ex Hispaniâ missum & planta nata) sed hæc omnium abundantissimè crescit inter Muram & Dravum flumina, paullo supra eorum confluentes.

Foenum graec.
fil. Tragi.
Glycyrrhiza
fil. Gefneri.
Cicer fil.
Matthioli.
Galega vulg.
Ruta capra-
ria.
Onobrichin
Tracallitry.

ASTRAGALVS.

CAP. XLV.


QVONAM hanc plantam referrem, diu multumque apud me deliberabam: sed nullam veteribus descriptam ineniebam, cujus historia illi per omnia quadraret. Cum verò esset elegans, & nemini ex recentioribus, quod scirem, cognita, ante quàm Scirpium per Hispanias observatarum historiam evulgarem, operæ precium me facturum tum putabam, si illius iconem cum historia, cap. de Astragalo subicerem: quam simili capite nunc repero.

CVBITALES autem, & ampliores sunt illi Astragalo (qui primus ordine erit) caules, minimi ferè digiti crassitudinem æquantes, pentagoni, sive angulosi, duri, subrubentes, & lanuginosi: folia lanuginosa & incana, in longa costa ex aduerso semper inter sese opposita, veluti in Vicie & Ciceris folijs, gustu primum adstringente, deinde fervido: flores copiosi, Lupini aut Fabæ vulgaris florum æmuli, secundum oblongos ramulos (seu virgæ ex alarum sinu prodeuntes nascuntur serie quadam digesti, albi omnino, sed ante quàm aperiantur & explicentur ex luteo foris nigricantes: fructum ferè dicitur (nam florentem duntaxat observabam) in lobis Faselo minori Dodonæi similem, qui gustatus, fauces, os, & linguam inflammatione torqueat: eum anno M. D. XCVI. accipiebam à Dodonæo viro Simone de Tovar: radix, pro stirpis magnitudine amplissima, brachialis nonnunquam crassitudinis, palmaris verò longitudinis, deinde in binos aut tres ramos divisa, foris nigra, rugosa, intus candida, dura, & lignosa, ingrati saporis, quæ arefacta, cornu duritie superat.

Primum hanc plantam collibus quibusdam supra Vlyssipponem, quos Tagus fluvius aluit, inter vepres observabam, atque mense Decembri eruebam anno sexagesimo quarto supra millesimum & quingentesimum: deinde sub exitum Ianuarii insequentis, silvosis locis non procul Hispaniâ, dum Gades proficisceretur, florentem ineniebam.

LVSTITANI, *Alfabeca* vocabant: Bæztici autem, *Garavancillos*, hoc est, Cicer exile.

Alfabeca Garavancillos.



Si facultates, quas ex ejus temperamento contrarias deprehendere licet, non refragarentur, legimum Astragalum esse censerem, cum cujus historiâ plurimis notis convenit. Videtur porro ea esse, quam Amarus Lusitanus Apocynon facit, & Lusitanis *Atrameços de can*, id est, Lupinos caninos vocari ait.

CETERVM Astragali nomine, multæ plantæ hodie insigniuntur: nullæ ramen, meo judicio, ad Dioscoridis descriptionem propriis accedere videntur, quàm illa cujus historiam nunc dedi, & alia quàm in Cantabris, Helveriorum alpinis, atque etiam Pannonicis observabam, ramulis aliquor ex una radice prodeuntibus, gracilibus, interdum surrectis, ut plurimum autem procumbentibus, folijs Ciceris foliorum instar in alâ ordine dispositis, sed rarioribus & longioribus, nec in ambitu serratis, sed valde accedentibus ad Orobanchi primi, præcedenti capite descripti folia: flore Vicie aut Ciceris flori simili, ex cæruleo purpureo, cui succedunt lobi Arachi siliquis ferè pares, in quibus semen continetur: radix est ruberosa, nigra, dura, cui propagines adnascuntur sarmentis radiculis inhaerentes, illi similes, sed minores.

Nascitur in montibus, quos dixi, vento perflans & apertis, & eam esse existimo, quam Fabius Columna, pro legimine Dioscoridis Astragalo, exhibet: multum differentem à Chamaebalano, seu Glandibus terrestribus.

HISPANI aliam quandam plantam proponebant, Astragali quidem facultatibus respondentem: sed formâ radicis minimè. Nam tametsi pusilla haberet Ciceris aut Lentis folia, tota incana, cauliculos breves, duros, & in his stulosos piû florum æmulos, pusillos, congestos & purpureos, summis ramulis inhaerentes: radix tamen, ut plurimum singularis, & nullam affinitatem cum Astragali radice habens, omnino repugnabat.

Crescebat ea in vinetorum & arborum marginibus secus vias, per Lusitaniam & Hispaniam. Florebat April.

DOCTISSIMVS vir Ioannes Plaça, Medicus & Professor in Valentiniâ Hispaniæ Academiâ, Onobrichin esse censebat, discrepare ramen historiam. Lusitani *Herva de S. Laureano* nuncupabant: atque illius in clubano siccata pulverem, vulneribus & ulceribus unctis inspergi asseverabant.

Illam aliquando alere memini in horto, dum in Belgicâ vivebam, unâ cum Astragalo Mompeliensis vocato: sed illa roto triennio ante quàm stirpium in Hispaniis observatarum historiam publici juris facerem, perierat. An altera porro adhuc perduret, quæ erat folijs superioris quidem folijs præne similis, sed minus incanis, majusculis floribus, curvis & inflexis, instar falcis, siliquis duplici serie semen continentibus subfulvum, rotundiusculum, radice perisimili, me latet.

VICIA

Apocynon
Amar.
Atrameços
de can.

Astragalus
al.

Natalis.
Astragal.
Diosc.
Chamaebalano.

Astragalus
al.

Natalis.

Onobrichin
Plaça.
Herva de
S. Laureano.

Astragalus
Mompeliensis

VICIA SILVESTRIS.

CAP. XLVI.

VARIA per Pannoniam, Austriam vicinasque regiones inueiuntur Vicie silvestris genera, alijs Provincijs etiam communia: duo tamen me observasse atbitror, quæ ali-
bi videre non memini.

Vicia.

Vicia sil.albo flore.



MULTOS ex eadem radice, quæ potensis est, profert Primum genus ramos teretes, striatos pedales, etiam cubitales interdum, quos ambiat foliorum alæ, quem admodum in Viciâ vulgarî fativâ & silvestri, sed densiore lanugine obductæ, & quasi incanz, capreolis, quibus vicino graminî se implicat, extremam alam occupantibus: flores in superius folio-
rum alis terni plerumque, Vicie vulgaris floribus per similes, candidi coloris, superiore ta-
men folio, obsoleti coloris venis internæ distincto, inferiore foliolo ejusdem coloris: flori-
bus succedunt siliquæ (scu vaginæ plantæ) quantum videlicet ex illarum rudimentis collige-
re licuit, nam Maio mense florentem anno M.D. LXXIX. duntaxat observabam) vicie vul-
garis siliquis similes: radix fibrosa est, tuberculisque ut Leguminum pleræque radices vi-
vaces, donata.

Vicia sil-
bo flo. fl. l.

Nascitur in arvis desertis apud Chyztreg oppidum Magci viri N. Bamfy, in Pannoniâ si-
tum, olim flurens, cum verò istac iter facerem magnâ ex parte exsultum, & ob contiguas
Tuccorum in ea loca excursions, omnino ferè desertum, non procul à Kerkæ fluvio.

CYBITALIBVS est altera ramis, striatis, lenis, infirmis & humi, nisi capreolis sese susti-
neant, procumbentibus, oblique modò in hanc, modò in alteram partem, secudùm folio-
rum alas, inflexis, è quibus frequentes plerumque ramuli enascuntur: foliorum alæ obloo-
gæ, renues, deorsum incurvæ seu nutantes, & in binos capreolos desinentes, duodenis, vice-
nis, vicenis senis, aut pluribus interdum oblongis angustisque foliolis surrectis, & ex aduer-
so nunc æqualiter, modò inæqualiter nascentibus, præditæ sunt: flosculi elegantes, superio-
ris floribus formâ non dispares, minores tamè, & Onobrichidis quartæ flosculus propemo-
dum respondentes, coloris ex cæruleo purpurascens, viceni nonnunquam aut plures, spi-
cæ instat in oblongis nudis ramulis, ex superiorum alarum sinu exeuntibus, nascuntur: de-
inde uncialis longitudinis siliquæ exiguum semen continentes: radix tenuis, latè serpens,
& sub rellure se condens, singulis annis novos frequentioresque ramos profert.

Vicia fl. st.

Passim in agris & inter vepres, illis se implicans crescit, per Vngariam, Austriam, Mora-
viam & Bohemiam, atque Maio floret.

Natalis.

VICARIA cum superiorem, rum hanc (quæ plurimum à Belgicâ vepribus se implican-
te differt) atque denique omne silvestris vicie genus, *Waryw borje*, nuncupant, hoc est, cor-
nicis pisum.

Waryw
borje.

CICERCULA

Cicerula
Aegyptiaca.

Natale.

Lathyrus.
Cicerula.
Cereus.
Pois cretes.
des Sans.
Lathyr.

Securidaca vera.

Securidaca
legitima.Securidaca
altera.

NEQUE folijs, neque cauliculis, reliquisve partibus à saviâ vulgari Cicerula valde differt ea, cujus historiâ hoc capitè date institui: nam cauliculus habet infirmos, & nisi sustineantur, humi procumbentes, in quibus hinc inde bina adnascuntur ex adverso sita foliola, è quorum sinu prodeunt oblongo pediculo innixa bina alia folia angusta & surrecta, ac tandè is pediculus desinit in capreolum nonnunquam multifidum, quo sese vicinis herbis & virgulis implicat: flos etiam sativæ flori non dissimilis, sed color diversus, quia qui in sativâ albus, in hac internè elegans est cæruleus, foris ex cinereo purpureus: quo defluente subnascuntur in longis tenuibusq; petiolis alatae vel supernè pinnatae siliquae seu lobi, in quibus bina, terna, raro plura continentur grana, domesticæ cicerulae granorû magnitudine, inæqualia, frequentibus nigris maculis insignita: radix, ut in ejusmodi stirpium generibus, tenuis, non vivax.

Primum mihi nata est hæc planta Viennæ Aultrix anno M.D. LXXXVII. semine in Ægypto lecto, & Constantinopoli missio. Flores tulit Junio & Julio, atq; etiam in Septembrem usque: semen marurum fuit Augusto & Septembri. Natam etiâ arbitror plerisque amicis, quibus semen communicabam: nam & Francfurti singulis annis provenit, flores tulit & semen maturum produxit.

GRÆCIS porro vocatur hoc legumen *Λάθυρος*, Lathyrus: Plinio & Columella, Cicerula, (sativam intelligo) Galli *Ceres* & *pois cretes* appellant: Paribiles, quorû agro abunde colitur, *des Sans*. An verò quam describo, ea est, quam Bellonius cap. XIX. lib. II. Observationum inter legumina recenset, & à Græcis vulgo *Lathyr* appellari scribit? cettè ipsa appellatio ad Græcam alludit.

SECURIDACA. CAP. XLVIII.

ALIVOT plantas in meis peregrinationibus observare memini, quæ nō incommodè, meo judicio, ad Hediari sive Securidacæ historiâ referri posse arbitror.

MULTOS, atque oblongos ex eadem radice fundit Prima caules, humi distilos, virides, striatos, intus cœcavos, valde ramosos: tulia alata, è multis foliolis, cōjugatim, & æquali, contrario tamen, firu uni costæ inhærentibus, constans, solo extremo impari, Hediari legirimi folijs perquam similia, amari saporis: è singulis superiorum florum alis, oblongi pediculi prodeunt, coronam flosculorû legitimi Hediari floribus formâ similitudinem graviterq; odoratorum sustinentes, non flavi, ut illi, colons, sed varij: nam superiura folia, carnei, ut sic appellem, sunt coloris, hoc est, blandè & dilutè rubentis, laterum alæ nixæ, & carina infima, licet alba, rostro est purpureo: siliquæ flores subsequentes, non sunt planæ, sed reteres, oblongæ, rostroq; internodijs distinctæ, quemadmodum Polygalæ Valentini siliquæ, continenter subitum fœmen, oblongo uscu-

distinctæ, quemadmodum Polygalæ Valentini siliquæ, continenter subitum fœmen, oblongo uscu-



longiusculum, saporis non minus amari quàm legitimi semen: radix tamen, non annua ut illius, sed maxime vivax & fibrosa, longè latèque sub terrâ se condens, & vicina loca occupans, atque etiam è tenuissimis fibris renascens.

Vulgatissima hæc est per univertsam Pannoniam, Austriam, Stiriam, Moraviam atque Bohemiam, cum in pratis, tum in agris, & secūdum vias. Floret Iunio, interdum totâ etiam æstate: semen maturum est Iulio & Augusto. Variat etiam interdum floris colore, qui vel torus candidus est, vel exalbescit, vel intensius purpureascit.

ALIQUANDO nobis in Belgicam missum fuit hujus semen, Galgæ alterius nomine, cum qua, siliquarum facie duntaxat affinitatem habet: mihi multis notis Hedyfarum referte videtur, exceptis corniculis & semine, quæ, ut dixi, plana non sunt.

SE D aptius forsitan Hedyfar descriptioni conveniet ea planta cujus iconem & descriptionem eum alijs stirpibus à C.V. Thoma Pennæ accipiebam, quam Dioscoridis Securidacam esse ipse censebat.

CYBITALIS, eo teste, est planta, aut altior, multos caules ramosos ab radice lignosa & perenni emittens, foliâq; habens ciceris modo secundum oblongum nervum binatim disposita, uno impari extremitatè ejus tenente, cicute minora: flores in summis caulibus glomeratim coherentes, ex candido rubentes: siliqua fusci coloris, securis formam quam nos *hylbosa*: & vulgo appellamus (anglicum est vocabulum *hylboush*, quo putatoriam sive arborariam falcem exprimunt) probe refertentes, vel eultri genus quo nostri & Belgici futores uti solent: singulæ siliquæ unicum semen ejusdem figuræ continent. [ex sicca tantum planta, quam mihi communicabat, dicebam, siliquas nonnunquam longiores esse, & supra securiculam seu falcem illam, alium artisculum longiorem obtinere, qualem extremitas superior siliquæ habent, quem admodum in icone addi curabam.] Tota avara est, præsertim siliquæ & semina.

Crescere aicbat agro Genevensi non procul à Ponte tremulo, inter dumeta, nusquam alibi ipsi conspectam.

ΑΠΟ ΠΕΡΟΝΑΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Græcis, Hedyfari & Securidacæ Latinis dictæ, classem referri posse arbitror has plantas. Nullus tamen semen aptius veterum securim meo judicio refert, quàm ejus quæ ab omnibus Hedyfarû legitimum cesserit, & aliquot locis inter segetes sponte nascetem in meâ per Hispaniam peregrinatione observabam, quam ob causam ejus iconem initio capitis hujus præfigere volui. Nam in fra Madritum secures videre memini, quæ huic semini essent simillimæ, nempe in medio quâ manubrium trajicitur, & adaptatur, crassiores, & utrinque in planam aciem desinentes.

In hoc

St. John's

Galgæ ab-
tard.

Securidacæ
Forsk.

St. John's

St. John's
St. John's
St. John's

Securidacæ
St. John's

Securidaca peregrina.

Hedysarum
peregrinumScolopendria
leguminosa.

Onobrichis L.

Onobrichis L.



Nataha

IN hoc porro caput inferendam etiam du-
xi, raram, peregrinam & elegantem eam plan-
tam, cujus iconem ad me mittebat anno M.D.
XCIIII. Amplissimus vir Iacobus Antonius
Cortufus Patavinus Patritius.

STATIM verò à radice (quantum videlicet
ex icone nullis coloribus expressâ colligere li-
cebat) se spargebat ea plâta in multos ramos,
fistatos, Securidacæ alterius ramis similes, ad
quos nata erant simili modo alata folia, hoc
est, vicena aut plura uni costæ inhaerentia, &
ex adverso sibi opposita: ex horum autem alis,
prodibât alij ramuli similibus alarâ folijs præ-
diti, qui summo fastigio flores tulerât (ut qui-
dem apparebat, nulli enim expressi erant) si-
mul congestos, deinde siliquas (ut expressæ
erant) quarernas, quinas, aut plures, alternas
quàm omnium quas unquam viderim, formæ,
uncialis nimirum, aut amplioris longitudinis
(si pictura fideliter expressa est) angustas, pla-
nas, & utrinque in ambitu dentatas: quale au-
tem semen contineret, ejus temperamen-
ti esset tota planta, vivit adixne, an quotannis
petiret, nihil erat adscriptum: sed id duntaxat
significabat missam fuisse plantam à C. V. Ho-
norio Bello Medico, qui eam nascentem ob-
servabat in scopulis apud Sebenicium Illytici
urbem.

Ipse autem Cortufus picturæ adscripserat,
Scolopendria leguminosa, vel Hedysarum pe-
regrinum: quod postremum nomen aptius il-
li convenire videtur.

Biennio post mittebat ipse Cortufus plantæ
resiccatae fragmentum aliquot flores & siliquas
resinés, ex quo hanc iconem exprimi curabam.

ONOBRICHIS. CAP. XLIX.

AD Onobrichidis classem reduci posse
existimo eas stipes quas hoc capite de-
scribere institui, quoniam illi quodam-
modo affines esse videntur.

CYBITALES plerumque habet Prior caules,
frequentes (si vetusta sit planta) rotundos, du-
ros, humi procumbentes, in quibus frequen-
tia folia lenti similia, angusta, hirsuta seu lan-
nugine quadam obducta, quindena subinde,
& totidem alia ex adverso uni costæ adhaeren-
tia, uno impari extremam alam occupare, gu-
stu amaro & ingrato: ex alarum cavis exorun-
tur ramuli similibus folijs septi, ex quibus do-
drantales exeunt pediculi fistati, ferè res mul-
tos flores, trifolij florum amulos, oblongi, cul-
los, eleganti purpurâ nitentes, inodoros, cõfer-
tos, & veluti spicâ trium inrerum unciarum
longitudinem æquantem efficientes, nonnu-
quam etiam longiorem, præsertim quando in
semen abeunt, quod bifidis brevibus turgidius-
culis, quibus vasculis continetur exile, nigrum, du-
rum, lapore ingrato ut alia legumina. radix illi
magna, longa, dura, in obliquas nonnullas fi-
bras se spargens, & subinde ad cauliculorum
exortus tecentes fibras agens, vivax & perennis.

Frequentem inveniebam ad Danubij ripas,
supra

supra Pofonium, arido ſolo, apud Petronellam oppidum (quod nonnulli, ex loci ſitu, rudibusque antiquis Carnutum veterum eſſe conijciūt, à Plinio numeratum inter Pannoniæ urbes) ad viarū margines, & frequentiffimè toto illo itinere ad Badenſes thermas tendente, multiſque alijs circa urbem Viennam Auſtriæ locis, tam citra quàm ultra Danubium.

Flores proferebat Maio, Junio, & Julio, interdum etiam Auguſto, quo etiam tempore ſemen maturum legebam.

Onobrichis 11.



Onobrichis 111.



MULTOS ex eadem radice promebat Altera vimineos cauliculos, pedales, nonnullam etiam longiores, humi ſuſos, crebris nodis diſtinctos, & in his alata folia, hoc eſt, tredecim, quindecim, ſeptem & decem, aut pluribus & oblongis foliolis uni coſtulæ inheren- Onobrichis 11.
tibus conſtantia, extremo ſemper impari numero faciente: prodeū deinde ex aliſ te-
nues pediculi ſeu virgulæ, ſoſculos in ſpicam conſertos ferentes, Piſi aut Vicie ſorum for-
mā, ſed longè minores, colore dilutè cæruleo, vel ex cæruleo purpureſcente: his ſuccede-
bant exiles ſiliquæ quaſi duplicatæ, continentes puſillum ſemen reniſ formā, nigrum: ra-
dix miniſ digiti craſſitudinem ſermè æquabat, dura, lignoſa, cōtorta, obliquè ſe ſpargens,
& alrè ſub terra ſe condens, rarique fibris donata, quæ ſummā parte in aliquot capita exten-
derabat, & quibus ſingulis annis novos cauliculos fundebat.

Rara eſt, nam paucas duntaxat plantas inveniebam publica via ſecundū orbitas, inter Natalis.
Schweket & Gözeſtort inſtra Viennam Junio florescentes anno M. D. LXXX. & illum præce-
dente, non procul à Znaim Moraviæ oppido, dum Pragā, & inde per Germaniam in
Angliam proſciſcerer. Eriam in hortum tranſlata florebat toto Julio & ſubinde ſemen
proferebat.

SESQUIVITALIBUS aſſurgebat Tertia ramis, teſtis, firmis, duris, viridibus, in quibus fo- Onobrichis.
lia Lennis, ſive Vicie ſilveſtris, longa, anguſta, duodena aut quindena, & totidem ex adver- 111.
ſo, eidem coſtæ adherentia, uno etiam quod extremæ coſtæ inſidet, impari, lanugine obſi-
ta, gultu ingrato & amaro, deinde nonnihil acri: ramuli extremo caule ex alarum ſinu pro-
deuntes, palmares, ſtriati, in dodranteales ſpicæ ſoſculorum trifolij flores æmulantium, ob-
longiſculorum, pallidiorum deſinebant, quibus impreſſi nigricantes quidam radij: his ſuc-
cedebant ſiliquæ Prioris ſiliquis ſimiles, mucronatæ, duobus valvulis conſtantes, in quibus
ſemen ſemogræco panē ſimile, ſed minus & nigrum: radix craſſa, dura, lignoſa, longa, ali-
quot fibris donata, candicans, perennis.


Valde rara & hæc eſt, duobus duntaxat locis mihi conſpecta, ad Hamburgum videlicet Natalis.
urbem, duobus ſupra Poſonium (vulgo Preſburg) miliaribus, & ad oppidum Fiſchmuſen
ad Fiſcham

ad Fischeham flumen firum paullo supra quàm in Danubium se exonerat, publicâ viâ, unde singulares planas singulis locis duntaxat erubâ florescentes Maio mense, anno M. D. LXXIII. arque biennio post.

In horum translatâ, Maio etiam floruerunt, atque totâ deinceps æstate: Augusto semen, sed ægrè admodum prurulerunt, nimium videlicet propere caducis magnâ ex parte floribus, antequàm in siliquis formari possent, ipsâ planâ, uti coniecio, luxuriante præ nimia soli pinguedine & humiditate.

Onobrichis IIII.

Onobrichis
IIII.



Nata.

Onobrichis.

QUARTA multa folia promit ab eadem radice, Lenticulæ aut Tragacathæ folijs proxima, uni similires costæ inhzrenna, molliora tamen, viridia quidè illa, sed lanugine quadam candicante pubescentia, lenro primum gustu, deinde nonnullam amaritudinem relinquente, postremò linguam vellicante: nascuntur inter foliorum alas cauliculi serè dodrantes, supini, exiles, quadam lanugine obducti, aliquot stoculis onusti, vicè bilvestris aut lenticulæ florum magnitudine, colore ex cæruleo purpurascènte: quos excipiunt siliquæ pusillæ geminis cellulis constantes, semine (quod cum adhuc immaturum esset, probè non potui observare) plene: mulas ex eadem radice, quæ longa crassiusculâque st, & ubi quas fibras agit, propagines & ramulos dodrantes, humi fusos, in laiera emittens.

Crescit in summo Sneberg jugo, atque in Etscheri summis scopulis, quibus duobus locis florēt & siliquas jam formatam erubam Augusto.

Nec minus forsitan rara erit, quam Britannicâ anni M. D. LXXXI. peregrinatione, Londini in doctissimi viri Ioannis Rehart pharmacopæi Regij orto nascentem videbam, ad descriptarum hoc capite stirpium classem proculdubio referendam, cum proximè ad Quartum genus accedat.

Similima etenim habebat folia, mollia, incanâ lanugine pubescentia, ut Tragacanthæ legitur: tota, & eodem modo uni costæ inhzrenna, quindena & plura, interdum etiam vicina quina, uno extremam costam occupante: cauliculi tamen in hac oblongiores sunt, fusco cortice recti, leni, fractu còtumaces, humi fusi, & plerumque nudi, qui extremâ parte frequenter ramulos suis alaris folijs onustos proferunt, & in unciali villosâque pediculo multos stoculos in caput & globum congestos, Tragacanthæ floribus proximos, candicantes, deinde membranaceas siliquulaservi siliquulis minores, & Dorycnij vulgariter nuncupari sive Hispanici valvulæ pares, singularia semina fœnogreco similia continent.

Florebat Iulio & Augusti initio: semine deinde Londino ad me misso & terræ commisso natæ planæ, quæ feliciter & flores & semen insequente anno protulerunt.

A nullo tamen descriptas fuisse has stirpes existimo, ante quàm Plantarum in Pannonia viciniquè Provinciis observatarum historiam in lucem emitterem: nec etiam nomen vulgare ullum aut facultates à rusticis vel alio quopiam intelligere tum licuit.

Si quis verò non inter Onobrichides, sed inter Astragali congeneres plantas, præsertim duo postrema genera, cum quibus magnam similitudinem habere videntur, referre malit, Astragali sunt: prior Alpinus, alter peregrinus.

Astragal.
alpinus.
Astragal.
peregrin.

GLAUC.

CAP. L.

Glauc. Dio.

MULTAS plantas Glaucis nomine, à Recentioribus proponi, & describi non ignoro: nullam tamen adhuc (meo quidem iudicio) magis ad Glaucis historiam à Dioscoride traditam, respondentem videre memini, eâ quæ à me hic exhibetur.

TERNIS autem, vel quaternis à radice assurgit cauliculis, dodrantem altis, gracilibus, incanâ lanugine pubescentibus: folijs serie quadam secundum costæ longitudinem utrinque digestis, live ala foliorum illos vestiente, Onobrichidis, aut Astragali prioris in modum, mollionibus tamen, supernè virentibus, infernè canâ lanugine obstitis, gustu nonnihil amaro: stoc-

Glaux Hispanica.

Tribulus terrestris *πρίνος* Theoph.

SALMANTICENSIS ejus decoctum ad pituitam crassosque humores incidendos & euacuandos felici successu clysteribus iniiji prædicabant: cum tameo Galeos terream & frigidam qualiteram Tribulo terrestris tribuat, Dioscoridem nimirum secutus.

TRIFOLIUM SPINOSUM Creticum.

CAP. LII.

PRORSUS novum & elegans est hoc Trifolij genus, à quo stirplum quæ inter trifolia recenseri possunt, historiam auspiciari volumus: certè mihi ante annum uoægelium

XX

tertium

ro: flos extremo cauliculi innaſcit: ut confertus, capituli, ſpicæ brevioris & obtuſe iſtar, Glycyrrhizæ vulgaris florum forma, & colore perquam ſimilis: radix candicans eſt & exilis, quæ, an vivax ſit, aſſerere nequeo.

Nuſquam enim albi, quàm ad ripas fluminis Thormis Salmanticæ alluentis, paullo infra eam urbem obſervabam, nomine vulgari carentem, menſe Junio: verùm is locus procul à mari diſtat, juxta quod Dioſcorides Glaucem naſci tradit.

ΓΛΑΥΞ, λανξ perinde atque Latinis Glaux appellatur hæc planca: quæ appellatio, ſi quibuſdam minus probabitur, petim itant quæſo Glaucem Hispanicam à Cluſio nuncupari gauiſſer, donec magis aptum nomen ioveniret.

DIOſCORIDES porro Glaucem cum hordeaceâ farinâ, ſale & oleo coqui ait in forbitone, ad revocandam extincti lactis ubertatem.

TRIBULVS TERRESTRIS.

CAP. LI.

HERBA eſt Tribulus terreſtris, multis viculis gracilibus, humi ſtratis, prælongis, cubitalibus plerumque, quas frequentes nodi diſtinguunt, prædita: quibus adnaſcuntur alata folia, ſeu numeroſa foliola uni coſtæ inhxrentia, Cicetis foliorum iſtar, quibus valde ſimilia ſuot, ſubacri guſtu cum quadam adſtrictione flores ex ſingulis foliorum alis naſcuntur longi petiolis innixi flavi, Potentillæ flonbus formâ pares, ſed minores: fructus ejus quinquepartito diviſus (quatuor autem ſpinis ſingulæ diviſuræ quæ gibbæ & dorſo eminenti ſunt, conſtant) ſub folijs latens, io quo rotidem ſemina: radix interdum minimi digiti craſſitudinem æquat.

Ad arborum ſemitas, io quibus Meloſepones Salmanticæ ſeruntur, frequentiffimè provenientem reperiebam, hortulanis valde moleſtum & exolum, quoniam fructus ejus (qui per maturitatem facilè de plârâ decidit) firmis aculeis pedes illorum oudi graviter offenduntur. Florebat iſtic Julio, ſemen verò Auguſto & Septembri maturum. Memini etiam olim Mompeliano agro obſervare, ſub iſtis ſerè urbis mœnibus inter oliveta.

Eſſe autem hanc plantam Dioſcoridis τριβύλος χερσίων, id eſt, Tribulum terreſtre, aſſignare noo velim: ſed optimè quadrare videtur alteri ex terreſtribus Theophræſto deſcripto lib. vi. Hiſtoriz Plantarum cap. v. πρίνος videlicet, tametiſi hic non ſit valde præcox, locis ſaltem quibus ſponte naſcentem obſervabam. Hiſpani αβρὴας appellabant.

Natalis

γλαύξ

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris


Natalis

τριβύλος χερσίων

τριβύλος χερσίων

αβρὴας

Trifolium spinosum Creticum.



Medica legitima.



Medica legi-
tima.

ættium supra millesimum & quingentesimum non confectum: ejus primam cognitionem acceptam fero doctissimo viro Petro Speltherio R^{mi} & Ill^{mi} Electoris Moguntinensi Medico, qui ejus ramum, brevem quidem, sed secundum radicem telissum, & pluribus alijs ramulis præditum, suisq; floribus & capitulis onustum sub Augusti finem, Moguntia usque Francofurti mittebat paulo ante meum ex cæ arbe discessum, quem in tabellâ lignea statim exprimi eutabam, ut hic proponitur. Nata autem est ex eaplanta Moguntia in R^{ma} ejus Celsitudinis horto, semine ex Italia quidem misso, sed Cretâ accepto.

H v m t autem sparsa fuerat in orbem tota planta, teouibus ramis quad angulis (qui frequētibus geniculis ex viridi purpurascētibz eiusdē erant) prädita, ad quē utnoque sibi opposita nascebantur terna foliola un petiolo oblongulculo & plano inhiarentia, angusta, crassifusula, vitrida, mucronata, prominentibus in singulis nodis seu geniculis, quatuor spinulis, binis superne, totidē inferne spectantibus: in singulis tamulorum alis nascuntur singulares flores, quinque foliolis constantes, coloris purpurei, aogallidis floce majorez, quorum medium occupant decem ita micula flavo apice prädita, capitulo intet ea latente, quod teporis succellu, in quinque angulos five piones formatur, ut i cerream clavam (qualem avorum nostrorū ætate equites gestare solebant, & adhuc Vogari gestāz speciem quodāmodo testat: ea deinde capitula, incurvato petiolo sub tamis se condūt, & matura, in singulis aogulis seu pinnis, unicum scmen continent, planum, nigrum: qualis sit ejus radix, me latet: nam cum unica esset, ei qui tamū mittebat, nata planta, erue- re noluit. Tota autē m, ^{perisperm} ^{perisperm} est, & frequētissimis tamulis prädita.

Diffidens autem Francusfuto, nonnulla
femina ab Honorio Belli & Creta accipiebatur
evante Illuftri viro, eodemq; eruditiffimo &
humaciffimo Ioanne Vincentio Pinello, ioter
que genus unâ debitorum nomine, è quo
terraz commiffio infulcente Vere, nata Lugo-
dari Batavorum planta, illi, cuius modò hi-
ftoriani fcripti, profus fimilis: verum cum eâ
aeflate in gravidiffimum motum, qui me fetè
fulfult, incendifsem, ipfius plantæ reliquas nos-
tas plenius obfervare non potui.

Σ Ε ο cū multis notas Tribulo terreſtri Dioſcoridis non repugnantes habeat (liceat quæſo liberè & ſine præiudicio meâ opinio- nem in mediū adferre) hærebâ, an legitimus Dioſcoridis τριβύλος χαρακτηρῆſſet, aut ſal- tem ad genus ejus aliquod terreſtri poſſet.

MEDICA FLAVO FLORE.

CAP. LIII.

LEGITIMA Medica non modò vatijs Hispaniæ locis sponte efficit: sed etiã plerisque diligenter colitur in pecudum pabulum, sed maximè equorum, vice fœni, ut quod, propter

Medica flavo flore.



Medica marina.



nio descriptum, esse mihi persuaderem: multas enim habere videbam notas, quæ ad Helenium illud accommodari possent, ut sunt cauliculi interdum cubitales, per solum diffusi &

propter ubertatem, singulis annis aliquoties demeti possit. De illâ autem nobis non est sermo (nam à plerisque tradita est ejus historia) sed de aliâ quadam sponte etiam nascente, quâ in meis peregrinationibus observabam. Placuit tamen legitime iconem Lectoris oculis eriam subijcere.

MULTOS porro Medica, de quâ nobis sermo, ex eadem radice proferit ramos cubitales, aut longiores, humi plerumque fufos, reteres, viminales & flexibiles; in multas alas divisos, folia terna uni petiolo inhzrentia, Legitimæ Medicæ folijs respondentia, & dorso eminente, sed longè minora: flores in extremis ramulis confertos, alterius floribus formâ pares, flavo tamen colore, non inodoros: cornicula deinde plana contorta, corniculorum legitimæ Medicæ instar (quæ perperam à pictore fuere expressa) angustiora tamen quam illa: in quibus grana sativæ granis similia continentur, sed paullo minora: radix legitimæ radici par, crassiuscula, latè sparsa, fibrosa, perennis, singulis annis novos caules proferit.

Nascitur tota Pannoniâ, Austriâ, Moraviâ, & quibusdam Bohemiæ, Norici, Franconiæque locis. Floret autem Junio & Iulio.

MEDICA MARINA. CAP. LIIII.

CAULES sive ramulos habet hæc Medica tres aut quatuor pedales, humi fufos & procumbentes: folia trifolijs, aut Cynsi Maranthæ folijs minora, quæ, cû ramulis, tomentosa lanugine obsita sunt: flores extremis ramis inhzrentes suis petiols, ex alarum sinubus exiliunt quini aut seni simul congesti, Medicæ aut Sertulæ campanæ florum formâ, coloris flavi: siliquæ deinde glomeratæ & contortæ sive inflexæ, in quibus semen continetur subrotundum, Medicæ semini simile: radix crassiuscula, perennis seu vivax, ex candido pallefeit.

Provenit hæc passim in Hispaniâ & Galliâ Narbonensî, ad Mediterranei maris littora: inveniebam etiâ in Oceani littore, ad Tagi fluminis ostium, ad D. Ioannis propugnaculum nondum tunc absolutum, & Caccays, sub Olyssipone Decēbri florentem anno M. D. LXIIII, Floret alioqui æstare & Autumno, & subinde semen proferit. Apud Belgas lata, à quibusdam rei herbariæ studiosis colebatur ante meum in Austriam abitum, longioribus tamen ramis, neque adeo densâ canavæ lanugine obductis (ut pleræque stirpes è suis natalibus transplantæ, degenerare solent) serius etiam florebat, & raro semen dabat.

MARINAM Medicam nuncupabam, quod Medicæ cû sit similima, maritimis locis Meridiei præsertim obversis nascatur.

Cû anno M. D. LI. in Galliæ Narbonensis maritimis eam plantam primùm conspicerem & legerē, parum absuit, quin Helenium Ægyptium Cratevæ Dioscoridi cap. de Hele-

repentes, folia Lenticulæ numerosa & crebra, radix minimi digiti crassitudine æquans, pallidiuscula, per ima tenuis, superne crassior: præterea, quod in maritimus nasceretur. Nam licet Dioscorides corticem nigrum radiei attribuat, in Cratæ exemplari nō inveniri Angulata scribit. Nihil tamen in re dubiā affirmo.

Facilitas.

CETERVM Ægyptij Helenij radicem in vino potam, contra serpentium idūs auxiliari testis est Dioscorides.

OXYTRIPHYLLON quorundam.

CAP. LV.

Oxytriphyllon
Seribonij
Lotum silvestre.

DV M Mompelij vivebam, Trifolij genus cubitale aut amplius, & quodammodo fruticans observare memini ad lævam pontis Iuvenalis quā ad Grammontiam silvam iter est, ad Ledi fluminis ripam, quod nonnulli Oxytriphyllon Seribonij nuncupabant, aliqui Lotum silvestrem: nec defuerunt qui inter Cytisi genera referrent.

Oxytriphyllon
duplex.

SIMILEM porrō ferē plantam (si non eandem apud Granatenſes observabam cubitali altitudine, & multis ramis præditam, per quos secundum nodos & ramulorum divaricationes sparsa erant terna semper folia, uni petiolo inhzrentia: flores summis ramis nascebantur, pusilli, candicantes, in globum quodammodo congesti: quibus succedebant cornicula sive lobi semen exile rotundum, nonnunquam oblongiusculum continentes. Ejus autem plantæ duplex erat genus: unum candidioribus ramis & alba radice: alterum caule & ramis ex albo purpureiscentibus, similiter & radice, quæ tamen in quibusdam plantis magis rubere videbantur.

Perempſana
Arabum.

Eositas.

Facilitas.

Lotum fructu
coquo.

Granatenſis quidam Medicus Lagopum esse volebat, refragantibus tamen notis. Ioannes Plaça Medicus & Professor in Academia Valentini (nam & Valentino regno frequentem observabam) Perempſanam Arabum vocabat, eamque duplicem faciebant: primam humidis nascentem, Granatenſi similem: alteram montanam lanuginosamque. Granatenſes Mauricani *Enevar* suā linguā appellabant, & ex utriusque radice, quæ satis crassa, & magnæ adstrictionis participes est, præsertim autem ex rubescente, scrapius conficiebant ad dysenteriam utile.

Hujus Semen deinde ex Italiā missum Loti fruticosi nomine & natæ ex eo plantæ.

Lotum præter
siliquosum.

TRIFOLIUM autem genus illud teretibus viticulis humi sparsis, flore pisti pallido, satis magno, folijs perpetuo ternis uni pediculo inhzrentibus, & molli lanugine pubescentibus, rariis per viticulas sparsis, quod Mompelliani, dum istuc vivebam, à siliquarum magnitudine, Lotum pratensem siliquosum cognominabant, maxime frequens est in omnibus Pannoniæ & Austriæ pratis: sed Narbonensi paullo durius, quantum quidem mihi videbatur.

Lotus siliquosus rubello flore.

Lotus siliquosus
rubello flore.



Pisum rubrum.

Lupinus ruber.
περσικαίτης
βίος.
περσικός.
πτερυγίδης.
περσικός.

Sandalida.

ILLIVS verò genus invenitur frequentioribus ramis præditum, humi ut plurimum fufis, quorum extremitates nonnihil esse attollit, in quibus hinc inde sparsa sunt folia terna semper uni petiolo inhzrentia, mollia & quadā lanugine pubescentia, ex quorū alis, breves crassiusculique oriuntur pediculi ternis etiam folijs paullo minoribus præditi, binos ut plurimum flores sustinentes, florum Vicie æmulos, eleganti colore præditos, qui ad sericum villosum saturè rubrum accedit: illis succedunt longiusculæ siliquæ seu lobi, supernè & infernè binis alis satis magnis ac sinuosis præditi, quibus resiccaris, lobi quadranguli quodammodo apparent, granā continent, rotunda, cineracei coloris, pīso minora: radix annua est, quam subsequens hiems tollere solet.

Noriberge primum genus illud videbam anno M. D. LXXIX. in horto Oellingeri pharmacopœi & aromatarij ejus urbis: ipse pisum rubrum nuncupabat: postea missum fuit ejus semen Lupini rubri nomine, licet ejus planta Lupino prorsus sit dissimilis: nonnulli τετραπυγίδης & τετραλόφον cognominarunt ob siliquam quatuor alis sive cristis præditam: non minus aprè tamen πτερυγίδης & τετραπτερίς forsitan appellare liceret. Postremo ex Italiā missum aliquoties ejus semen *Sandalida* appellatione.

CRESC.

CRESCEBAT etiam in eisdem Oellingeri horto Trifolij quoddam genus satis amplis folijs pro plantæ exiguitate, quod à magnis & membranaceis vesiculis quibus semen cum suo pericarpio continetur vesicariam appellabant, etiam Mompelij, ubi in nudis & petrosus quibusdam collibus cum Hyacintho autumnali minore aliquoties erueri memini. Id postea plerisque Germaniæ hortis vulgare factum.

TRIFOLIUM MATVS.

CAP. LVI.

VARIA sunt Trifolij genera: sed tria majora, spicæ forma & floris colore inter sese differenteria passim in Pannonia & vicinis Provincijs nascentia observabam.

Trifolium majus I.

Trifolium majus III.



PRIMUM ternis, aut quaternis interdum assurgit virgis aut cauliculis, pedalis, firmis, rectis, teretibus, circa quos nascuntur rara folia, oblonga, angusta, dura, nervosa, carinata, & dorso elatiore, terna semper ab uno exortu prodeuntia, ut in reliquis Trifolij generibus, incana, in ambitu velut dentata, ab radice frequentiora, & majora: flores extremis ramulis, in quos cauliculi separantur, inhaerent parvi, frequentes, conferti, & spicam quodam modo formantes, albo colore, & nonnullo odore præditi: radix vivax, minimi digiti crassitudinem æquans, fusco & denso cortice testâ, longa, aliquot fibris donata est.

II. non valde dissimile est Alterum genus, vel amplitudine, vel formâ: folia tamen paulo angustiora, & crassiora flosculorum, qui confestim nascuntur, spica, eaq, summo caulis fastigio inherens sine ullo petioli vestigio, & quasi inter folia latens, cui plerumque adnascitur alia brevior, rarissimi tertia: flosculi verò differunt colore, qui non albus est, sed ruber, & odore cujus sunt expertes: radix, prioris radici ferè par.

MAJORE multò crescit Tertium altitudine, quæ plerique cubitalis est: caules etiam habet crassiores, nodosos: folia ex singulis geniculis alternatim prodeuntia, longa, striatâ, que, dorso magis eminente & elato, laxâ quadam veluti vaginâ in binas appendices desinere, caulem amplectentia, d einde terna numero ex eodem petioli nascencia, superiorem duplo longiora, illis tamen non minùs dura, & per oras denticulata, gustu nonnihil adstringente: huic spica oblongior, & major, elegantissima, rubrorum flosculorum è caliculis hispids emergentium serie composita: radicem habet superiorum radici similem, vivacem, & singulis annis plures caules proferentem.

2. Hujus generis alia est species, quæ vel magnitudine vel foliorum & florum formâ aut colore,

Trifolij maioris III. altera species.

Natalis.

Esoffet
Esoffet.
Cytisus
Tragi.
Lagopus al-
ter Lobelij.

Lobere.



Lagopus maximus Lobelij.

Lagopus ma-
ximus Lob.Lagopus fi-
lifolius major.

colore, nihil, aut quàm minimum differt: folia tamco angustiora illorum longitudinem aliquantulum excedere videntur, & florum spica longior esse.

INVENIUNTUR non modò in Ham-
burgenfi Pannoniæ monte, & illi vicino Prel-
enberg, fed alijs etiam Pannoniæ & Austriæ,
Stirizque mootibus alpestribusque pratis &
silvis, secundum & tertium utrumque genus
præfertim: priora etiam duo geoera, siccio-
ribus pratis Vienoæ vicinis, tum pariter in
Moraviâ & Bohemiâ. Florent Maio
& Iunio.

TRAGVS Tertij generis alteram speciem
Esoffet Esoffet, hoc est, magnum hircium trif-
folium, & Cytisum appellavit: Lobelius, alte-
rum Lagopus nuncupasse videtur. De eo au-
tem quem Lagopus maximum vocat, pro-
ximo capite Deo volente agemus. Vngari por-
tò vulgare Trifolium *Lobere* appellant, quia
equis in pabulum cedit.

LAGOPVS MAIOR.

CAP. LVII.

QVEM Lobelius Lagopus maximum
vocavit, Belgicè ptimum innotuit An-
no M. D. LXX. C. V. Alphoofi Pancij muore,
quiejus semè dum Machliniæ viveremus mit-
tebat, è quo nobis tum natæ plantæ, quæ cùm
annuæ sint, & marurius suum semen perficiant,
spontaneâ satione genus suum tum istic, tum
toto Belgio hæcous conservarunt.

MVLTÀ autem illi Trifolio seu Lagopo,
statim à radice prodeunt folia, terna simul in
oblongo pediculo oascenria, pæne orbicula-
ta, mollia, dilutius virentia; inter quæ peda-
lis aut amplior oonnunquam affurgit caulis,
in aliquot ramos divisus: sub quibus ad oascun-
tur similia folia, non aded tamen orbiculata,
sed paullo longiora: extremis ramis insident in
quinque lacias angustas divisi utriculi, in
longiusculum caput, seu spicam coogesti, è
quibus emergunt flosculi coloris elegantissi-
mi, ex purpura rubri: quibus excussis, succe-
dunt in utriculis femina, in singulis singula,
flavescencia, rotunda, crassiuscula. Floret
totâ æstate, nonnunquam etiam in Autum-
num usque, & subinde semen profert, quod
sponte decidens, etiam ante brumam novel-
las plantas procreat, insequens anni æstate
flores daturas, ut Lugduni apud Batavos ob-
servabam.

ALIVO portò Lagopi maioris genus, se-
mine ex Hispanijs accepto natum, cujusico-
nem ad me mittebat Iacobus Plateau: Id uni-
cum fert caulem gracilem & satis firmum, no-
dis quibusdam distinctum, & in aliquot ra-
mos divisum, nascentibus ad singulos nodos
pediculis, satis laxâ sede caulem & ramulos
amplectentibus, quorum extremis terna insi-
dent folia ut in supetiore, non orbiculata ta-
men, sed

Lagopus angustifol. Hispanicus.

Trifolium pratense Salmantic.



Hepatica trifolia czrul. flore.



men, sed longiuscula & angusta, carinata, five dorso elanore, canescentia instar foliorum vulgaris Lagopi: summi rami desinunt in longas caliculatorum spicas, quibus emergunt flosculi vulgaris floribus formâ similes, & tere concolores, hoc est dilutè rubentes.

Simile, vel forte illud ipsum genus obser-
vare memini Salmanticensi agro, dum in eâ urbe vivebam, ad vinetorum aggeres.

TRIFOLIUM PRATENSE Sal-
manticum. CAP. LVIII.

LICET non multum à Belgico vulgari Trifolio differat illud, quod passim in pratis circa urbem Salmanticam nascitur: quia tamen quasdam notas habet dissimiles, illius historiam negligendam esse non existimavi.

Cauliculis autem est pedalis, quin aut
senis, humi sparsis, folia terma simul conjun-
cta habet uni petiolo inhaerentia, uti Belgi-
cum, minora tamen, in ambitu serrata, & par-

và lividiusculâ maculâ insignita: virgulæ teretes ex alarum sinubus prodeunt, sustinentes capicella flosculorum elegantissima purpurâ rubentium: quibus succedunt membranacei folliculi, & in his semen exile subrufum: radix qualis in vulgari Trifolio.


Totâ æstate floret. Hispani, *Trebol de prados*, & simpliciter etiam *Trebol*, quemadmodum & cetera Trifolij genera, vocant.

CETERVM, quoniam in Trifoliorum historiâ versamur: obiter etiam meminisse hoc loco libuit Plantæ illius, quam nonnulli Trifolium nobile, vel Trifolium aureum (ad imitationem Germanicæ appellationis *Eulben Hae*) & Hepaticam trifoliam appellant.

Trebol de
prados.
Trebol.
Trifolium
nobile.
Trifolium
aureum.
Hepatica
trifolia.
Eam

Hepatica trifolia rubro flore.

Hepatica trifolia cæruleo pleno flo.



que varietas Eam flore vel cæruleo. vel ad violaceum tendente alunt Belgici horti : alunt & flore rubello & albo munere Alphonſi Pancij, qui nobis urramque mitrebat Machliniani : atque *prodr. p. lly* flore cæruleo, bis aut ter : sed quæ nunquam comprehendere voluit.

Natalis. Omnes autem, præter eam quæ pleno flore est, Viennensi agro sponte nascentes observabam. Nam Viennensis saltus, & cæruleam præcociorem, & eam quæ florem ad purpuram tendentem habet paullo serius florentem, alit, tum illas quæ incarnaro sive rubello, tum albo sunt flore, ubi aliquot earum stupes eruebam anno M. D. LXXIX. arque eam quæ

Hepatic. tri. fol. albiflora. niveo prorsus est flore (diversam ab ea quæ à Pancio mitrebat) prius apud Gatingam cœnobium Cartusianorum. Priores verò duæ, non modo Viennensi agro, sed in omnibus Pannoniæ & Austriæ inferioris silvis abundanter proveniunt: quæ autem rubello est flore, apud Nissam Siliciæ, & Ienam Thuringiæ etiam sponte nasci ab amicis intelligebam: at albo flore præditam apud Sabaudos, superaro monte Senis, qua iter faciunt qui ex Italiâ in Galliam proficiscuntur, non procul à pago Lunenburg, frequentissimam nasci mihi referebat D. Balrhafar à Nerden Medicus. Anno autem octogesimo sexto supra millesimum

Hepatic. tri. fol. cæruleo pleno flore. & quingentesimum & sequentibus, jam venalem proponere exeperant satis frequentem Viennensi foro rhizotomæ mulerculæ è montanis silvis erutam. Post meum verò Viennâ discessum, invenna est apud arcem Starnbeg Mag^{us} Domini de Heusenſtain in silvis illis quæ ab illâ arce ad Niveum montem extenduntur, etiam illa quæ pleno est cæruleo flore, ut ipsius Dn. de Heusenſtain uxor Francofurtum ad me perferrebat, quin & florem illius, ne dubirarem, papyro involutum & e pistolæ inclusum mitrebat, brevi additura dimidiâ ejus plantæ (quam unicam habebat) partem, nisi Turcicum in eâ Provinciâ bellum fuisset exortum.

OXYIS FLAVO FLORE.

CAP. LIX.

Oxyis flavo flore.

AD Trifoliorum etiam classem pertinet hæc elegans plantula, quæ ramulos dodrantem pedis longos habet, interdum longiores, graciles, rotundos, rubentes, nodulos, per terram repentes, & subinde ad singulos nodos radices agentes, novôque furculos & ramulos proferentes: folia illi oxydis vulgaris. rerna in singulis petiolis, sed minora & ex palido virentia, acidi saporis, quæ sub vespere, aut ingruente imbre, complicantur, & veluti in umbonis cujusdam figuram coeunt: flores in oblongis pediculis terni aut quaterni simul enascuntur,



Muscus terrestris Lusitanicus.

enascuntur, quinque foliolis stellatim decussatis conspicui, vulgari minores, flavi coloris: quibus succedunt oblongiora mucronataque capitula, sive cornicula, semine exili, rufo, plena, quod (per maturitatem dehiscentibus corniculis) exilit, & recentes plantulas, insequente anno flores & semina prolaturas, generat: radix tenuis & capillata, singulis annis perit.

Vmbrosis quibusdam circa Hispalim locis nascitur: olim similem etiam videre memini, Mompelji in horto D. Guichardi, professoris Medici in illa Academia, quem in urbe quidem, sed ad moenia situm colebat, in quo & Cyclaminum folio hederaceo & anguloso conspiciebam.

Apud Belgas, atque aded in omni solo fata, provenit. quin & semel fata, postquam florero coepit, tota deinde ætate flores producit, & semen fert: plantæ tamen omnes, ut jam dixi, hiemis inclementia pereunt: sed & semine deciduo renatæ (si rigida hiems subsequatur) plerumque corrumpuntur, prorsusque genus interit, frigidioribus præsertim regionibus.

OXYOIS Plinio, ut putant, dictæ, genus est hæc planta, quam terna habere folia, & ad dissolutorum stomachum dari, atque adversus enterocæcen edi, lib. XXI. cap. XII. scribit.

Oxyo Plin.
tertia facula
ita.

MYSCVS TERRESTRIS.
Lusitanicus. CAP. LX.



TENERRIMA herbula est hic Muscus, dodrantalibus aut pedibus interdum repes viticulis filo tenuioribus, numerosis utrinque adnatis ramulis in obliquum expansis, & subinde capillaribus quibusdam, quas producunt, fibris, terræ inhaerentibus. Omnes autem viticulæ rectæ sunt frequentissimis foliolis, sive squamulis potius tenuissimis & tenerrimis, pulcherrima serie digestis, dilutioneque & quodammodo pallecente viriditate præditis, tactu quidem mollibus, sed veluti ficcis, adstringente gustu, cui tamè grata quædam dulcedo admitta sit.

Muscus ter.
repes Lus.
tenuis.

Nusquam hoc Musci genus mihi conspectum, quàm in umbrosis aggeribus Olivetorum, ad Colibriam Lusitaniz urbem, & Academiam totius regni celeberrimam, vulgo Coimbra dictam, trans flumen Mondego, Latinis Munda nuncupatum, non procul à deserto quodam facello, in colle sito, juxta quod linum silvestre latifolium alterum legere me dixi, & pone ipsum facellum, Ruscum suis bacis occultum observare memini.

Natalis.

PELAGICÆ quædam & AQUATICÆ plantæ.

TRADITA Terrestrium stirpium historia, pro Coronide Sexti & Plinii meorum Observationum Libri, plantar quasdam adicere volui, quæ in mari & aquis nasci gaudent: inter quas primum locum obtinebunt tres elegantes peregrinæ me misse.

MYSCVS

Muscus marinus.*Palmaria Theophr.*

HARVM prima, Musci marini genus quoddam videtur, quatuor unciarum, aut paulo amplioris longitudinis, in frequentes & late sparsos ramos divisum, qui deinde in alios plures minores & multifidos desinunt instar foliorum Chamæmeli, vel si quæ sint illis minora aut tenuius incisa, molles initio, & flexiles, transparentes, si lumini opponantur, virides infimâ parte, supremâ verò purpurascens: sed nec resiccata plantra, licet asperior siccitate reddita, valde fragilis est ut Corallina vulgo dicta, tamen ad ejus aliquod genus quodammodo referri possit, saporem tamen valde salsum retinens, &, si aquæ immergatur & aliquantulum macetetur, denuo mollescens.

Illam Neapoli ad me mittebat Doctissimus vir Ferdinandus Imperatus anno M. D. XCII. *Palmaria marinis* Theophrasti appellatione: sed quisquis VII. cap. lib. IIII. Theophrasti de Historia Plantarum leger, & *Palmaria marinis* historiam eo capite descripsit, diligenter expendet, nullas hanc habere notas cum *Palmaria marina* convenientes comperiet: & forsitan ad *Bru* genus quodpiam potius esse referendam, pronuntiabit.

LICHEN MARINVS.
CAP. LXII.

*Lichen marinus.**Lichen marinus.**Sertularia.**Cornelia latifolia.*
Osmia marina.

PALMARES habet elegans hæc Planta ramulos, quæquæ versum in læta expansos, foliaceos, quia singula folia alia pariunt vel singularia, vel bina vel etiam tria interdum, & illa deinceps alia, sic ut tota planta ramulis prædita sit, qui folijs super altero insidentibus constant, ipsæque planis & orbiculari formâ præditis, sibi invicem autem ita connexis, ut tenui aliquo filo vix conspicuo duntaxat trajecta videantur, admirando spectaculo. Infima porro folia, quæ saxi adhaerent, fusci sunt coloris, reliqua candicant, extima (ut quæ novella) diluvius virent: omnia verò splendent & lævia sunt, etiam inter chartaceas paginas aliquot annis adservata: vetustate tamen lavorem illum pristinum amittunt, & rugas contrahunt, asperioraq; fiunt, salsedinem autem retinēt.

Eam etiam ad me cum superiore Neapoli mittebat Imperatus, iconem verò infeliciter expressam, Amplissimus vir Iacobus Antonius Cortusus, curante Illustri viro Ioanne Vincentio Pinello. Imperatus quidem, adscripto *Sertulariæ* nomine, quia veluti serum aliquod aut corallam ipsius folia ita connexa representant: Cortusus verò è *Corallina* plantam accepisse scribebat *Corallina latifolia* appellatione: nomen autem illi imposuisse, *Opuntia marinis* littoralis & saxatilis, satis (meâ quidem sententiâ) commodâ ratione. Nam Theophrastus libro I. capite XII. *Histor. Plant.* scribit circa *Opuntiam* herbulam

herbulam esse quandam, quæ ex folijs radicem mittat, ac cum suauitate mandi possit. Plinius verò ipsum sequutus, lib. Naturalis Hist. XXI. cap. XVII. circa Opuntem, inquit, Opuntia est herba, etiam homini dulcis: mirumque, è folio ejus radicem fieri, ac sic eam nasci. Et certe credibile est, hanc plantam recentem cum aceto, sale & oleo, vel etiam sine sale, non minus suauiter edi posse, quàm portulacæ marinæ & similium folia.

CETERVM qui Cortulo plantam è Corsicâ in sulâ mittebat, & Corallinam larifoliam nuncupabat, addebat, ipsam faculratibus eam pollere, quibus reliquæ Corallinæ.

Opuntia herba.

Faculrati.

MYRIOPHYLLON PELAGIVM Cortusi.

CAP. LXIII.



SUPERIORIBVS non minis elegans & peregrina hæc Planta, cujus iconem, cum caulis infimâ parte & radice, ab eodem Cortuso accipiebam anno M.D.XCII.

QUANTVM porro ex ipsâ picturâ conjicere licebat, fuerat hæc planta cubitalis altitudinis caule recto, satis tamen gracili, prædita, in plures ramos, seu potius, ut Pliniano utar verbo, ramulosa folia diuiso, foliorum filicis penè formâ & effigie, sed longè tenuiora, nutantia instar ramorum Palmæ, colore pallescente, summus caulis minoribus folijs obfusus delinebat in nuculas qualdam veluti in caput congestas, quæ nullum aliud semen continere deprehensæ sunt, quàm tenellas plantulas jam formatas, matris facie similes, quæ cadentes infimum mare petunt, deinde crescunt, & in eandem magnitudinem evadūt, quam matres obtinent: ipse caulis quàm plurimis tenuissimis & plustquam capillaceis fibris, tanquam radice nixitur, non super saxis, aut oliteorum testis, ut pleræque aliæ pelagicæ plantæ, sed super arena aut luto in imo maris sito: fragilis est caulis non minis quàm vitrum aut Corallina, dum siccus est: at viridis, & terræ adhuc inhærens, lentus est & flexibilis instar sparti.

Myriophyllum pelagicum.

Nascitur in altissimis gurgitibus maris Illyrici, unde piscatores extrahunt barmis & instrumentis, quæ ipsi *sperte* appellant. Tota planta etiam exsiccata, falfedinem suam retinet.

IPSE Cortusus valde apto nomine Myriophyllum pelagium appellavit. Piscatores verò *Penachio delle Ninfe*, & *Palma di Nettuno*, quidam etiam *Settaro di Nettuno* nuncupabant.

Penachio delle Ninfe. Palma di Nettuno. Settaro di Nettuno. Faculrati.

REFEREBANT præterea utilem esse adversus morsum omnium serpentum marinorum, & virulentos ictus piscium: applicatam supra levia recentia vulnera, ea viginti quatuor horarum spatio curaret: Cortusus autem ejus periculum fecisse scribebat, ad vermes necandos & ejiciendos, illamque non minoris esse efficacæ deprehendisse, quàm quævis Corallina, etiam minore quantitate datam.

MYRIOPHYLLON AQTATICVM minus.


CAP. LXIII.

VULGARE admodum est in Pannoniæ, Austriz, vicinarumque Provinciarum fluvio, quorum aquæ versandarum molarum causa tetinentur, Millefolium illud aquaticum flore albo, à Neotensis descriptum.


Millefolium aquaticum.

SED in lacunis secundum rivos sitis, nec profundis, exiguum aliud genus observabam, latè se fundentibus scapis præditum, qui rotundi, virides frequentibusque nodis intercepti sunt, è quibus tenues capillaceæque fibræ spargit, quibus telluri inhæret: superior scaporum pars palmum supra aquas eminet, quam ad singulos nodos quinque tenuium parvisque foliolis præditorum foliorum alæ ambiunt, vix unciam longæ, virides admodum, quæ sensim circa scaporum summitatem minuuntur, sic ut in pyramidalem quasi formam scapi definant,

Myriophyllum aquaticum minus.



Tribulus aquaticus minor.



Tribulus terrestris.

definant, qui summo fastigio totidem flosculos, quor foliorum alas in singulis nodis ferunt, pusillos valde, octonis candidis foliolis simul iunctis, nec sese explicantibus, prædiros, qui deinde in quædam tubercula quatuor radiolos in capite habentia transeunt.

Flore & semine onustam conspiciebam hanc plantam mense Iunio.

TRIBULUS AQUATICUS MINOR.
CAP. LXV.

LECVBITALES, tricubitalisque, aut longiores, pro aquæ altitudine, ex radice proferunt hæc planta, scapos, tenues, puniceis coloris, planos, nodosos (qui rebeccati, leni sunt & flexibiles) circa summum divisos in plures ramos, alternarim ferentes in singulis nodis singulana folia, duarum inrerdu unciarum longitudine, & semunciali latitudine, tenuia & quasi transparentia, in ambitu adeo crispa & sinuosa, ut lacinia videantur, colore ex viridi subpuniceo: pediculi exigui candicantes flosculos utæque in morem cõgestos sustinentes, oblongi crassiusculi, funi, & inter folia exoriantur, quæ bina semper ex adverso sic nascuntur, contrario quàm reliqua inferiora modo singulis flosculis plerumque succedunt quaterna aculeata grana simul coherentia, paucam cãdida nudellam continetia: scapi infimã parte ad singulos nodos oblongas, tenues, candicantes fibras agunt, quibus firmanrur, & alimētum necessarium attrahunt. Toraplanta aquis immergitur.

PRIMUM in stagnis apud Nemeth-wywar, maximã copiã, interdũ tribulum aquaticum majorem fructu eduli, & Nymphæam flore albo nascentem, atque Iunii initio florētem, & semine prægnantem observabam anno M. D. XXC. maturius tamen florere existimo, quia omnes ferè plantæ semine abundabant: deinde eodem mense Viennam reversus, in ejus urbis fossis, ad portam quæ vulgò *St. Antoine* nuncupatur, crescentem, de ponte prospiciebam.

SIMILEM deinde ferè plantam illo ipso mense videbam apud Ebreitshof Mag^o Dn. Hieronymi Beck à Leopoldstorf arcem (ad cuius hortũ, in muro meridiei obverso plurimæ veteres Inscriptiones latinæ in Pannoniã repertæ, ferè quadam sunt repositæ, ut Nobilis ille vir totius Antiquitatis diligens est observator) in lacunis secundum purissimæ aquæ rivus deruentes nascētem, scapis autem non planis, sed rotundis, eodem tamen modo geniculatis, bina semper inter se oppo-

sita foliola, ad singulos nodos ferentē superioribus breviora, mucronata, in ambitu minimè crispa vel sinuosa. flosculos deinde ternos vel quaternos, pusillos, Muscatellę Cordi flosculis perfimiles, tenui brevique periclio insidentes: semen non observabam, quia non licebat mihi quovis momento istuc recurrere: serpit hæc, & ad ramulorum nodos atque alas plerumque fibras agit.

APPENDIX

AD HISTORIAM PLANTARVM

CAROLI CLVSI.

QUIA nonnulla planta demum à me sunt observata, jam traditâ Typographo, ut cuderetur, meâ Historiâ, eas in Appendicem congerendas censui, quæ ad ejus calcem accederet, indicatis capite & libro, quibus inferi deberent.

CORAL ARBOR. ad finem Cap. IX. lib. I.

PROPTER foliorum quandam cum Siliquæ silvestris folijs similitudinem, peregrinæ cujusdam arboris historiam adjicere volui, cujus tres aut quatuor ramulos, Hispani ad me mittebat doctissimus vir Simon de Tovar, ejus urbis primarius Medicus.

Coral arboris ramulus.



Coral arboris ramulus.

EAM arborem in horto alere scribebat, semine ex Americâ accepto ipsinam, cui nomen inditū esset Coral, ob flores Corallij æmulos, sed eorū formam non addebat; illud dumtaxat in epistolâ adscriptum, binas ipsū habuisse arbusculas, quæ florem tulissent, in quarum adultiore etiā siliquæ sive lobi nati essent, prægrandibus phaseolis pleni, rigidissimâ autem, quæ istic anno præcedente fuerat, hieme, non modò illam arborem, atque ceteras Indico semine natas, verum etiam pleraque alias plantas, ipsi perijisse. Quandoquidem portò lobos profert ea arbor, conjecturam facio, ejus flores pisorum floribus formâ nō esse dissimiles, quales in Siliqua silvestri, vulgo arbore ludæ nuncupatâ nascuntur, sed alterius coloris, videlicet rubri ut coralliū, præsertim quū in Indice horti ipsius, quem ad me anno præcedente miserat, adscriptum esset, Arbor indica, dicta Coral, ob ejus florem similem Corallo: cujus folia valde similia sunt folijs arboris ludæ, sed spinas illa habet, quibus hæc caret. Et certè ramuli quos mittebat (etenim ramulos cum folijs mittere scribebat, duplo autem & triplo majora arborem etiam proferre) folia habebant, arboris ludæ folijs non valde dissimilia, sed breviora innixa pediculo, atque ex adverso nascentia, extremum ramulum, qui aliquot spinis, ut hamus recurvis, præditus erat, occupante singulari folio: an verò hi ramuli sint dumtaxat foliorum

costæ, aut veri ramuli, hæreo, quia quotquot mittebat, terna solum modo folia habebant: facile autem mihi persuaserim, dumtaxat folia fuisse, quum extrema costa in unicū folium desineret, & infima unius, inter cæteros, ramuli pars, vestigium adhuc retineret, quo ramo innaxisse videbatur. Nihil verò assero, quum ob brevi subiequentiâ ejus, qui mittebat, mortem, nemo fuerit à quo percontari possem. Foliorum tamen aliquot formam, ut ramo adnata fuisse conjecturam faciebam, in tabellâ adpositâ exprimi curabam.

AN verò istam adumbrare voluerit C. V. Matthioli iconem Acaciæ primæ, quæ spinosa, & folijs, arboris ludæ foliorum æmulis est expressa in Commentariis mihi ipsius in Dioscoridem postremâ editione, ignoro: sed si hanc arborem voluit, pictor iconem fideliter non expresse.

Acacia 1. Matthioli.

Guayavæ arboris ramus.

Guayava
matera test.

Dorycnium Plateau.

Guayabæ
O. virens.Dorycnij
alterius histo-
ria.

Est igitur Dorycnium illud, planta fruticosa, ad duorum aut trium pedum altitudinem
aflurgens, & multos ramos lignosos spargens, non valde dissimiles reticulis ramis Zyziphi
albæ,

TA M E R S I hæc arbor nullâ affinitatem
cum Pruno, cap. XXIX. lib. I. meæ Planta-
rum historiæ descripto, habeat, quia tamen
dubius eram cuiusnam arbori in eâ historiâ de-
scripser, illâ subiectione possem, jam dicto tan-
dem capiti accommodandam esse centui, præ-
sertim quò ejus fructus, pulpam pruno non
dissimilem habuisse videatur, licet ossiculi
experterem. Quòd si hanc Plantarum historiâ
recedi cõtingat, peculiare caput illi dari po-
terit, & commodiore ordine reponi: interea
fruaturs benevolus lector ejus in hac Appen-
dice historiâ, & illi adpositâ iconè.

Istvm etiam ramulum ad me mittebat vir
eruditissimus Simon de Tovar, addito ipsius
arboris fructu, sed prorsus rugoso, & ut opi-
nor, immaturo, Guayavæ appellatione.

Erat autem is ramulus, cujus summâ par-
tem cum fructu exprimi curabam, pedalis
longitudinis, quadrangulus, alternatim binis
folijs ex adverso semper sitis obstitus, quatuor
uncias longis, unam cum semisse vel binas
interdum latis, lauriorum foliorum formâ,
facis fitmis, quæ pronâ parte, tumente nervo
secundum longitudinem, & in latera excur-
rentibus venis erant insignita, cineraceis, &
incani colonis, suprà verò læviora, minusq;
apparentibus venis, quæ contracta, licet ve-
tusta essent, lauriorum foliorum odorè ad-
huc retinebantur, ac etiam quodam modo sa-
porem manducata: fructus, ut dixi, rugosus
erat, & levis, quia forsitan immaturus, exigui
mali magnitudine, oblongiusculus, foris ni-
gricans instar prunorum maturorum, intus
pulpâ rubescenre plenus, acidiusculi saporis,
in cujus medullâ multa grana candicantia
congesta erant, milij, aut granorum, quæ in
fibribus reperiuntur, magnitudine.

Guayabi porro historiâ describit Ferdi-
nandus Oviedus cap. XIX. lib. VIII. Primæ
partis Historiæ generalis & naturalis, quam
Lector reperiit inter peregrinas plantas, qua-
rum Historiâ ex varijs Auctoribus concinnâ-
re (Deo vitâ concedente) in animo habemus.

DORYCNIUM VERVM Jacobo Plateau cre-
ditum. ad Cap. LXVIII. lib. I. ante se-
ditionem, VETERES porro.

CETERVM aliud Dorycnium propone-
bat ornatissimus vir Jacobus Plateau,
ipsi semine natum, quod ejus opinione, legi-
timum erat. Sed quum ipse plantam nascentem
nò conspexerim, nihil pronunciare pos-
sum: ejus tamen qualem cumque descriptionem
ex notis quas ipse Plateau ad me mittebat
unâ cum ramulis folia etiam nò retinentibus,
& iconè ipsius manu delineatâ, concinnavimus,
quam subjectâ etiam tabellâ expressam hic damus.

albæ, cui etiam similia folia habet, hoc est, incanā lanugine pubescentia, verū minoræ & firmioræ: summis ramis multas florum gemmas proferit veluti in umbellam congestas, quæ deinde aperiuntur instar florum convolvuli aut stramoniz, sed facis fugaces, quia uno marcescente, aliter sese expandere incipit: fructum se observare non potuisse scribebat, quoniam nullus floribus deciduis succedisset, ipsam deinde plantam perijisse: fruticem tamen esse semper virentem, & hieme folia non abiciens.

ASCLEPIAS CRETICA. ad Cap. lxxxix. Lib. I.

TAMETSI in meâ Plantarum historiâ de Asclepiade non agam, quia illa à multis est descripta: quum tamen ejus quoddam genus Cretico semine natum observarim ab alijs nondum proditum, illius historiam in hac Appendice ponendam esse existimavi, quæ ad calcem capitis lxxxix. lib. I. meæ Plantarum historiæ adijci possit: illo enim capite quædam congeneres plantæ continentur.

MVLTI porro ad eadem radicem virgis assurgit, lentis, flexibilibus, gracilibus & viridibus, quæ æternis ambiunt folia, vulgaris Asclepiadis folijs non dissimilia, bina ut plurimū, contrarijs inter se pediculis nascentia, dilursus virentia: inter quæ terni aut quaterni prodeunt flosculi brevibus petiolis narentes, quinque pallidis folioli constantes, quibus succedūt interdum singulares, nonnunquā geminæ siliquæ, breviores quàm in vulgari, sed crassiores, striatæ, bifido mucrone, continentes semen planum suâ lanugine involutum, perinde atque vulgariæ. Tota planta gravis est odoris, buxum referentis. Eam muscis perniciosam esse deprehendebam, quandoquidem illas floribus insidentes, enecatas repetebam.

*Asclepiadis
cretica historia.*

LILIUM MONTANVM FLAVO FLORE. ad Cap. xlii. Lib. I. ante sectionem Lilij potro silvestris. Si verò contingat Plantarum historiam rursus cudi, peculiare Caput illi dari poterit.

ELEGANS est hoc Lilij montani genus, quod proximis his annis demum observatum, nec à quopiam hætenus, quod sciam, descriptum. De hoc enim primum ad me scribebat, in Plantarum cognitione egregiè versatus Ioannes Robinus Serenissimi Regis Galliarum atque Christianissimi Simplicita, ut vulgo appellant, Lutetiz Parisiorum habitans, bulbos ejus se habere significans anno M. D. xcviii. mense Februario, unum ex illis se misurum pollicitus, quem insequente Novembri accipiebam, sed valde corruptum, quia pyxidulæ terræ plenæ fuerat inclusus, cujus attitu ex gestatione squamæ plurimum afflicte: terræ tamen credicus, comprehendit, & sequente anno caulem cubitalem protulit, nullum florem, rigidissima deinde quæ subsequuta hiems prorsus corripuit, ut & selectissimas pleraque alias plantas. Scribebat verò, florem habere ex aureo flavescentem, folijs instar Lilij montani, aut Byzantini miniati reflexis, distinctum maculis uigris, ut sunt Lilij montani, sive Marragoni Matthioli flores. Ceterum illam ipsam plantam esse censebam, de qua Nobilis vir Ioannes Boissot ad me scribebat ejusdem anni mense Augusto, his verbis. Superioribus diebus, meus vicinus acceperit à N. Bidaut, nepote Ioannis Bidaut canonici Insulani, Lilij montani picturam, cujus exemplar ad te mitto. Is ante sepe annuum, vel circiter, in montanis Pompeiopolis proximis, regno Navarræ, semina cujusdam Lilij montani istic reperti collegenter, dum radicem, quæ nimis alrè demersa, aut nimis tenaciter hærens, commodu instrumento destitutus, eruere nequiret ob temporis angustiam, quia ejus comites jam longius processerant, quos assequi cupiebat: ea semina patruo mittebat, qui plantarum culturâ valde delectabatur, quæ partim ipse ferebat, partim alijs communicabat, inter quos fuit Medicus Insulanus, cui anno M. D. xcvi. binæ plantæ illo semine nate flores tulerunt, nonnihil (ut me monebat Iacobus Plareau, qui eas florentes viderat) differentes: nate etiam binæ Canonico, sed quæ nondum flores tulerant. Boissot etiam semina miserat, cui unica planta nata, sed ab ipso neglecta, donec picturam videret: tum demum requisiram plantam invenit. Habebat autem, ipso asserente, radicem Lilio albo similem, aut, si quid flavi admixtum, modicum id erat: cerè quæ accipiebam, alba erat, sin alius color admixtus fuisset, corruptus is erat ex attitu. Sed & alij bulbi quos postea mittebat amicus, albis squamis erant præditi.

Ceterum pictura quam Boissotus mittebat, angustiora folia habebat, quàm Liliū Byzantinum miniarum, quod etiam asserere Bidaurius, incondito ordine (ut sequente anno in meâ plantâ observabam) per caulem sparsa, & (quod ille omittebat) dilunore virendine prædita arque parte supina magis splendentia, quàm in Lilio miniato aut vulgari cruento: in cuius summo, bini inter folia nati flores, longo pediculo subnixi, sex folijs reflexis constantes, instar florum Lilij Byzantini miniati, colore flavo, nigris punctis circa umbilicum distinctis: è quo sex flamina miniatis apicibus prædita prodibant, inter quæ media elava virens surgebat, sive, ut Nicander Georgicorum secundo apud Athenæum libro xv. appellat, turpe armamentum rudentis aëni. An autem, adultæ plantæ plures flores proferant, ignoro: sed tempus nos docebit.

*Lilij montani
flavo flore
historia.*

Lilium mont. flavo flo. maculis distincto.

Liliū mont. fl. flo. nullis macul. distin.



Certe etiam illo ipso anno Robinus donabat nobilissimo viro Philippo Marnixio Sancti-Aldegondio (ex qua adpositam iconem exprimi curabam) quatuor flores tulit summo caule, ut Lilium Byzantinum miniatum, ab eodem exortu nascentes, colore flavo dilutius, & quasi pallente, circa umbilicum nigricantibus maculis distincto, & sex stamina apicibus miniatis donata, habentes. Florebat extremo Maio, sed nullum semen ferebat.

Quum porro huc de Lilio montano flavum florem gerente commentatus essem, mittebat ad me Burdegala cruditissimus vir Ioachimus Venerius, quatuor istius Lilij crassos bulbos, monebatque duorum generum esse, alterum enim altero magis praeoces flores proferre: addebatur insuper se aliud adhuc genus observasse, cujus flores nullis punctis internè distincti, sed omnino flavi essent, illiusque unicum bulbum se duntaxat habere. Ipso autem teste, nascitur Lilium istud de quo agimus, in *Cageire en barcho* nuncupatis locis, atque Pyrenaeorum montium alijs, unde ipse retulerat, cum quibusdam alijs elegantibus plantis, quæ in illis montibus sponte proveniunt. Plures deinde hujus Lilij bulbos ab ipso superiore Martio accipiebam, quos amicis communicabam.

Liliū montanū
flavo flore
plurimū his
floris.

Ceterum quatuor illi priores bulbi hoc anno sexcentesimo supra mille simum flores tulcrunt, non, ut adscriptum erat, alij praeocius alijs, sed omnes eadem hebdomada, bini ternos, tertius quinos, quartus septenos: qui ternos, extremo caule & eodem exortu natos: qui plures, paulo infra summum caulis fastigium, in ala binos habuerunt. Erant porro omnes flores (quum primum aperiebantur) coloris ex viridi pallentis, deinde pallidi, tandem flavi, sex folijs constantes sursum reflexis & convolutis, instar florum Lilij Byzantini miniatum & montanum, à medio ad umbilicum internè punctis seu maculis ex atro pupureis distinctis, sex staminibus vitescentibus, miniato apice praeditis cum pistillo triangulari crassiusculo ex umbilico prodeuntibus, quo pistillo nonnullos flores carere animadvertēbam, etiam in eadem plantā quā alij: odor medius inter gravem & suavem, qualis ferè in Sambuci & quorundam Iridum floribus. Caules flores sustinentes, bicubitales aut ampliores fuerunt, rotundi, virides, quos incondito ordine plurima ambiabant folia longa, angusta, viridia, mollia, trinervia, oris albicantibus, & veluti lanugine quadam obfusa: radix crassa multis squamis praedita, instar radieis Lilij albi. Flores produxit duntaxat (ut hic annus ferocius) Iunio, maturis tamen Byzantino & montano.

FRITILLARIA PYRÆNA. ad Cap. xi. Lib. ii. Plant. Historiz, ante sectionem, QVI ad me primum genus.

Mittebat idem Venerius cum Lilij montani flavo flore bulbis, paucos etiam Fritillariæ cujusdam à Pyrenæis montibus erutos, & cujus floribus quos insequente anno pro-

no proferebat, diuerſimode eſſe obſervabam ab ijs quas cap. xi. lib. ii. Hiſt. Plant. exhibui.

BUTYRUM quidem habebat Fritillariæ illo cap. deſcriptæ formâ ſimilem, minore tamen, ex quo prodibat pedalis cauliculus, gracilis, viridis, ſenis aut ſeptenis folijs ſeptus ex viridi cineracis, qualia ferè ſunt in alijs fritillarijs, in cuius ſummo faſtigio naſcebatur ſlos, aliarum Fritillariarum flore minor, ſex folijs conſtans, quæ extimas oras nonnihil reflexas habebant, ut parvi tumiduli ſorſum exprimeret, quorum terna exteriora, interni erant anguſtiora, omnia obſoleti ſoris coloris, circa oras tameo (præſertim interiora) venis quibuſdam flaveſcentibus diſtincta, internæ verò ex viridi flaveſcentis & ſplendens: à medijs porrò folijs ad ipſos uſque ungues (qui ſimilem colorem habebant) plurimis maculis ſaturatè purpureſcentibus reſſelatis diſpoſitis norata: ex umbilico prodibant ſex breviora ſtamina longis apicibus pallidis prædita, trifurco ſtilo è medio illorum procedente: odor ejus gravis, quâſi phalli odorem referens, & proximè ad eum, qui in ſpacula fortida percipitur, accedens.

Florebat Maio cum Fritillaria ſerotina: nullum ſemen tulit, aliundè tamen accipiebam, proſuſ ſimile Fritillariæ vulgaris ſemini, à quo natæ quinque aut ſex plantulæ, quæ, ubi adoleverint, ad matrem ſimiles flores dabunt, aut ab illis variantes, tempus nos (ſi vivemus) docebit: ſin minus, alios, ad quos ex plantæ pervenient.

NARCISSVS JUNCIFOLIYS MINOR. ad Cap. xii. Lib. ii. Hiſt. Plant.

EONEM tempore, ab illo ipſo accipiebam Narciffi juncifolij alterius generis binos bulbos, qui minor, ad aliorum differentiam vocari poterit.

PRODUCBAT autem iſ Narciffus, ex bulbo aliorum Narcifforum juncæo folio bulbis formâ non diſſimili, valde tamen puſillo, quinque aut ſex folia, anguſta quidem illa & juncea, aliquantulum tamen planiora, dodrantem aut pedem longa, nonnihil procumbentia, viridia: inter quæ prodibat unus aut alter cauliculus, gracilis, nudus, viridis, pedalis longitudinis, ſummo faſtigio geſtans folliculum membranaceum inſtar aliorum Narcifforum, è quo exiliter ab uno aut alter ſlos longo pediculo innixus, formâ juncifolij vulgaris floribus ſimilis, ſed paulò minor, ſex folijs pallidioribus conſtans, cum medio calice flavo, majore aliquantulum & magis patente, quàm in vulgaris Narciffi juncifolij flore, è cuius umbilico pallidula breviora ſtamina emergebant, medio ſtilo prominente: odoratus quidem eſt ſlos, paullo tamen gravior eſt ejus odor quàm vulgaris juncifolij. Florebat April.

Sponte naſci in illa Galliz parte ſcribebat, quæ vulgo *Reverge* nuncupatur.

HYACINTHVS MAURITANICVS. ad Cap. xxvi. Lib. ii. Hiſt. Plant. calcem. Sin hanc Hiſtoriam denuo eudi contingeret, peculiari capite donari poterit.

EX eâ Mauritaniæ parte in qua *Fezæ* & *Marræ* urbes ſitz, initio anni nonageſimi noni ſupra milleſimum & quingentefimum, cum alijs bulbaceis plantis adferebatur Hyacinthi genus exoticum, illi non valde diſſimile, quod in Hiſpania natum, xxvi. cap. lib. ii. meæ Plantarum deſcriptum eſt, quum folijs, tum floribus: omnia tamen in hoc paulò majora. Nam hujus folia Hyacinthinis, aut Ornithogali Arabici legitimi folijs ſatis reſpondebant: & inter illa prodibat caulis pedalis longitudinis aut amplior, craſſior quàm in Hiſpanico, ſitimus, impenſè viridis, vicenies interdum etiam plures flores ſuſtens ſex folijs conſtans, quorum externa tria nonnihil explicantur, interna quodammodo coeunt. & rubi cujuſdam formam expriment, extremitate tamen aliquantulum reflexa, veluti in Hiſpanico jam dicto, coloris autem magis obſoleti & fuſci: de ſemine nihil pronuntiare poſſum, quia nullum tulit: radix bulbacea, alba, Hiſpanici radici non diſſimilis, paullo tamen major, & ad Ornithogali Arabici legitimi radicem valde accedens.

Flores dabat Maio inſequente: plantas verò omnes corrumpere cum multis alijs ſingularibus, aſperriima quæ ſubſequerebatur hiems.

Hunc cum alijs, ut dixi, bulbis, è Mauritania acceptum, honeſtiſſimi viri Willemus Paddy, & Ioannes Somet cives Medioburgenſes in Walachia amicis communicabant.

INTER reliquos porrò bulbos, fuerunt Narciffi, quorum flores jam præterierant, & *Sisyrinchij* majoris genus, quod mihi flores protulit, *Sisyrinchio* majori quod in Luſitania obſervabam, formâ proſuſ ſimiles, non tamen caruleos, ut illius, ſed purpurei dilutionis coloris, valde etiam fugaces & ephemeros, quorum terna majora folia inflexa & terram ſpectantia, albâ maculâ erant inſignita.

ORNITHOGALVM MAXIMUM. ad cap. xxxiii. lib. ii. Hiſt. Plant. anteſect. ALTERVM.

TAMET SI cap. xxxiii. Lib. ii. meæ Plantarum Hiſtoriæ ſcripſerim, Ornithogalum illud, quod C. V. Dodonæus *Alphodelum* Galeni appellat, omnium maximum eſſe: nuoc tamen ſententiam muto. Nam poſtea aliud genus mihi conſpectum eſt illo longè majus, cuius hiſtoriam in hac Appendice Lectori proponendam cenſui.

MULTA id incunæ vere ab radice producit folia, longa, diluvius viſ rentia, latiora quæ, quàm

*Fritillaria
pyrenaica*

*Narciffi juncifolij
minoris diſtincti.*

*Hyacinthi
Mauritanici
hiſterius.*

*Sisyrinchium
Mauritanicum.*

*Ornithogalli
maximum hiſt.*

YY f

quàm Narbonense & Byzantinum, inter quæ prodit sesquicubitalis, & amplior interdum, caulis crassus, viridis, lævis, magnam longamque florum spicam gerens, ut centenos aut plures in eadem spicâ numerare meminerim, sex folijs constantes, nivi proptus candoris, & nullo nervo viridi, ut aliorum flores, insignitos, qui interdum explicantur, sexque stamina brevia & latiuscula, alba, flavis apicibus prædita, capitulumque trigonum cingentia & umbilicum occupantia ostendunt, noctu verò contrahuntur, aliorum instar: floribus excussis, succedunt trigona capita, semen rotundum, nigrum continentia: radia bulbosa, crassa, candida, è latâ sede multas fibras emittens.

Tempus.

Floret cum alijs maioribus Maio, interdum etiam Junio, pro anni præcocioris aut magis serotini ratione.

EVM bulbum accipiebâ Ornithogali Arabici Lilij Alexandrini appellatione insignitum, quæmodum etiam Byzantinû eadem appellatione non semel ex Italia ad me missum.

ORNITHOGALVM MINVS è Pyrenæis.

ad idem Cap. xxxiii. Lib. ii. ante sectionem SEPTIMUM.

Ornithogali
minoris d. 27.
p. 66.

BINOS etiam à Venerio exiguos bulbos in Pytenzis erutos accipiebâ Hyacinthi stellulari albicantibus floribus appellatione insignitos, quorum flores quum hoc anno M. DC. conspicerê, non Hyacinthi, sed Ornithogali parvi esse deprehendebam: erentim & similia folia, & flores nò dissimiles Ornithogali minoris sexto loco descripti cap. xxxiii. lib. ii. meæ Plant. Hist. folijs & floribus habuerunt: in eo dûtaxat differre mihi videbantur, quod istius flores paulo majores apparerent, sex etiam folijs constantes, ut illius, quorum singula foris nervo, seu venâ subcartilæa secundum longitudinem per medium essent distincta, & sex staminulorum apices in hoc furvi, qui in illo violacei. Florebat Maio.

ASPHODELVS MINIMVS.

ad Cap. xxxix. Lib. ii. Plant. Hist. ante sectionem GRÆCIS ἀσφοδελος.

NOVVM porro Asphodeli genus, & à nemine descriptû, semine natum sibi esse scribebat Iacobus Plaireau, à quo iconem ipsius manu delineatâ XXI. Julij hoc anno M. DC. accipiebam cum aliquot noris, quarum adminiculo hanc historiam concinnabam.

Asphodelus minimus.

Asphodelus
minimus.

Tempus.

Colchicum
minoris d. 27.
p. 66.

MINOR est Tertio jam descripto, & ab eo plurimum differt: nam gradulolas radices habet instar Secundi generis, licet minores, è quarum capite prodeunt quina aut sena folia valde angusta, & longiuscula, inter quæ assurgit cauliculus rotundus dodrantè aut pedem altus, singularis, nec ullis ramis præditus, in quo spicæ in modum nascuntur multi flores albi, sex folijs constantes, quorum singula interne & externe venâ quadam secundum longitudinem sunt notata, perinde ac Tertij præcedentis flores.

Julij initio flores profertre incipere scribebat, quum reliqua genera suos abjecerunt, propterea magis illis serotinum censendum: hinc folia amittere, & nova denuo acquirere circa Aprilis initium.

COLCHICVM ποικιλεσθ' alterum.

ad Cap. xl. Lib. ii. Hist. Plant. ante sect. QVARTVM genus.

ALIVD Colchici versicolore flore genus accipiebam ab honesto viro Theodorico Cootnhart anno M. D. XCIX. quod bulbo, folijs cum vulgari proptus conveniebat, & perinde altè assurgebat, flores proferens vulgaris floribus formâ quidè similes, sed diverso colore, ex albo videlicet & purpurascens vario, dissimili tamen à præcedente, quia in hoc colores magis permixti, & purpurascens dilutior: binos vel ternos tulit flores, quibus

succeserunt longa, crassa, & trigona capita, vulgaris capitibus non dissimilia, semen etiam simile continentia. Florebat cum vulgari, paulò maturius præcedente.

Eodem

Eodem capite, ad finem sectionis PAVCOS porrò Colchici.

Ex illis tamen ipsis, binos habui bulbos, quorum singuli quaternos aut quinos flores protulerunt anno M. D. XCVIII. & cum insequente, non adeò altè assurgentes ut in vulgari, sed breviores, quorumque folia luci opposita, tessellatim distincta apparebant, perinde ferè ac in diluore Fritillariæ flore: semen etiam abundè præbet id genus, sed in minoribus brevioribusque capitibus quàm vulgare.

Eodem etiam capite, ad finem sectionis, ALIVD porrò elegans.

Hujus autem Colchici plenos flores anno M. D. XCIX. observabam esse versicolores, & folia habere similibus coloribus distincta, quibus Colchici versicoloris alterius flores distincti sunt, hoc est, ex albo & dilutius purpurascente mixtos.

CROCVM VERNVM capillari folio.

ad Cap. XLII. Lib. II. Plant. Hist. ante sect. NONNVIII.

MITEBAT præterea idem Venerius Croci verno tempore florentis genus capillari folio, quod Burdigalensi agro locis desertis nasci scribebat, & duorum generum inveniri: unum, purpurascente flore. alterum (quod rarius) albo.

Id autem exiguum radicem habebat, bulbosam, duro spadiceo cortice tectam, instar illius quod in Hispaniâ observabam ad Anam flumen, vel ejus, quod Catagobus mittebat: è qua insequente anno bina aut terna prodibant angustissima & quasi capillaria folia viridia, surrecta, inter quæ pediculus verius quàm cauliculus uncialis longitudinis aut paullo major, ab unâ parte planus, sustinens semuncialis magnitudinis florem sex foliis constantem, quorum terna exteriora paullo longiora, erant, & purpurei coloris, tribus venis saturatioribus secundum longitudinem exterius distincta, tria interna breviora & diluore colore prædita, omnia autem internè dilutè purpurascebant, & ungues habebant pallidos, ternis venis distinctos, prodeuntibus ex umbilico tribus staminibus brevibus, longo apice flavo præditis, & medio stilo extremâ parte diviso.

Florem proferebat initio Maij, qui sole splendente aperiebatur, sub noctem autem claudatur, & paucos dies durabat, nullius, aut pertenuis odoris.

STACHYS SPINOSA. ad calcem Cap. XX. Lib. III. nisi quis peculiare caput illi tribuendum existimet, quod statim post caput de *Marrubio* collocandum esset.

QUANTUM hujus plantæ descriptionè in Epistolis C. V. Honorij Belli Lector inveniet: quia tamè Iacobus Plateau ejus iconem cù aliquor notis (nam & ipsi nata erat, & mihi non confectâ existimabat) misit, eam denuo, cù iconem in tabellâ expressâ, hic subijcimus.


Stachys spinosa.



PRIMO quo hæc planta mihi nata fuit anno, ad Stachydem à C. V. Matthiolo propositam valde accedere videbatur: etenim folia illi non dissimilia habebat, oblongiuscula videlicet, incanâ lanugine tecta, nullo autem grato odore prædita: secundo anno cauliculi excrecebant in cubitalem pene altitudinem, & in plures ramulos dividebantur, in molles quasdam spinas definentes, ad quorum exortus bina ex adverso semper nascebantur folia, prioribus minorâ & angustiora: flores rari per ramulos sparsi nascebantur, floribus Teuctij Bæticæ non valde dissimiles, minores tamè, qui valde caduci, nullum semè tulerunt: radix lignosa & dura. Semine porrò ab Honorio Bello è Cretâ misso, *Gaidetherthymo*, hoc est, asinini thymi appellatione nata hæc planta, priore anno tota hieme virens in horto permansit, eo loco ubi sars fuerat, vitro vase tecta: altero anno, famuli negligentia, qui, ut præceperam, hieme non texerat, perijt. Ejus qui, plantæ apud se etiam Cretico semine natæ, iconem ad me mittebat, opinione (cui etiam mea accedit) non incommodè Stachys spinosa dici poterit, quo nomine etiam illam exhibemus, donec aliud magis aptum occurrat.

PISTOLOCHIA altera semper virens.
ad Cap. XLVII. Lib. III. ante sectionem
NOVVM autem &c.

CARTICO femine natum est hoc Aristolochiæ genus Iacobo Plateau, cujus in hac Planta.



*Pistilochia
altera.*

Plantarum historia frequens mentio. Is autem anno sexcentesimo supra millesimum à nato Christo, illius aliquot ramulos cum eicône ipsius manu delineata, additis quibusdam notis ad me mittebat.

Multa porrò è summo radicis capite proferre scribebat tenuia farnēta, pedem aut plus vel minus longa, angulosa, striata, ramosa, lenta, fractu contumacia, humi sparsa, & ex atro virentia, in quibus incondito ordine nascūtur folia nervosa, superiori similia, magis tamen mucronata & ad similitudinem asperæ foliorum formam quodāmodo accedentia, minora, attrita & immarcescibili viriditate prædita, oblongis pediculis nuda, è quorum sinu nascuntur longi caviq; flores, Aristolochiæ longæ floribus formā similes, saturā tamen rubedine foris magis distincti, internè verò aliquantulum flavescentes, oblongisq; pediculis inhaerētes: his succedit fructus Aristolochiæ longæ fructui non dissimilis, sed minor: numerosas autem hoc genus habet radices instar præcedentis, vel similes asperæ, verum graciliores, & fibris quibusdam tenuibus donatas, odoratas. Flores proferre monēbat Iulio & Augusto.

HIERACIUM PARVUM, CRETICUM. ad finem Cap. xxxvii. Lib. v.

*Hieracii par-
vi historia.*

SEMINE natum etiam est Iacobo Plateau istud Hieracii genus, cujus iconem vivis coloribus depictam Tornaco ad me mittebat qualem tabulā subjunctā proponimus.

ELEGANS autem est plantula, cujus sena aut plura folia sum mā tellure diffunduntur, quā parte radici adherent, angustiora, extremā parte latiora, per ambitum incisa, medio nervo purpurascēte: inter quæ nascuntur bini aut terni cauliculi, circiter pedem alti, enodes, præterquam supremā ferè parte, ubi in binos ramulos dividuntur, subnascētib; parvis foliis valde incisis: flores in extremis fastigijs nascuntur satis grandes pro plantæ proportionē, ex multis foliis sibi invicem incumbētib; constantes, superna parte profusè albis, subtus carnei (si ita appellare licet) coloris: radix est singularis, oblongiuscula, superne crassior, deinde paulatim ad infimum vsque gracilescens, aliquot lateralibus fibris donata, instar radicis cichorii silvestris.

FINIS APPENDICIS.

FVNGO.

FVNGORVM

IN PANNONIIS OBSERVATORVM

BREVIS HISTORIA,

A

CAROLO CLVSIO ATREBATE

CONSCRIPTA.

ILLVSTRI HEROI
IOANNI VINCENTIO PINELLO, &c.
CAROLVS CLVSIVS ATREBAS.

MEMINI, Illustris Heros, ante annum me ad te scribere, occupatum esse in concinnando de Fungis Commentariolo (abs te verò monitum, Clarissimum virum Vlysem Aldrovandum in eodem argumēto versari) respondere, de ijs duntaxat agere instituisse, quos in Pannoniā vario tempore observassem, qui, licet alijs etiam in Provincijs sint communes, fieri tamen posse, ut quædam notæ mihi perspectæ fuerint, ab alijs forsitan minimè animadversæ. Et sanè nunquam existimassem tot tamque varia genera in unâ Pannoniâ reperiri, aut illa in adeò diversas species distingui potuisse.

DVM verò istic versabar, summa mea cura fuit, ut in illis observandis, viros mihi adjungerem, in eorum dignotione industrios & adprime exercitatos, qui monerēt, quales innoxij, quales perniciosi essent: nam, nisi valde exercitatis, difficile est Fungos dignoscere, cū plerique inter lethales reperiantur esculentis persimiles.

SINGVLORVM itaque, cū edulium, tum perniciosorum, quæ observabā genera, nativis coloribus à peritō pictore exprimi curabam, sumptus faciente Illustri Heroe Balthasare de Batthyan, hæreditario Dapiferorum Regni Vngariæ Præfecto, qui me unicè amabat.

CETERVM omnium brevem historiam concinnavi, eamque in duo summa capita distribuendam censui: Primo quidem esculentos fungos descripturus, eosque in varia genera, & illa rursus interdum in suas species distributurus, addito etiam apparandi & condiendi (prout intellexi) modo: Altero autem, perniciosos & lethales, eorumque varia genera & species.

HVC porrò libellum, Illustris Heros, tibi nuncupare, meaque erga te observantiæ publicum testimonium esse volui, certo mihi persuadens, minimè ingratum tibi futurum. Deum autem Opt. Max. oro, ut te quàm diutissimè servet incolumem. Lugduni in Batavis VII. Cal. Maij M. D. IIC.

FVNGORVM

IN PANNONIIS OBSERVATORVM

BREVIS HISTORIA,

à Carolo Clusio conscripta.



FVNGORVM, cum Vienna Austria viverem, multa & varia me in Pannonias peregrinationibus observabam genera, quorum magnam partem, cum in vicinis, tum alijs Provincijs etiam crescere non dubito: sed quia istic diligentius (subinde in pratis, caduas silvas, nemora, montanæque & aperta loca excurrens, cum ijs qui noxios & perniciosos ab esculentis discernere norant,) observare potui, non inutilem operam me sumpturum existimavi, sic eorum brevem historiam pertexerem

ILLAM porro in bina summa capita dividendam esse judicavi: ut scilicet Primo de ijs fungis agam, qui edules & minimè perniciosi estimantur: quanquam (ut ait Plinius) quæ voluptas tanta ancipitis cibi? Altero autem eos percurram, quibus nemo vesci solet: sed perniciosi sunt & lethales.

FVNGI ESCULENTI

CAP. I.

ESCULENTORVM Fungorum, quos primo hoc capite describere institui, varia sunt genera, atque singulorum diversæ etiam interdum species. Singulorum autem generum historiam pro temporis, quo nascuntur, ordine, tradendam existimavi, atque etiam singula genera, in suas species (si quas habebunt) distribuenda.

PRIMUM GENVS.

APRILII crescit genus illud, quod apud Vngaros, atque per universam Germaniam adeo in deluisset, ut filo tractum & in corallas compositum è clavo suspendant, & adferrent, ut etiam media hieme eo vesci possint. Vocatur autem ab Vngaris *Szemerchek*, à Germanis *Maurachem*. Cujus quatuor observantur species, colore & magnitudine inter se differentes.

Prima enim, pollicis extremum articulum magnitudine raro superat, valde rugosa, & quasi favi instar in cellulas distincta membranacea cute, coloris albicantis quasi fulgine infecti, præsertim illius venter rugosæ & prominentes, pediculo, quo nititur, cavo, ut & totum fungi corpus.

Alteræ, proteræ magnitudine non multum superans, aliquantulum contractior est, & pyri in clybano cocti instar rugosa, vel potius tuber aur radiceæ Aristolochiæ rotundæ verustate contractam & multis rugis præditam, valde mentitur, coloris ex rufo fulci: cujus rei causa Germani *Baum maurachem* cognominant.

Tertia, Primæ formâ non dissimilis, sed duplo amplior, orbicularis plerumque, præter pediculum quo sustentetur: interdum autem in trium unciarum longitudinem, æqualemque aur ampliore crassitudinem excrevit, ejusdem cum Primæ coloris, nec minus quàm illa rugosa, & veluti in cellulas distincta, internæ etiam cava: Germanis *Stech maurachem* dicitur.

Quarta recens natæ figura, quodammodo ad Tertiam, quæ orbicularis est, accedit, sed rugis magis turbaris & compressis, ut in Secundâ, color etiam magis candicans, & pediculus longior. Paulò adultior verò, in longitudinem excrevit metæ instar, aut piscei sive petasii Germanici longioris qui limbo caret, ejusque apud eos usus duntaxat hieme, fons etiam rugosa, & in cellulas distincta, quæ colorem pallecentem veluti fulgine quadam infe-

Z Z 2 sum ha-

1. Generis esculentorum Fungorū 3. species.

Dolmanus
scutell.
scutell.

Fungus spon-
gius.

Morilles.

Spongula.

Parvulus ro-
sis.

Alnus genus
fung. scutell.



III. Genus esculentorum Fungorum.



Tortil genus
fung. scutell.
Scutell. Gy-
rogi gano-
bata.
G. Scutell.
scutellum.

Natalis

Parvulus ro-
sis.



fectum habet: internā autem parte cava & hians: Germani illā *Dolmanum* nomināt.

Nascitur autem Prima species apud Vngaros plerumque sub abietibus, in dumetis, atque pratis, sed in his Almeta præsertim: Tetra verò & Quarta sub quercubus, magna ex parte.

Valetur porro hic fungus is esse, quē Dalcéphius spongiosum cognominat, in asperis & saxosis nascentem, sæpe tamen ad Castanearū radices, colore fulvo, corpore spongioso, figurā in metam desinente, suavissimi gustus: quam ob rem in delicijs haberi varijs modis præparatum, ut hominum palatū varijs condimentis oblectatur. Gallos vocare *Morilles*, inde fortasse, quoddam moti fructus figuram nonnihil accedat. Et quem Baptista porta, à Neapolitanis *Spongiolas* appellari scribit.

Ceterū *Morilles* recentes solent Vngari affare supra craticulam, vel ex oleo decoquere: sed etiam reficcati torteti possunt, prius tamen macerati: qui verò elixis velci mavult, macerari non oportet.

GENVS II.

V LTRA Balatonem lacum Vngariæ, in parva insula cui nomē *Fano*, Simudien. si Comitatu, Aprilis etiam mense nasci intellegebam Fungi genus delicatissimi saporis, cuius nomen indicare nemo poterat: sed illi similis esse ferebatur, qui inter perniciosos & lethales Decimum sextum genus est, & ab Vngaris *Kygie gomba*, à Germanis *Natter schwammen* dicitur: pyramidalis tamen dotalitque, apice & angusto hunc fungū esse.

GENVS III.

T ERTII generis, quod Vngari *Szent Györgyi gomba*, Germani *Sant Georg schwammen* appellant, quia circa diē D. Georgio factum (qui in vicesimum tertium Aprilis incidit) invenitur, unicam observabam speciem.

Parva autem illa est, duatum unciatū amplitudinem vix æquans, orbiculatū ferē formā, superne quidem aliquantulum extruberante, & quodāmodo pulvinatā: inferne verò concameratā, & quibusdam veluti venis distincta, pediculo crasso, brevique, colorem exalbidū, cui flavi quidpiam admixtum sit.

Crescit in siccioribus atque pascuis pratis: & fortasse is erit fungus, quem Horatius satyra quarta lib. 11. Sermonum, optimum pronunciat his verbis,

præsentibus optima fungus
Natura est: alij male creditur.

Est verò Tertium hoc genus, aliorum fungorum modo præparandus, qui repurgati, ut plutimum elixari solent, & in frusta concidi, quæ inter binas lances reposita, inperfo oleo olivarum vel butyro, & pipere addito, super ptunas coquantur: aut cum larido inijcitur iuliculum ex lactis cremore paratum, quod Germani *Milstrum* appellant.


GENVS

QUARTI generis, Vngaris *Saxilwa alya* dicti, quia (sub pruni arboribus nascitur (Germanicum nomen nullum novi) plures etiam sunt species. Nam aut parvæ sunt, aut mediocres, aut majores.

IIII. Generis esculent. Fungot. 3 species.



v. Generis esculent. Fungot. 1. species.



Prima, uncialis duntaxat est magnitudinis, aut paulò amplior, crasso subnixa pediculo, infernâ parte convexa, & quasi fornicata, sulcis vel strijs quibusdam apparentibus notata: supernâ autè in mucronem quodammodo vel metram fastigiata, coloris albican-tis fusco tincti.

Media species paulò planior est, quasi in orbem circinata, duarum unciarum, aut majoris amplitudinis, infernâ parte simili-ter fornicatâ, & strijs quibusdam veluti exa-ratâ: color idem qui in superniore.

Major, quæ & *Tertia*, formam quidem *Primæ* similem habet, etenim supernâ parte in mucronem fastigiata est, infernâ cava & fornicata: sed ejus magnitudo pletum-que est trium unciarum, crassiorèque pedi-culo nititur: color hujus magnâ ex parte magis fuscus est, & notis quibusdam inter-dum distinctus: deinde superna pars, ut plu-rimum lacera & scissa apparet.

GENVS V.

PLVRES item habet Quintum genus differentias, sed omnes uno nomine ap-pellatas: ab Vngaris quidem *Pestrice*, à Ger-manis verò *Pastermy*. Sola porro earum dif-ferentia in magnitudine consistit, quando-quidem formâ, materiâ, & colore pæne con-veniunt.

Prima autem species angulosâ figurâ est, quatuor unciarum amplitudinis, brevi & quasi nullo pediculo, sed eo valde crasso: in-ferna pars candicante & satis densa materiâ constat: superna veluti spongiosa est, & villis quibusdam obsita, coloris ex rufo fusci.

Altera magis orbicularâ est figurâ, cras-siore & paulò longiore pediculo prædita, quinas aut plures uncias lata, totidem longa, infernè & supernè à *Prima* specie non mul-tum differens: materiâ autem, seu corpore, paulo crassiore, & magnitudini respondente.

Tertia longè major est, orbiculata ferè fi-gura, in tres tamen lacinias divisa, ut trifo-lij frondem quodammodo referre videatur: sex autem aut plures uncias in longitudi-nem patet, totidem in latitudinem: crassio-re etiam ea constat pediculo, unciamque la-to, brevi tamen: color idem qui in superio-ribus, infernè, sed supernè, dilutior illis, & spongiosis quibusdam crassissq; villis sive po-tius frôdium rudimentis ex fusco pallescen-tibus prædita.

In Vlmorum, Populique albæ caudicibus dejectis nasci solet, & bis plerumque, etiam ter interdum, in anno provenire.

ZZ 3

An au-

Peziza fung.
gri.


An autem genus illud quod Plinius à Græcis *Pezicas* dici, & sine radice, sine pediculo nasci afferit?

Parandis 14.
na.

Ceterum *Pezizæ*, repurgati, eodem modo condiri possunt, quo *Scythiæ* de quo infra Decimo septimo vescorum fungorum genere: sed & elixi conciduntur, atque in lance compositis frustis, laridum accensum insutillatur.

GENVS VI.

VI. Genus esculentorum Fungorum.



VI. Genus
esculent. fung.

EXIGVA est in Sexto genere diversitas: aut si quæ est in magnitudine differentia, eam ex ætate duntaxat provenire arbitror. Hoc autem peculiare habet istud genus, quod non singulare, sed conseritum plures simul plerumque crescunt: nam vel bini, ternive simul fungi conjunctim nascuntur, vel etiam quini, senive, aut plures.

Sunt autem omnes ferè orbicularis formæ, plantæ tamen, infernâ parte albi, & striati, supernâ aliquantulum protuberantes, mediâ autem nonnihil depressi, ut umbilicum exprimere quodammodo videantur, colore raris fusco quàm infernâ. Minores, circiter unciæ lani sunt, aut paulò amphiores: Mediæ, binarum unciarum latitudinem adquirent, vel explent: Maximos, quatuordecim unciarum etiam latitudinem superare existimo.

Scilicet.
meretula.
Berula.
Strophomen.

Omnes verò hæc Vngarico nomine dicuntur *Scilicet meretula*, hoc est, ad ulmos nascentis fungus: rametis indifferenter ad ulmi, quercus, cerni, fagi, ostriz (quam Galli *Hesire*, Germani *Hagenwurzen* appellant) berulæ, populi albæ, & juglandis radices, aut earum dejectarum caudices, crescant: Germani *Berbeschwamm* id est, faginos fungos nominant. Vngari autem eum qui ad Ostriz radices nascitur, coloræque magis fusco tinctus esse videtur, peculiariter *Gilwa gyertyan* sive *termewit* appellant.

Gilwa gyertyan
sive termewit.
Berula.

Magna etiam copia nascuntur in truncis relictis supradictarum arborum, præsertim verò ulmi & juglandis, si leviter terrâ, vel etiam solo stramine sepulti & tecti putrescât. Quod valde onosum est cum his quæ Matthiolus Comment. in Dioscorid. lib. 1. cap. de Populo scribit: ejus verba in studioforum gratiam, hic adscribere libuit, ne quis vana esse existimet, quæ Vngari de fungi modò descripti natalibus aiunt.

Fungorum
aducendum
ratio.

Atqui, inquit, præter ea quæ à Galeno de Populi facultatibus scripta sunt, sciant velim rei medicæ studiosi, populum albam, humo renus sectam ad radicem usque, & aquâ calidâ, in qua fermentum fuerit dissolutum, perfusam, infra quadriduum fungos copiosos edere, ejus quoque gratissimos.

Parandis
ratio.

Reperitur autem à novo Vere in Autumnum usque.

Simili porro ratione apparatur hic fungus (ne eam repetere cogar) quæ Decimum septimum esculentorum genus Germanis *Scythiæ* Vngaris *Fr gomba* dictum: unde petere licet.

GENVS VII.

VII. Genus
esculent. fung.

SEPTIMI generis forma duplex esse mihi visa est: Nam vel planos conspiciebam supernâ parte nonnihil rumentes, interdum etiam in ambitu laceros, coloris aut albi fusco permixti, vel maculis quibusdam distincti: infernâ nonnihil convexâ, & veluti strijs live

VII. Genus esculent. Fungorum.



VII. Genus esculent Fung. 2. species.



sive fulcis, à pediculo crassiore in oras ufque ductis, exarata, fu'ci coloris. Aut orbiculari penè figurâ, superne, immò rotâ superficiei, candicantes, ut ovum exalpeum exprimere videatur, præsertim adempto pediculo.

Hoc genus Vngari *Chöpörke gomba*, id est, tuberosum fungum, appellant: Germani *Ängering* quoniam in siccioribus pratis, sive pascuis juxta pagos sitis (quæ ipsi *Ängern* nominant) proveniat. Ter autem in anno reperitur.

Sed & istud genus non incommode forsitan referri possit ad illud Horatii, de quo in Tertio genere.

GENVS VIII.

OCTAVVM genus nō ineptè in tres (species meâ opinione) quis dividat: quarum Primæ & secundæ discrimen in solâ magnitudine consistit, non nihil & colore: omnes tamen tres, similis formæ. Vngari, *Kesfrew gomba*, hoc est, amarum fungû: Germani, *Pfifferling*: Galli, *Champignon* & *Potiron* vocant: tamen in universum omnia penè Fungorum genera ijs nominibus donent.

Prima ergo species, binas ferè uncias lata est, planæ, sed orbiculatæ figuræ, superne tamen quodammodo pulvinata, & candicâs, infernè veluti camerata & convexa, strijs quibusdam à crasso pediculo in oras ductis distincta.

Alterâ, huic prorsus similis, sed amplioris magnitudinis, ut quæ quaternas aut plures uncias æquet, ejusdem cum Primâ figuræ, sed crassiore pediculo subnixa: superne albâ cute, cui insperxæ aliquot maculæ fuscæ & flavescentes: infernè flavescens aliquantulum, & magis conspicuis strijs à pediculo in extremas oras productis, exarata.

Tertiam speciem Vngari *Vörös Kesfrew gomba*: Germani eadem de causa *Äbepfifferling* nominant, quia magis ruber præcedentibus: sed & Vngaris *Bik alya* dicitur, quod sub sagis interdum crestat. Amplior est hæc Secunda specie, & magis circinare rotunditatis, longiore gracilioreque subnixa pediculo, & colore superne à infernâ parte ex fusco subrubente, non minùs evidentibus & conspicuis strijs, à pediculo in orbem diffusis, inferius distincta, quàm Secunda species.

Omnes autem species, ut plurimum, in exdus silvis nascuntur, circiter Penrecosten, hoc est, sub extremum Maium, aut Iunij initium.

Priores duæ species, palato gratæ esse solent, quo Decimum septimum genus.

GENVS

Chöpörke gomba.

Ängering.

VIII. Genus esculent fung.

Kesfrew gomba.

Pfifferling.

Champignon.

Potiron.

10.

11.

112.

Vörös Kesfrew gomba.

Äbepfifferling.

Bik alya.

Natalis.

Parandis p.

110.

feruntur, atque ijs plerique vescuntur eodem modo paratis, quo Decimum septimum genus. Tertiam edunt etiam nonnulli, sed perpauci.

17. Genus
of white fung.
Herench.
Kremling.

IN Nono genere plures etiam observabam differentias, quas ordine describo: sed omnes uno nomine dictas cum apud Vngaros, tum apud Germanos: etenim illi *Herench*, hi *Kremling* sua lingua appellant.

Prior autem species, Secundo generi valde absumilis non est: nam circumataz in plano ferè est rotunditatis, unciam aut binas magna, supinâ parte pulvinata & candicans, infernè autem magis est fusca, & evidentioribus strijs donata, quam Secundum genus.

18. Ad Quinti generis Primam speciem plurimum accedit *Alterâ* species: etenim angulosa est, sed amphor, ut quam uncias quatuor aut plures æquare existimem, superne etiam albicans, non, ut illa, fusca: infernè vero nõ lævis & glabra, instar illius, aut alba, sed crassis strijs ab um bilico, sive pediculo, in oras ductis, insignita.

19. *Tertia* magnam affinitatem habet cum Octavi generis *Alterâ* specie: quia ferè orbiculata est, & æqualis pænè magnitudinis: superne tamen in albedine magis fusca est: infernè illi non dissimilis, nisi quod ejus striæ crassiores sunt, & pediculus illam sustinens crassior, brevior, atque magis nigricans.

Viridis He-
rench.
Notte
Kremling.
Natalis.

20. Sola magnitudine ab Octavi generis *Tertia* specie differt hujus *Quarta* species. Illa enim amphor est, hæc minor, utraque autem circumataz ferè in plano rotunditatis: illa superne rubescens, hæc multò magis rufescens, eamque adeò ob causam Vngaris *Vörös Herench*, Germanis *Notte Kremling* dicta: graciliore illa pediculo subnixâ, hæc crassiore & magis albo, ut etiam inferna hujus pars candidior est illâ, & minus evidentibus strijs exarata.

Nascuntur autem omnes eodem, quo Octavi generis species, tempore, atque in cædis, ut plurimum, silvis, quemadmodum & illæ.

GENVS X.

21. Genus
of white fung.
Kremling.

MANIFESTVM est inter utramque Decimi generis speciem (binas enim ejus species observabam) discrimen, licet magnitudo ferè sit æqualis. Nomen utriusque apud Germanos *Kremling*/quasi cervinum dicas. Vngari ut vocent, ignoreo.

x. Generis esculentor. Fungor. I. species.

21.



Kremling.
Kremling.
Kremling.

21.



Natalis.

Prima species pediculo binas uncias longo, minimum digitum crasso nititur: ipsius verò fungi orbicularis in plano est forma (cujus diameter duarum unciarum aut amplioris magnitudinis est) superne nomenhil extumescens, & veluti sericeis villis obsita, colore puniceo dilutiorè, & veluti carneo, oris in infernam partem valde reflexis, quæ ex albo rufescit, & multis strijs, instar aliorum fungorum distincta est. Hanc speciem Germani *Kremling*/hoc est, hirsutum sive villosum cervinum fungum, quemadmodum Alceram sequentem *Kremling*/quod significat nigrum cervinum fungum.

Alterâ species longiore constat pediculo, ejusdem tamen cum superiore crassitudinis, sed infima hujus pars crassior est & veluti limbo circumvoluta: præterea in hac bini plerumque fungi conjunctim ex eodem pede oriuntur: orbicularis etiam in plano sunt figuræ (præterquam qua parte sese mutuo comprimunt) ejusdem cû superiore magnitudinis, aut paulò amplior, paululum extumescens superiore parte, & glabra, coloris ex rufo fusci, oris non adeò in infernam partem inflexis, quæ non minus frequentibus strijs est prædicta, quam *Prima* species, colore ex pallido nigrescente.

Nascuntur in cædis silvis, eodem propemodum tempore quo Nonum genus.

GENVS

GENVS XI.

XI. Genus esculentorum Fungorum.



ISDEM locis, atque eodem quo Decimum tempore reperitur Vndecimum genus, cuius unicam speciem videre memini: aut, si quæ est differentia, ex fungitestate duntaxat provenit Germani *Erpfellam* hoc est, caprinum pedem sive ungulam appellant, ab Ungaris *Erpfellam* nullum nomen intelligere potui, nisi illud à Germanis mutuatum.

Initio quidem inæquali est figurâ hic fungus, magis tamen ad orbicularem tendente, per oras lacer, duarum unciarum latitudine, superne subfusci coloris, inferne candicantis, & strijs distincta. Adultior autem, magis orbiculatæ est figuræ, & per oras magis laceræ, quàm recens natus, cum longè amplior, ut ejus diameter sit quatuor unciarum: ejus item color magis fuscus superne, & albicans inferne, cui fuscedo quædam admixta.

GENVS XII.

PROVENIT etiam in silvis Duodecimum genus, & reperitur circa Pentecosten. Id Germanis *Xebeling* quasi Capreoli fungus dicitur. Ungaricum nomen mihi ignotum.

Vnicam etiam hujus Fungi speciem observabam, nec formâ, nec magnitudine à Primâ specie Octavi generis valde differentem: sed color diversus, qui superne flavescit, inferne ex flavo rufescit, striâque habet in superiorem pediculi (qui eum sustinet) partem usque productas, illâque in eum radiatim declinantes: gracilius autem est pediculus, quàm Octavi generis.

GENVS XIII.

DECIMI-TERTII generis variaz sunt species: eam ob causam apud Ungaros & Germanos varia obtinuit hoc fungi generis cognomina: generali autem appellatione Ungaris *Galambica*, Germanis *Teubelinge* dicitur.

Nascuntur autem omnes ejus species promiscuè in silvis, & Junio Iulioque mensibus inveniuntur. Germanorum potiùs distinctionem sequentes, quinque hujus generis species faciemus.

Prima, omnium amplissima est, ut ejus plana superficies quincuncielem diametrum habeat, orbicularis, ut plurimum, est ejus figura, digitalis longitudinis pediculo, unciam crasso, tubinix: supernâ parte protuberante, colore ex albo virescente prædita: infernâ candicante & striata. Iltam Germani *Primo Teubelinge* hoc est, Dominarum cognominant.

Alterius paulù minor est amplitudo, ut ejus diameter quaternas uncias non excedat, orbicularis etiam & planæ est figuræ, superne tumescens, l: d in medio & quasi centro nonnihil compressæ, ut umbilicum mentiat, coloris ex cæruleo, viridi, & fulco commixti: infernè ex albo subfusci, pediculo sulca pollicaris crassitudinis, sed brevior quàm Prima. Huic Ungari, *Kerk galambica*, Germani *Blaw Teubelinge* quod ejusdem est significationis, cognomen dederunt.

Aequalis Teubelinge

XI. Genus
esculi fung.

XII. Genus
esculi fung.
Xebeling.

XIII. Genus
esculi fung.
Galambica.
Teubelinge
Kerk.

1.

Primo
Teubelinge

II.

Kerk
galambica.

Blaw
Teubelinge

Aequalis Teubelinge

111.

Virens ga-
mbica.
Nott Ten-
belinge.

1111.

Schwartz
Cresbingerv.
Nott
Cresbinger

Aequalis ferè cum superiore est *Tertia* am-
plitudinis (interdum autem vix binas uncias
superat ejus diameter) sed paululum angulo-
sa, coloris supernè elegantis, ut qui ex purpu-
reo & saturato rubro commixtus videatur, e-
migrantibus aliquando, sed raris albis maculis,
quas cōtrahi arbitror flore illo ex cōtactu de-
terfo: inferna pars candicat, & fuscis stris ex-
arata est, oris in ambitu parū & dilutè purpu-
ralescentibus, extrinsecus nempe supernæ partis
oris aliquatulum inflexis. Vngaris *Perewi*: *Ga-
llicia*, Germanis *Nott Tenbelinge* quod idem
est, dicitur.

Quarta species minor est *Tertia*, nec ejus
superficie (quæ orbicularis est figura) diame-
trum binas uncias excedere puro. Vinea
longitudinis pediculo sustinetur, graciliore
quàm superior: superna pars quodam modo
pulvinata, in medio nonnihil cōpressa, & um-
bilici formam exprimens, colore flavescens,
veluti fuligine infecto: inferna pars alba, fus-
cis stris à pediculo ad circūferentiam distin-
cta. Germani *Schwartz Cresbinger* id est, ni-
gram cognominant.

Quinta species, cognomen dederūt Vngari
Waras galambica, Germani *Nott Tenbelinge*
quasi dicas asperum. *Aequalis* autem est cum
Quarta magnitudinis, circinare in plano quo-
dam modo rotunditatis, supernè etiam intu-
mescens, & pulvinata, asperiorq; reliquis spe-

ciebus, coloris supernè ex albo fusci: infernà verò parte, candicante quidem, sed quam fu-
scæ stris in oras excurrentes, veluti inficiunt.

GENVS XIII.

xiiii gen-
eris fung.
Nott Ten-
belinge.

1.

EODEM, quo superioris generis species, tēpore in silvis oritur *Decimum-quartum* esculen-
torum fungorum genus, quod Vngari *Niwl gamba*, hoc est, Leporinum fungum: Ger-
mani *Hofm edeln* Leporinam auriculam, appellant. Videtur autem in duas species posse di-
stingi: nisi quis forsitan ætare duntaxat differre putat.

Prior speciei forma angulosa est, magis tamen in orbē circinata, unciam, aut paulo am-
plius lata, brevi crassiq; pediculo subnixa, supernà parte extuberans, pallidi coloris, quem
flavæ aliquor maculæ varium faciunt: inferna pars flavescit, fuscisq; stris exarata est.

xiiii. Generis esculentorum Fungorum secunda species.



11.

Alter species duplo major, non minus tamen, quàm *Prior* in ambitu angulosa, & veluti
crassioribus quibuldam lacinijs secta, supernà parte non pulvinatà, ut superioris, sed potius
cavà,

xv. Genetis esculentor. Fungor. 2 species.



xvi. Genetis esculent. Fungor. 2. species.



cavā, ita ut, si quis manu teneat, & oblique sive ex latere duotaxat conspiciat, flavum (nam talis est ejus color) florē tenere videatur: inferna pars multis strijs in oras excurrentibus & productis, insignita est, crocōque colore infecta.

GENVS XV.

DECIMO-QUINTO generi, nomen deditur Vogari *Dicno gembā*, hoc est, Suilli fungi: Germani ejusdem significationis vocabulo *Schwainbling* expresserunt.

Nascitur in silvis eodem, quo Decimum-quartum genus, tempore. Dux autem sunt ejus species manifestō discrimine inter se differentes: quatuor.

Prior orbicularis ferē est figuræ, circiter quatuor uncias lata, brevi crassiorēque pediculo fulta: supernē nonnihil extuberans & pulvinata, coloris subalbidi, sed veluti fuliginē infecti, per quem sparſe sunt aliquot albæ maculæ: inferna pars subalbi etiam est coloris fuliginē infecti, multis crassioribus strijs nigricantibus, à pediculo in circuitum excurrentibus, notata.

Alter a Priorem amplitudine superat, & ejus orā in interiorē partem magis reflexā, orbiculatæ quodāmodo figuræ, cujus superior pars pulvinata, coloreque tincta purpureo, cui tuber saturatior commixtus, in mediotulio tamen flavescens, & secundum oras, albis maculis distincta: inferior pars ex albo fusca est, & tenuioribus strijs exarata, pediculo, quàm in *Primā*, longiorē.

Germani hanc postremā speciem à rubro colore *Non Schwainbling* nominant.

Tametſi autem non valde probetur hoc fuoſi genus: non defunt tamen qui illo vescantur, adeo intemperantis gulæ reperiuntur quidam. An porro hoc genus, tertium illud *Plinio*, quod *xxi*. *Natural Historiæ* cap. *xxxi*. venenis accommodatissimum esse asserit? Certē nemo convenit: licet ille formam non expresserit, sed circa radices querus, roboris, cupressi & pini, gigni scribit. Ioannes Baptista Porta, Suillos antiquum nomen apud Neapolitanos adhuc retinere ait, atque illis *Silli* dici.

GENVS XVI.

DECIMO-SEXTO vescorū fungorum generi, nomen satis obſcōrum apud *Vogaros*: nam illi *Farganya* appellant: Germani autem *Bätl* quia pediculi, quo sustinetur, pars infima, io majorem crescat amplitudinem quàm suprema, ad ejus pōnē fagite formam, quæ crassiorē & veluti orbiculata est cuspidē, ipsius *Bätl* occupatæ, Gallis autem *materæ*. Reperitur in silvis circiter extremum Augustum.

Ejus porro tres observabam species inter se differentes: oonnulli quartam addebant, sed eam propter formæ dissimilitudinē, ad aliud potius fungi genus referendā censui, dubiamq; teci, reponens inter *Vandiceſimum* & *Viceſimum* pernicioſorum fungorum geōra.

Prima

Prima verò quatuor uncias longo fulcitur pediculo, supernâ parte fatis gracili, & minimi digiti crassitudinem vix superante, infernâ crasso, ut qui uncialis sit aut amplior, coloris varie mixti ex cæruleo, viridi, & fusco: superior fungi pars orbicularis in plano est figuræ, tumescens & quasi pulvinata, cujus diameter trium unciarum aut paulo major, color ex candicante subfuscus: inferior pars, cui pediculus inhaeret, nullis strijs deformata est, sed plana & alba: quam ob causam Vngari *sejer varganya*, hoc est, album cognominant.

sejer varganya.

Secunda species brevior conflat pediculo, sed eo longe crassiore quàm Prima, ut qui digitalem crassitudinem supernè æquet, vel etiam superet, infernè, binas uncias cum semisse, & coloris ex albo flavescens: ipsius fungi caput orbiculatæ quidem est figuræ, sed inæqualis & quasi sinuosa, cujus diameter, pediculi infimam partem amplitudine non valde superat, colorisque est ex flavo rubescens: versâ pars nonnihil camerata est, colorisque est ex flavo rubescens, nullis strijs exarata. Vngari *verews varganya*, id est, ruber dicitur, cum venius *sarga varganya* appellari deberet; meâ opinione, id est, flavus: nisi fortè eo cognominare donare voluerunt, quia ejus averfa pars, aliquantulum, ut dixi, rubet.

Verews varganya. Sarga varganya.

Tertia species duplex est differentia. Nam alia est junioris & recens natæ facies, alia adultioris. Junioris porro figura prorsus orbicularis est, diametrum duarum circiter unciarum habens, valde in rotundum elata supernè, & sulci ad modum coloris, fuliginosique: infernè cava & fornicata, coloris albi & nullis strijs deformati: pediculus illam sustinens binas uncias longus est, aut paulo longior, supremâ parte pollicaris crassitudinis, infimâ, duorum digitorum. Adultior autem, longè amplior est: nam quaternas aut quinas uncias latus est, ternâs ferè altus, & in rotundum quasi fastigiatus, coloris supernè ex fusco rufescens: infernè planus, æqualis, albus, nec ullis strijs exaratus: pediculo fulcitur ternas uncias longo, supernâ parte unciam crasso, infernâ binas, coloris ex albicante sulci. Istam speciem Germani *gawer hiltz* cognominant.

Gawer hiltz. Avaritia.

Habet verò hoc fungi genus aliquot notas, ob quas Pauli *ajusfrus* esse liceat conjicere: etenim colore fuliginoso sunt ejus species, orbe etiam quorundam tam amplo, ut fæpe humanum caput æquent, pediculo omnium crasso, infra colore nigro virescente.

Parandi ratio.

Ceterum hic fungus apud Vngaros in hunc modum apparari solet. Repurgatus conciditur, frustra paululum in clibano exsiccantur, deinde in aqua elixantur: ips deinde exemptis, panis vulgaris, quo videlicet familia uti solet, talex super craticulam tollit, in prædicto jusculo coquantur, id de mum jusculum cribro farinario succernunt: postremò, huic condimento (quod nec tenue nimium, nec crassum nimis esse debet) elixa fungi frustra imponuntur, additòque aceto, pipetis, gingiberis, atque caryophyllorum aromaticorum polline eduntur. Tenuis autem fortunæ homines & rustici, illo cum panici semine pulvis instar decocto, & pipere denique insperfo, vescuntur.

xvii. Genus esculent. Fung. primum prodicens.

GENVS XVII.

xvii. Genus esculent. fung.

Kistala

Vr gomba.

Kepferling.




AD nobilissimum porro esculenti fungi genus (quod, secundum ordinem à nobis observatum, Decimum septimum est) transeamus.

Provenit autè id in silvis rarè quercu constitis, ipsque cædis præfertim, & editionibus siccioribusque locis, bis singulis annis, circa messem videlicet, & ante vindemiam. Vngari propter excellentiam *Vr gomba*, veluti si diceret Dominorum fungum, seu primum fungum: Germani ob eandem causam *Kepferling* appellant, quasi Cæsareum, quòd inter fungos principatum teneat. Et sanè adeò elegans est, ut non mirandum sit, si eos qui libenter fungis vescuntur, præ ceteris generibus fungorum, ad se edendum invitet.

Illius unicam duntaxat speciem videre & observare memini: licet ex ætate discrimen quoddam esse videatur.

Primum è terra erupentis hujus fungi forma, ovum quodammodo candore & figurâ refert: altera aut tertia die laceratur hæc alba cutis, seu (ut Plinii vocabulo utar) volva, supernâ parte, & veluti ovi luteum ostendit: deinde magis extuberat illud luteum, & fungi formam induit, paulatim & sensim evanescente peteùtque volva: magnitudo autem fungi

xvii. Genus esculentum. Fungus jam expansum.



Et satyra sexta,

— minus ergo nocens eris Agrippina

Boletus: siquidem nimis praeordia pressis

Ille sensu tremulumque caput descendere iussit

In calum

Sed & ipse Nero, Boletum Deorum esse cibum cavillari solebat, quia illo perijisset Claudius Cæsar, & defuncti Cæsares in Deorum numerum referri solerent.

Ceterum ad Boleti parandi rationem, quali Vngari utuntur, nunc transeamus.

Recentes boleti (suaviores enim & delicatiores illi sunt adultioribus) repurgati, in aqua elixantur, deinde in tenuia frusta conciduntur: frusta concisa in jusculum è cremore lactis confectum injiciuntur, adjectis felini folijs minutim sectis & pipere. Vel repurgari, præciso pediculo invertuntur, & super prunas positi, addito oviluteo torrenrur. Vel recentes etiam (emundati videlicet) recisus pediculus, fringuntur cum butyro atque ovo simul in sartagine coctis, dissolutis & simul mixtis, instar ejus ferculi ex ovis & butyro in sartagine frixis parati, quod Germanis est in delicijs & paratu facile, illis *Eperstomati* nuncupatum. Sed & exciscari servantur: deinde ovorum instar coquantur, aut in aqua elixantur: tum demum, ut præcedens genus, cum condimento illo ex ipsorum jusculo & pane tosto parato, additis acetis, pipertis, gingiboris, & caryophyllorum aromaticorum polline, eduntur.

MEMINI ANNO M. O. XCIII. ad Illustrē Heroem Balthasatem de Batthyán sub vindemia répus accersitū (solebar enim ille bis aut ter singulis annis, misā, qua veheret, rhedā, ad se evocare) in ejus arce firmissimā Nemeth. Wywar holpino exceptum, atque fortunatam semel in mensa, dum pranderemus, adpositum hunc fungū in lance cum suo jure elixum: tum ego, qui fungis minimè vesci soleo, & ignarus croceam illam tincturam è boleti succo esse, gallico sermone ad ipsum (plures enim ille Heros peregrinas linguas præter vernaculam perfectè callebat, Latinam, Italicam, Gallicam, Hispanicam, Germanicam, & Vandalicam, sive Croaticam, ab Vngarica diversam) valde crocatum, sive croco tinctum est hoc jusculum, inquam. Ille suaviter ridens, ad Nobiles viros, qui ejus mensæ assidere soliti erant octo aut decem, conversus: *Clusius Fram*, hoc est, Dominus Clusius (& cetera verba ungarico idiomate proloquutus) existimat hoc jusculū, croco in eo dissolutum esse tinctum: tum omnes illi cachinnum sustollere, & mirari, mihi ignotam boleti naturam, præsertim cum scirent, & illo, & præcedentibus aliquor annis, diligenter observasse, præter alias multas elegantes stirpes, fungorum quæ apud eos nascitentur genera.

fungi sua volvâ inclusi, ternas uncias in longitudinem patet, binas in latitudinem. Contumpra volvâ, fungus in planam orbicularem se se explicat formam, cujus diameter quatuor pæne unciarum est, cujus superna pars aliquantulum inrumesceens, aureum sive croceum colorem elegantissimum habet: inferna flava est, & minus stris à pediculo in extremas oras productis insignita: pediculus fungum sustinēs, digitalis longitudinis & crassitudinis est, flaviq. coloris. At cum jam adolevit, paulò amplior est ejus magnitudo, & in ternas aut quaternas partes scinditur, colorisque illum florem & elegantiam deperdit: nam superne, languidioris est aurei coloris, inferne, omnino pallidi.

Non dubium autem est, quin hic fungus, sit ille Verenis ad eò celebratus Boletus, à Principibus viris sic in delicijs habitus: nam si conferantur quæ de Boletis scripsit Plinius, cum hujus historia, similis esse deprehenditur. Infamis aurem, & immenso exemplo in crimen adductus fuit, Plinio teste, quod Tiberium Claudium Cæsarem (qui Boletorum esu impensè delectabatur) cōjunct Agrippina, bolero veneno illuro, sustulerit, ut Nerone filium ipsi successore in Imperio daret. Hinc illi Juvenalis in satyris fales de Boletis. Nam satyra quinta,

Falsus ancipites fungi ponentur amicis,

Boletus domino: sed qualem Claudius edit

Ante illum uxoris, post quem nil amplius edit.

*Boletus sp.
tertio.*

*Parvulus bo-
leti nasci.*

*Ille Balthasar
de Batthyán
mularum
linguam
perit.*

XVIII. Genus esculent. Fungorum.


XVIII. Genus.
Fung. escul.

Ervz lab.

Waltzing

Conocelle.

XIX. Genus esculent. Fung. 1. species.

XIX. Genus
Fung. escul.
Scaevias
gomba.
Ergenbert.
Ergenbert.
Ergenbert.
Ergenbert.
Ergenbert.XIX. Genus
Fung. escul.Ergenbert
gomba.Fung. Scaevias
gomba.

NVLUM inter fungi, qui innoxius astimatur, genera esse puto, quod longiore praeditum pediculo, quam Decimum octavum: est enim ille in octo aut novem unciarum longitudinem porrectus, digiti minimi crassitudine, rectus, varicolor, & maculis, strijs quibusdam, & maculis parvis & magnis, ex albo, rufo, & fusco coloribus commixtus distinctus marmoris varij instar. Ipsum vero fungi corpus pilei se ugaleti forma quodammodo refert, valde laxis oris, deinde sensim in turbinatam metam desinens, altitudine trium unciarum, aut ampliore, orarum diametro uncias fere octo occupante, candicans superne colonis, multis tamen maculis magnis & exiguis ex fusco rufescentibus infectis, supremo fastigio prorsus fusco: inferna pars cava admodum & camerata, candicans quidem, sed plurimis strijs fuscis eblisque & veluti in ciocinnos compositis, distincta: duabus autem fere uncis infra supremum pediculi fastigium, corolla digitalis circiter latitudinis ipsum amplectitur, unde corporis ipsius fungi orz abrupte videntur, dum in laxitatem sese diffudit.

Hujus unicam speciem observabam, quae in arvis plerumque provenit. Tribus vero diversis anni temporibus interdum nasci intelligebam. Vngari Ewz lab, hoc est, capreoli pedem, satis improptio, ut mihi quidem videtur, nomine appellant: Germani Waltzing.

An autem ille fungus, quae Ioan. Bap. Porta à Neapolitanis Conocelle vocari scribit?

GENVS XIX.

SETEMENSI mense sub corylis nasci gaudet Unde vicissim fungorum esculentorum genus: quod Vngari Scaevias gomba Germani Ergenbert & Ergenbert (quod idem est, utraque enim vox caprinam barbam significat) tum Ergenbert appellant: nonnulli etiam Ergenbert eodem quo Decimum genus, nomine.

Diversae potè à reliquis fungi generibus est formæ, exque elegantis, quod in his species colore inter se differentes, non nihil etiam formâ dividi posse arbitror.

Primum autem locum dabo illi, quæ & reliquis elegantior videtur, & colore magis conspicua. Ipsum corpus binarum fere unciarum crassitudinem habet, intus cavum, colonis fusci & fuliginosi, in quo elucet albedo quædam pallida mixta: deinde corpus illud in plurimos tennes ramos dividitur, duas aut amplius uncias longos, colonis suprema parte flavi elegantis, cui inspicit crocæ macula, flosculorum formam quodammodo exprimere videntur. Hanc Germani Ergenbert & Ergenbert, id est, flavam caprinam: barbâ, aut Ergenbert cognominant: ad quorum imitationem Vngaris Scaevias gomba dici posse existimo.

Non mi:

Non minus crasso est *Altera* species trunco, coloris tamen albi in eandem interdum magnitudinem crescit eum Priore: nonnunquam brevior est, aliquando autem vix binas uncias alta, videlicet primom nata, cujus rami onciales, & illi ferè prorsus dilutè rubefcentes: jam adulta verò, candicantes ramos habet, quorum extremitates rubescunt, formamque totum fungi corpus habet, quale cerebrum brassicæ Cypriz degeneris, & quæ ob præmarutas pruinas ad frugem pervenire non potuit. Huic Germani *Kotte Gesselt*, hoc est, rufæ eaprinæ barbæ cognomen indiderunt, live *Kotte Hirsling*.

Minus crasso corpore est *Tertia*, coloris ex albo pallescentis huius rami longiores & crassiores sunt quàm in biois superioribus speciebus, & aliquantulum rariores, coloris, ut ipse truneus, pallidi albo commixti: exsiccatam & marcidam eam esse, quis credere posset.

Affinitatem quandam habere videtur hoc fungi genus, cum illis fungis quos Bapt. Porta *Fungi à saxis* è saxis ex Gargano monte erutis nasci scribit non pileatos sed tunones ut asparagos, & in ramos divisos.

GENVS XX.

VICESIMUM genus esculentum fungi rorsus ad vulgatiorem fungorum formam redit, & sub extremum Autumnum in silvis, plerumque autem sub abietibus nascitur: cuius rei causâ Vngari *Fenyo alja gomba*, Germani *Thannling* appellât, hec illis *Gesselt* etiam dicatur: nam Vngaris *fenyo-fa* Abies est, atque Germanis *Thannbaum* idem significat. Hoc autem genus in tres species dividemus.

xx. Geocris esculent Fung. 3. species.



Prima, orbiculatæ (planæ tamè) est figuræ, binas aut ternas uncias lata, supernè, coloris vel dilutè admodùm rubetis, aut lateritij, veois quibuldâ sic exarata, ut hirta videatur, non secus ac Decimi generis *Prima* species, cui valde similis est, iò medio nonnihil compressa, & veluti umbilicata: infernè pallescens, & multis strijs fuscis à pediculo (qui uncia paullò longior est, miomum digitum crassus) in orbem ductis, insignita.

Altera, Priorem magnitudine nò valde superat, paullò tameo crassiore pediculo constat, magnâ etiam ex parte orbiculata est, sed non compressa supernè, immò potiùs extuberans, coloris ex albo, pallido, & fusco permixti: infernè candicans, & strijs fuliginosis coloris, à pediculo in oras productis, exarata.

Tertia, longè amplior est binis superioribus, orbiculatæ tamen perinde, atque illæ, figuræ, cujus diameter pæne quincuncialis est, pediculo subnixa non majore quàm præcedentes duæ: supernâ parte etiam extuberans, mixtique ex albo, pallido, rufo, fuliginosâque, coloris: interna pars plana est, rubescens coloris, crassius strijs ex atro purpureiscentibus, à pediculo in ambitum excurrentibus, oortata.



GENVS XXI.

MONSTRUM verius fungi, quàm fungus censerî potest Vicesimum-primum genus esculentorum fungorum, quia ad eò valè interdum est amplitudinis, ut integrâ etiam mixtorum familiam explere & satiare possit: nam audiebam (dum hunc fungum in Vngariâ observabam) circa Lewa Domioorum Dobo oppidum, in extremitate Vngariæ limitibus Croaticæ vicinis, tantâ nonnunquam amplitudine excrecere, ut bigam faciliè impleeret, præsertim, ut aiebant, si quis præteriens (quod superstitione non caret) admirandus subsistat: immò (quod magis ridiculum) asserabant nonnulli, convitijs proficiendum esse, ut in tantam molem excreseat, alioqui manere iò eâ magnitudine, qua primum conspectus est, quasi ægrè ferentem se negligi.

Nascitur autem in Vngariâ sub extremum Autumnum, vel circiter diè Divo Michaeli sacrum, ad quercuum radices. Vocatur ab Vngaris *Bokros gomba*, à Germanis *Stehring*.

Ceterum

Ceterum, tantæ magnitudinis non erat, quem in Vngariâ observabam, sed illius molis ductatæ, quæ ternos aut quaremos pascere posset, multos flatus pariens, ut ab ijs intelligebam, quic derant. Amplitudine tamen superabar omnes quos unquam conspexerim fungos: nam pediculum seu palmarem aut ampliorem, & semipedalis altitudinis habebat, corpus fungi sustentem in longitudinem & latitudinem diffusum bipedalem aut majorem, multis veluti amplis & laciniatis folijs, squamarum vel imbricarum sibi invicem incumbenribus constans, quorum etiam nonnulla, quercus sinuosa sola imitantur: coloris ex rufo nigricantis, vel ex albo nigri, aut multis maculis nigris in albo conspersis, notati.

Si quis porro Quidam generis species cum hoc monstroso fungo cooierat, non sine causa forsitan existimabit, illas esse hujus generis nondum adultas species, adeo illæ ad istius formam accedunt.

Fungus latini-
scitatem
inscripuit.

Considerandum autem est, an similis fuerit fungus, qui (referente Diodoro Cassio Nicæo) Traiano Cæsare adversus Decebalum Daciarum Regem profuscente, ingens latinis literis inscriptus circumferebatur à Barbaris.

Gallinaccia.

Eum certe esse conjicio, quem Ioan. Baptista Porta vulgo à Neapolitanis *Gallinaccia* appellari scribit, tantæ magnitudinis, ut sexaginta libras interdum pendat, sufficereque possit ad universam familiam pascendam.

Id. B. alio q'u
en de Marti-
lyan miss.

Et hæc quidem sunt, quæ de Fungis esculentis apud Pannonos nascentibus, cum apud eos diversis anni temporibus versaret, intelligere potui. Ea ut Lector boni consulat, etiam atque etiam rogo. etenim mihi non licuit, de singulorum sapore vel gustu certi quidpiam pronunciare, quandoquidem in fungis non vescor, & naturâ ab illorum usu semper abhorui. Quamobrem Illustris ille Heros Balthasar de Batthyany, cujus memoriam, dum vivam, colam (è vivis autem ille excessit anno M. D. XC. hoc est, circiter biennium post quàm Viennâ Francofurtum me contuli) cum intelligeret me de fungis in eo Regno nascentibus aliquid commentari velle, ridens (ut erat vir lepidus & valde facetus) dicere solebat: ubi, inquit, quæ meditans in lucem protulens, insigniter te nugari dicâ, qui de ijs rebus scribere in animum induxeris, quas ne semel quidem gustare unquam volueris. Sed de his satis. Nunc ad eorum Fungorum, qui non sunt esculenti, sed perniciosi potius & lethales, brevem historiam conscribendam accingamur.

FVNGI NOXII ET PERNICIOSI.

CAP. II.

Fungus per-
niciosus.

REVIOR ero in scribenda horum Fungorum historia: oam cum apud Veteres nulla eorum fiat mentio (nisi fortè generatim, & nullo nomine addito) atque Recentiores supervacuum æstimarint quidquam de ijs fungis scribere, quibus nemo velceretur, omnes mihi erunt ex propria observatione describendi. Et sanè, licet à rusticis & peritis facile agnoscantur: operæpretium ramen esse putavi, de illis aliquid commètare, atque eorum formam exponere, ne quis imprudens pro innocijs legat, quandoquidem multi inveniuntur, ijs qui esculenti sunt per similes.

Eundem porro ordinem sequemur, quem in vescoreum fungorum historiâ tradendâ observavimus, atque singula genera in suas species, si quæ erunt, distribuemus.

GENVS I.

I. Genus perniciosorum Fungorum.



I. genus per-
niciosorum, sub-
genus.

PRIMO generis unicam speciem observare memini, licet magnitudo ejus una non sit: sed eam diversitatem ex ætate oriri arbitror. Quotquot autem conspexi, brevissimo, vel po.

vel potius nullo pediculo nituntur, sed caudici arboris inhaerent, aut singulares, aut gemini, membranacea cute conitantes implicata & sinuosa, coloris ex cinereo nigricantis. Vultus auticulum Iudae nominat, cartilaginea enim & membranacea est substantia, quemadmodum autis. Vngari *Bosa fa termewr*: Germani *Jelber schwanen* appellant, quia in Sambuci caudice nascitur, cum huic arbori primum prorumpunt folia.

Solet is fungus, tamen si non esculentus, à plerisque adlerari exsiccatus, in usum: nam in gutturis tumoribus, acetum in quo maceratus sit, exhibere solent, ad gargazandum & guttur eluendum.

*Articulata
Iuda.
Bosa fa termewr.
Jelber
schwanen.
Fasciatus.*

GENVS II.

SV B Pruni arboribus novo Vere nascitur Secundum genus, ideoque ab Vngaris *Szilwa alya* nuncupatur.

Illius unicam speciem etiam observabam, numerosam ex eodem pede, nullo tamen pediculo conspicuo, confertim nascentem, variâ magnitudine & forma: nam fungorum nonnulli, binas aut ternas uncias lati sunt, atque etiam ampliores, vel orbiculatae figurae, aut angulosae: alij paulò minores, nonnulli vix unciam lati: omnes coloris ex albo, pallido, & fusco commixti.

*11. Genus
nascitur fung.
Szilwa alya.*

GENVS III.

TERTIVM genus Vngari *Ganefon*: Germani *Wist schwanen* appellant, quoniam in sterquilinis nascitur primo Vere.

Vulgans admodum est hic fungus, propterea nemini nõ notus, formae orbicularis in plano, veluti citrino ductae, exili & tenui fulvis pediculo, tenui non crasso corpore, candidus omnino, & veluti farina conspersus cum inferne, tum superne: pars tamen averfa seu lupina, fulcis strijs, à pediculo in oras ductis, distincta est.

*111. Genus
nascitur fung.
Gaupod.
Wist
schwanen.*

GENVS IIII.

QVIA novo vere post praematuras pluvias plerumque nasci solet in Salicum caudicibus Quartum genus, ideo ab Vngaris *Fiz sa gomba*, à Germanis verò *Jelber schwanen* vocatur.

Est potèd hic fungus confertim nascent, & caudicibus Salicum firmiter inhaerens, Lichenis instar, in corpus tuberosum excretescens varia formâ & magnitudine: nam pleraque tubera uncialem magnitudinem non superant, alia binas & ternas uncias interdum ampla sunt, coloris elegantis & variè commixti: nam in eis & albedo conspicua est, & pallor, & suave rubens color, & satur, atque etiam flavus, addo his fuscum sive fuliginosum colorem hinc inde ipsius inspersum.

*IIII. Genus
nascitur fung.
Fiz sa gomba.
Jelber
schwanen.*

GENVS V.

v. Genus pernicioforum Fungorum.



NASCITVR etiam novo Vere in putrescentibus Ceraforum caudicibus, Quintum genus pernicioforum fungorum: eam ob causam apud Vngaros *Reves cerefoye sa gomba*, apud Germanos, *Reisenbaum schwanen* nomen invenit.

*v Genus
nascitur fung.
Reves cerefoye sa
gomba.
Reisenbaum
schwanen.*

Plures autem fungi ex eodem pede nati, imbricatim, sive tegularum instar, alter super alterum conferti nascuntur, infimâ parte unciam lati, deinde sensim altitudine crescente, ternarum aut quaternarum unciarum in extremis oris, palmum aurem longi. Superna corporis fungi pars varijs coloribus infecta est: nam circa pedem ex albo pallescit ad uncialem altitudinem, deinde transversî colores secant, ex flavo rubroque commixti, postea flavus: supra illum denuo transversim secant colores flavus & ruber simul mixti: hos sequitur flavus color, quibuldam tamen veluti fuliginosis maculis infectus: extimæ oræ satius rubedine nirent, quam nonnihil sedat linea quædam veluti farina conspersa: supinâ verò parte, aut pallescit, aut flavus est.

Filiæ ar.

Sed & hic fungus, rametis hominibus noxius, alicujus tamen est usus: nam Rustici exsiccatum recondere solent, quia illius pollinem cum sale & pabulo mixtum, ægris bobus & vaccis salubriter dari, sibi persuadent.

GENVS VI.

VI. Genus
noster fung.
Muriyos
alya gomba.

SEXTVM genus, quia sub corylis crescit, Vngari *Muriyos alya gomba* vocant: orbicularis autem est figuræ, binas uncias latus aut major, supernè nonnihil tumescens, extremis oris in lupinam partem flexis, coloris ex rubefcente fuliginosi, cui albedo quædam permixta videtur, interdum etiam omnino fuliginosi & fuscii: infernè nonnihil rubescit, strijsque exaratum est, à pediculo gracili binas uncias longo, in ambitum ductis, crassiusculis, fuscii coloris.

Invenitur circiter Pentecosten, hoc est Maio, aut sub Junij initium.

GENVS VII.

VII. Genus
noster fung.
Bagoly gom-
ba.
Kotten
schwamm.

CIRCA idem tempus prorumpit etiam Septimum fungi perniciosi genus, quod Vngaris *Bagoly gomba*, Germanis *Kotten schwamm* dicitur, utriusque linguæ nominibus eandem rem significantibus, nimirum rubet, vulgo buffonis dictæ, fungum. Cujus tres oblectavaham species.

1.

Prima valde gracili, & plus quàm duas uncias longo pediculo fultam, pilei sive galeri præne figurâ in meram sublatâ, unciali ferè latitudine, orarum verò circiter trientali ambitu, coloris albi fuligine quodammodo infecti, summo fastigio flavescèntes: interior & cava pars fusca est profusa, & nigris strijs, à pediculo in oras ductis, exarata.

II.

Alteram magis orbiculatam & tumente corpore, crassiore pediculo subnixam: superna & tumescens pars duas inrerduum uncias duntaxat est ampla, nonnunquam etiam tres, modo fuscii omnino coloris, ex albo pallescens, modo flavi fuligine infecti, singuli autem maculis albis & nigris summâ parte notati, ut rubetæ colorem, præsertim fuscus, valde referte videatur: pars inferna alba est, levib' strijs subfuscis, à pediculo in oras excurrentibus, distincta.

III.

Tertia reliquis major est, & orbicularæ profusa in plano figuræ, cujus diamater trium unciarum est, sèpernè alba, cui rubescens aliquantulum color est admixtus, & rarè pallescentes maculæ insperstæ: inferna pars quodammodo pallescit, & frequentibus fuliginosis strijs, à pediculo minimum digitum crasso, ad extremas usque oras secta.

GENVS VIII.

VIII. Genus
noster fung.
Nyris gom-
ba.
Buchen
schwamm.

OCTAVVM genus etiam circa Pentecosten provenit in filvis, ad betularum caudices & truncos, cujus rei causa Vngari *Nyris gomba*, Germani *Buchen schwamm* appellant, hoc est, betulaceum fungum.

Orbiculatæ præne est figuræ, supernè paulo elatioris, albi coloris levi fuligine adumbrati, in quo maculæ quædam rufescentes, latitudo duarum unciarum: inferna pars tota alba est, exceptis strijs, quæ fuligine infectæ, à pediculo binas uncias longo & gracili ductæ, in extremas oras desinunt.

GENVS IX.

IX. Genus
noster fung.
Borfsi gom-
ba.
Bollen
schwamm.

CIRCA Solstitium ædium invenitur Nonum perniciosorum fungorum genus in filvis nascens: quod Vngari, *Borfsi gomba*, Germani, *Bollen schwamm* nominant, quia (ni fallor) crasso & tumente sic corpore: nam satis brevis est pediculo, unciam non multum superante, digitum aut pollicem crasso.

Ejus licet binæ videantur species, ætate tamen inter se duntaxat differre arbitror. Constât verò, ut dixi, crasso & protuberante corpore, sphericæ quodammodo & orbicularis figuræ, binas uncias lato in minoribus: in adultioribus autem, tres atq. etiam quatuor, vel etiam ampliore, colore supernâ parte ex atro rufescente, infernâ, exalbido, & multis strijs rufescentibus, à pediculo ad oras usque ductis, insignito.

GENVS

GENVS X.

x. Genus perniciosorum Fungorum.



B Is in anno reperitur Decimum noxiorum fungorum genus, circa messiem videlicet, & vindemiam, in silvis proveniens Vngari *Krefke gamba*, Germani *Bofo* & *Schwamm* appellant, hoc est, caprinum fungum.

Valde exilis est hic fungus: nam primum emergens, vix uncialis est magnitudinis, interdum singularis, nonnunquam geminus, id est, bini simul nascentes, ipso fungi corpore, minimi digiti unguem vix aequante, rufescentis coloris: cum adolevit corpus, in uncialem magnitudinem excrevit, infernâ parte valde à pediculo striata sese invertente, adeo ut superna pars veluti camerata & cava reddatur, & cum suo pediculo, parvum infundibulum mentiri videatur: color flavescit tam externè quàm internè, & superna pars jam in umbilici speciem contracta, rufis maculis est distincta.

GENVS XI.

E OREM tempore, similibusque locis reperitur Vndecimum genus, quod è terrâ primum erumpens, valde boleto imitatur, immò quodammodo mentitur. Vngaricum nomen nullum intellexi, sed Germanicum est *Marzen schwamm*, ac si diceret fatuum vel fatuotum fungum, quoniam fortè, si quis vescatur, mente ruretur, quod facillè contingere potest, ad ejus usum invitanre præsertim primum nascentis tanta cum boleto similitudine.

Corpore, dum è sua volva erumpit, est boleto dissimili, longiore pediculo subnixum minimo digito graciliore, sescuncialis latitudinis, in metam assurgens, supernâ parte candidâ, infernâ cameratâ, & multis strijs, à pediculo in ambitum productis, notatâ.

GENVS XII.

N Ec hujus perniciosi Duodecimi generis nomen Vngaricum mihi notum est: Germani *Fliegen schwamm* appellationem dederunt à muscis, quæ illud valde appetunt, & plerumque huic insident, non sine ipsarum perniciæ, siquidem quotquot degustant intereunt. Variæ autem sunt ejus species, omnes extremo Sextili in cadus silvis provenientes: quas hac serie describo.

Prima speciei duas observabam differentias, magnitudine quidem convenientes, sed colore diversas. Orbicularis & quasi circino ductæ utraque est figuræ, unam interdum, sæpissimè binas uncias latæ: Vni, color supernè parti pallescens, cui quidpiam rubedinis & fuliginis admixtum sit: Alteri autem lundus & fuligine infusus, cui inspersæ albicantes maculæ atro permixtæ, non secus ac in Septimi generis perniciosorum *Secunda* specie: pars supina in utraque persimilis, hoc est, alba, exarata tamen fuscis strijs, à pediculo (qui gracilis est & curciter sescunciam longus) ad extremas oras ductis.

Paullò major est *Altera* species, & longiore crassiorèque pediculo subnixâ, ut qui minimi digiti longitudinem & crassitudinem æquet: ejus autem forma pæne orbiculata, cujus diameter triente paullò minor, color superne varius, hoc est, ex purpurei dilutione & saturâ, rufopallido, & albo coloribus variè mixtus: inferne pallet, & nigris crassioribus strijs, à pediculo in extremas oras ductis, notata est.

Tertia speciei differentiam habet ex ætate perpetuam: nam primum emergens contracto est corpore, crasso & unciali, quasiq; a radice mentiente, pediculo sulta, duas uncias lata, tandem longa, in metam formam sublata, coloris rubri, sive potius lateriti, frequentibus maculis albicantibus conferta, summo tamen fastigio pallida: Adultior verò palmari pediculo, eoque digitalis crassitudinis, affurgit, infernâ parte ruberofo: ipsum corpus fungi in orbicularem figuram compositum (cujus diameter quatuor uncias sive trientem latus) per

2. Genus
noxiar. fung.
Krefke gamba.
Bofo
Schwamm.

21. Genus
noxiar. fung.

Marzen
schwamm.

22. Genus
noxiar. fung.
Fliegen
schwamm.
Natalis.

23.

24.

25.

per otas interdum fissus & lacer, coloris pronâ parte rubri, & albis quibuldam maculis in fedi, orâ rufâ sunt: supinâ autem, albâ prorsus, strijstamen levi fuligine infectis, à pediculo in ambitum procurentibus.

xii Genetis perniciosa. Fung. 4 species.

1111.



Natalis.

v.

Omnium elegatissima est *Quarta* species, cujus ab ætate duntaxat quoddam discrimen est: Junioris enim & recens natæ corpus minorem habet orbem, & binas uncias solummodo latum, rubeo colore valde satuto instar concreti sanguinis tinctum, per cujus superficiem frequentes exalbidae sunt cõspicæ maculæ: Adultior in majorem latitudinem patet, ut quæ quincuncialis sit, aut amplior tumida supetnè, rubro etiam colore, sed paulò remissiore, quàm in juniore, tincta, obliuoribus veluti undis intercurrentibus distincta, & crebris etiâ exalbidis maculis infecta: pediculo autè constat procuberante infimâ parte, deinde trientem longo, unciam crasso, à quo infimâ parte crassâ nigra strâ ductâ in ambitum: bini interdum ex eodem pede conjunctim nascuntur.

Invenitur etiam hæc species in cædis silvis Francofurti ad Mœnum vicinis, unde rusticæ mulieres lectam, in urbem deferunt venalem, cum non ignorent plerisque empiricos ad muscas necandas: nam cum, ut dixi, muscæ libenter illi insideat, divallam in fragmenta, varijs in cõclavi locis ante fenestras spargere solêt, ad quæ invitata & excitæ muscæ, succum sugunt ipsi perniciosum, & paulò post etiam lethalem.

Crasso etiam est *Quinta* species pediculo, nec minis longo, quam superior: atque ætate conspicitur etiam in ea aliquod discrimen: nam Recens nata, binas uncias vix efflata, in totidem unciarum metam assurgens, coloris ex rufo fusci, & fuliginis veluti infecti: Adultioris corpus longè majus est, trientalem videlicet latitudinem aut ampliorem habet, in metæ formam assurgens, & oris valde laceris, coloris supetnè mixti ex albo, rufo, pallido, fusco, mixturâ vel radiatim, vel maculis duntaxat inspersis, constante: color infimâ parte prorsus fuliginosus, quem nigra strâ, à pediculo in extimas otas ductâ, intersecant.

GENVS XIII.

xiii. Genus
perniciosa. Fung.
Wt. scilicet
terrena
gomba.
Froschen
Bastl.

DECIMUM-TERTIUM genus noxiorum fungorum, secundum vias & semitas in cædis silvis provenit extremo etiam Augusto. Vngari ut *scilicet terrena gomba*, hoc est, ad semitas nascentem fungum: Getmani autem *Froschen Bastl* quasi ranatum sedem, appellant, quoniam tanx his libenter insidere conspiciunt.

In hoc genere observari potest discrimen quoddam, sed illud ex ætate duntaxat proveniens: nam Recens nati corpus, ad binarum unciarum latitudinem non pertingit, & supetnâ parte candicans, fuliginis quadam infectum est: infimâ etiam ejusdem coloris, sed raris strijs, vixque apparentibus præditum: ubi autem Adolevit, majorem habet latitudinem, quatuor videlicet unciarum, & in orbem ferè circinatum est, immaculatâ supetnè candoris, nisi orbis centrum palletet: infimâ pars etiam candida est, multis purpurascens strijs exarata: pediculus gracilis & longus.

GENVS XIII.

xiii. Genus
perniciosa. Fung.
Wt. scilicet
terrena
gomba.
Froschen
Bastl.

IN cædis etiam silvis crescit Decimum-quartum genus, atque eodem quo præcedens tempore invenitur. Vngaricum nomen intelligere non licuit: sed Germani *Wt. scilicet terrena gomba* appellant, causa nominis me latet, nisi quòd à sue appellatio de sumpta videtur. Ejus autem binas observabam species, magnitudine, & infimæ seu supinæ partis colore inter se differentes.

Prima

Prima inæqualem habet magnitudinem: nam Recentior nare corpus, uncia majus non est, fastigiarum, coloris albi fuliginis velut infecti, uncialis longitudinis pediculo, minimum autem digitorum crasso, subnixum, interdum geminum ex eodem pede nascens: Adulta trunciale diametrum habet, in orbem ferè circumscripta figurâ, supernè alba quidè, sed fusco colore infecta, flavo fastigio: infernè verò pallida, & rufis strijs, à pediculo excurrentibus, exarata: pediculus digitalis longitudinis & crassitudinis.

Alterius forma, orbiculatæ, & veluti circino circumductæ, est rotunditatis, cujus diametrum triente latius est, pediculo brevi pollicemque crasso prædita, supernâ parte candida, cui maculæ parvæ fuscæ, & flavescentes nonnihil color, inspersus est, & oris aliquantulum in infernam partem converfa: infernâ ipsâ parte pallidâ, fuliginosisque strijs insignitâ.

GENVS XV.

xv. Generis perniciosi. Fung. 1. species.



DECIMUM-QUINTVM perniciosi fungi genus, quod Ungari *Ti nor gomba*, Germani *Smettschwamm* appellant, perinde ac si unguinosum fungum diceret, in cævis quoque silvis crevit extemo Sextili, hoc est, circa diem D. Bartholomæo sacrum: cujus varietates dicuntur inveniri (species: ego binas observabam).

Præter, truncialis amplitudinis cum suo pediculo, aliqui corpus ipsum fungi uncialem magnitudinem non superat, pediculus aurem binas, supremâ parte pollicaris crassitudinis, infernâ fusciculis, in bulbi formam excrefcens, coloris ex albo pallesceris: ipsum etiam fungi corpus supernè pallidum est, sed maculis dilutè nigricantibus distinctum, atque oris in supinam partem inflexis: infernè mulris strijs ex pallido fuscis, à pediculo in ambitum porrectis, distinctum.

Hanc speciem *sever ti nor*, id est, albam, Ungari cognominant.

Alteri, cognomen dederunt à nigro colore, Ungari, *Fekete ti nor*, Germani, *Schwartzsmettschwamm*. Informis hæc est species, & valde retricoloris, ut verius ligni, sive radicis cujusdam nodosum & nigrum fragmentum videatur, quàm fungus, quod utraque manu vix comprehendi queat: crasso brevique pediculo innititur.

GENVS XVI.

EXTERMO etiam Sextili provenit sub corylis Decimum-sexturn genus, fœtidi admodum odoris, quod Ungaris *Kygo gomba*, Germani *Taster schwamm*, quasi serpentinum, sive colubrinum fungum appellabatur. Ejus porò tres species observabam magnitudine parvè inter se æquales, sed colore & formâ dispares.

Prior oblongo graciliq; fulcitur pediculo, cui insidet initio veluti ovum exalptum, uncialis magnitudinis, coloris albi fuliginis perfuncti externâ parte, nigri striati infernâ & supinâ: deinde, oras explicans, fuscunciale amplitudinem adquisit, in pilei parvique galeri similitudinem formatam, albi supernè coloris, frequentibus fuscis maculis distinctam, atque ipso fastigio veluti fuliginis infecto.

Alteræ longi graciliq; pediculo sustinetur fungi corpus, parvi galeri figurâ formatum, vix ungue majus inirio, dilutiore fuliginis infectum: fuscuncialis aurè magnitudinis cum adolevit, galeri etiam formâ, colore supernâ parte atra fuliginis tincto: infernâ autem, instar tornicis cameratâ, & nigris strijs exarata, quemadmodum & junior.

Tertia



- III. Tertia corpus, ejusdem cum superiore magnitudinis, valde laceris est oris, & quodammodo in lacinias divisum, rufi interdum coloris superne, fuliginosis strijs notatū inferne: nonnunquam autem albi coloris fuligine infecti superne, & nigris strijs exaratum inferne: aliquando etiam infernā & supinā parte aded inversā & reflexā, surrectisq; lacinijs, ut florem aliquem exprimere vel mentiri videatur.

GENVS XVII.

xvii. Generis perniciof. Fung. 2. species.

xvii. Generis
perniciof. fung.
2. species.



CIRCITER diem D. Bartholomæo factum, planis & apertis locis provenit Decimum-septimum noxiorum fungorum genus, à Germanis *hos garpilen* appellatum, Vngaricum nomen nemo mihi indicare potuit, & an ullum etiam apud Vngaros obtinuerit, haud scio: quandoquidem magna ex parte negligere solent eos fungos qui nō sunt elcūcti. Ejus autem duas observabā species.

Primam, dodrantalem amplitudinem habentem, & minimi digiti crassitudine præditum pediculum, binas aut ternas uncias longum, ex cujus imo plerumque subnascitur exigua proles: orbiculatæ fere est figuræ, oris in inferiorem partem nonnulū inflexis, colore supernā parte rufo ad nigredinem tendente, cui flavescent circa medium admixtus est: inferna pars pallida est, strijsq; fuliginosis exarata.

Secundam, ejusdem cum illa magnitudinis, sed graciliore pediculo præditam, circinatæ etiam rotunditatis, nisi laceras haberet oras in ambitu: color in hac superne planè luteus, hoc est, ex pallescente fuliginosus, & venis quibusdā exalbida maculosus, ipsa fungi substantia, sub externā illa cute, omnino atra, ut etiam est pars infima, sic tamen ut crassæ nigræ striz obscurè appareant. Hanc speciem *Schwartz hos garpilen* Germani cognominare possent, ut Priorem *Kott hos garpilen*.

GENVS XVIII.

xviii. Generis
perniciof. fung.
Kurtling.

EODEM quo proxime præcedens tempore crevit Decimum-octavum pernicioforum fungorum genus, in silvis proveniens, & à Germanis *Kurtling* appellatur: quoniam vacca valde appetunt.

Longè

FVNGI PERNICIALES.

cc.lxxxiiij

Longè minor est hic fungus Decimo-septimo, nec uncialem aut fescuncialem magnitudinem superat, pilei sive parvi guleri figuram exprimens in meram quodammodo sublatam, coloris supernè rufi, infernè exalbidi, fuscis strijs distincti: pediculus gracilis est, & binas tamen uncias longus.

Eius Fungi perniciosi quem Vngari *Farganya* appellant, duò competio genera: Vnum à Germanis *Binglin* dictum alterum ab iisdem *Bals* nuncupatum: quod discrimen, non sine iudicio ab iisdem factum esse censeo: nam alia est Primi, altera est Secundi facies. Nos Germanorum distinctionem sequemur, & bina genera constituemus.


Binglin.
Bals.

GENVS XIX.

VNOVICESIMVM ergo perniciosorum fungorum genus nobis erit, quod Germani *Binglin* appellant, secundum vias & in quercetis nascens circa Calendas Septembris. Hujus autem multæ sunt species, omnèsque perniciosæ, præsentemq; interdum mortem ijs inferentes, qui vescuntur; quia similitudine, quam cum XVI. genere Vesicorum habent, illos ab innoxijs discernere non sciverunt.

212 Gump
notum fung.
Binglin.

XIX. Generis perniciosi. Fungor. 1 species.



Prima, valde gracili subnixa est pediculo, binas uncias aut amplius longo, sustinens ipsum fungi corpus orbiculatæ formæ, fescunciam latum, aliquotulum in supinam partem inflexum, coloris ex flavo, rufo, fuliginoso, commixti supernè, ex pallido fusci infernè, & multis strijs exarato.

Altera amplior est, nec adeo gracilem habet pediculum: orbiculatæ etiam est figura, paululum supernè tumescens, & coloris vel rufi, raris quibusdam maculis conferti, vel fusci omnino & fuliginosi: infernè autem pallidi, frequentibus fuscis maculis notari, vel ex fusco pallidi omnino, nec ullis strijs distincti.

Tertia species, Quarti generis esculentorum Tertiam speciem plurimum imitatur: crasso etenim prædita est pediculo, unciam longo, corpore in metam assurgente, uncialis magnitudinis dum recens nata, & ex cineraceo fusci coloris: adulta autem, binarum unciarum, colorisque magis exalbidi, & notis quibusdam distincta, lacera & hians.

Quarta species, duplex esse videtur: nam, vel infra duarum unciarum magnitudinem consistit, crasso corpore, gracilioreque pediculo prædita, supernè ex atro rufescentis coloris, infernè flavi, frequentissimis parvis maculis inspersis: Vel trientalem amplitudinem adquirent, crasso & protuberante corpore, fusco supernè & scissuris quibusdam albis laceros infernè ex flavo pallidente, striarumque ex parte.

Quinta species satis informis est, tuberis (dum junior) figurâ, supernè valde fusci, infernè rubra saturâ & nigricans, circa oras flava & ochræ colore, binas uncias lata: in Adultâ magnitudo amplior, quatuor videlicet unciarum, orbiculatæ pæne figuræ, per intervalla protuberantis supernè, & fusci coloris, in quo diluor rubescens color quibusdam locis elucet: infernè autem ex rubro atroque obscuri, strijs carente, pediculo valde crasso, inæquali & fusco, ipsum autem fungi corpus contractum cærulei, virescente intercepti, est coloris.

Sexta species, magnum cyclaminum tuber valde refert, tum amplitudine, tum colore, & inæquali rotunditate: infernâ autem parte ochræ colore est, venis quibusdam rubescentibus aut fuscis distincto, nullis tamen strijs. Hanc speciem Vngari *Baba Farganya* appellant.

Omnium autem amplissima est *Septima* species, ut quæ sesquipolmaris sit, inæquali tamen ambitu, supernè magna ex parte purpurascens coloris, cui permixti sint rufus & fuliginosus: ipsum internè corpus subcærulei coloris, ut etiam pars supina cui pediculus inhe-

Baba Farganya.

213.

lit: reli.



sit: reliqua pars inferior flava est, binis aut ternis magnis maculis rufis infecta. Iunior verò & primum emergens, longè minor est, duarum videlicet unciarum duntaxat, supernè & infernè ejusdem cum Adultiore coloris.

Vargaria
dubia
f. 1.

Stictis
bulg.

Antè quàm ad Vicesimì generis noxiarum fungorum historiam describendam accedam, operæpretium me factum arbitror, si dubij cujusdam fungi mentionem hoc loco faciam, tanquam ejus qui à nonnullis inter innoxios reponeretur nomine *Vargaria* insignitos: meà tamen opinione potius ad præcedens non veficorum genus referendi.

Triuncialis autem is est pediculo, digitalis pæne crassitudinis, albicantis coloris, sed multis fuscis venis varij: ipse fungus circumatque in plano rotunditatis, tres uncias latus, superius aliquantulum tumens, & lateritij coloris, propter quem Germani *Kottelbulg* cognominant: infernà parte cineraceum quodammodo habet colorem, nullis striis distinctum. Sunt tamen, qui inter ejus generis, quod proxime describam, species, referendum censent: quorum sententiam etiam improbare non possum in re dubia.

GENVS XX.

xx. Generis perniciosorum Fung. 1. species.

XX Genus
noxiarum fung.
Vargaria
bulg.

Natale
f. 1.

Crasso
bulg.
f. 1.

Sagittæ
bulg.
f. 1.



Vicesimì Fungorum noxiarum generis (quod, ut dixi Vngaris, *Vargaria* etiam dictù, Germanis verò *Bulg*) perinde ac xvi. veficorum fungorum genus, ob eà quam istis expressi causam) variaz etiam sunt species, quæ eodem quo Vnde vicesimì genus, tẽpore, in cædis silvis nascentes reperiuntur.

Crasso est corpore *Prima* species, in metæ formam surrecto, cineraceo supernè colore, infernè ex flavo pallente, nullis strijs rimoso, brevi, sed crasso pediculo, hoc est, sescũciam longo, unciam crasso: à Germanis *Crasso bulg* cognominatur.

Longiore est *Altera* pediculo, non minus tamen crasso, parte terræ proximà, summà autem, graciliore: ipsum fungi corpus crassum, binas uncias latum, etiam in metâ quodammodo assurgens, colore, vel ex pallido fusco, vel fuliginoso prout & inelegati: inferna pars nullis strijs notata, ochreæ colore est, quam ob causam ab Vngaris *Sagittæ Vargaria* appellatà puto, licet aliz species etiam infernè flavæ sint, sed non adeo eleganti colore præditæ.

Tertia species crasso similiter constat pediculo, parte terræ proximà: corpus ipsum in primum nato fungo sescũcialem magnitudinem non excedit, & raso colore est: in adultio duarum unciarum, aut amplioris latitudinis,

dinis, circinatæ uterque ferè rotunditatis, & nonnihil extumescens: inferna pars strijs etiam earet, & colorem ochræ fuliginè perfusam habet. Germani *Notte bulij* vocant, non minus tamen propriè (meâ opinionè) *Schwartz bulij* nuncupantur.

Quarta speciei orbis trium unciarum est, in elegantis coloris, ut qui ex rufo & fuliginoso cominixtus sit, pediculo subnixus binas ferè uncias longo, minimi digiti crassitudine inferna pars subrufo est colore, & præter superioris generis omnes species, hujusque reliquas, multis fuliginosis strijs scissâ est: cujus rei, ut opinor, causa, Germani *Widder bulij* hoc est, silvestris cognomen indidère.

Notte bulij.
Schwartz bulij.
Widder bulij.

GENVS XXI.

Sva extremum Septembrem pervenit *Vicissimum-primum* genus subter abietibus, quemadmodum & *Vicellum* genus esculentorum, cui per simile est: sed quoniam interiore parte hirsutum est, rejicitur. Germani *salische Bessling* quali spurium nominant: Vngari, *fenyosalya gomba*, hoc est, sub abietibus nascentem fungum: sed additis his duabus vocibus, *nem io*, ut solent omnibus fungis non vescis.

Svi. Grom noster, fung.
fenyosalya gomba.

Recens natus hic fungus uncia non multo major est, & oris valde in supinam partem inflexis, crassiusculo corpore, & veluti crassis quibusdam venis subrubentibus in orbem superne ductis notato in albicante planicie: Adultus autem, *Vicissimi* esculentæ amplitudinem acquirit, superne ejusdem cum primùm nascente coloris, & pari ratione subrubentibus venis in orbem ductis insignito, oris tamen magis inæqualibus: inferna pars dilute rubet, & multis rufis strijs exarata est: pediculus digitalis ferè crassitudinis, binâque uncias longus, qui contractus, rubrà substantiâ constare deprehenditur.

GENVS XXII.

Vicesimus-secundus generis noxiorum fungorû, quod Vngari dicitur *Tauis alya gomba*, Germanis *Widder bos schwamm* (quod numen Vngarici interpretationem exprimit) quia ad Spinarum, quæ vetustate corrumpi incipiunt, atque inter dumeta nascuntur: multæ sunt species, quarum proventus circiter Calendas Octobris.

Sxi. Grom noster, fung.
Tauis alya gomba.
Widder bos schwamm.
Natalis.

Prime speciei, sem aut septem nascuntur ex uno pede fungi, longis & gracilibus pediculis fulti, orbiculari ferè corpore (sornicaro tamen, seu camerato infernè) vel semicirculari, vel unciali, colore flavo, quemadmodum ipsi etiam pediculi, qui maculis tamen nigris distincti.


Conferunt etiam nascuntur in *Alterâ* specie, octo aut novem fungi ex uno exoito, breviorè & perinde gracili subnixo pediculo, in orbem veluti expanso corpore, quod uncia aut fescunciam latum est, superne pressum, & tanquam umbilicatum, coloris flavi rufi suffusi: infernâ autem parte flavâ, & multis fuliginosis strijs distinctâ.

Rufi coloris sunt, qui conferunt etiam in *Tertiâ* specie nascuntur fungi viceni & plures ex eodem pede, gracilibus pediculis fulti: ipsius corporis fungi forma orbiculata est, latitudo inæqualis, pro ætate ut arbitror vetustate: nam & inveniuntur ungue nō majores, & unciales, & fescunciales, omnes rufi colore tincti superne, infernè fulcis strijs exarati.

Quarta species plurimos habet ex eodem ortu provenientes fungos, tricenos videlicet aut plures, pediculo, pro singulorum ætate, brevi aut longo suffultis, orbiculatæ omnes figuræ, magnitudine tertiz speciei fungis pares, colore tamen inter se variant in hac specie: nam vel flavi sunt, multo tamen rufo colore perfusi, aut omnino rufi, sed nonnihil tumescentes & fusci: infernè autem nigricantibus strijs notati. Germani *Stod schwamm* appellant, quia in ipsis tuncis humi jacentibus nascuntur.

Sxii.
Stod schwamm.

xxii. Genetis perniciosorum Fungorum 5. species.



bb

Majorem

- v. Majorem orbem habent *Quinta* speciei fungi, quippe cujus diameter sit duarum unciarum, & quindeni aut plures ex eodem ortu nascuntur simul, doctantibus, gracilibus, candicantibusque pediculis fulci, colore supernâ parte vel rufo, vel ex rufo dilute albescente: infernâ parte, quæ aliquantulum camerata est, subalbida, & crassis fulcis strijs distinctâ.
- vi. Turbinato, & quasi in metam assurgente sunt *Sexta* speciei fungi corpore, seni aut plures ab eodem exortu nascentes, & oblongis gracilibusque pediculis, mediâ parte crassiusculis, instar caulium ceparum, fulci, latitudinem habentes uncialem, aut duarum unciarum, supernè cineracei quodâmodo ex rufo coloris, aut fulci: infernè crassis nigris strijs exarati.

GENVS XXII.


XXII. Genus
noster. fung.

CIRCA idem tempus, cùm secundum vias, tum in lignis putridis & palustribus locis proveniunt aliquot alia fungorum genera, quorum nomina Ungaris & Germanis, ut existimo, ignota, certè nullius nomen ab ipsis edoceri potui. Nos ea omnia sub Vicefimam tertiam classẽ perniciosorum fungorum reducemus.

- vi. *Primus*, uncialis magnitudinis habet orbem, supernè tumidum, & rubri perelegantis coloris: infernè albicante, fulcis tamen strijs exaratum, unciali pediculo, non valde tamen gracili fultum.
- vii. *Alter*, orbiculatæ etiam est formæ, paulò tamen amplior superiore, longioræque pediculo subnixus, prolem fungi ab exortu plerumque proferente: supernè rufi, & ad laterium tendentis coloris: infernè dulcius, & frequentibus strijs distinctus.

xxiii. Genetis pernicios. Fung. 3. species.

xxiii. Genetis pernicios. Fung. 3. species.



- viii. In nodum veluti collecto est corpore *Tertius*, infernè fornicato atque camerato, suis oris pediculum uncialis crassitudinis, duarum autem unciarum longitudinis stringente & amplectente, coloris ex albo, rufo, & fuso variè commixti.
- ix. *Quartus*, binas uncias latus est, sed inæquali orbe, supernâ parte candicans ex cineraceo, infernè similiter, sed fulcis strijs à pediculo ad extimas oras productis: pediculus brevis & crassus.
- x. *Quintus*, informi pænè figurâ emergit, tuberis instar: deinde ruptâ illâ externâ membrânâ, sive volvâ, stilus exilit pollicari crassitudine, digitali autem longitudine, penis aut verètri canini instar, & tanquam unciali glande summo fastigio præditus, initio quidem ex atro virefcente, deinde nigra, & cellulis quodâmodo præditâ, quales ferè in *Primi* generis efculentorum

lentorum fungorum speciebus conspiciuntur: ea autem suo tempore expanditur, & strijs infertne distincta est. Volva ipsa cineracei quodammodo est coloris, interdum etiam subrufa, ipse stilus sive coles initio albus, deinde *σπείλος* & varius, parvisque notis subfulcis maculosus: fortius est hic fungus, & iam periturus quodammodo liquefcit, atque in atramentum dissolvitur, nigro colore tellurem inficiens. Intellego etiam mufcas eo degultato interire. Valde autem accedere videtur ad Phallum à C.V. Hadnano Junio olim in fabulosis aggeribus Hollandiæ, Oceano objectis, observatum & decantatum.

Phallus Hadn.
de Junj.

Fungus mi-
nimus dicitur:
p. 20.

Ab his porò omnibus, protius diversus est is fungus, quem *αὐτοῦρος* vocabo, & omnium minimum esse existimo: nam vix semunciam altus, Autumno plerumque nullo petiolo fultus, ligneis tabellis pulvinos & arcolas in hortis ab invicem segregantibus adnascitur, cineracei vel exalbidi coloris, formâ penè grossum immaturam referens, minimi digiti extremum articulû magnitudine & crassitudine vix æquans, singularis plerumque, vel (quando plurimi) binii, terni, aut quatermi simul cohærentes, qui maturi supernâ parte dehiscen-tes, pleni apparent lenro quodam succo, & seminibus, magnitudine quidem seminis cyclami: sed exiles fungulos formâ figuræ exprimentes, cineracei, ut parens, coloris.

Nasci etiam in Italiâ hunc fungum, nullum est dubium: nam meminî ejus semen exsiccarum, istinc olim ad me missum ab amico, exotici cujusdam seminis nomine, explorandi gratiâ, an dignoscere possem: ut reperiuntur quædam ingenia, quæ ex aliorum ignorantia laudem captare & venari student.

GENVS XXIIII.

VICESIMUM-QUARTVM fungorum noxiôrû genus Germani *holz schwaamm* ap-
pellant, quoniam Octobri mense, in putridis dejectarum arborum ramis crescat. Vn-
garicum nomen mihi ignotum. Tres autem ejus species observabam: quarum,

XXIIII. Genus
noxiôrû fung.
holz
schwaamm.
1.

Prima reliquis major in majusculis ramorum fragmentis humi jacentibus nascitur: for-
mâ à Primo generi non esculentorum fungorum haud valde dissimili, sed colore elegantio-
re, nempe rubro, uncialis aut duarum unciarum magnitudinis: interdum plures simul co-
hærentes, & in unum corpus veluti coalescentes, valde tamen se remittente colore.

126.

Alterâ longè exilior est, & unguis latitudinem interdum non superans, nonnunquâ etiam
laciôr, singularis aliquando, interdum bini simul conjuncti, formâ veluti supernè exscalprâ,
coloris egregiè rubentis, & adeò floridi, ut coccineum provocare videatur. Inhæret plerum-
que tenuibus ramorum humi jacentium, aut corticis illorum fragmentis, in vis obfuscat &
ab arboribus obfessis, quæ Solis radios adiungunt.

111.

Proterius rogofo est *Tertia* corpore, uncialis aliquando magnitudinis, nonnunquam sefcun-
cialis: interdum bini simul cohærent unciâ minores, plerumque etiam terni, & illi quidem
elegantiore aureo colore præditi, reliqui flavo: adnascuntur similiter tenuibus vel ramulis
vel eorum fragmentis humi jacentibus.

GENVS XXV.

IN putridis dejectarum arborum caudicibus crescit Vicesimum-quintum fungorum
non esculentorum, immo pernicialium genus circa Calendas Novembres. Ungari *fyer*
szekes ar gombis, à candore cognominât: Germani *weiße schischling*, id est, silvestrem cervinum
fungum, ad ejus differentiam, qui Vndevicefimo vesceorum genere descriptus est.

XXV.
Feyer szek-
es ar gombis.
Weiße
schischling.

Sempedalis magnitudinis est hic fungus, aut amplior, elegantissimæ formæ: nam fruti-
cosus est, & in innumeros quodammodo ramulos divisus, candoris immaculati, quorum
nonnulli abiegnorum ramulorum figuram expriment, adeò ut si splenderet, ex puro puto
argento constatum quis æstimare possit: aliquando nullum habet pediculum, sed ipsi deje-
ctæ arboris caudici inhæret: interdum sefcunciali fulcitur pediculo.

GENVS XXVI.

SUPEREST Vicesimum-sextum noxiôrû fungorum, quos in Ungariâ observabam,
genus, quod circiter Calendas Novembres etiam provenit, non in arborum dejectarum
caudicibus aut ramis, sed in seccionibus pratris, & cævis silvis. Ungari *Poffeteg*; Germani,
Wobes szil id est, muliebrem creptum; Galli, *l'esse de loup*, hoc est, creptum lupi, appellant,
quod nomen etiam apud Herbariorum vulgus obtinuit.

XXVI. Genus
noxiôrû fung.
Poffeteg
Wobes
szil.
L'esse de
loup.
Creptum lu-
pi.


Ejus autem tres observabam differentias, magnitudine, nonnihil etiam formâ inter se
distrete pantes.

Prima, omnium vulgarissima, etiam ipsi pueris nota: nam in omnibus, quas adj., provin-
cijs, nascentem observare memini. Boleum terrâ primùm erumpentem valde mentitur,
& initio eximij candoris est: deinde evanescente candido colore, succedit alius pallescens,
& tanquam fuligine suffusus: internum corpus albâ substantiâ constare deprehenditur per
medium sectum. Cùm vetò maturum est, contractum & pressum, pulverulentum quen-

bb 2 dam fa-

dam fumum effundit, ut memini me puerum frequenter observare, cum aequalibus ludentem in siccioribus pratis (ad quæ nos sapiusculè deducere solebat noster pædagogus animi relaxandi gratiâ) in quibus hæc species crevit, & certanem, uter plures hujus fungos maturos eximo pede propelleret, ad pulverulentum illum fumum excitandum.

xxvi. Generis perniciosi. Fung. 3. species.



Altera in cædis silvis crevit in plerisque, ut credibile est, Provinciis: sed mihi in Vngariâ duntaxat observata. Magno illa constat corpore, amplitudine capitis pueri aliquot annos nati, cineracè cute tecta: sed quæ deinde, multis locis laccra, substantiam ostendit spongiosam, coloris prorsus fuliginosi, quæ compressa, multum pulverem effundit.

Tertium sola amplitudine à Secundâ differre arbitror: nam cutis illa tenella ipsum corpus tegens, ejusdem est coloris, & perinde atque illa variis locis laccra, ipsumque fungi corpus illâ amictum & tectum, planè etiam spongiosum, fuliginosique coloris, pulverem, si comprimatur, non secus ac illa effundens. Exerescit hæc interdum in foliis pugillarij, quem vulgo ballonem appellant, amplitudinem. Eam exsiccant, & omni pulvere, quem continebat, vacuum, ad servare solent tonfores, illaque uti ad sanguinis fluxum in vulneribus restinguendum: quam ob causam in suis officinis pensilem eos habere plerumque, etiam in Germania multis locis observabam.

ISTA etiam de pernicioso fungo in medium adferre libuit. Quisquis autem perfectam & absolutam fungorum cognitionem adquirere volet: his adjungat, & diligenter evolvat quæ Plinius cap. viii. lib. xvi. Naturalis Historiæ, quæ item cap. xxii. & xxiii. lib. xxii. ejusdem Natural. Historiæ scripsit de fungis: quæ similiter Diosc. cap. lxxviii. lib. iiii. atque cap. xxiiii. lib. vi. de iisdem fungis tradidit, atque Matthioli in eundem Commentarios. Deinde Athenæi lib. ii. Deipnosoph. postremo quæ cap. lxx. lib. x. Villæ suæ scripsit Ioan. Bapt. Porta, vir nobilis & in Philosophico studio summâ cum laude versatus, qui omnium diligentissimè, quidquid Veteres de fungis scriptum reliquerunt, peculiari complexus est capite.

Quia verò plerique ejus librum fortè non conspexerunt, aut etiam conspectum ad manum non habent: non abs re me facturum exultavi, si, in illorum gratiam, totum illud caput hic subijcerem.

DE



D E F U N G I S.

Caput lxx. Libri x. Villæ Ioan. Baptistæ Portæ
Neapolitani.

INTER Cartilaginea refectemus & fungos: nec nisi supra terram totus est. Diocles Castius inter rusticas dapes recenset apud Athenæum. Nunc autem suajucunditate tam moroso divitum palato placeant, ut eos in mortis discrimen sæpius adducant. Euripides, quum in Icarum insulam adnavigasset, matremque cum duobus filiis & virgine, fungorum esu mortuos vidisset, hoc epigramma fecisse dicitur, teste Athenæo.

*Sed, qui perpesno colorum tramite curris,
An visum facinus hinc simile ante tibi est?
Pars eadem lucis geminis cum virgine fratres
Abfult, & matrem: quatuor urna tegit.*

Libuit Plinio coquendi dare aliquas communes in omni genere observationes, quando ipsæ suis manibus deliciae præparant hunc cibum solum, & cogitatione ante pascuntur, succineis novaculis, aut argenteo apparatu comitante. Noxij erunt fungi, qui in coquendo durationes sient, innocentes, qui nitro addito coquentur, si utique percoquantur. Turiore sient cum carne cocti, aut cum pediculo pyri, profunt & pyra confectum sumpta. Debellat eos & aceti natura, contraria ijs. Diphilus Medicus ijs, qui hoc cibo strangulantur, remedio esse dicit, aquæ mulzæ, nitræ & aceti potum, ita ut in vomitione reddatur: itaque parati debent ex aceto, aqua mulzæ, vel melle & sale, ex Athenæo. Apinius de fungorum apparatu hæc habet. Fungi farnei elixi, calidi, exsiccati, in gatro cum pipete excipiuntur, ita ut piper cum liquamine feratur. Alite: In fungis farneis piper, carenum, acetum & oleum laudantur. Vel, fungi farnei ex sale, oleo, mero & corianno conciso inferuntur. Fungos boletos, carenum, fasciculum corianni viridis ubi ferverint, exempto fasciculo inferes. Vcl, boletorum coliculis, liquamine, vel sale asperfos inferunt: vel, boletorum thyrsos concisos in parcellam ovæque perfusus, addito pipete ligustico, modico melle, & liquamine, temperabis oleo medico. Platina coquendi rationes aliquas affert. Cum succosa illa thyrsi parte, qua terræ inhæret, in aqua ptimum cum excavato pane, cumque pyris, aut pyrorum surculis, ac pediculis coquendi sunt. Allium quidam induunt, quod obolare venenis putatur. Elixæ ac saliti, in oleo aut liquamine friguntur, fricti, moreto, quod falsam vocant, aut alliari suffunduntur. Sunt etiam qui eos ablata pelle, aut superiore folliculo (indito sale atque oleo) sursum versum in carbonibus decoquant, piperque aut cinnamomo asperfos devorent.

*Fungorum
amandulæ
satis.*

Græci *μακρὰς* æniss capulo, vel summo vertice vaginam occultende appellant. *Nomen.* Significat *μακρὰς* eniss manubrium, sicuti ex Herodoto liquet, unde & Mycenæ nuncupati credunt, quod ibi à Perseo sint conditæ Mercurij præcepto, ubi excidit gladij manubrium. Poëtæ *μακρὰς* vocant, hoc est terræ natos: nam quorum pater ignotus est, filios terræ vocare solent. Quod Cicero ad Atticum in epistola confirmat. Porphyrius *μακρὰς*, Decorum filios, quod sine semine provenire videantur. Latini fungos vocant, nomenque (aliquorum opinione) à funere deducitur, quod suo veneno ad funus vescentes ducant. *Italici fungib.*

Nunc genus, suis verò particulatim tractationibus species subseribemus. Theophrastus cortice, modulla, nervo, & vena catere dixit, ac radice penitus. Sed Athenæus Theophrasti testimonio fretus, levi cortice esse dicit, sine radice: sed principium habere suæ pili laticinis caulem in longitudinem propensum, atque per ipsum nervum se extendere. Phanas verò, neque florem, neque feminum vestigia demonstrare. Quod falsum esse, jam alibi diximus, quippe semen ferunt.

Fungorum perniciosiora natura. Nos paucis genera perstringemus. Fungorum genus, vel *Genus.* naturæ, vel artis opus. Sunt enim ægritæ ex industria, ut dicemus. Naturalium duplex *Fungi natura.* discrimen, Dioscoride auctore: ait enim. Qui manduntur, aliquando perniciosi sunt. Le- *ratio digni-
tati.* tales multifariam virus contrahunt, vel ubi clavus ferreus, in quo sit rubigo, vel ubi putridi panni, vel serpentum laticula & cava, vel si juxta arbores erumpunt, qui noxios privatim pariunt fungos: omnibusque ijs colluvies quædam infidet, & spuma, iidemque à carptu celeriter computrescunt, atque matore viriantur. Plinius à Dioscoride & alijs excipiendo, hæc habet. Pernicialia prorsus improbanda: si enim caligatis clavus, ferrive aliqua rubigo, aut panni matore adfuerit nascenti, omnem illico succum alienum, saporemque in venenum concoquit, deprehendisseque nisi agrestes possint, atque qui colligunt. Ducunt ipsi alia vitia, nunc quidem si serpentis caverna juxta fuerit, si nascentes primo adhalaverit, capaci venenosum cognatione ad virus accipiendum: itaque caveti conveniet prius quàm se condant serpentes. Signa erunt tot herbar, tot arbores, fruticeque, ab emerulicarum ad latebram usque vernantes: & vel fraxini tantum folia nec postea nascentia, nec ante decidentia. Quorundam ex his facile noscuntur venena, diluro rubore, rancido aspectu, livido intus colore, ximosa stria, pallido per ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdam: ficci- *Pernicialia
ut digne
si accuti.*

quæ & nitri similes, veluti guttas in vertice albas ex tunica sua gerunt. Vnde à petitis regionum legendi sunt.

*Sine arboribus
necesse fungos
parant.*

Arborum verò, quæ varios fungos parere solent, qui cibis abdicantur, sparsim Authores meminerunt. Nicander in Georgicis suis Athenæo teste.

*oleis inimica propage,
Quercu, & punice malo tristissima pestis,
Ilicibusque venit fungus gravis humidus atque
Letifer.*

Plinius, robur, cupressus, & pinus noxios pariunt, item fagus. Theophrastus: robur è radicibus, & iuxta radices emittit fungos. Avicenna, ex olea improbos. Platina noxios emittit. Sed edules autumnales, vel verno tempore nascuntur.

*Fungus la-
dabilis.*

Dicemus de Autumnalibus qui primis imbribus nascuntur. Horum genus tripliciter partiemur: vel enim in pratis, vel arboribus, vel lapidibus adnascuntur. Dicemus primo de pratenlibus quum sint laudabiliores. Horatius,

*pratenlibus optima fungis
Natura est, alys male creditur:*

Pratenfium optimi, quique principatum tenent, boleti sunt dicti à Latinis, à Græcis vero βολήτης, Galeno, & Paulo Æginetæ suo affectæ. Sunt qui dictum volunt a βολή, quod glebam, & privatim rubricam illam vulgo bolus dictam, significat, unde colos boleti. Neapolitani *anale* & *bolecciali* vocant: ita enim ovorum vitellum dicunt, cujus formam præse ferunt. Quanti olim existimati fuerint, indicat vel illud Martialis:

*Argentum atque aurum facile est, lenamq, togamq,
Mittere: boletos mittere, difficile est.*

Volati.

Plinius, Inter ea, quæ temerè manduntur, boletos merito posuimus: optimi [opimi] quidem hos cibi, sed immenso exemplo in crimen adductos, veneno Tiberio Claudio Principi per hanc occasionem à conjugè Agrippina dato. Origo talis est. Volvam terra ob hoc prius gignat, ipsum postea in volva, seu in ovo est luteum: nec tunice minor gratia in cibo infantis boleti. Rumpitur hæc primò nascente, mox in pediculo corpus absumitur, raròque unquam geminæ ex uno pede. Origo prima causæque e limo, & accrescente succo madentis terre, aut radicis fermè landisferæ: initioque spuma lentior, dein corpus membranz simile, mox partus. Ortus, occasusque ejus omnis intra dies septem est. Robur boletos producit circa radices. Glaucias stomacho utiles putat boletos. Galenus: omnium fungorū vix minimè noxi. Sed ne quis largius eis utatur: pravi enim sunt succi, atque interimere possunt. Variè condiuntur, ut ea, quæ nulla insigni qualitate prædita sunt. Eadèmq; Paulus asserit. Succedunt quos Græci *αμάρτυρας* vocant, Latini Suillos, quos ad hunc usque diem Neapolitani vocant *silli* & *ammoniti*. Apicius farnicos fungos vocat, à farno roboris genere, ut suspicor. Dixit enim Plinius, robur eos producere. Proximi bonitate jam dictis. Galenus: Secundi post hos sunt amanitæ. Et Paulus: Colore sunt fuliginoso, pediculo omnium crasso, orbe, ut sæpe humanum caput æquant, infra colore nigro virefcere. Quum elixantur sunt mucosi. Nascuntur in silvis, ubi solum incultum. Nicander cum non torrerè debere dixit ex Athenæo. Plinius: venenis accomodantissimum. Familias nuper incremère, & tota convivâ, Annæum Serenum præfectum Neronis vigiliam, & tribunos & cæturiones Quæ voluptas tanta incipitis cibi? Siccantur pendentes suilli junco transfixi, quales è Bithynia veniunt. Suilligulæ novissima irrimenta. Circa roborum radices gignuntur. Tutissimi qui rubent callo, minus diluto rubore, quàm boleti. Mox candidi, velut apice flaminis insignibus pediculis. Hos Neapolitani *Conocchiele* vocant, longo enim prodeunt pediculo, callo corporis in turbinem mucronato: à neto fusorum glomere, *conocchia* vulgo dicto, ita appellantur, placèntque moroso divitum palato. Sunt in fungorum genere à Græcis dicti *Pezæ*, qui sine radice aut pediculo nascuntur, ex Plinio.

*Amantia
Silli.
Farni/fum
S.*

*Suilli fungi
venenis ac-
commodatissi-
mi.*

Conocchiele.

Pezæ.

Gallinacea.

Gallinella.

Piperitæ.

Peperella.

Richione.

Galucci.

*Fungus a-
boribus.*

Nunc aliquos subjungemus antiquis inditos. Est fungorum species, Neapolitanis *Gallinacea* vulgo dicta, mirabili profectò forma, ut necias cui assimiles: ad magnam crevit altitudinem, ut brachijs diductis vix homo completi possit, pondus sexaginta librarum, non orbiculari forma, ut ceteri, sed veluti manus in digitos plures diducta, ut quercus frondibus affimiletur, albi, callosi, ut vix integro universa familia vesci possit. *Gallinella* verò parva est forma, spongij vel nascentibus portis similis, quatuor digitorum longitudine nascitur Autumnino locis umbrosis. Est & fungus quem *Piperitum* vocant: quia vescendo linguam vellicat, ac si piper voraremus, ac fauces incendit: nascitur etiam Autumnino, coloris albi, vulgoque *peperella* dicitur. Est & candidus, odoratissimus, orbem vix utraque manu diductis pollice & indice cinges, tam esui suavis, ut crudus edatur: præbetur ægris innoxie, incolæ *Richione* vocant, quasi magnum fungorum regem dicas. Qui vulgo *galucci* dicuntur, candidi sunt immaculati, bini, aut terni ab uno pediculo juncti, forma non rotundi, sed veluti galli cristæ, unde nomen sumpsisse suspicor, croci odore, coma velut villosa. Sed ne molesti sumus, summa est, quod unaquæque regio suos populares habet.

Nunc ad aliud genus deveniendum, quod scilicet circa arbores adnascitur. Nicander maxime fungos, qui sicui adnascuntur, laudat, inquit:

Quum

*Quam sacris ficus multo sub stercore tecta,
Si mox perpetuo fluxu confuseris illam,
Innocui surgens radicibus undique funes,
Quos tu ne vertas, radicem cauto nullam.*

Plinius non solum ex ficus arbore: sed, his abetir, inquit, veneni argumentum, quo similior fuerit arborum fici. Quidam discernere arborum generibus, fico, ferula, & gummi ferrenbus. Populus alpina tangis nascentibus laudatissima. Quercus probatissimos, inquit Plinius. Sed apud nos noxii sunt: nescio cur quercus probatissimos ab eo producere dicatur, rob. ar. verò noxios, quum ejusdem generis sit, ne dicam idem. Diphilus medicus: Familiares & innoxii creduntur recentes, minutissimi, molles, friabiles, qui in ulmis & picis nascuntur, ex Athenæo. Sed omnium optimi, qui in Sambuci radicibus adnascuntur: eos hieme edimus.

Postremum genus è faxis nascitur. Præciditur ad usum, alius subnascitur, semperq; novos producit, resubili secunditate: septem diebus perficitur, sexies anno demetur, terra dorante operitur. Neapolim afferuntur ex Vesuvio monte lapides: Surrentum ex Fageto altissimo sui tractus monte: Abellini, ex Partenio monte, in Apulia, ex Gargano, & cellioribus montium partibus: nam saxa, ubi semel produxisse videntur, suffodiunt, & venum exportant. Nascuntur aliquando non pileati, sed tuniones ut asparagi, & in ramos divisi.

Nunc & genera indicabimus, quæ verno nascuntur tempore. Plinius Nec non & carnosâ aliqua appellabimus, ut spongas in humore prætorum enascentes. Nascuntur Martio mense, eiſque vesiſimur quadragimalibus jejunijs. A spongiarum similitudine *spongias* dicimus. Strobilos magnitudine & forma præferunt, ut trium librarum pondus sæpe expleant, foraminibus pervix, & vacuæ sunt. Simul & cum his nascuntur, quas vulgo *monacelle* vocamus, colore nigro, cauli sex foliolis rotundis per centrum annexis hærentibus, sed sapore inferiores. Sunt & omnium fungorum optimi, qui vulgo *Firni* dicuntur, quod verno tempore nascuntur, Romanis *prignoli*; primis Aprilis imbribus erumpunt, odorati, gustui suaves, & innocui: nascuntur in silvis sub arborum umbris, & ubi nascuntur, quotannis repullulant. Aliquando, cæcis arboribus, è loco evanescunt: solum in quo creſcunt cinerei coloris. Hermolaus innocentissimos dixit, qui è rubis vere nascuntur rotunditate clusili, quos inde *prunelle* & *stimulo* vocant, & è carduis, quos inde *cardueles* appellant.

Postremo eos prosequemur, quos ars repetit. Dioscorides tradit esse qui dicant, utriusque populi, albx nigræq; cortices in minutias concisos, & stercoreatis segetibus inspectos, fungos utiles innocentisque parere toto anno resubiles. Ait Tarentinus: Fermento in ipsiſ populi nigræ truncis, juxta terram recisis aqua diluto, protinus coalescunt *agritæ*: additisque, si montanum arvum, multis calamis, stipulis, & stercibus scatens, quod cælum imbres parit, incendatur, permulti sponte naturæ prorumpent fungi: si tamen arvo jam ignem experto, non subsequitur imber, qui impendete videbatur, aqua linteo raro stillatim, imbris imitatione conspergenda ijs incensis locis, nascunturque fungi quidem, sed aliquanto deteriores: siquidem meliores in hoc genere sunt, qui in imbre aluntur.

Hæcenus Ioan. Bapt. Porta, qui, quum Athenæi versionem postremam à C. V. Iacobo Dalechamio factam multis alijs Villæ suæ locis sit sequutus, eam toto libro Decimo neglexisse videtur: quæ tamen longe elegantior est, & magis probata.

FVNGO.



FVNGORVM ALIQVOT ALIÆ I C O N E S



QVONIAM Typographus aliquot fungorum icones jam sculptas habebat, quibus C. V. Matthias Lobelius ad calcem sui Herbarij Germania inferioris Idiomate conscripti usus est: eas hic subijcere, atque illius descriptione utilibuit. Fatemur tamen binas in nostrum Commentarium intulisse, quæ sola, ad eorum, quos descripsimus, Fungorum Historiam accommodari potuerunt, ad primum videlicet Esculentorum genus, & ad postremum Perniciosorum: quorum quidem icones vivis coloribus expressas totidem habemus, ac utriusque generis species descripsimus: sed paucas in tabellis scalpi voluimus, ne nimis sumptibus Typographus gravaremur.

E vernaculo Lobelij Herbario desumptæ icones & descriptiones.

VVLGARES EDVLES FVNGI, PLANI, ET IN METAM QVODAMMODO ELATI. A.

Vulgares edules fungi. A.




VULGARES, quibus fermè passim vescuntur, satis sunt cogniti: carne constant illi prorsus alba, dum recentes sunt, & infernè subrubent. Vetusstate virium contrahunt, & noxii fiunt, gravem odorem contrahentes, & fuscum colorem. Deglubari elixantur, deinde coadiuntur butyro, vel oleo olivarum, omphacio vel acetoi minus nocent, si piper ritum inspergatur. Nascentur Vere & Autumno sabulosi recens stercoreatis agris, subinde etiam in fimetis, in quibus insalubres oriuntur.

Horum fungorum in tabula A delineatorum, alij ad Tertium & Quartum genus Fungorum esculentorum à Carolo Clusio descriptorum referri possent, majores verò ad Oleari generis primam speciem.

SINVOST NEMORVM FVNGI. B.

IN silvis & nemorosis locis nascuntur quidam fungi sinuosis oris, supernè pallentes, & maculis rubris infecti, infernè subalbidi & strati: qui à nonnullis, primum repurgati elixantur, aut friguntur, denique eduntur: ac perinde probantur, ut alij ejusdem generis prope arbores, aut subillis nascentes, quia purioris sunt naturæ, & absumunt à
ferreis

Sinuosi nemorum Fungi. B.



Amplus nemorum Fungus. C.



ferreis clavis, aut putrilaginosus locis: nisi forte sub perniciosus arboribus, & circa serpentum latibula crescant.

AMPLVS NEMORVM FVNGVS. C.

ISDE M locis reperitur aliud Fungi genus planum, quod interdum in tantam amplitudinem excrefcit, ut lancem implere queat. Id aliquando prorsus album, nonnunquam superne maculis nigris & rufis distinctum, inferne album & nigris strijs exaratum, pediculi inferiore parte nigra.

VVLGARES PERNICIO-
SI FVNGI.


EXILES PERNICIOSI FVNGI. D.

PASSIM isti nascuntur, in agris, pratis, hortis, & veteribus ædificijs, qui facile à superioribus dignosci possunt, ut & reliqua genera. Horum autem,

Quidam sunt exiles, in rotunditate oblongiusculi, & præalti galericuli instar concavi, colore flavo præditi.

Alij ampliores, albi, aut cineraceis fuscisve interdum maculis notati, inferne aut in cavitate nigri. Sunt & plani ut acetabula, nonnulli etiam parvis similes.


Exiles perniciosi Fungi. D.



F V N G I

FVNGI ALII CLYPEIFORMES PERNICIOSI. E.

Fungi alij Clypeiformes perniciosi. E.



HORM forma plana quidem est, sed rugosa & per oras reflexa, flavi coloris, pediculis fuscis. Innascuntur plerumque putridis lignis aurasseribus verustarum ædium rusticarum & stabulorum.

Iisdem locis & secundum rusticorum casas inveniuntur etiam alij ejusdem quidē formæ, planæ & orbiculatæ, sed qui non sunt reflexi, quorum etiam aliqui per oras crenari.

Inveniuntur adhuc alij his non valde dissimiles in arborum aggenibus, sub sepibus, rubri coloris, quorum nonnulli nullo peculiari odore sunt præditi: alij verò moschi odorem quodammodo referunt.

FVNGI IN ARBORIBVS
NASCENTES.ARBORVM FVNGVS AVRICVLÆ
IUDÆ FACIÆ. F.

EX verustarum arborum truncis oriuntur quædam alia fungorum genera, quorum alia alba sunt aut flavescientia, rugosæque & cartilaginosa, instar Auriculæ ludæ vulgo appellatur.

Arborum fungus auriculæ ludæ faciæ. F.




Alia etiam spongiosâ materiâ prædita, ortu, substantiâ & formâ Agarico non valde dissimili, colore quo spongiæ, aut ex flavo fuscis. Hoc genus aliquones in luxivio coctum & recoctum, aut in aquâ additis cineribus, exsiccat, & paratur ad ethychnia conficienda, nam ignem fovet, adeo ut nonnullis locis igniarij vicem suppleat. Vidi enim usurari, & ipse usus sum in castris igniarij fomini loco, ad scopum explodendum. Solebat Antuerpiæ venalis repenti ad publicam porricum, quo mercatores singulis diebus bis convenire solent, cum ignitabulis ad ignem excipiendum. Fortè lucernæ fungus Cornarij.

Frequenter & magnâ copiâ huiusmodi fungum præparatum in foro venalem expositum singulis hebdomadibus confrexit Carolus Clusius, & interdum emis, præsertim hierno tempore, ad ignis scintillas chalybeato ferro excitatas excipiendum, tamquam fomitis usus, ut sulphurato flammam excitaret.

PHALLVS

PHALLVS HADRIANI IVNII. G.

Glans seu capitellum PHALLI.



INTER Naturæ miracula celebratur hic Fungus apud Baravos, anno M. D. LIX. Antverpiam ad nos missus. Similem deinde seiprennio post arenoso loco ad Ligenis fluvij ripam non procul Blæis repenebam Septembri. Copiosè crevit in Hollandia è radicibus sparti, hinc ab indigenis appellari (quemadmodum in Gallia Nationensi Hypocistis ex Cisti radicibus oritur) diversis fabulosis aggeribus sparto illo rudi confitis, præsertim verò ijs qui Harleymo & Alemarie sunt vicini. Sed quandoquidem Hadrianus Iunius elegarè & proximè illum descripsit, breviter eum adumbrabimus.

Manium, Cicodemumve ova.

† Scapus co-
ligit Phalli.

• Thymum.

§ Volvæ ru-
bra, ligata
& aperta.

Volvæ sive matrix, glomus aut scroto-
rum formâ referens (è qua scapus exiit) gemi-
no involuero prædita est, albo, deinde fu-
sco flavescere, insidès pediculo per quem
alimentum exugere credibile est. Est verò
ea volva plena frigidissimo, fetido, gravi &
coagulato succo, qui quodammodo lique-
scit, volva è terra eruta: coles artectus, ca-
vus, & bipalmaris, maculis cineraceis dis-
tinctus, & è media volva prorumpens, bre-
vi etiam flaccescit, quasi desitutus suo ali-
mento & naturali femine: habet autem per
mediam longitudinem æquale angustum
foramen, in extremo tamen angustius, in

quo flava stamina: summum caput veluti galea tectum est, tamquam penis glandem ex-
primens, albi in initio coloris, deinde vetustate fuscis, foramine in vertice præditum, ex quo
fetidus odor exhalat. Sunt qui asserant frigidissimum illum volvæ coagulatum & lentum
muccum valde utilem esse ad podagram ex humore calido progeneratam profligandam. Mu-
licæ valde apperunt hunc Phallum, perinde atque alios fetidos fungos.

Cùm anno M. D. XCVIII. Amsterodami esset Carolus Clusius Septembri mense, ostendebantur illi
à diversis aliquot ejusmodi volvæ recens ex arenosis aggeribus eruta, quæ omnes alba erant præter
unicam, in qua purpurascens & veluti carneus color elucebat: sed omnes adeò frigida, ut manu reti-
nenti, non minus rigorem & veluti torporem quandam illi in eâ inducerent, atque si torporem ap-
prehendisset: harum una per medium sectâ, apparuit coagulatus ille & crassus humor instar lactis
coagulati, & in ipso medietatibus liquor quidam pellucidus instar nervi optici in oculo. Sed cùm vol-
va illa, tamen si non fetida, nauseam illi quodammodo excitaret, diligentius observare super sedet.
Phallum porro è volvæ præminentem nullum vidit.

FINIS FUNGORVM.

HONORII BELLI

VICENTINI,

Medici Cydoniensis in Creta insula,

AD CAROLVM CLVSIVM

ALIQVOT EPISTOLÆ,

De rarioribus quibusdam plantis agentes.



MONOMER

VICET

of the

... ..

... ..

... ..



CAROLO CLVSIO ATREBATI,

HONORIVS BELLVS VICENTINVS,

P. S. D.



Vt Venetijsessem, Adrachnes & Oenoplæ Bellonij icones, à me ad virum delineatas misi. nunc autem Cydoniam reversus (ubi Medicinam me facere cum significabam) licet nullas adhuc à te litteras acceperim, ut tamen certior sis quanti te faciam, & quantum opus tuum juvare cupiā, mitto tibi ejusdem Oenoplæ duos ramos, ex quibus facillimè cognoscere poteris, an icon teclè arborescem exprimat. Mitto etiam semina Cyprî Plinij ex Ægypto accepta: tum aliquot semina aliarum plantarum hic nascētum, simul cum aliquibus earundem plantarum ramis siccis, à nullo, quod sciam, descriptarum, quæ fortasse tibi non ingratis erunt, præsertim cum aliquas legitimas esse comperies. Ego enim diu in hac Insula legitimas antiquorum stirpes perquirere summa cura conatus sum, ut & Republicam iuvarem, & inventas amicis communicare. Si autem in aliquibus me lapsus deprehendes, togo, ut æqui boniſq; confulas, atque mihi ut homini patum exercitatio, mediocriq; ingenio prædito condones.

PETROMARULA, Cretica planta est, & nusquam alibi, quod sciam, sponte provenit: folia profert cichoracea, magna, profunde incisa, in orbem diffusa, saturè virentia, infertnè splendentia, ad purpuram aliquando tendentia, ut Cyclaminus, lævia, cum autem semine nata prodit, prima ejus folia violæ nigre folijs similima sunt, rotunda, &, aut nihil, aut parum duntaxat serrata: cauliculos autem multos habet, rotundos, striatos, cubitales, bicubitales, aut tricubitales, quibus innascuntur flores copiosissimi, purpurei, hyacinthi orientalis florum æmuli, dense compacti, ut spicam, eamque magnam referre videantur: quibus succedunt semina minutissima: radice firmatur magna, alba, in alas diffusa, eduli, sapore tapunculi radicem imitante. Tota planta lacte abundat: provenit ubique in arborum marginibus secus vias, læto solo, inter saxa, & super parietes. Floret Vere, & æstatis Principio, Maiorque aut Junio arefcit tota præter radicem, quæ Octobri folia proferre incipit, & viret tota hieme. Vocatur vulgo *πετρομαρούλα*, hoc est, petraæ lactuca, licet cum lactucis nihil aliud commune habeat, quam quod lacte abundat. Radix manducata, tum etiam caulis adhuc tenet, venerem stimulare vulgo creditur: & ideo nomine obſceno *πετροκαυλ* vocatur.

CORIS legitima, Ericæ similis, provenit lætis collibus satis frequens, in omnibus rectissimè Dioscoridis Historiæ conveniens, nisi quod frutex est multos annos durans, perpetuè que virens: &, si pingui solo otiar, ad sesquicubitalem altitudinem assurgit Bellonius lib. primo Observationum cap. xvii. tribuit Cori radicem ingratiſſimi saporis, quod minime verum est: unde facile suspicor, ipsum legitimam Corin non vidisse, sed aliam stirpem, quæ vulgo appellatur *ἀγρίδιον*, meoque judicio Alcyrum legitimum est. Nam fruticosus est Hyperico, majores habens ramos, rubentes, in multas alas divisos, folia longa, flores luteos, Hyperico similimos, quibus attritis, digiti cruentantur: semina resinosa ut Hypeticum profert. radice nititur satis firma, eaque ingratiſſimi saporis: ex hoc scopæ sunt parvæ, estque tota planta longè major Cori: utriusque plantæ ramulos feminibus onustos mitto, ut faciliè, an legitimæ sint, dignoscere possis. Legitima autem Coris vocatur *ερνιάκαρο*, hoc est, *ερνιάκαρο*.

PÆONIA alba ubique in celsissimorum montium convallibus provenit, promiscuè que est: mare in enim vel feminam nodum in hac Insula vidi, quemadmodum neque rubram: licet non satis constanter eam inveniri, rustici quidam mihi asseruerunt: vocatur autem Pæonia *ψευδα*.

RORIS MARINI hujus folia Selino similia sunt, serrata, floresque in umbellis albi: quibus succedunt semina, oblonga, aspera: radice nititur crassa, foris nigro cortice eoque tenui, vestita, intus alba, thus maxime olente: ideo Libanotis legitima mihi videtur, quam Theophr. lib. ix. cap. xxi. descripsit: licet radix sit nigra, quia detractio levi cortice, specietur maxime alba. Appellatur vulgo *καριόπαρα*, quod verriginem inducere credatur: &, ni fallor, Siler Creticum à quibusdam perperam vocatur.

ELEGANTIS plantæ, quam Arcturum Creticum voco, licet legitimus non sit: nam neque rotunda folia habet, neque Cymino semen simile: sed folia serrata profert, Beticonice & Verba-

& Verbasco similia , minima verò , & tota lanugine quadam , ut Æthyopidis folia , operata : cauliculi infunt recti , floribus luteis , Verbasco aut Blattariz similibus onusti : quibus succedunt pillule rotundæ , parvæ , Blattariz similes , in quibus semina parva continentur : proveniunt inter saxa , & super parietes . Nomine caret .

Smyrnia
Ce. Helen.
smirna.

SMYRNI hujus virentem plantam non vidi , sed in itinere , in Cefalonia , semina ex siccis umbellis legi , atque à rusticis ejusdem Insulæ *σμύρνα* vocari audivi .

Chrysanthemum
per. n. d. a.

CHRYSANTHEMVM hoc vocatur *μυρτιάδα* , & à rusticis editur : mihi tamen sapore & odore parum probatur , licet in multis cum legitimo conveniat .

Aristolochia
Clematis.

ARISTOLOCHIA Clematidis hæc , nisi fallor , optimè describitur à te lib. 11 . Hispan. stirp. cap. xxiii . eam autem legitimam Clematidem esse cenfeo , licet histor. Dioscoridis non conveniat : textus enim corruptus est , ut etiam alij optimè animadvertierunt . Nam Plinius , neque Theophrastus , neque Antiquorum aliquis ullam foliorum differentiam faciunt : immò correctio textus Theophrasti à Dodonæo , optimè quadrat huic : nam folia similia helixini cyllampelo profert : adde , quod Plinius lib. xxv . cap. viii . scribit , Aristolochiam Clematidem vocari Creticam . Sed in Creta hucusque nullum aliud Aristolochiz genus observavi : longam enim aut rotundam nondum vidi : sed hæc ubique provenit copiosissimè , & adhuc *σπυδαίου* appellatur : hieme folia retinet , & tota odoratissima est , radicem tenuem , longam , odoratissimamque habet , colore buxo .

Aristolochia
Cretica Plin.
σπυδαίου.

Hippomarathrum

HIPPOMARATHVM folia tenuia , scenieulo quodammodo similia , profert , caulem lævem , duos aut tres cubitos longum , minimi digiti crassitudine , geniculatum : florem luteum in umbellis , ut Anethum , semina magna cacheri similia : radice nititur firma , magna , odorata . Vocatur *σπυδαίου* , quod latum cumini sonat . Hujus semen vulgariter à mulieribus coquitur in lixivio ad capillos aureo colore tingendos .

Leonopodium

LEONTOPODIUM herbula est parva , folia ferens quatuor aut quinque , plantagini angustifoliz similia , longitudo quatuor digitorum , cauliculus tres , quatuor , quinque , aliquando plures , binis digitis longos : in quibus continentur flores parvi , nigri punctis distincti , quibus succedunt capitula , incana , lanosa , semen parvum , ptylo simile continentia : radix verò minima est . Cum arefcit , capitula in se contrahunt ad speciem unguium milvi exanimati , ut in Catanance prima Dioscoridis : sed Catanance non est , nam folia Coronopi non sunt , neque semen Orobo simile habet . Si autem hæc duo haberet , legitima esset Catanance . Vtuntur hac vulgariter ad solvendo quos putant ex maleficio venire uti non possent : nam herbâ super prunas posita , ter patientem nudum per fumum transire faciunt , & tandem vicibus indusium ejus fumigant : & sine dubio liberum à maleficio fore prædicant .

Catanance
Dioscor.

Vitis ejus.

Anthriscus

ANTHRISCVS herba similia Scandici legitima est , folia ferens tenuiora , crebrius divisa , odoratiore multo , cauliculi ejus dodrantes , flores in umbellis albi , semina longa , sed minora quàm Scandici : tota planta suavissimi gustus est : provenit latis collibus , locis siccis , & inter saxa : manditur in acetanis vere , & maximè appetitur . Venetum mirum in modum excitat & adjuvat , ideo *παραμυρία* nomine obsceno vulgo vocatur , quod vulvæ purgamentum significat . Meminit Anthrisci Plinius lib. xxi . cap. xxi . his verbis . Eadem erat Anthriscus , si tenuiora folia & odoratiore haberet , &c . quæ quidem verba corrupta sunt , & hoc modo legenda cenfeo . Eadem erat Anthriscus , nisi tenuiora folia & odoratiore haberet . Nam si legatur *(si)* & non *(nisi)* Anthriscus esset Pestem Veneris vulgaris : cui non conveniunt vires à Plinio tributz Anthriscu . Nam Pestem Veneris neque odoratus est , neque ab ullo comeditur : vocatur autè *αγροκάριον* : Scandix verò legitima dicitur *καριζα* & *σκανδα* , quæ comeditur quidem , sed ipsa neque Venerem excitat , neque fatigat Veneris corpori succurrit . Vnde apparet error Andræ Tiraquelli comment . in legem Connu-bialium : qui Scandici hoc tribuit , quod Plinius Anthrisci peculiare esse scripserat . Scandix ab exco Dodonæo affabre pingitur . Hanc autem herbam , Anthriscum esse , primus Silvester Todechini Fundanus agnovit (vir in cognitione stirpium exercitissimus , cuius studiofissimus) mihi quoque ostendit , atque excellentissimo pie memoræ Melchiori Guilandino Patavium misit .

Elas n. d.
παραμυρία

Plinio locis
omnibus.

Pestem Veneris

αγροκάριον

καριζα

σκανδα

Andr. Tir.
quæd. l. ap. Plin.
silvestri

Elaschry
sum.

ELIOCHRYSYM hoc elegantissima planta est , tota tomentosa , folia fert longa , angusta , caules dodrantes , in quibus infunt umbellati flores , aurci , pulcherrimi , corymborū æmuli , qui in pappos resolvuntur : ij autem perpetuo durant eodem aurco colore fulgentes , si loco sicco condantur .

Ranunculus
varia
genua.

RANUNCULI hi , quia elegantes flores proferunt , & copiosissimi in collibus verno tempore spectantur , tibi eorum semina & radices mittendas duxi : nam plurimum temporis efflorescunt .

BYONIA hæc diococos frequentissimè in Creta provenit: elegans est, & differt ab alijs *Byoniadi*
quæ alibi nascuntur. *occos.*

CAVALIS, hic & in tota Græcia vulgarissima est: vocatur *καβαλιντρα*, & eadem est, quæ *Canalic*
pro Tordilio accipitur, & quam Bellonius lib. III. Observat. cap. XI. legitimam censet. *αβαλιντρα.*

AN legitimi Tordilij semina hæc sint, nescio: nam folia adhuc videre non potui, quia to- *Tordiliu*
ta herba erat arida: sed terræ commitam, & diligenter observabo: quod & tu facias, etiam
atque etiam rogo.

CHAMÆLEON albus, gummi, ut Mastix, ferens, copiosissimus est: radicem habet maxi- *Chamaleo*
mam, odoratam: Junio & Iulio circa echinum gummi distillat, quod pueri legunt, & ali- *albus.*
quantulum mastican, postea digitis lævigant, & complanant, complicatūque in vesiculæ
formam, super alteram manū fortiter impellunt, ita ut ex ictu vesicula rumpatur & cre-
pitum edat: quo ludi genere, summo opere pueri delectantur. Quod autem, ut scribit Bel-
lonius, loco mastichis id gummi dentibus attrerant, nondum scire potui: nam hic Cydoniz
neque legitur, neque curatur: radices vocantur *καλλας*. *αλλας.*

DAUCVS tertius folia Coriandri, sed minora & crassia aliquantulum profert, caulem ses- *Daucus ter*
quicubitalis longitudinis, flores luteos in umbellis ut Anethum, semineque cumini. Vere *tius.*
manduntur radices & folia, quæ aromatici gustus sunt. Vulgo appellant *κουρόσποδο*, quod
cornicis pedem significat. *κουρίσποδο.*

ANAGYRIS passim fecus vias provenit, differtque ab ea, quam tu lib. I. Hist. Hispan. stirp. *Anagyris*
cap. XLIII. describis: nam rotundiora folia profert: vocatur *αζόρρα*, acciditque interdum, ut *Cretica,*
ca præ & oves fame vexatæ, folia hujus depascant, licet odoris sit ingratisissimi, & postea ex *αζόρρα.*
harum lacte caseus conficiatur: quo si forte ignarus aliquis vescatur, aut lac bibat, statim
excitantur tum vehementissimi vomitus, tum fluxus ventris: & cum hoc sæpissimè acci-
dat, multi in vicæ discrimen venerunt: eam ob causam frutex hic omnibus est exosus. *Nissa.*

LYCIUM hoc Creticum, vulgo vocatur *λαυζι*: frutex est ad quatuor aut quinque cubi- *Lycium Cre-*
tos assurgens, totus spinis horridus, spinasque res simul (ut in berberi vulgari cernuntur) pro- *laυζι.*
ferens: folia habet parva, ad buxi foliotum formam accedentia, leviter serrata, flores copio-
sos, luteos, instar Paliuri, sed minores, quibus succedunt fructus aliquantulum longi, ut Ber-
beri fructus, coloris autem nigri, saporis inter acidū & dulcem mediū: in quibus vel unum,
vel duo granula continentur. cortex ligni non lævis ut Berberi, sed asper & pallidus est: ma-
teries ligni lutea, atque radix ipsius elegantissimo luteo inficitur: oritur in altissimorum mon-
tium convallibus: differt autem à Berberi, cujus folia majora sunt, & fructus racematim
nascuntur. Legitimum verò Lycium non est, quia fructus neque rotundus ut piper, neque
amarus est. Propterea potius vocanda erit Berberis alpina aut montana, quam Lycium,
quemadmodum Silverius Todechini censet: qui hunc fruticem frequentissimum in Li-
bano monte etiam invenit. Ceterum duo alia Lycij genera hic reperiuntur, quorū Vnum
maximè historice convenit: id etiam in Libano monte oritur: cujus cum ad manus neque
semina, neque rami sint, ideo de ipso in præsentia verba non facio. Alterius verò ramos li-
cos simul cum ejus fructu nondum maturo mitto: vocatur *λαυζι*, & *πυροσπορ* & *αλα*, hoc
est, petraæ amygdalæ, licet cum amygdalis nihil commune habeat: frutex est ad duorum
aut trium cubitorum altitudinem assurgens, densus, folia parva firmaque ferens, spinis to-
tus plenus est, & fructum rotundum ferre, parvum ut piper habet, cum ad maturitatem
pervenit, nigricantem: radix lignosa est, maxima, eaque firmissima: Hebræi ex hujus fru-
ctu elegantem luteum colorem parant.

ASPALATHVS hic est secundus Dioscotidis verus & legitimus: atque in tota Græcia no- *Aspalathus*
men adhuc retinet: illo sepes conficiant, & integræ silvæ hoc solo constare spectantur: ligni *alio Diosc.*
marces alba, durissima & gravis est: medium autem ligni, nigrescit, odore carens: flores
habet luteos, genitæ æmulos, parum odoratos: vento autem spirante, eorum odor satis
suavis manè longius percipitur: succedunt parvæ siliquæ, in quibus tria quatuorve semina
continentur: folia Rutæ similia sunt, terna simul juncta: spinis totus frutex scætet: radice
nititur firma, lignosa, odoris expetere. Excus^{us} Matthiolus hunc fruticem non sine errore
Acaciam alteram appellat, cum sit Aspalathus alter Diofscotidis. *Acacia altera*
Matth.

CYTISVS Creticus frutex est totus obliquus, ad quatuor aut quinque cubitorum altitu- *Cytisus Cre-*
dinem assurgens: folia profert terna simul juncta, argentea, trifolij æmula, dorso aliquan- *tium, alioq*
tulum prominens: flores trifolij majoris, adhuc ramentis majores, rubros, in quibus intermi- *legitimus.*
xti sunt albi quidam villi, qui struthiocameli pennas, eaque in minutissimas partes divisas
æmulantur: ea ratione flos elegantissimus apparet, videtur enim ex purpura, & argenteo
quodammodo à natura formatus: succedunt semina milio majora: marces ligni nigra
durissimæque est: cortex cinereus, & totus profundis scissuris plenus. Orietur ubique in

apophor. asperimus collum locis & præcipitijs. vocarunt, vulgo *apophor* dicitur, quod nobile lignum sonat. Hunc fruticem, Cytillum, & fortasse legitimum esse iudico.

Hæc sunt Vir Clarissime, quæ tibi nunc mittenda duxi: quæ si tibi grata fuisse iotellexero: alia & alia mittam: interea si aliquid semen peregrinum habes, ut & mihi portiunculam mittas, etiam arque etiam rogo. Deus opt. max. incolumem te conservet. Cydoniæ Cretæ xxiiii. Septembris M. D. xciii.

Quanto autem cum meo merore hæc omnia, quorum in epistola meministi, perierint: satis declaravi cap. xix. lib. i. meorum Observationum, quod Oenoplia historiæ completitur. Sed nec hæc infortunium intellexissem: nisi ipse ad calcem sua epistola hæc sequentia adieisset.

Hanc epistolam simul cum seminibus & herbis siccis Ill^{mo} Pinello miseram, ut tibi reddendam curaret, eamque Silverio Todeschini Fundano qui navi Ventias petebat, commendaveram. Sed, ut audio, navis ipsa, maximâ tempestate vexata, in Siciliam appellere coacta fuit, adeo afflictâ, ut ad amplius navigandum inutilis iudicaretur: quare timens, ne herba, semina & literæ perierint: exemplum earundem litterarum mittendum statueram simul cum aliqua portione eorundem seminum, quæ mihi, nescio quo casu supererant: ne, nisi omnia ad te pervenirent, eorum saltem portione non priveris. Exemplum autem jam conscripseram, meque ad complicandum paraveram: quando tuæ mihi redduntur, Coloniæ Agrippinæ xi. Octobris scriptæ: quæ mihi mirum in modum gratæ fuerunt: ex ijs enim cognovi animi tui candorem, & quantum temp. juvare cupias. Propterea h. Deus opt. max. incolumem me servabit ætate futura, tibi semina herbâque siccas mittam, & omni conatu efficiam, ut ad te perveniant. Si liber quem misisti, ad manus pervenerit, cum libentissimè perlegam, & inter cariora recondam, atque diligentissimè, ut nostræ contraictæ amicitia pignus, servabo. Bene vale, Cydoniæ Cretæ, xxii. Januarij M. D. xciiii.

Acciperam autem ipsum hoc exemplar xxv. Maij insequentis, & pridie Calend. Iunij respondendam.

CLARISS. V. CAROLO CLVSIO, HONORIVS BELLVS, S. P. D.



AM annus est, quod tibi aliquot semina miserim: sed navi quæ ea ferebat, maximâ terribilique tempestate in Siciliam ejectâ, omnia perierunt. Quod statim ut intellexi, xxii. Januarij tibi iterum alia misi, sed non omnia, quia non supererant: illa ad acciperis, & quid de his seintis, pergratum mihi erit intelligere. Sed quoniam, ut alias scripsi, opus tuum juvare cupio, alia stirpium aliquot adhuc (ut puti) incognitarum semina nunc mitto, simul cum illis quæ deerant, & quorum historiam dedi: addidi Oenopliæ florentis ramulum, & Leonopodij iconem suis coloribus pictam, quæ omnia, ut credo, non prorsus tibi despicenda videbuntur, nova enim sunt, & à nullo, quod sciam, descripta.

Abelica.

ABELICA, cujus semina nunc mitto, arbor est magna, recta, multis ramis prædita, aspectu pulchra, cui folia Alaterni, sed rotundiora, profundè serrata (quos flores proferat ignoro) fructus magnitudine piperis, figurâ quasi rotundus, colore inter viridem & nigrum medio: materies ligni dura, & paululò odorata, pulvis enim hujus santala imitatur, unde Pseudo-santalus Cretica jure appellari posset. Arbor hæc in solis montibus Leucis, eorumque altissimis jugis provenit, & ex ea trabes sunt: Antiquis ignota fuisse puto, oî sit ultimus montana Theophrasto descripta lib. de Historia Plant. i. l. cap. xiiii. sed folia neque leviter serrata sunt, neque magna, ut pyri, verum longè minora. vocatur ἀπὸ λικας.

*Pseudo-santalus Creticus
Natalis.
Vincet noster
tana.
ant. cat.*

Pulcherrimus fructus.

PULCHERRIMVS fructus, cujus semina etiam mitto, ad duorum cubitorum altitudinem assurgit, in orbem diffunditur, perpetuoque virens folia habet longa, rotundiuscula tamen instar foliorum mali, firmiora, laxissimè virentia superne, inferius verò albâ quadam lanugine obdusa, ut argentea videantur, cauliculos albos, lanuginosos, quos folia utrinque ambiunt, in quorumque extremitate flores ceræotus specie thyrsi, ut in saponaria vulgari dispositi, sed figurâ Cyani, colore phœniceo, calice tamen longiore quàm Cyani, squamato, albo & rabro diluteo colore prædito: flores in pappis resolutum, semen longius quàm cyminici, calicisque sunt perennes. In altissimis præcipitijs inter saxa provenit: quo nomine autem vocetur, nondum scire potui.

Natalis.

Echinopoda.

ECHINOPODA, vulgarissima planta est, & multum cum Erinacea à te descripta convenit, nisi quod hæc folijs caret, & flores luteos proferit, totaque colore viridi cœctum, in orbem dif-

hem diffusa, & erinaceum mirum in modum multitudine spinarum representans. Hujus stirpis meminit Plutarchus Sympoticarum lib. 1. quæstione quarta, & lib. de Auditione quasi circa finem, antiquum hujusmodi dithichum citans.

Ἐχινὸς ἐχινὸς ποδὸς ἔχει, καὶ οὐκ ἔχει ἄλλο ποδόν

Ἐχίνος ποδὸς ἔχει, καὶ οὐκ ἔχει ἄλλο ποδόν

Inter Echinos podas velut, asperam & inter ononin

Interdum crescunt mollia leuocia.

Meminit etiam hujus Athenæus lib. Dipsosophist. tertio, perinde ac si semper inter echinopodas & asperam ononin verferis. sed fallitur in margine Dalechampius Athenæi interpretes, quod per echinopodam Cardui Chij genus intelligat: nam Echinosoda tam hic Crete quam in insula Chio totaq; Græcia vulgarissima est, non cardui genus, sed fruticis censenda: & hanc sub Chenopodis nomine intellexisse Plinium existimo lib. Natural. Hist. xi. cap. viii. quod etiam ante me animadvertebat Turnebus vir summa laude dignus Adversariorum lib. xxiii. cap. x. i. nam licet hæc plāta copiosissimos flores proferat, & ubique occurrat, ejus tamen flores apes non attingit, ut quotidie observari potest. Excellentissimus p. m. Melchior Guilandinus Echinosodam non novit: nam epistola ad Langium eam inter ignotas stirpes enumerat. Bellonius verò lib. i. Observat. cap. xviii. ipsam novisse videtur, sed non descripsit: neque ita congener est Aspalatho ut ipse putat. Nam Aspalathus frutex satis magnus visitur, folia tetra simul juncta fetens, licet ætate ipsa amittat, ut Autumno alijs induatur, nec spinis adeo crebris scatur, ut ista.

Cardui
Chij.

Chenopis.

Echinosoda
heri non at-
tingunt apes.

Aspalathus.

ELEGANTISSIMA Planta, quam (ni fallor) nonnulli Poterium perpetam appellant: alij Pimpinellam spinosam, cujus semina nunc accipies, legitimam Dioscoridis Scæben esse contendit, licet ipse nullam Scæbes descriptionem reliquerit: sed affinitate nominis fretus, quod in tota ferè Græcia adhuc retinet, facultatibusque quas in Medicina habet, alijsque non levibus conjecturis adjutus, non vereor affirmare legitimam esse: differreque multum à Scæbe Galeni, quam libro primo de Antidotis describit. Planta ista perpetuò hic vires, multoſque annos durat, in orbem diffusa, furculosæque ad cubiti altitudinem assurgit, folia ferens carnosæ, divisa, in uno pediculo plura utrinque disposita, quæ cū Autumno primùm erumpunt, in se contraſta videntur, & Aspleni folia quodammodo imitantur, sed longè minor, quæ tamen successu temporis majora apparent, & Pimpinellam forbastellam vocatam foliorum positu & divisiōis æmulantur, minora verò sunt. Tota planta crebris, firmis & tenuibus spinis scatur: femina fructus rubi aut mori imitantur, plures enim simul congesti sunt, initio virides, postea ad rufum tendentes: flores parvos, carnosos, ex vitidi rufescentes, multoſque simul conceptos proferunt. Super hanc stirpem nascitur Epichymum, quemadmodum super thymum, iisdemque collibus frequentissimè invenitur, in quibus & thymum, & thymra, & asparagus pro veniunt: nunquam autem invenitur palustris Adstringendi vi pollens, vulgariterque in tota Græcia *scæba* vocatur. Quid autem sit Dioscoridis Scæbe, clarissimè patebit, ubi prius ostendero phleas & Scæbe unum & idem esse, & ex aculeatarum genere esse, phleam autem nomine neutro multum à Scæbe differre: nam plerofque doctissimos viros ex confusione horum nominum in maximas tenebras incidisse compe-
no. Omnes enim qui phleas & phleam apud Theophr. confundentes eadem esse plantam putant, frustra studebunt cognoscere conari sunt. Nam phleas quæ vocatur scæbe à Theophrasto lib. v. de Hist. Plant. capite 1. enumeratur inter eas stirpes, quæ præter spinam folium habent, ut hæc Pimpinella spinosa: & non, ut veritè Gaza, quæ juxta folium aculeatum, alterò quoque folio conduntur: eamque comparat Ononidi & Tribulo: quæ quidem phleas, sive scæbe, folio constat carnosæ, in ramo sparsa, multisque radices habet, non tamen altè descendit, germinat cum vergilijs, primoque aratro unâ, nec folia dimittit, non enim annua, sed diuturnior est, ut idem Theophr. lib. vi. de Hist. Plant. cap. 1. affirmat. Et Plutarchus in vita Theſei circa initium Scæben inter spinas enumerat: Menalippi, inquit, filius Ioxus orycto socius deducendæ in Cariam Coloniz fuit: unde Ioxides originem traxerunt, quibus mos est patrius neque spinas asparagi, neque scæbes igne cremare, sed honore & cultu prosequi. Aëtius verò libro tertio, capite vigesimo nono, super scæbem epichymum nasci asserit: Quod autem Theophr. cap. 111. lib. vi. de Hist. Plant. tribuat phleas, cappari & tribulo peculiare, quod non solum habeant caulem aculeatè, sed etiam folium hispidum, mendum esse suspicor: nam eodem libro cap. v. Inturi sive cappari hoc peculiare esse voluit, & manifestè tribuit phleo folium minimè pungens: dicit enim nec phleam & ippophyllum triulari quæ folijs mitibus constant. Plinius etiam lib. xi. cap. xv. non tedè animadvergens quæ Theophr. locis citatis de phleo seu scæbe scripserat, erravit & ipse, & multis errandi occasionem præbuit. Phleum verò, longè alia diversique planta est à Scæbe, & ab antiquis Græcis non inter spinosas, sed inter palustres stirpes enumeratur. Plutarchus enim Naturalium quæstionum secunda, Phleum palustrem stirpem facit, dicens, Ig-
notavit Layus, quod etiam palustres stirpes, ut sunt tipha, phleum, & ulva, neque geminant, neque augescunt, ubi imbres suo tempore non decidunt. Idem fecit Aristophanes in Ranis. Chorus enim ait, saltavimus per Cyprium & phleo, gaudetes cantibus. Et Theophr.
lib. 1111

Poterium
perpetam.
Pimpinella
spinosa.
Scæba Dioſc.

Scæba Gale-
ni.

Pimpinella
spinosa.

Epichymum.

scæba.

Phleas sive
Scæba. sive
spinosa.

phleum, sive
palustris plan-
ta.

lib. III. cap. XI. de Histor. Scirpium, Phleum inter lacus Orchemenij stirpes enumerat, ejusque genera statuit, marem fructiferam, & feminam sterilem ad nexus duntaxat utilem: fructus hujus Phlei Anthella vocatur, quo ad lixivia utuntur: estque placentaceum quoddam molle, & rubidum: quæ quidem planta adhuc mihi ignota est. Ex his liquido constare arbitror, Pimpinellam hanc spinosam, siue Græcorum *σακδα* legitimam Dioscoridis esse Screeben: nam hæc planta rectissime Theophrasti descriptioni convenit, cum ex aculeata- rum sit genere, & vulgaris notitie, facultatis adstringentis, & adhuc in sanandis alvi fluori- bus indilincte à rusticis usurpetur. Nam ejus in aqua decoctionem jejuni bibunt, & à mor- bo, ut aiunt, liberantur: præterea antiquum nomen quasi retinet: nam *σακδα* à *σακ* de- rivatum esse censeo.

Gethym. BVLBVS hic quem mitto, Gethym antiquorum esse judico: nam solijs concavis constat ut cepa, ijsque longis, floresque & semina cepis similia profert: capite ampeloprasidis simili- mus est, gultuque cepam & porrum æmulatur. Cepam agrestem olim putabam: sed Plinius lib. XX. cap. V. negat cepæ genus inveniri silvestre. Licet autem Theophrastus Gethym sine capite esse scripserit lib. VII. de Histor. Plant. cap. III. & duntaxat cervicæ longa constare: capitati tamen genus inveniri, ex eodem Theophr. hinc, inde colligitur. Nam lib. I. cap. X. ait, radix enim bulbi & Gethyi caule omnino carebit: & lib. VII. cap. IX. & alie multis tunicis constant, ut bulbi, scillæ vel cujusvis generis bulbosi: addit cepæ & Gethyi, & simi- lium: & eodem lib. cap. XI. scribit, ac Ensis appellati radix, rotunda hæc est, & sine cortice, capillamentis Gethyi modo fibrata: ex quibus appareret apud Theophrastum Gethyi genus extare capitatum, cui folia ut cepæ concava sunt. Idem enim Theophr. lib. I. de Hist. Plant. cap. XVI. ait, peculiare in oleribus, ceu cepa & Gethyo, foliorum concavitas. Athenæus verò Deipnosophist. lib. IX. clarescime Gethym describit capitatum, cum ait. Quidam capita- tum id esse volunt quod Gethym nominant. hujus meminit Phrynicus in Saturno, cujus fabulæ interpretes Didymus, Ampeloprasidis similia tradit esse Gethya, quæ & Gethyllides vo- cant: licet Epenetus apud eundem Athenæum, porrum capitatum Gethyllidem vocarit: fortasse ob similitudinem bulbi. Gethyllides autem Latonæ sacras credit antiquitas, quoniam Latonam, cum Apollinem utero gereret Gethyllidem expectivisse, memoræ mandarunt.

Gethyllides.

Struthium
Disf. STRUTHIVM legitimum Dioscoridis hanc herbam puto: sed ejus descriptionem nunc describere superfluum mihi videtur: cum excellentis p. m. Melchior Guilandinus rectis- sime ipsam descripsit epistola ad Maximilianum II. Cæs. anno M. D. LXXXII. Sed tantum ad- dam quod in tota Græcia vocatur *χυμωρα*, qua utuntur fullones in tingendo serico luteo ex- cellentissimo, cujus quidem *χυμωρας* sit mentio apud Aquarium inter recentiores Græcos, libro de Urinarum differentijs cap. VII. At verò postquam aliquam tincturam urinae ca- pient, longè à civitate discedentes, primum spicæ existunt, deinde spicæ, ita ut alie vi- deantur similes *χυμωρας* quæ mediocriter fuerit infusa humori: sic enim legendum est, non bili: & ita in manuscripto antiquo exemplari legitur. Interpres autem ignorans quænam herba esset *χυμωρας*, reposuit *χολα*. Addam etiam quod Phyteuma (Antirrhinum videlicet silvestre Dodonæi) cujus folia rectissime cõparantur huic Struthio, vulgariter adhuc usur- patur à Græcis mulieribus ad amatoria, eam multoties conjurantes, silente luna manu si- nistrâ colligentes, demum suspendentes fumigantesque, & alijs modis utentes: vocaturque Cydoniæ *Κρετα χυμωρα*.

Struthium
Millefolium
μυροφολα. STRATIOTES Millefolium ita legitimum est, & sic Dioscoridis descriptioni quadrat, ut ipsi aliquid addere, supervacuum mihi visum sit: semina igitur duntaxat mitto: vocatur *μυροφολα*.

Thymum
legitima.
θυμωρα, θυμωρα. THYMBRAM Bellonij, Antiquorum legitimam esse censeo: vetus nomen adhuc retinet, vocatur enim *θυμωρα* & *θυμωρα*: super hanc frequentius invenitur epithymum quàm super Thymum.

Agropyron
αγροπυρον. AΓΠΟΑΝΖΙΝΑΡΗ, hoc est, Cynara silvestris planta sic vulgo vocata, ex aculeata- rum est genere, cujus echini ut Cynaræ primo vere, antequàm aperiantur, ab omnibus & crudi & elixi eduntur ex sale, oleo, & pipere, licet spinosissimi sint: sed mira facilitate rustici eos mundant. Scirpem non describo: nam licet vulgarissima sit, ejus tamen formam non rectè memoria teneo.

Agropyron
αγροπυρον. SEMINA autem Leontopodij, Dauci tertij, Roris marini Theophrasti *σκατωρα* vocati, anagyridis, Cyrti, Anthrisci, Ascyti, Coris, sine descriptionibus mitto: eorum enim anno elapso historias dedi.

A 8 Illud Pinello librum tuum accepi, pro quo gratias ago immortales, agamque dum vivam, & ipsum inter cariora servabo. Vale à Cydonia Cretæ, prima Octobris M. D. XCIIII.

CL^{MA} V. CAROLO CLVSIO ATREBATI
HONORIVS BELLVS S. P. D.

ROSTQVAM ventis reluctans navis ex hac insula solvere non potuit, hæc deinceps Tragij quærita femina seorsim mitto, quæ non minus tibi grata fore iudico, quàm reliqua, quia à nullo forsàn alias missa fuerunt, aut observata.

TRAGIVM porro frutex est rectus, aspectu pulcher, ad tria, nonnunquam ^{Tragium.} & quinque cubita assurgens, brachiali interdum crassitudine, perpetuo virens, folia ferens glycyrrhizæ aut Terebinthi, lato virore prædita, flores in umbellis luteos, Hyperico similes, sed quadruplo majores, multis flaminibus luteis, longis, plenos: quibus succedunt capitula oblonga, forunda, terebinthino fructui æqualia, tenuissimo semine repleta, quæ à planis non decidunt, sed ei perpetuò inhaerent: cortex ligni ad rufum tendit, ætateque resinam fundit, sed paucam. Secus fontes & rivulos provenit, nec alibi invenitur. Tota planta ita hircinum virus olet, ut longius percipi possit: vocatur à rusticis ^{Natalis.}

^{virens.} *rostri*. Sed quoniam Dioscorides Tragium, fructum, folia, & virgas lentisco similia proferre scribit, verum minora omnia: mendum inesse ex Plinio lib. Natural. Histor. xiii. cap. ^{Diptamum album.} *xxi* convinci potest, qui Tragio fruticem Terebintho, non Lentsco similem tribuit: Guidandini quæ opinionem probo, legentis *μαρσπριπα* non *μαρσπριπα*. Quod verò Diptamum album vulgo appellatum Tragium sit, minime concedo. Nam Diptamum album hirci odorem non spirat, sed gravem, neque in tota Creta id invenitur. Univerfam enim insulam ipse lustravi, diligentissimeque Tragium perquisivi, nullo labori parcens, sed frustra: nullum enim aliud Tragij genus invenire potui, quàm illud: nec etiam ullum comperi, qui Diptamum album in hac insula vidisset. Dissert hæc arbuscula à Ruta silvestri Dodonæ: quoniam hæc arboris in morem excrescit, non autem herba est, nec satuta viriditate nigricat, sed læte vi-

ret, non lanuginem in folijs habet, non sanguinis æmulum succum reddere, neque ejus femina resinam olet, sed hircum, quemadmodum & folia: unde hanc Tragium esse, jure existimari potest. ^{Ruta sil. Dodonæ.}

Mitto etiam femina Galostividæ sic vocatæ, ob similitudinem quam cum Scivida habet, ^{Galostivida.} multitudine videlicet spinarum. Sed ejus descriptionem in præsentia non accipies, quia ad manum planta non est: oritur enim in parte australi insulæ, quæ quinquaginta miliaribus distat à Cydonia: nec ejus formâ rectè memini. Sed aliis diligentissime describam: interea femina terræ mandare potens, & ipse eam observare. Vale è Cydonia Cretæ ultima Octobris. M. D. XCIIII.

POSTREMAM utramque hanc epistolam accipiebam Lugduni apud Batavos xvi. Maij anni insequentis, & xv. Kl. Novembris ejusdem anni respondebam.

CL. V. CAROLO CLVSIO

HONORIVS BELLVS MEDICVS. S. P. D.

VCVNDISSIMÆ mihi tuæ literæ fuerunt, quas Leonida frater Colonîæ Agrippinæ, ubi nunc habitat, incolumes misit, & si alias dabis, ut mihi redantur, diligentissime curabit. Quod autem femina tibi missa, ob Regionis intemperiem non nascantur, displicet sanè plurimum: nam si stirpes vivas observare potuisses, magnam voluptatem accepisses, eandem enim ex siccatum intuitu percipere nō potes. Nunc autem tibi mitto historias quarundam stirpium peregrinarum, quas in fictilibus servo, femine ex Ægypto misso natas, earundemque femina cum herbis luccis, nec non quarundam hinc nascentium, quæ omnia gratissima fore spero.

Mitto etiam fructum quandam peregrinum nomine *Abave*, quem amicus Cayro misit, ^{Abave.} è Zeila nobili Æthiopiz emporio extra Erythræum mare sito, allatum. Est autem hic fructus magnitudine mali citrij mediocrius, denso duroque cortice ut Cucurbita vestitus, nullis excurrentibus sulcis, sed tantum extremâ ejus parte mucronatâ, quâ atbori adhæret pediculo crasso & firmo, sulcorum rudimentum cernitur, in quibus lanugo quædam inest, quemadmodum in Cydonijs malis videre licet, reliquo corpore lævis: alterâ non in mucrone, sed in obtusam rotunditatem desinit, ut primo aspectu Cucurbita sicca appareat colore fusco: pulpam continet subrubram, friabilem, ut facile in pollinem resolvatur, acidam ori gratiam, adlitionis expertem, per quam sparsa sunt semina renibus animalium similia, seminum Anagytidis æmula, duro cortice, qui rubet quædam membranâ tegitur, quâ

^{Abave.}
^{ex his histo-}
^{ria.}

quā demptā semina fusca, ad nigrum inclinantia, & splendētia cernuntur, intus medullam albam continentia, edulem, Avellanæ gustu: verum semina ex umbilico fibris non suspēduntur (licet per pulpam multæ fibræ tectæ excurrant) ut semina fructus quem tu Guanabano Scaligeri similem ex Mozambique allatum spectandum proponis. Convenire autem multum mihi videtur cum fructu, quem tu Guanabano similem ex Theveti America descriptis folio fici: sed hic longè minor est. Affinitatem etiam habet cum Bahobab ab Alpino descripto partibus internis, sed formā differt: nam Bahobab utrinque mucronatus est, pulpamque continet (ut ille scribit) non acidam tantum ut hic, sed adstringentem Lemniz terræ instat, quæ nota in hoc desideratur. Sed quoniam vereor, ne ob difficultatem itinens illius Pinellis tibi fructum mittere possit, ipsum rogavi, ut Patavij delinendum curer, iconemque saltem & semina mittat. Æstate præteritā hujus fructus semina terræ commisi, quorum nonnulla felicissimè nata, & quæ bina rotunda folia protulerunt eis simillima, quæ Staphisagria & semine prodens ferre conspiciuntur, at majora, in quorum medio caudicis rudimentum apparuit, qui sensim incrementum fumens, folia mala citrio similia prodixit, sed sine pediculo: augescēte autem caudice audā sunt & folia, pediculi quoque niti corpebant: at ubi caudex pedalem longitudinem attigit, illico ramos spargere cœpit, & folia ipsi in hærentia longiores pediculos adquisiverūt, neque singulana tantum singulis pediculis in hæserunt, sed initio bina, postea terna, quaternæ & quina, eo modo disposita, quo sua proferunt Pentaphyllum, Lupinus, Castanea equina, & reliquæ quæ hujusmodi folijs prædix sunt, eo quod medium locum occupat semper majore apparente, deinde alijs duobus quæ utrinque ipsi proxima, ipsi magnitudine cedentibus, postremo reliquis duobus, ut in sicco folio quod mitto observare poteris. Radice firmatur rotundā, tuberosā, ovi magnitudine, appendicibus paucis & tenuibus utrinque excurrentibus, cortice tenui vestita, quem tenuissima pellicula pulginei coloris tegit, facileque digiti attritu detergitur, ut tunc radix alba appareat, carnosa, subtili raphano simili, sed tenerior, in quā per transversum scissā, à centro ad circumferentiam multæ lineæ ductæ conspiciuntur, ut in raphani radice. Præmansa, tota ferè in aquam succum vertitur, subdulcem, teretis odoris, quique in ore adstrictionem quandam relinquit, non sine exiguo caloris sensu, salivamque satis copiosè elicit. Hoc in unicā tantum radice adhuc observavi, mirumque mihi visum est, arborescētem tali radice præditas. Martio arbusculas in viridatium transieram, & an omnes hujusmodi radicibus prædix sint, diligentissimè animadvertam: nam, ut dixi, in scissilibus adservo jam ad sequepedalem altitudinem elatas, pollicari crassitudine, cortice albo laticoque, medulla magna abundantes. Ligni materies satis infirma esse videtur, quapropter inter eas arbores hanc recensendam judico, quæ brevi incrementum sumunt, & fortasse brevi fenescent, tum inter eas quæ perpetuā fronde naxali solo virent: Nam hic Cydoniz per totum Decembrem folia non amisit. Illud addam, plantas licet semine ex uno eodemque fructu exempto & terræ commissio natas, diversâ tamen folia protulisse: alia enim malo citrio similima fuerunt, minimè ferrata, alia longiora & serrata, plurimum ad Castanæ folium accedentia, sed inodora omnia: unde suspicari licet hunc fructum diversi generis arbores generare.

Ossa.

Ossa. frutex est stolones multos à radice proferens rectos, rotundos, leves, geniculatos, quibus circa genicula insunt folia longa, rotunda, crassa, per quorum medium nervus excurrit albus, è quo utrinque venæ exeunt aversâ foliorum parte satis conspicuæ, folia autem ex intervallis bina semper inter se opposita sine pediculis stolones undique ambiunt, ex quorum alis multi rami nunc etumpete incipiunt, non quidem ex omnibus, sed alternatim, ita ut si à primo initium fumens, lineam ab uno ad alium ducas usque ad ultimum, perfectissimè lineâ helicen describes. Radice firmatur validâ in multas fibras diuisâ, luteo Boreis proferit, fructusque mali magnitudine, cordis figurâ, colore vindec, binos aut ternos ex uno pediculo pendentes, in quibus semina lara, lanugine quadam mollissimo candidissimoque serico simillimâ involuta: Caulis & folia incana sunt, lanugine quadam tecta, ut crassiore quapiam farinâ tota planta conspersa videatur, quæ imbris cluitur, eoque teniore folia & caulis colorem ex viridi ad album tendentē contrahunt: pars caulis radici proximæ albo cortice tecta est, fungoso, nimis dissecto, ut Sam buci caulis videri possit, & illius instar multa medulla alba repleta est. Stolonum cortex & foliorum nervus quoniam copiosus lactis amaro & acti abundanter brevis iter tota planta aspectu pulchra est, & quæ in scissilibus sermo semine ex Ægypto accepto natas, ad trium cubitorum altitudinem jam excreverunt, folia quoque hieme retinent: nondum autem vel flores vel fructum tulerunt. Planta hæc in Ægypto vulgariter *Offar* appellatur, fructus verò *Beid el offar*, hoc est, ovum ex offat, aut Italicè *Ova del Offar*, *Beid* enim Arabicè ovum significat, & *el* est articulus, qui Italicè dicitur *del*. Hujus fructus lanugine pulvinaria implent, lacte autem coria depilant. Sine dubio, hæc planta illa est supet quam Avicenna & alij Arabes Saccharum Alhufar (mannæ speciem) inveniunt scribunt: & quam Serapio ex Abnasis sententia, Mutono interprete descripsit his verbis.

HAOSER, seu Alafet, seu Alhufar, planta est quæ lara habet folia, singulis annis succrete & saccharū ex tamis extillans, & à foliorum cavis quod copiosissimè legitur, non parū quid e m amaric & m s:

Guanabano
fructu scali-
geri.Bahobab
Alpini.Beid el offar.
V. s.Saccharum
alhufar.Haoser,
Alafet,
Alhufar.

amarefcens: poma profert càmclorum reſtibus non diſſimilia à quibus res quædam cauſtica, adureſcive emanat, cauterijs maxime accommodata, ex qua etiam & culcitraz, & pulvinaria fulciuntur, planta cujus Cherca nuncupatur: folia aurem Haofer inſiſa humorem deſtillant in Maio colligi ſolitum, in quo corna depilantur, adeoq; exſudat, ut vas quàm capaciffimum ex una vel altera expreſſione adimpleatur: lignum verò Haofer, leve eſt, craſſum, ereſtum, pulcherrimū, ut non injuriâ ſuis carminibus tum brachia, tum crura formoſarum ſanè mulierum Jigno Haofer Poetæ bellè compaſcent. Eſt & alia planta Haofer nominata ex Tirhymallorum quidam genere. Hæc Serapio: Sed animadvertendum eſt, veterem Serapionis interpretationem rectius huic plantæ quadrare, quam Mutoni, ut utramque cum poſtrâ conferenti facile patere poterit. Deſcribitur etiam hic frutex ab Abembirar Medico Arabæ Hiſpao, in ſua Simplicidum Hiſtoria, & à Malahyſah Medico Perſa, qui Abembiraris Hiſtôniam in Epirotum contraxit: quorū libtos manuſcriptos apud Haym Abexorum ſem medicum Hebræum Hiſpanico ſermone vidi, qui mihi Offaris hiſtoniam ex eorum ſcriptis ad verbum hoc modo humaniſſimè interpretatus eſt.

Oſſaria frutex eſt Tirhymalaceus, longus & parte ſuperiore tenuis, folia habens lata, ſuper quæ decidit manna quæ Zuccar el Oſſar vocatur (florem fert Oleandro ſimilem) hoc addit Malayſah: Abembirar enim nullam floris mentionem facit, ſed fruſtus dumtaxat: folia ipſius plana & levia ſunt, caulem habet viridem, concavum: ſert fruſtum quædam ſimilem ſacculo pendeuri, qui intus continet particulas albas unas ſuper alias, quibus utuntur Arabes ad accendeodum ignem, nihilq; (dicunt ipſi) ad hoc munus peragendum præſtantius inveniri poſſe: pulvinaria etiam hac materiâ implent. Oritur in montium cavitatibus, ſcilicet ubi mons jungitur monti, quanſo que etiam in arenis ſalci conſpicitur: Si caulem aut folium incidas, lac magnâ copîâ emanat, ita ut quatuor & ampliùs libræ ex unâ piſtâ exeant, quod quidem eſt acre, calidum & ſiccum, corrodit & incidit, ut ſit in principio quarti gradus caliditatis, planta verò ipſa calida eſt in fine ſecundi aut principio tertij. Habitatores Mechæ pilos extrahunt à corijs, depilant videlicet coria cum hoc lacte, ea in ipſo inſundentes: quod quidem eſt vehemens lacſe omnium tirhymallorum: drachma enim una & ſemis per ſos aſſumpta interficit euacuando & excoſciando: folia verò in pulverem redacta, & inſperſa ſuper ulcera maligna atque corrodentia, ampliùs progredi non ſolent: exſiccant ulcera ſordida, humiditatem excrementitiâ, carnemque ſuperfluam conſumit, lac conſert maculis cutem inſciantibus. Hujusmodi ſtirpes nonnullæ Tripoli reperiuntur, nonnullæ etiam Cayri. Sed cavendum ne propinquius accedas ipſis, aut ſub umbrâ dormias.

Bellonius lib. 11. Obſervationum cap. 1x. hanc ſtirpem fortè intellexit ſub arboris lanigeræ nomine, non tamen deſcripſit. Si verò hanc lanigeram eſſe Theophrasti aut Plinii putavit, valde hallucinatus eſt: nam lanigeræ Theophrasti nihil aliud ſunt quàm Goſſipium, quod in Arabia & Ægypto arboreſcit, & multos annos durat: ſed in Crêtâ hieme perit. Alpinus quoque hunc fruticem deſcribere videtur libro quem de plantis Ægyptijs edidit ſub nomine *Baid el ſar*: ſed ut ingruè fatear, ipſius deſcriptionem non ſatis aſſequor. Neſcio enim quid commune habeant hujus plantæ folia cum Aloës folijs, quibus ipſa comparat, neque in quibus ſemina hujus conveniant cum lacſucæ ſeminibus: & ideo quam præſtantiam proponit diligentioris pictorem requirebat: ſemina verò & fruſtus ſaris rectè expreſſi: at majores ſunt his quos ex Ægypto accepi, ut ex ſiccis folijs & fruſtu quem cum ſua lanugine & ſeminibus mitto, obſervare poteris. De ſacclato autem quod ſuper hac ſtirpem inveniri ſcribunt, aut ab ipſâ manare, nihil adhuc compertum habeo: nam in novellis plantis illud obſervare non potui. Illud tantum animadverti, quod lac detracto ſolo emanans, ſuccellu rempons circa vulnus conſciſcit inſtar gummi cujuſdam albi, Tragacanthæ valde ſimili, dulcedinis tamen experte.

SOſERA ſuffrutex eſt, ad duorum triumve cubitorum altitudinem aſurgens, caule ſimo, recto, fibroſo, multos ramos firmos è foliorum alis undique ſpargente, in quibus folia Myrti folijs ſimilia quidem, verum anguſtiora, alata, hoc eſt, in longo pediculo utrinque ſita contrarijs ſemper inter ſe petiolis, numeroque paria, ut in Lentili folio conſpicere liceat, ſuperne late virentia, infernè verò ſatura viriditate prædita graviter olentia, veſperi, ſuperne folij parte qua petiolo inhzrent, coſcuntia, infernâ parte terram ſpectante, ſicquè clauſa tota nocte permanent, manè verò circa Solis ortum denuò expanduntur: croceos fert flores, inodoros, plures in uno ramulo pendentes, multaque intus ſtamina cum ſilique rudimento continentes, in cauſis & ramorum ſummiratibus naſcentes: quibus ſuccedunt ſilique torundæ, digrum longæ & cælum ſpectantes, plurima ſemina continentes torunda æquantulum compreſſa: non omnes tamen ſilique ad perfectionem veniunt, ſed plurima ante decidunt. Elegans planta eſt, diutiſſimèque floret, ſubinde novos & recentes flores prufeſcens, ſemperque virens: radicem habet multiſidam, lignoſam. Semine primum nara, duo, ut obſervavi, dumtaxat profert folia, deinde quatuor, longo pediculo inhzrentia, utrinque bina, poſtea ſex, utrinque terna, atque ita deinceps quemadmodum cauſis augetur, foliorum oumetus creſcit, cæque majora apparent: duodecimum tamen numero non exceduot

cedunt ea quæ caulem ambiunt, hoc est, utrinque sena: nam ramorum folia tametsi eodem modo numero crescant, decimum tamen non superant, quina videlicet utrinque. Hieme (quam satis commodè ferre posse videtur, si diligens aliqua cura adhibeatur & loco quodam calidiore & à ventis libero adserverut) facile à ventis præsertim septentrionalibus læditur, qui folia & flores exsiccat, ea tamen, licet siccissima, à ramis non deßiunt, ut in mihi natis plantis obferro, imò ferè statim nova folia & ramos proferre caperunt. Hoc eodem nomine Alpinus plantam describit, quæ tameo plurimum ab hac differre videtur, ut ex ipsius descriptione & icone colligere licet.

Infusa Al-
pin.

Nardo
Cretica.

NARDVS Cretica herba est Valerianæ simillima, odore, caule, flore & forsitan etiam semine, quod longiusculum & depressum est, figura ad Lini semen accedens & in pappum deßinens: folia prima herbacei sunt coloris, rotunda, ut Afari esse videntur, interdum majora, crassa, succi plena, quæ deinde subsequuntur paulo longiora sunt & nonnihil incisæ, quibus alia magis secða succedunt, & similiter alia, utrandem ultima, ante quàm caulis emerget, Valerianæ majoris folia rectissimè æmulentur. Caulem Valerianæ persimilem habet, concavum, ad septicobitalem altitudinem assurgentem, quem bina folia Valerianæ divisa utrinque per intervalla ambiunt: flores albos in umbellis Valerianæ similes, majores aliquantulum, odoratos: radicem tuberosam, ex primaria enim, cui caulis nititur, minimique digiti est crassitudine & longitudine, tenues quædam radices per terram sparguntur, quibus aliz tuberosæ adnexæ, ut in Filipendulæ radicibus, nardi odorem referrentes: tota hieme viret, & novo Vere caulem emittit, qui Aprili aut Maio marcescit, & exsiccatur: tota autem æstate radices sub terrâ latent, & Autumno primis imbribus germinare incipiunt. Oritur humilibus collium locis, inveniturque etiam inter saxa. Ad Nardi genus accedere videtur Antiquis forte ignotum. Nam licet Galenus Lib. ix. de comp. medic. sec. locos cap. iiii. dum Philonis Tarsensis medicamentum exponit, Nardi Creticæ meminerit, tamen præter nudum nomen, nihil aliud de Nardo Creticâ apud ipsum legere memini. Pinus verò Lib. xi. cap. xii. Nardi geoera coumersant, Creticum recenset, quod à connullis agrum, ab alijs Phu appellari scribit, folio Olusatni, caule cubitali, geniculari, in purpurâ albicante, radice obliquâ, villosâ, imitante avium pedes: quæ quidem descriptio, non huic nostræ Nardo, sed Valerianæ, sive Phu à Dioscoride descriptio quadrat, licet nullam floris Narcissi similis mentionem faciat, ut Dioscorides. Dalechampius autem Annotationibus in Plinium ad calcem cap. xii. legendum censet io græco Dioscoridis textu αἰνῆσπις τὰ τοῦ κισσοῦ, quod optimè convenire ait coloris & figuræ. Non me lateat nonnullis legisse αἰνῆσπις τὰ τὰ νάρδον, aliquos etiam αἰνῆσπις τὰ τὸ νάρδον, sed ultimæ lectiones minimè placent. Quocunque tamen modo legatur descriptio, nostræ huic plantæ convenire non videtur: nam radices repugnant. Hoc tamen addam, in hac Insula Nardum frequenter inveniri; Valerianam autem minimam frequentius, ubique enim oritur: aliz verò species admodum raræ sunt.

Nardo.

Phu.

Cichorium
græcum.

CICHORIUM spinosum frutex est in maritimis proveniens, siccisq; collibus, & arenosis locis: folia ferens cichoracea, profundè divisa, crassiora tamen & minora, magisq; amara, quàm cichorii vulgaris: caules dodrantes, albos, in orbem diffusos, crebris albis spinis scatentes, cinaceum quæmadmodum Echinopoda totâ facie representans: flores inter spinas figurâ Cichorio similes profert, colore cyaneos: quibus succedunt semina Cichorii: radice firmatur singulari, magnâ ut Cichorium. Recens semine nata, ante quam in caulem abeat, in acetarijs manditur, sed durior & amarior est Cichorio. Vocatur vulgo *κυπαρισς*, hoc est, Hydriz spina, quia vulgariter in tota Cretâ schilibus hydriz utuntur ad hauriendam aquam è fontibus, quas hac herbâ obturante, ne mures aliudve animal intus penetrare possit, videtur enim ad hoc munus ista planta à naturâ formata: nam semper rotundâ figurâ cernitur. Hydriz vulgo dicitur *κυπαρισς* & *αἰνῆσπις* spinam significat, nomine ab *αἰνῆσπις* corrupto: quibusdam Insulæ locis dicitur etiam *πυλινος*, hoc est, radichium stividam, ob similitudinem quam cum cichorio habet, quod in Græcia vulgariter *πυλινος* vocatur, & Strebe quæ dicitur *πυλινος*. Hujus usus in defectu cichorii.

Cyparissus
Hydriz spina.

Hydriz spina.

Galastivida.

Spina.

Galastivida
altior.

GALASTIVIDA, cujus semina alijs misî, radicem habet multifidam, lignosam, sit mam, longam, multos caules conjunctim proferens, in orbem diffunditur & læ fruticat, pedem altitudine non excedens: caules albi sunt, crebris firmisque spinis præditi: inter quos folia leucocij albi folijs similia, licet minora, & quadam lanugine obsita: flores verbasco aut Blatariæ similes, albi, paululum ad flavum tendentes, in quorum medio stamina quædam purpurea: floribus succedunt exiles siliquæ, rotundæ, tenuissimum semen continentes. Rustici ad struendum ignem calefaciendâq; fornaces eâ utuntur, ob similitudinem verò spinarum, quam com Strebe habet, & album colorem, galam stividam nuncupant, non quoddam lac emitat. Sed & alia est planta ex Tithymali genere, hoc nomine donata, quæ spinas ut hæc profert, luteos flores, folia parva tota ova, lac copiosum effundens, radice (si rectè meminî) carnosâ, cujus historiam alijs dabo.

MITTO

MITTO etiam semina Molochiz, Cypri Plinij, sive Aleannæ, Bunæ, ex qua in Ægypto potioris illud genus conficitur Cave vocatum, præterea Seysban fruticis pulcherrimi, jam modò cum epistolam scribebam ex Ægypto accepta.

MITTO similiter ramum floribus & folijs onustum, simul cum fructu ligni illius Rhodij quod clariss. Martholus Olivaltrum, nonnulli Agalochum vocant, à quamplurimis etiam pro legitimo Alpalatho in Thetiatis usurpatum: ex cuius intuitu facillimè cognoscas in quantis tenobis omnes adhuc versentur. Nam lignum illud neque spinosum est, neque oleæ, & multo minus Alpalathi: sed veti & legitimi Cytisi, perquam similis Cytiso à Maranthæ descripto, sic ut eundem esse credam. Oritur hic tunc in Insulis Rhodo propinquis, & Rhodo ipsâ, unde ramos & truncos accepi: frequentius tamen in parva quadam insulâ prope Rhodum sitâ, cui nomen Astachida, ubi singulis annis quamplurimi caduntur trunci (mercimonium enim non vile est) Rhodumq., & Pathmon, & Constantinopolim, aliq. loca asportantur: nam Turcæ vulgo pro manubris eiusum conficiendis usurpant, & Caloiet Pathmii in spherularum precariarum usum convertunt: flores croceos fert in extremis ramulis, quibus succedunt falcate filiquæ ut Maranthæ Cytisi, sed aliquantulò minores, quàm ex aliquibus observare potui: semen idè quod Maranthæ Cytiso, & terna folia simul conjuncta, ut nihil detit legitime descriptioni: frutex ipse humanâ altitudinem superat, brachiatq. aut majore est crassitudine: cum floret, aliquantulum acris est, què admodum Aristoteles lib. iii. de Hist. anim. cap. xxi. scriptum reliquit Theoph. verò lib. v. cap. iiii. tribuit Cytiso medullam spissam & nigram, ut Ebeni proxima videatur, quod in hoc ligno observare licet: idem etiam affirmavit Plinius lib. xvi. cap. x. licet ex Hygino lib. xii. cap. xxiiii. ligno nullam gratiam tribuerit. Ex quibus colligi potest etiam Marthiolum credentem & lignum spinosum esse, & oleæ speciem: non esse autem Alpalathum rectè iudicari. Erravit & Anguillarius cum suo Rhodiensi pharmacopœo, qui illud suffumigij genus somniavit, hoc enim scite diligentissimè cupiens, mendacium esse deprehendit. Sed omnium maxime in errore versantur, qui hoc ligno in Thetiatis pro Alpalatho testè uti iudicant, quemadmodum celeberrimum Patavinorum collegium, & me quoque etiam nunc deprehendo, quando Cytisum creticum à *Maranthæ* vocatum, cuius semina tibi misi, & iterum cum ramo suis floribus onusto mitto, legitimum fuisse putavi. Nam differt ab hoc folijs quæ longiora & angustiora sunt, neque semper uno pediculo terna simul profert, sed quaternâ & quina, ut nuper observavi, sentiènque non in filiquis, sed trifolij modo, quod significare neglexeram, profert: hanc ob causam, non amplius Cytisum, sed Ebenum Creticum vocandum hanc frutem censco. Materies enim ligni plurimum ad Ebenum accedit colore nigro, splendore, & ductile, ut ex fragmento adjecto iudicare poteris.

HÆC tibi nunc mittenda habui, quæ non minorem voluptatem allatura spero, quàm prima. Quod autem rogas, ut tibi permittam meas epistolas publici juris facere, hoc quidem gratissimum mihi esset, maximâque tibi gratias agerem, quod eas tanti æstimes, ut tuis doctissimis elegantissimisque scriptis adijcendas iudices. Sed quia optime novi, quàm parum faciundâ valeam, & quàm confuso ordine sint scriptæ: veror ne tuæ Historiæ, quæ elegantissimo stilo conscripta est, plus de decoris alferant, quàm decoris: attamen cum tuæ sint, inq. tui gratiam eas candidissimo animo scripserim, ijs veluti tuis utaris licet: interea vive felix, meque tui amantissimum amare perge. Cydoniæ Cretæ x v. Februarij M. D. XCVI.

HANC epistolam Lugduni Batavorum accipiebam: x. Maij ejsdem anni, & pridie Cal. Iunij respondebam.

CLARISSIMO CAROLO CLVSIO ATREBATI HONORIVS BELLVS P. S. D.



X tuis litteris penultima Maij nuper præteriti scriptis vidi, meas xv. Februarij te accepisse cum aliquibus iconibus, & seminum, quæ tibi miseram, parte, quod mihi maximam lætitiâ attulit: hæc eas seòd acciperem, mûrum mihi visum non est, locorum enim distantia, & itineris incommoda hæc efficiunt, satis est semina non perijisse: nunc autem pauca tibi mitto, impliciter enim rebus familiaribus, & uxoris infirmitate, quæ diuturna, feminibus collegendis vacare non potui: addo etiam quod hoc anno in hoc climate, ex nimio diuturnoque æstu præter consuetudinem, siccitatēque maxima, & imbrium inopia, omnia ferè hebratam frugūque genera perierunt, ita ut nunc ea rerum omnium sit difficultas, ut incommodis multis vexati omnes cogantur: imò & ægei matris insule ab ipsi iocolis desertæ relinquuntur, qui hæc & illuc, ne fame pereant, confugunt.

Nunc iconem OSSARIS rami florentis suis coloribus pictam accipies, ex qua facile unusquisque præcipue poterit Malaisah, Alpinumque non rectè hujus stirpis florem descripsisse: nam neque Oleandro, neque Ranunculo similis est, nec minus coloris lutei, ut alias mihi telarum fuit: sed à te ex Weixij ramo optimè describitur: constat enim unico folio quinque profundis incisuris diviso, coloris fors quidem pallefcentis, intus autem circa cuspidem incisarum purpurefcentis, in cujus medio quinque veluti flamina firma maximo artificio confecta cernuntur, eoque obsolescere purpurefcente, quibus succedunt siudus. Hujus fruticis stirpes octo in scilicet maximis alo, quæ jam ad quinque cubitorum altitudinem sublatæ, innumeros flores protulerunt, sed omnes inanes deciderunt, ita ut in hac insula fructum ferre non posse credam: nunc tamen tres fructus uno pediculo inlidentes ferre incipit, ex quibus semen maturum colligere posse spero. Quod autem fetibus à Weixio te intellexisse hanc stirpem multo succo, eoque pallecente abundare, quod planè falsum est, nisi circa Iordanem alterius sit naturæ: nam in Ægypto, & hic Cydoniæ, lacte candidissimo abundat, non pallido: nec minus planta gravis est odoris, imò prorsus odore tota caret. Circa finem Julij à medio caule radicem vertus, folia decidunt, ita ut trunci omnino folijs nudis conspiciantur: radice firmatur alba in multos ramos divisa, crasso conice vestita, lactesque albo plena, ex qua novi stolones continuo fetere erumpunt.

ABAVI plantæ quatuor adhuc mihi supersunt, quas in scilicet magnis fervore: alias Martio in viridarijs traspluli, sed aquatum defectu (nam ex anni intempeie siccissima plurimi fontes, quibus irrigari solebant vitidaria, aruerunt) cultorumque negligentiæ perierunt: hæc omnes radice confabant tuberosa, una eademque figura elaborata, quod maximum mihi naturæ miraculum visum est: Sed illæ quas domi servo circa Solstitium tantum solia commiserit, hoc est, circa principium mensis Julij, sed ita diversæ, ut nemo, qui plantas anno præterito viderit, ignarūque fuerit ex unico fructu satas fuisse, nunquam congeneres eas arbores esse judicabit. Nam una folia aliquantulum ferrata, ad Castaneæ folia accedentia, singularia, aut bina, vel terna aliquando unico petiolo inlætrentia proferit: altera folia minimè ferrata, eaque bina aut terna unico petiolo constantia habet: retia similis est huic, sed folia aliqua quinque alijs folijs ex unico petiolo pendentibus prædita fert: quarta singularia tantum folia brevissimis petiolis hærentia proferit, eaque minimè ferrata, illius generis mali citrij folijs similia, quod Limones appellant. ita ut merito affirmare possimus Abavi arbores diversorum generum inveniri. folia verò quæ nunc proferunt, minora sunt ijs, quæ primo anno protulerunt: hujus etiam Abavi tres plantæ Iulio mense mihi natæ sunt, semine anno elapso tetra commissio, & fortasse alia nascentur.

Nunc aliquot plantarum hæc nascentium semina tibi mitto, quæ in hac temporis angustia colligere potui: sunt autem Agavani, Calochiermi, Gaidarothumi, Phascoli novum genus, Scordotis, Agnopastinaca, & Agnostari, quæ omnia fortasse tibi nova eunt, & ideo valde grata.

AGAVANVS planta est spinosa, folia habens aliquantulum lata & spinosa, caules bicubitales aut tricubitales, in quibus capitula Echini æmula, è solorum quæ caulem ambiunt cavis, ut ex extremo caule exeunt, in quibus flores obsolescere purpureæ, deinde semen rotundum, aliquantulum compressum, cannabis semen colore æmulans: vulgaris est Æthiæ in hac insula, & ante quàm in caulem abeat, comeditur. Hanc stuprem Acanon Veteribus dictam fuisse iudico, à qua teliqua spinarum generis Acanaceæ nuncupata: cujus quidem Acani licet pauca ab Aoriquis prodita sint (fortasse quia vulgarissimæ plantæ omnibusque cognitæ notas describere superfluum visum fuit) tamen ipsam legitimum Acanon esse affirmare audeo, conjecturis non despiciendis fretus: nam acanus inter φυλλοειδων δένδρων recensetur à Theophrasto lib. i. Histor. cap. xvi. ἀκανθώδης ὁ ἀκανός, & vi. Histor. Plantar. cap. i. Alia constant folijs aculeatis, ut ἀκανός, ἀκάνθιος, ἀκάνθος. Acanus etiam apud eundem Theophrastum dicitur illud quod veluti malum extuberat in spinarum genere, à Dioscoride ἰχθὺς nuncupatum, vel ἰχθυόειρος ἀκανθώδης, sive patet apud Theophrastum in descriptione Chamaeleontis, quem Gaza vermitaginem interpretatus est: dicerem Theophrastum lib. ix. cap. xiii. de Histor. Plantar. τὸ δὲ καρκινώδες ἴχθυος ἀκανθώδης, ὅτι ἀκανθώδης λέγεται, & lib. vi. cap. iiii. ejusdem Histor. de Trine verba faciens, dixit, αὐτὸ δὲ τὸ πικρὸν μύρον ὁ ἀκανθώδης ἰχθυὸς ἐστὶν, ἀπὸ τῆς μύρας: hinc ἀκανθῶς vocant hujusmodi acanon ferre, ut apud ipsum eodem loco γὰρ ἰχθυὸς ἀκανθώδης. Ex quibus Theophrasti locis elasticum è colligitur Acani nomine apud antiquos Græcos duò significari, unò herbam vulgarissimam aculeatam echinos proferentem, sui generis plantam: altero fructum quarundam aliarum spinarum, quæ omnia huic Agavano conveniunt rectissimè. Nam herba est aculeata vulgaris notior, echinos ferens, & est sui generis planta: & agavani appellatione vulgariter omnium aliarum spinarum echinos vocant, unòque & eodem modo à Cretensibus nunc Agavani nomen usurpat, quò veteres acano uli fuere: unde Agavatum ab Acano corruptum fuisse credo, stirpemque hanc legitimam esse Acanon: Quod autem Bellerminus Observationum lib. i. cap. xvi. asserit acanon in Creta aconachia vocari, ipsi impostum fuisse suspicor: nam hoc nomen omnibus cum nobilibus totis rusticis ignotum est, licet enim innumeros interrogavesim, omnes tamen hoc nomen nunquam aliis diversè

confessi

confessi sunt Hoc tamen prætereun- tum mihi non videtur, Guilandinum virum doctissi-
mum, præceptorumque semper colendum, commentario de Papyro pag. 128. asserere ixi-
nem à Theophrasto alio nomine acanon vocari, unde secundum ipsum ixine & acanus
unum & idem esset, quod mihi nullo modo convenire posse videtur. Hoc etiam addam
ακατο vulgare à Cerenfisbus vocari atque euspidem asperam.

Huius semine ab Honorio accepto nata sunt mihi anno M. D. XCVII. aliquot planta, quæ ad ses-
quicubi talem altitudinem excreverunt, & florem purpureum in echinatis capitibus tulerunt, sed
ante quàm semen perficerent, maturè superveniens gela abstulit. Conveniebant autem planta mihi
nata, cum ea, quæ elegantissimè Honorius hac epistola describit.

CALOCHIERNI, spina est Attaçylidi & Cnico silvestri similis, maior tamen, echinos &
i pla proferens, flores non vidi: nam tora sicca erat, semen duntaxat collegi. Hæc etiam à ru-
sticis ante quàm caules exeant, comeditur, & nisi acarna five acorna sit Theophrasti, inge-
nuè me eam ignorare fateor: interea femina terræ committere poteris, & eam observare,
vocatur καλοκρηνη αραθη, hoc est, æstiva spina.

Calochierni.

Et hæc semine nata, quæ ante quàm florem proferret, gela corrupta, valde autem similis Atta-
çylidi.

GAIDAROTHYMO, planta elegantissima est, & profus nova, pedalis, in orbem pet-
teram diffusa, multis pinis five aculeis horrida, folia longa, digitali magnitudine aliquantu-
lum angusta absque petiolis proferens, quæ caules undique, sed inordinata ambiunt, cau-
les quadranguli sunt, incani quemadmodum folia, ita ut tora colore cineris appareat, ram-
os utrimque proferens figura quasi crucis, qui in spinas desinunt, & in alios ramulos om-
nes dividuntur, spinæ, quæ medium locum obtinet, majore alijs semper exsistente: flores sal-
vix colore, magnitudine & figurâ similes profert in hispidis quibusdam caliculis ternos aut
quateros simul junctos, quibus succedunt semina inæqualia colore nigra: perpetuo viret &
Julio floret, totaque odore caret: radicem habet magnam pro portione plantæ & lignosam.
Echinopoda mirū in modum æmulatur multitudine spinarū, sed colore tota alba apparet.
Nascitur occidentali patre insulæ circa pagum Læda vocatum, qui triginta sex milia pas-
suum distat à Cydonia, locis siccissimis inter rhythm & rhythram, neque alibi vidissè
memini. Ignotam profus fuisse antiquis eredo: vocatur à ρυθμω, quod asinum
thymum sonat, licet nihil cum thymo commune habeat, nisi solum in quo oritur.

Gaidarothy-
ma.

Hac planta anno M. D. XCVII. satis frequens mihi semine nata est, quæ illo anno multas duntaxat
folijs: pradiatâ fuit incanis & lanugine obdita, salvia minori non dissimilibus nullo petiolo, aut
eo brevissimo folijs, nec in caulem abiit. omnes autem plantas, hiems corruptis, præter tres, quæ se-
quente anno caules protulerunt frequentes ab eadem radice prodeuntes: sed saxes valde immixta,
nam soli a prioribus longe minora fuerunt, & omnes rami qui in alios ramulos ex aduerso semper na-
scentes finduntur, in spinas desinunt, quarum media semper crassior & firmior est: sub ramulorum
separatione bina semper nata fuerunt foliola thymbræ folijs aequalia serè & incana. In firmioribus
spinis circa medium nati sunt inter foliola singulares duntaxat caliculi quinque lacinijs divisi, Se-
ptembri mensè in quibus flos salvia flori non dissimilis, sed superna parte repandus & dilutior colo-
rit. Cum vero tardè admodum flores protulerit, semen ad frugem pervenire nequirit. An porro
hanc plantam in proximam annum conservare poterò, dies me docebit.

Nova profus & elegantissima etiam hæc est planta, quæ apud me nondum nomen in-
venit, sed interim ob similitudinem quandam seminis, quam cum phaeoli habet, Phaeo-
li novum genus vocare mihi liceat. Ad sesquicubi talem assurgit altitudinem, modò sim-
plici caule, modò pluribus stolonibus ab una radice prodeuntibus, digiti minimi crassitudi-
ne: folia illi pinnata, hoc est, longo pediculo utrinque hærentia, semper contrariis petiolis,
Jennisei æmula, sed muctone obtuso ut securidacæ folia, è foliorum cavis filiquas fert ro-
tundas, pollicari crassitudine, rumentes & multo aëre plenas, colore rubras, in quibus con-
tinentur sex aut octo semina ad luteum tendentia, compressa, phaeoli figura: quos flores
proferat, compertum mihi non est, nam eam sponte nascentem in Spagia insula adversus
Matonem Peloponnesi sita, frequentissimam inveni M. D. XCVI. dum Venetias petebam,
mensè Aprili, quo tempore filiquæ ad maturitatem nondum pervenerant: à nautis grana
cruda libentissimè edebantur, græcèque lupinos silvestres vocabant, licet nihil cum lupinis
commune habeat: hujus plantæ femina his diebus ex eadem insula ab amico accepi, quæ
ut colligeret togaveram: nam insula habitatoribus caret, & non nisi adversis ventis à tri-
remibus petitur, & à piratis: eam ob causam femina citius habere non potui.

Phaeoli no-
vum genus.

Valde respondet hac planta (nam ea etiam semine misso mihi nata eodem cum superiore anno) Afragula
Baieico afragula, quam inter Hispanicas plantas descripsi, & cap. XLV. lib. vi. hujus Tomi primum Baieicu.

locum ubi nectis, quantum quidem ex ejus facie conijcere licet: superiorem hiemem in horto pertulit, & novè vere denno germinavit, nullum tamen floris specimen adhuc dedit: nescio an proximo anno (si per hiemem conservare poterat, perenni enim est radice) dabit.

Scordio
Plin.

SCORDIUS folia tomentosa, Menthastrò Marrubiòque albo similia proferre, per terram in orbem diffunditur, multis tamis & radice, quæ magna & perennis est, prodeuntibus, quadrangulis, tomento albo obfistis ut marrubium, in quorum summitatibus flores marubij albi in quadam magna & densa spica hærent, quibus succedit semen nigrum: tota planta major & crassior est Scordio vulgari. Nascitur ubique inter saxa, secus vias, & in marginibus agrorum: alij odorem ut Scordium, refert, & in tota fetè Creta seplasiarj pro scordio promiscuè hæc herba utuntur. Hanc herbam legitimum Scordotim Plinij esse assero: nam rectissimè descriptioni ipsius quadrat, & fortalis nemini adhuc cognita est, licet jam octo aut novem abhinc annos, semina Vicentiam, Pataviumque miserim. Lobelius, Pena, & Dalechampi, pro scordio stachyn Dioscotidis, salviam silvestrem, & gallitrichum officinatum describunt, quæ quidem stirpes omnes nothæ spurisq; sunt: nam neque alij odorem spirant, neque vitibus à Plinio attributis respondent. Scordotis inquit ipse, misceatur anidotis, rustici, misto nasturtio & resina cum melle tusa & arida opiculatus, facit & per se faciles excitationes, stomachum corroborat ejus succus, sistit alvum recentis drachma cum vino trita, vel decocta potu, vetusta vulnera cum melle purgat, farina ejus carnes exescentes per se inspersa consumit, menses & sudores provocat potu & illitu, partus accelerat pota drachma succi in aqua mulsa cyathis quatuor, venenis magicisque incantationibus adversatur. Hujus plantæ aliquot folia in hæc epistola occlusa invenies, ut, an legitima sit, judicare possis.

Fr illa epistola perijt (cujus hoc duntaxat exemplar postea missum) sic etiam ea folia addita: ejus autem semina sine epistola accepta, cum quibusdam alijs ab Honorio eodem tempore missis & terra creditis non sunt nata, eam ob causam de ea nihil promittere possum.

Agriopastinaca.

AGRIOPASTINACA vulgariter hodie vocatur in Creta herba quardam petroselinò vulgaris simillima, nisi quod minor est, foliaque eidem etiam incisuris prædita licet hæbear, minora tamen & aliquantulum crassiora proferre, caulibus petroselinò est, flores in umbellis albos sustinens, quibus succedunt semina petroselinò, sed minora, colore ad atrum accedentia: radice firmatur unica pollicis magnitudine, semper figura longa, cortice tenui tecta, qui digiti artritui facillime à radice separatur, quæ candida edulisque est, bulbocastani gustu: tota hieme vires, seménque Maio proferre, postea tota arefcit præter radicem, quæ terra later, & primis Autumnii imbribus germina protudete incipit. Hujus stirpis duo repetiuntur genera, colore corticis radicum tantum differentia: nam unius rufus, alterius niger conspiciuntur. Nigrum genus in montibus totius Cretæ & etiam in Dalmatia provenit. At rufum abundantissime tantum in scopulis Cretæ propinquis inter saxa, & copiosè admodum in quadam insula parva, nunc Grabussa vocata Occidentali Cretæ parte sita, ubi ære munitissima extructa est, quam insulam unam ex tribus Mussagoris à Plinio appellatis esse judico. Hæc herba ad Bulelinon à Plinio lib. x. cap. xii. descriptum accedete plurimum videtur: nam differt à Petroselinò brevitate caulis & radicis colore rufo: à Seplasiarj pro saxifragia usupatur, & saxifragia vocatur, à rusticis verò ἀγριόπαστινα, id est, silvestris pastinaca, à qua tamen longè differt, pastinaca silvestris adhuc in Creta legitimum nomen retinet, nam eam ἀφύλλων vocant, frequenter illiusque radice & herba cocta, verno tempore, vescuntur rustici.

Grabussa.

Mussagoris
insula
Bulelinon
Piræ.

Hæc anno M.D.XCVII. semine mihi nata sed cum valde serò germinasset, & maxime temella adhuc esset planta, hiems proximè sequens corrupta, ut observare nequiverim: erant verò ejus folia ex atro splendens, non minus quàm eleosilini.

Agriostari.

AGRIOSTARI, quod triticum silvestre significat, frequentissime in Cretâ invenitur, negligitissime. Herba est tritico similis, folia & caules tritici ferens, spiciatque aliquantulum asperas, nigriores, & aristæ breviores, ejus grana minora sunt tritico sativo, & altera parte obruta, ita ut secales grana potius quàm tritici æmulentur. Hæc semina nulla alia causa tibi mixto, nisi ut tibi competum sit, non in sola Sicilia triticum oriri silvestre, quemadmodum Poëtæ tradiderunt: & quod non absque ratione Cretæ sit triticum primo à Cretæ in Creta inventum fuisse sibi persuaserint, quemadmodum Diodorus Siculus in suæ Bibliothecæ lib. vi. scriptum reliquit.

Felicissime & abundanter mihi nata erat hæc planta, sed ante quàm caules proferre, inciperet, ab eo cui repurgandi horti curam dederam, pro inutili herba evulsa & abjecta fuit, licet seris quadam & ad normam, quemadmodum fuit ærat, nata.

Incipit,

Trifolium, trifolij, aut loti genus est edule: in foro enim ejus filiquæ, ante quàm durescere incipiant, venales repuntur, à pueris & fœminis libentissimè eduntur, succosæ sunt, & dulces, pisi recentis gustu: multos tenues caules à radice profert folia trifolij angusta, crassiuscula, aliquantulum mucronata, terna semper sinu conjuncta, flores luteos pisi, quibus succedunt filiquæ rotundæ, falcatæ, ac, pro ratione plantæ, magnæ: inter segetes invenitur, & in marginibus agrorum frequentissimè, herbæque omnibus nota est.

Hujus etiam semen (quod Astragalo Montpellierensium non multum absimile videbatur) cum alijs ab Honorio acceptis terra commiseram: sed non est natum.

Iulio nuper præterito ex Ægypto semina accepi *Oenopliæ spinosæ*, Bamiz ab Alpino descriptæ, Leclap diversi ab eo quem in Pannonicarum historia describis, Balsamæ veri, & Phascoli ex Iensen, id est, ex Arabia felici, quæ omnia terræ commissæ felicissimè nata sunt, maxima mea voluptate, & tibi nascituræ confido, nam recentissima sunt.

OENOPLIÆ spinosæ ossæ rotunda ferè figura existunt & durissima, in quibus duplex semper invenitur medulla in duabus ipsius ejusdem ossis quasi cellis ossæ membrana distinctis, ita ut ex his terræ creditis binæ semper arbores nascantur parum inter se distantes: folia in nuper natis aliquantulum serrata sunt, & spinis acutissimis circa petiolos munita, quæ semper binæ circa triagula folia visuntur, hoc est, utrumque una: folia figura & nervis similia sunt eis quæ *Oenoplia* sine spinis profert, at non adeo firma nec parte averfa incana, fortasse hoc in novellis tantum evenire credibile est.

BAMIA, folia malvæ fert, aliquantulum villosa, maxima, ita ut ad Cucurbitæ folia quasi accedant, longo pediculo inhzrent, & procul intuenti malva arborea videtur: florem malvæ profert magnum, quinque folijs constantem, colore pallido inter luteum & album medio, in um bilico purpureum, cui succedit fructus cucumeri silvestris similis, altera parte acutus, quinque angulis distinctus, plenus seminibus rotundis ad nigrum tendentibus, magnitudine Orobi: ad quinque cubitos assurgit, & in Creta hieme pent. Hanc *Triumtum* Theophrasti, sic interpretante Gaza, Leonardus Rauwolfius in Appendice Historiæ generalis Rovilij, appellat, sed quàm rectè, nescio. Ignotam veteribus fuisse judico.

LEBLAB, fructus, filiqua, & colore differt ab eo quem tu descripsisti: nam hic filiquas profert magnas, longas & latas, caulis color purpureus ad nigrum tendens, pediculi & nervi foliorum ejusdem sunt coloris, flores plures uno petiolo inhzrent. Ab Alpino rectè planta delineatur: sed flores valde differunt: nam non in fine caulium, sed è foliorum cavis exeunt longo pediculo plures quasi spicatum, magni, figura aliorum phascolorum, sed colore atropurpureo, qui Italicè *pennazzo* dicitur, phalcolique ad rubrum tendunt nigris maculis insigniti, longo hilo (ut niger) & albo.

*BALSAM*i semen idem est cum eo quo vulgariter utuntur: sed ego recentissimum accepi, quod opobalsami odore maximè fragrabat, ejusdemque odoris resina sicca multis seminibus inhzrebat: sed brevi tempore odor ferè evanuit, ita ut nunc obscurè sentiat, semina tamen in ore retenta, leviterque mansa suavem odorem relinquunt, terebintho proximum. Ex his seminibus terræ commissis quinque plantulæ reli nate sunt, quæ duo folia figura quasi rotunda protulerunt, in quorum medio cauliculum assurgentem, folijs primo lingularibus, & postea ternis, parvis, longo tenuique pediculo harentibus præditum, colore ex viridi albescente: plantulæ septem tantum folia adhuc habent, tardèque crescunt: caulis nunc crassior aliquantulum fieri incipit prope terram, ita ut quasi pyramidalis figura cernatur, colore ad rufum tendente. Hujus tam nobilis plantæ novellæ, si tibi iconem ad vivum delineatam mitterem, gratissimam fore judicans, eadem magnitudine qua nunc spectatur, majore qua potui diligentia ipsam delineavi: adultæ enim Alpinus publicavit. Hiemen in hac insula ferè posse confido: nam Creta & Hiericho sub uno eodemque ferè climate sunt, & si voti compos fiam, diligentissimè eas observabo: folia opobalsamum olent, licet adeo parva sint.

PHASEOLOS ex Iemen ab Alpino sub Abrus nomine describi puto, licet ipse fructum non rectè (meo judicio) descriperit: nam figura phaseoli non est, sed ovali, orbis granis paulo majior, nec totus corallij colore, sed parte, qua filiquæ aut suo fructui adheret (nescio enim quo modo oritur) hebeni nigerrimi cernitur: durus est, & difficilè dentibus cedit, sapore legumina imitatur, & insuavis est, in cibosque vix admitti posse ob duritiem credo. Hujus tres plantæ natæ sunt, quæ folia protulerunt similia ijs quæ in Alpini iconè spectantur, & ad Solem mirum in modum conuertuntur: nam folia quæ pinnata sunt, hoc est, longo pediculo harentia contrarijs periolis, & semper numero paria, parte averfa unum contra aliud arctissimè circa Solis occasum clauduntur, ita ut mucrones foliorum terram spectent, pediculique longi quibus folia harent, noctu terram versus inclinantur, ita ut caulem ferè tangerent, & sic tota nocte permanent: at cum Sol ori-

CCCXIIij EPIST. HONORII BELLI AD CAROLVM CLVSIVM.

tur, panduntur, & pediculi suo in situ ad angulos sere p̄ ciosci in caule conuertiuntur: Circa meridiem paulatim folia cælium spectare incipiunt, & meridie parte superiorem vni in cæ-
tra aliud inuicem clauduntur ita ardēt, ut unum aliud roraret, n̄ ueniret. cetera cælium spe-
ctent, contrario prorsus modo quo noctu permanent, follea inclinate in m̄ Sole pandun-
tur. Hæc foliorum ad Solem conversio mirabilis & observatio ne dignissima mihi uisa est:
& ideo particulariter tibi significandam duxi.

Hæc, vir clarissime, tibi scribenda habui: alia Deo optimo maximo favente aliàs scri-
bam, in flore vive felix, meque, ut soles, ama. Cydoniæ Cretæ die xv. Augusti more ve-
teri M. D. XCVI.

** Semen, quorum hæc epistola m̄minis, pars sub anni M. D. XCVL. finem mihi suis reddita,
sed epistola minime: quod cum illi significassem xv. Iunii anni insequentis, hæc illi epistola ex-
emplar cum sequente epistola ad me misit x. Octobris ejusdem anni M. D. XCVII. sed qua mihi
denum reddita (curante ipsius fratre Leonida) xxviii. Augusti M. D. XCVIII. Ad utram-
que autem respondebam v. Septembris insequentis.*

CLARISSIMO VIRO CAROLO CLVSIO,

HONORIVS BELLVS

S. P. D.



SEPTEMBRI nuper præterito epistolam tuam accepi xxv. Iunii scriptam,
qua certior factus sum, te semina tantum accepisse, litteras vetò nullas: quod
me maxima admiratione affecit, ipsi enim fuerat adjuncta epistola, cujus ex-
emplar iterum tibi mitto. Et si tardius fortè, quàm desideras, ad te perveniet,
locorum distantia describendum etiam si maturus certior factus fuisset,
citius etiam exemplar misissem. Cum hac nullum semen accipies: nam uxo-

ris morte, quæ iiii. Nonas Aprilis accidit, ita malè affectus fui, ut per totam ætatem nul-
lum consolationi locum reliquerim, neque semina colligendi, necque stirpes indagandi vo-
luntas adfuit. Quare me exculatum apud te esse velim, si promissis satisfacere non valui:
ætate enim futura, abundè tibi satisfaciam. Sed quia per temporis angustiam plura non
licet, Vale, meque ut soles, ama. Cydoniæ Cretæ ad x. Octobris veteri calculo M. D.
XCVII.

CLARISS.

CLARISS. VIRO CAROLO CLVSIO,
THOBIAS ROELSIVS

Reip. Medioburgensis Medicus

S. P. D.



SUPERIORIBVS mensibus, ad cœnam, mihi apud Pharmacopœum amicū indicatam, accessi libens: ad quam affinis meus Ioan. Junior, florum imprimis studiosus venerat, in qua corporis nostri vires vario ac lauro ciborum apparatu reparabantur, & convivarum animus tum vivā contemplatione herbarum, ac omnifaria florum amenitate refocebatur (quis ctedat hiberno illo tempore apud Mattiacam gentem, Zelandos hodie vocant, Anemones coccineas duplices, Narcissos junctifolios, Antirrhinum, & Caryophylleorum florum species floruisse passim in hortis, non aliter quàm æstate mediâ, ac cædida Leucoia, & flaventia lumina Calthæ, ut loquitur Columella de cultu hortorum lib. 2.) tum honesto ac utili de floribus sermone delatatur. Ex his sermonibus delapsi sumus in peregrinas & exoticas plantas: & dum in frequenti convivio sæpe alternantur verba, opportunitè mentionem feci epistolæ tuæ, amicorum optime, qua petis ac mones, ut de fructu Caryocæ, de farinâ cuius tibi aliquando specimē misi, & de radice *Inhamæ* scribam aliquid, ut vices de his historiis scribere queas.

Offendat nobis hospes & dominus convivij Wilhelmus Patduynius, eum in sua arte peritissimus, tum diligentissimus, radicem crassam, dodrantalem, utrinque obtusam, quæ ab extrema & obrutiorie radicis parte sex septemve sarmenta sicca, humi diffusa, & multis exiguis spinis munita produxerat. Sarmentis plurima folia inhaerent, quinque aut sex divisius insecta, suntque ea palmari amplitudine: verum non licuit folia videre. Radix habet exteriorē corticem nigrescentem, partem verò interiorē albiſsimam: virgultum hoc unum, quod nunc tibi mitto, à radice præcidi, essetque, ut videre potes, lignosum, rotundum, lentum ac vimineum, spinisque frequentibus quidem horridum, sed admodum exiguis. Admonui, ut hanc radicem ad te daret (quod ipsum fecisse cognovi) quæ quidem ab ipso pro *Inhamæ* fuit: sed aliter ab Indorum præfecto, qui ad famulitium suum duodecim mancipatos nigros ab Insula S. Thomæ adduxerat, edoctus fui. Quum enim ex aëris mutatione in morbum incidisset, me vocavit sanitatis recuperandæ causâ: atque hac tam commodâ occasione oblata, studui plenissimè ab ipsis rescire, quæ ad historiam illam spectarent. Atque ipse hanc radicem affirmavit illam esse, ex qua fit farina, quam radicis Manyouæ farinam nominant, & ab advēis Mandioca petperam dicitur. Manyouæ radix nec florem, nec fructum facit, sed radice lenitur, nimirum in mallicos dissecta. Mallooli novelli tertæ commissi in radicem crassam & magnam efformantur, singulis ut plurimum annis, & nonnunquam semestribus intervallis, prout solum fuerit fecundum. Fecunditas soli facit, ut radices interdum in duorum dodrantum longitudinem excreſcant. Cæterum Manyoua ante paucos annos è Brasiliâ in Insulam D. Thomæ delata est, quæ Æquatori subiacet in longitudinis gradu xxxiii.

Manyoua
ferendatior.

Nomen quidem legitimum apud incolâs hujus Insulæ est Manyoua: sed eorum aliqui Yucam à Brasilianis nominari volunt. Non dubium quin plantæ hujus nomen veteribus ignotum fuerit, cum nec quidem occidentales istæ nationes satis ipsi innotuerint.

Manyoua.
Toca.

Radicis duntaxat usus est illis ad victum necessarius: continet radicis succum lethalem, & tamen ab usu radicis non abstinent. Verum ita præparare notunt, ut farina & panis è radice confusus edatur innoxie. Corticem primum abscisso secant radices cultris lapideis in frustula, & taleolas, folique exponunt, & ligneis vel lapideis quibusdam instrumentis contundunt, & in minutissimas partes comminunt: deinde facies è cortice taris, vel à stramine contextus imponunt, ac pedibus subigunt, donec omnem expresserint liquorem, qui non sine vitæ discrimine degustari possit. Non potui ex Nigris his cognoscere, hunc succum ulla ratione posse fieri salutarem, ne coctione quidem, quod tamen de Yuca testatur doctissimus medicus Nicolaus de Monardes Hispanensis in eo libello quem de simplicibus medicamentis novi orbis inscripsit, & tu latinum fecisti. Sed alios quosdam de Manyoua conveni, maximè verò narrant istum, qui in Hispaniola Novi orbis Insula, tricennim captivus fuit, & Cheriturgum Lusitanum, qui ab urbe S. Dominici ejusdem Insulæ, ante paucos dies ad nos venit, qui mihi affirmarunt, hunc succum crudum valde esse inutilem, maximè quæ lethalem, exuere nihilominus omnem qualitatem noxiam, si recentes radices enim catribus elixetur, uti ipsi met ipsius experti sunt: quod quidem à multis Nigris ignoratur. Fieri etiam potest

Manyoua
parados
ratis.

potest aliquam radicem pro Yuca habitam, esse innoxiam: sed quam multum ista differat ab ea radice, de qua nunc fit sermo, dicemus paucis, ubi de Inhamæ.

Cæterum panem seu placentam formaturi, sumunt totam hanc massam compressam, quæ similis est amygdalatum congeriei, cui oleum recens sit expressum, & ut planè ex succa reddatur, furnis imponunt & siccant: atque hic est planus ille ac depressus panis & libum Americanum *Cazabi* dictum, quo nunc Americani multis seculis vitam sustentant. Farinam etiam ex eadem massa conficiunt, quam non in furnis siccant, sed subactam & diligenter expressam minutim dividunt, & in sole siccandam collocant. Atque huic proprium & indigenum nomen est farina Manyouca, quam ad te cum superioribus litteris misi. Vix dici possit quantum tumefcat & inflatur hic panis, si liquor aliquis illi affundatur, & aliquamdiu macetetur, ut exigua hujus siccæ assumpta moles abdomen rurgere mirum in modum faciat. Atque adeo hinc factum est, ut publicis decretis edictisque cautum sit in Occidentali India, ne quis hunc panem in mensa apponat, quin aqua vel vinum additi: ne qui edant non maceratum, sed absque liquore siccum, suffocationis periculum incurrant. Commodè hi panes incorrupti servantur multo tempore: quare etiam navibus, quæ ab India in Hispaniam appellant, imponuntur panis bischoi vice, pro alimento, ut de Yuca scribit Nic. de Monardis. Verum magis nobis favit alma Ceres, & ut Poëta fabulantur, frugum inventrix, quæ nobis largita est cereales fructus salubriores, qui plus alimoniz, & alimentum Nature familiari, absque ulla facultate noxia suppeditant. Quod ipsum absque ratione Petrus Martyr refragatur lib. vii. Decadis iii. ubi de terræ istius inaudita fecunditate sic scribit. Si cui animus aliquando fuit, de serendo in montibus tritico, ubi parumper frigoris vigeat (in plano minimè, ab nimiam agrorum pinguedinem) est incredibile auditu, spicam superare lacerti crassitudinem, spithuma longiorem, granæque nutrire quamlibet duo milia amplius afferenter inquirunt, & jure jurando affirmant. Sed salubriorem Insulæ panem Yucæ præsertim ajunt, quem vocant Cazabi, quia sit digestionis aptior. Hadlenus Martyr. Quod etiam ab ipso scriptum est Lib. ix. ejusdem Decadis. Et eo modo, inquit, exsiccatâ, conditâque & decudâ in Cazabi, panem præbet stomachus humanis tritico saniores, quod aptior sit digestionis.

Sed cum illorum panes exigua mole plurimum ponderis adferant, tardissimè sarè decisciantur necessum est. Cæterum quod hi panes densi sint, & a surfuraceis, quos *moplas* Græci nominant, sint alieni, perspicuum est quod idcirco & fermento copiosiore indigeant, omniumque maxime subigere eos oporteat, nec statim post fabricationem assare, ut pulchrè de ejusmodi panibus summum illud Medicorum decus Galeus scripsit. Verum barbaries apud eos tanta est, ut non norint cibum gravem efficere ad coquendum facilem & suavissimum, in quo Epicurus nostræ gentis primas tenet: sed peccant rursus in adversum, dum nullum in cibis & potioniibus modum servant, & tantum sæpe cibi atque potioniis adhibeant, ut opprimantur vires, non reficiantur.

Alterâ radix ex Insula S. Thomæ allata ipsi Inhamæ dicitur. Inhamæ autem illud ex una radice germina satis crassa, candida, & succulenta mittit, uti planta una ostendit quam ad te dedi: hujus folia oblonga sunt, ampla, & non incisa. Quoscunque conveni, & florem & fructum ferre negant. Plantatur autem è germine statim à prima germinatione, non aliter quam apud nos in Sisaro sativo fit: turiones sunt tanquam semen, hi enim à radicibus succisi & terra reconditi, repullulant, atque in radicem transeunt, quam singulis annis perficiunt, in càmque molem brevi excreseunt, quæ necessaria sit ad ulum viæ. Binas has radices Veteribus fuisse ignotas puto, & ideo nullum nomen græcum aut latinum proditum. Occidentales Indi ac Hispani hanc vocant Inhamæ, illam Manyoucam. Ego conveni Indos quam plurimos, nec ullum invenire potui, qui alio nomine has radices appellaret. Præterquam quod Indorum Præfatus diceret ipsam Manyoucam esse radicem Inhamæ speciem, & esse in sua patria alias Inhamæ species præter has binas radices, quæ inter se parum differant. Editur ab ipsis Inhamæ radix cruda vel cocta, & coctione amittit lentorem, ac tenacem humorem, quem in se habet, sitque cibis siccis, & satis etiam gratus. Intemni cuiquam mirum videri possit, indigenas S. Thomæ neglexisse ulum Inhamæ, quæ tamen innoxia est, postquam ad ipsos venit Manyouca, quæ, ut præmonui, aconito lethaliorem in se continet succum. Sed hoc factum intelligo, quod sentiant corporis texturam, hujus quam illius usu firmiorem fieri. Nec dubium, quin alimentum solidum à natui ali nostro calore superatum, reddat corpora fortia, & ad labores ferendos apta. Exemplo sint agrestes nostri mortales, qui cibis duris, & carnis crudis, more Leonum, Vrsarum, ac Luporum vitant. Quod autem illorum ventriculus cibum hujusmodi durum ac gravem ferat, facit multum ipsa consuetudo. Tamest ipsi familiarem usum Manyoucæ incant, ob rationem allatam, habent nihilominus Indici Americi suas etiam Batatas, & suavissimos fructus Ananas, ac gratissimi saporis plurimos alios: præterea habent & Indicas Noces prægrandes Palmæ arboris, quæ, ut testatur in Aromatum historia Garcias ab Horto, humanis usibus aptior est quam ulla arbor. Porro cum Manyouca sit Inhamæ species, & ferendi seu plantandi ratio fere

ferendi
aliquem
tum at
lethale
Autem
que in
neque
& col
Quar
En
mæ d
ab ip
dylu
effici
nos
falsi
Al
Indu
quit
dicit
item
sult
tiam
inter
dul
tib
mi
exi
nâ
ha
au
ve
ce
sa
pe
ri
d
r
e
c

Cazabi.

Manyouca
fortia.

Inhamæ.

Manyouca
ferendi
ratio.

feret eadem sit utrique, nec forma externa utriusque radicis multum sit dissimilis, facile aliquem in errorem abripere posset, ut, quod diversis radicibus scribendum, uni tantum attribueretur. Etenim Inham salubris & minime noxia est: Manyouca perniciofa & lethalis: sine hac Brasiliensium Yuca, tibi, doctissime Clusi, dijudicandum relinquo, cum Aurores aliqui scribant Yucam omnem in Continenti nascentem salutarem esse, eandemque in omnibus insulis præfens esse venenum, Manyouca verò cruda neque in continenti neque in Insulis facultatem fortitur unquam salutarem. Inham autem ubique & cruda & cocta est ut innoxie ab hominibus nigris novi Orbis. Sed prolixior sum, quàm par sit. Quare hinc ad fructum Caryoces five Caryosso venio.

Fructus est Palmæ arboris, quæ ad differentiam reliquarum Palmarum à Nigris S. Thomæ dicitur Palma Ady. Triplicem habet ista insula Palmam: quarum una fert dactylos, & ab ipsis nominatur Palma Tamara quod dactylum sonat: nam *Tamar* Arabica lingua dactylum significat. Et notum satis est omnibus, hanc Palmam Tamaram longè diversam esse à Tamarindifera arbore: licet non rectè senserit in Nomenclatore suo Hadrianus Iunius vir aliqui doctissimus, dum *φωσφοβήλαρος* Dioscoridis, officinarum Tamarindum fuisse scribat.

Altera Palma *Coccoline* ab ipsis dicitur, & hæc est Indica Palma prægrandem illam nucem Indicam prodicens, cui Lusitani nomen *Coco* indiderunt ob tria illa foraminum vestigia, quibus Cercopithecus, aut alterius similis animalis caput representat, atque hinc *Coccoline* dicta est. Habui hujus Palmæ aliquot nuces integras, cum suis villosis corticibus, quæ in itinere vasi incluse, germinare cœperunt: harum tibi binas mitto, alterius nucis corticem sustuli, ut germinis exitum, & ejusdem radicationem possem videre commodius: tertiam cum germine nucem penes me servaveram, cujus prædium ac ligneum putamen internum aperiens, ex hujus medulla germen traxisse innotuit: nucleus five medulla conclusa in se nõ habebat aqua (quæ nucibus Indicis recentibus & non germinantibus inest semper) sed aqueum illud in mareriam fungosam excreverat, dum fortè in germinis alimentum converteri cœpit. Germen exitè nucum harum foramen tertio, & mox extra foramen, statim ab exitu per corticem exteriorem erasum ac villosum quas fenestræ radicum fibras dimittit in terram, per quas alimentum suæ naturæ conveniens attrahat. Germen quod per foramen emergit unicum, similiter perferat villosum corticem: atque in unius nucis stolone vestigia foliorum arundineorum conspicuntur, quæ bifida vel bina sunt, & vix aliquam videntur habere laritudinem, quod quinque vel sex plicis commissa sunt: folia primum in vagina laruisse videntur, è qua prodierunt necdum expansa, sed plicis commissa, uti metipse hæc omnia in altera hac quam mitto nucem contemplari potes, cujus germen in longam excessisse videbis trium palmarum mensuram. Deceveram Indicæ hæc nuce dum recentes essent, tetræ committere: sed per agrorum frequentiam neglecti, nec putem germen futurum alicujus evidentis magnitudinis, vel admodum diu posse excrefcere ac superfluitate manere: quandoquidem climatis nostri temperies earum naturis adversetur. Hæc Palma omni tempore fert Indicæ nuce, viræque toto anno, fructibus semper alijs subnascentibus: aliz enim præcarpuntur, aliz maturefcunt: & quod Pontanus alibi in Hesperidum hortis, de malis Citrij testatur, de hac palma dici potest,

Flere novis semper, semper quoque satibus aucta.

Hujus Palmæ arboris formam atque figuram nobis exhibuit Ioan. Hugo Linscotius capite lvi. sui Itinerarij: at tamen nuce rotundas depingi curavit, cum ex Guinea, ex Insula S. Thomæ, & occiduis tetræ tractibus triangulares ad nos advehantur quotidie. Verum aruerunt hæc nuce triquetæ: at succo plenæ fortè sunt rotundiores, non tamen omni ex parte putem eas esse rotundas, quod tamen * vigilantissimi Linscotij figura videtur innuere. In hujus arboris descriptione multa videtur à Garcia mutuatus. Sed hoc addit: Arboris truncus nudus est, nulli in eo sparguntur rami, præterquam quod in summitate folia excrefcant similiter extensa ac in Phœnicea Palma, & nuce *Coccoline* dictas conjundim profert, aliquando decem vel duodecem connectuntur, rarò solitariæ conspiciuntur crevisse, quæ exeunt subter folia trunco eum pediculo annexæ. Cæterum cum arbores sint excessæ altitudinis, non habent radices nimis magnas, inquit Linscotius, & tamen firmiter terræ hærent: quod mirum videri possit, quum ament solum arenosum, infirmum aliis: existimandum idcirco profundè eas radices agere. Sunt autem, inquit, arbores tam vastæ altitudinis, ut non sine horrore posses quenquam videre ascendenrem: tanta tamen celeritate eas conscendunt Orientales populi *Camarin*, ut vettus simæ quàm homines esse videantur. Arbores incidunt ad modum graduum, per

*Palma gris
genera in
Insula S. Tho-
ma.*

*Palma Coc-
coline.*

* innotuit
ad vespitem,
cum hæc
Palmam, &
plurimæ or-
um in suis
interioribus
caulis in de-
pictis car-
vini. Plura
enim de co-
dem crasso
pediculo pe-
neculibus
periculis im-
brentes de-
pende, ut in
scholijs ad

*U. Carlem mousi, & de ipsa India anno 1537. Ambradoram adveni interdam vieno, non singulares trunco annosa, nec illapianæ, nec orbicu-
lata forma, sed triquetra, atque cum recentis, quales me & Vissipens & Anacortia habuisse memoravi, primum in India Orientali delatæ, in
quibus hinc rotundam aqua libræ circumscribam.*

Olei hujus usus apud ipsos etiam vulgaris est ad inungendas corporis partes rigidas, neque contractas, imprimisque nervos distentos relaxare dicunt. Exercitatos etiam, & quovis labore fessis totum corpore inungunt: nempe quod exercitijs similes corporis partes excidentur, & colliguntur: quod ipsum humidatione sua impedit hujus olei perfunditione ad lubrica frictio. Hoc ipsum acopum est, & insigne lassitudinis remedium esse prædicant. Olim hæc corporum inunctio frequenti in usu fuit tam apud præcos Græcos, quam apud Romanos, illorum in delicijs æmulus: & habita certè fuit non postrema salubritatis Medicinæ prophylactica, id est, sanitatis conservatricis pars, ut passim Galeni scripta perhibeat.

Hujus Palmæ Ady meminit autor descriptionis Guinæ, Manicongi, Angolæ & vicinarum regionum occidentis Oceani, ubi dotes regni Congo refert, inquis, in campis proveniunt permultæ & varix Palmæ, utpote; quæ Nuces fert Indicas, & quæ dactylos gignit. Crescit præterea alia ibidem Palmæ species, non multum à duabus primis fronde diversa, ex qua oleum, vinum, acetum, fructus ac panem colligunt. Per viam expressionis fit oleum è fructus pulpa, uti ex olivis fieri solet, colore & substantia simile nostro butyro, præterquam quod è vitidi in flavum colorem magis declinet. Utuntur ipsi eo pro butyro ac oleo lampadum flammæ eas alunt, eodem oleo sua perungunt corpora, ut glabra & agilia reddantur. Denique cibi vicem gerit necessitas tempore, uti nobis evenit, qui fame perijssimus, nisi hoc oleum habuissimus. Hujus Palmæ vel fructus nomen non refert: verum ex orationis serie satis patet, hanc esse Palmam Ady quæ fructum Caryosif fert, ex cujus pulpa fit istud croceum oleum.

Et jam dispendium duxi operæpretium, an hi palmæ fructus ab Indis allati Veteribus innouerint, nec ne, quod summa cum cautione peragendum. Sæpenuerò enim rebus quibusdam sunt indita nomina, quæ tamen descriptionibus Veterum non conveniunt: quibus nominibus idcirco non nimis fidendum est, ut optimè & pulchrè monet vir gravissimus, doctissimus, & super hæc occupatissimus Petrus Bellonius libro primo singularium & memorabilium Observationum, quas tu mi Clu's latinæ fecisti.

Theophrastus de Palmarum generibus, Genera, inquit, Palmarum plura. Primum enim, & quasi discrimine maximo, quod aliud fructiferum, aliud sterile: & paulo post addit: * Fructuum ipsorum differentia plures, alij namque sine ligno intus, alij cum ligno: & alij duro ligno, alij molli proveniunt: colore quoque inter se discrepant: alij enim candidi, alij nigri, alij flavi: ad summam non pauciores quam ficeorum colores, aut absolute genera statuerunt. Ad hæc differre magnitudine figuræque volunt: quosdam enim in modum esse malorum, magnitudinèque tantos, ut quatuor tantum in spicam teneantur, alios minores cicetum magnitudine. Denique, paucis interjectis, inquit. Genus aliud est in Cypro, quod & folium amphus habet, & fructum multo ampliore, discrimineque peculiari discretum, magnitudine mali punice, figura oblongum: non tamen lapidum tanquam cæteræ, sed radicibus simile, ut non devoretur, sed succo tantum expresso exuat. Hæc enim Theophrastus. Qui sanè locus de sumptis ex Historia Plantarum lib. II. cap. VIII. Caryoces fructum utcumque proponit, quem antè diximus esse ex Palma fructifera, & habere durioris ligni corticem, cui insedit pulpa flava cum ejusdem coloris pellicula, magnitudinem etiam illius esse mali citrij, cujus sit forma oblonga. Quo modo denique præter nucleum pulpæ expressæ ineatur usus, in olei præparatione ostendimus. Itaque apertissimè patet nonnullis cum Palmæ ejusdem fructu Theophrastu notis, hunc Caryoces fructum convenire.

* *Videtur interdum Gaza negligentis interpretis officio sumptus, aut alium Græcum codicem sequutus: mem enim sic habet. πῦτον δὲ τῶν καρπῶν διὰ διαφορὰν πλείους. οἱ μὲν γὰρ ἀπύρτοι, οἱ δὲ μαλακοσύντοι, καὶ τὰς χροαῖς οἱ μὲν λευκοί, οἱ δὲ μέλανες, οἱ δὲ ἑρυθροί. τὸ δὲ ἕλκος οἱ ἰδιῶται χρῶματά φασι εἶναι τῶν συνῶν, οὐδ' ἀπὸ τῶν τῶν γένε. διὰ φύσιν δὲ καὶ κατὰ τὰ μέρη καὶ κατὰ τὰ χρώματα. καὶ γὰρ σφαιροειδὲς εἶναι ὁσὶν μῆλα, καὶ τὰ μέρη διὰ τῶν πλοῦτος, ὡς τὴν τῆρας εἰς τὴν σφῆρα εἶναι. ἡ δὲ δὲ ἰσχυρὸς, ἄλλους δὲ μακρὰς ἔχουσιν ἰσχυρὸς.*

Amphog præterea an Theophrasti locum de Palma Ady sit intelligendus. Sed & Carietas Dioscoridi & Galeni nihil aliud esse aio, quam palmulas sive dactylos qui ad nos afferuntur, qui quidem immaturi fisci & ad præparandum participes sunt, maturi autem dulces pingues & succulentissimi.

Hujus fortè meminit Dioscorides, dum Caryotatum, sive Caryotidarum Palmatum mentionem facit: inquit enim lib. I. cap. de Palma. μέλαν δὲ αἱ καρπὸν ἰδὲς ἰδιόδικον ἀπὸ τῶν πρᾶχ' ἔχεται ἰσχυρὰ. præsertim Caryotæ esu fauceum asperitati medoneut.

Earundem meminit & Galenus lib. II. de alimentorum facultatibus, ubi Palmæ fructus facultatem alimentalem rimatur: ἔστι δὲ, inquit, ἐν αὐτοῖς ἡ μακρὰ τῆς μὲν γὰρ ἐρυθρῆς ἐστὶν ἐνδοῦς, ὥστε οἱ ἀνθρώποι, τῆς δὲ μελανῆς ἐστὶν ἐνδοῦς, ὥστε οἱ κύνες καὶ ἡ μῆλα: id est. Non pauca autem in ipsis est differentia: quedam enim sunt sicce & adstringentes, ut Ægyptiæ: quedam verò molles & humidæ, & dulces, ut quæ Caryotæ appellantur.

Oleum

CCCIX. EPIST. THOBIAE ROELSI AD CAROLVM CLVSIVM.

ὉΛΕΑΝ ΠΡΑΤΕΡΑΝ ΗΪΣΤΕ ΚΑΡΥΟΤΙΣ ΣΥΝΕΚΑΡΥΟΤΙΣ ΠΑΥΛΟ ΠΟΙΤΗ ΣΙΣ ΤΟΙΣ ΒΕΡΒΟΙΣ ΑΠΡΟΒΑΤΑΙ: ὁ δ' αὖν αὐτὸν εἰς τὸ σῶμα ἀναβὰς ἐκ τῆς καρυίδος, ἀναβὰς πάλιν πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνέβη, καὶ ἔκ τῆς ἀναβὰς ὅρας ὁ δ' ὁμοῖον ἡμετέροις εἰσάγει ἐκ καρυοτῶν. id est: luccas autem qui ab ipsis in corpus distribuitur et crassius quidem omnino est, habet autem et liquoris quiddam, ubi palma pinguis fuerit, sicuti Caryota. Quin & ante dixerat Caryotas esse exiguae adfrictionis participes: quod videlicet multum olei continent, & valde sint usguinolæ. Ex his non abs re suspicari quis potest, hos fructus veteribus innotuisse.

Vit dochisimus de re herbaria optimè meritis P. Andr. Matthioli in suis in Dioscori-
dem longè doctissimis Commentarijs, non vultur ob servasse discim, quod Dioic &
Galen. Raruerunt inter Caryotas & reliquos palmarum fructus, dum inquit, Veneus Pal-
marum fructus, nōnullis palmula, aliquibus Caryotas, quibusdam verò dactyli dicuntur, ex
Syria & Alexandria Egypti advehuntur, ac etiam ex Neapoli, illuc prius ex Numidia im-
portati. Quod tamen discimen celeberrimus Io. Ruellius (quem ante Hieronymum Tra-
guem, Leonardum Fuchium, & Matthiolum scripsisse exilimo) annotavit in primo luoli-
bro, quem de natura stirpium eleganter, docte, & copiose conscripsit.

In hoc argumento, vir doctissime, præter morem prolixior fui, quod speculationum omnium que sunt in Medicina, ea propemodum sit utilissima, quæ circa faciliates versatur, quæ alimentis infunt. Nam alijs prædijs non omni tempore utimur: siue alimentis autem, ne vivere quidem, neque secunda, neque adversa valetudine possumus. Vale feliciter in multis annos, & me, ut facis, ama. Medioburgi Walachrix postredie Nonarum Maji
M. D. XC VII.

F I N I S



PLANTÆ,
ſeu SIMPLICIA, ut vocant,
QVÆ IN BALDO MONTE,
ET IN VIA
AB VERONA AD BALDVM
REPERIVNTVR;

Cum Iconibus & nominibus quamplurimarum
quæ à nullo antè ſunt obſervatæ : nunc à
IOANNE PONA Pharmacopæo Veronenſi
reperatæ, deſcriptæ, & editæ.



ANTVERPIÆ,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Ioannem Moretum.

cIo. Io c l.

THE
IMPROVED
METHOD OF

TEACHING

THE
ART OF
TEACHING



OF THE
TEACHER
AND
PUPIL

CLARISSIMO VIRO
CAROLO CLVSIO
IOANNES PONA S.



PRAESTANTISSIMAM Medicinam humano generi necessariam esse inde constat, quodd (uti in Ecclesiastico legitur, & in libris Castigationum purgantium Ioannis Mesuici) ipsi propter ejus fragilitatem, & caducam naturam à summo rerum opifice clementissimè fuerit elargita; constant siquidem hominum corpora ex elementis corruptioni subiecta in uicinis agentibus, & patientibus, ex quibus alterationes, & affectiones necessario hominibus occurrunt, quarum vi actionis facultatum, organorum ministeria, similium partium naturae effectus omnes varijs modis laeduntur: hinc ipsa rationalis anima labefactata instrumentis (quasi dentata dolabra) in operibus suis, & circa artes omnes, scientias, philosophiam, & (quod grauius est) erga suum summum creatorem deficere sepe cogitur: animam namque nostra hac carnea uelle obvoluta huius corporis instrumentis (continuis etiam fluentibus) ut sua perficiat munera indigere lucidissimè conspicitur, nam quo modo imaginatione corrupta, diminuta memoria discurreret, & ratiocinabatur? suum agnosceret auctorem, redemptorem, atque illi obtemperabit? aegrotum uero corpus quo modo homini artes convenientes exercebit? proculdubio aut hac diminutè tractabit, aut depravatè præstabit: o uerè infelix humana natura, cum prope innumeris arumini, & tot, tantisque morbis miserimè subiaceas! His tamen calamitatibus omnibus arte ipsa medica nobis à benedicto Deo benignissimè impartita obuiam imus, & uerè medemur. Hac etenim præcepta, & medicamenta proponit, ac exhibet, quæ dogmaticè rationabiliterque usurpata, quantum homini licet, præsentem tuetur, & deperditam sanitatem restituit: iam uerò hæc medica materia (habitibus illis prætermisissis, qui ex fonte philosophia hauriuntur) cum ab elementis, fodinis, animantibus, alijsque huiusmodi rebus naturalibus promanant; tum præcipuè à simplicium, plantarumque admirabili uirtute sumuntur. His igitur ego cum a uide operam naua uerum, tum, ut ex horum admirabili natura, artificio, & effectibus causantem artificem intelligerem, admirarè: quæ: tum, ut hac cognoscendo, discernendoque possem (quod munus est nostrum) uuliter, & non adulterinè, quæ ab Excell^m Medicis in hominum utilitatem præcipiuntur, gemina simplicia elgere, & eadem in pharmaca commiscere, neque expensis, neque laboribus peperci, ut ueret abiliū præcipua loca studiosè inuiserem, quæque ibi ad hoc scientia nascerentur, quanta possem diligentia perquirerem, obseruarem atque colligerem. Inter hæc igitur cum ceteris dote ista minime secundus sit MONS noster BALDVS dictus, Baldus (inquam) qui altitudine, latitudine, amœnitate, ac pulchritudine insignis in Italia finitimis limitibus Tridentum uersus, ubi fauibus Alpium ipsa à Rætia separatur, situs est, itaque in agro Veronensi, ab ipsa urbe Verona uiginti milibus passuum distans: quæ præter arces, & mœnia turrisima, ciuium splendore, uetustate, fundatorum, æris salubritate, amœnissimis collibus, flumine pulcherrimo Athesi, lacu Benaco (qui certè benè agit, cum solus Carpines, regio pisces & producat & alas) Edibus Superbo Amphibæatro, illustribus Templis, terra quibusque fructibus, ac uetorum ingeniorum feracitate, & quæ tandem naturali, & medico Viridario Baldo monte, in quo varia, ac peregrine plantæ abundè consuecuntur, præstantissima ciuitas existit. Hunc itaque ipsum cum per plures uices unâ cū illustribus, Excellentissimisque, atque admodum R.R.D. Patre Mauro, & D. Cesare, altero quidem fratre, altero filio peracutissimi integerrimique Iuris consulti D. Fabij de Nichefolis, huius ciuitatis, generis splendore, fortuna bonis,

et literis primatibus civibus: D. Nicolao Maronea, Hellore Mosalea pariter Urbis nostrae Medicis clarissimis: D. Hieronymo Calderino civis nostro doctissimo: D. Ioachimo Iungermano Norimbergensi (salutis recordationis) Philosopho, Medico, et Herbariae facultatis peritissimo; à quo veluti à scientissimo Duce plurimum et cognitionis, et artis simplicium omnium mihi comparavi: D. Pascale le Cog. Gallo, D. Iacobo Zuinghero Basiliensi, et D. Georgio Rentzio Vucinspergensi, omnibus Philosophiae, et Medicinae doctoribus, atque in plantarum notitia versatissimis: et cum per plures (inquam) rices montem ipsum Baldum peragrassem, investigando, rimandoque diligenter Valles, Praea, Sylvas, Rubos, Forneas, Cavitates, Rupes, Verticesque omnes praecipites, atque saxosos, ne quae iterato saepe labore conquiseram, temporis tractu in memoria effluerent, aut conspicerent, ac demum culpa mortis interirent, haec de maximo hoc Baldo breviter adnotare non ab re fore arbitratus sum: tum praesertim, cum numerosiora simplicia ipse quam alij hucusque observaverim, tum potissimum etiam, cum plantas aliquas novissime ibi ego adinvenerim, quae hactenus nec editae, nec cognitae ab aliquo (quod sciam) unquam fuerint, quas etiam nec parum et utilitatis, et pulchritudinis, herbariae suppellectili allaturas esse mihi persuadeo.

Memor ergo singularis humanitatis tuae, quam tu mihi aliquando doctissimis epistolis tuis, simplicium alicujus difficultatis enodationem traſlantibus declarasti, meque eorum perfectiori scientia adauxisti: optimèque sciens quantum in plantaria facultate polleas, quandoquidem scientiae tuae praesentia cuique ex praclarissimis tuis voluminibus satis patet, quibus prae te fers intomparabilia studia, vigilas, peregrinationesque ejus comparandae causa subivisse: eisdemque manifestas, te mirabili ordine, et eloquentia singulari, non minus singula describendo mentis oculis, quam suis iconibus referendo oculis corporis subijcere. Pulchrè itaque cognoscēs, te Medicae materiae tantū profuisse, ipsamque tibi in finitū debere, à ratione alienum non esse censui ut haec tibi uni dicarem. prout etiam in futurum, si quae occurrerent, mesaturum polliceor, ut apicem perfectionis tum in cognoscendis, tum in usurpandis simplicibus (si fieri possit) assequi mihi liceat: hoc autem eo libentius feci, quod ad id me (inter ceteros) Perillustis, et undequaue Clarissimus, ac omnium scientiarum genere insignis Ioannes Vincentius Pinellus, praecipuus ac singularis meus dominus, benèdificae servitutis meae erga te felix initium est cohortatus. Hic Vir praestantissime repèries Iter, Villas, Loca, Situs, Aspectus, seriemque omnem ac nomina herbarum, quae singulis in locis vere exoriuntur. Posthac verò, ac propediem (ut spero) Deo benè amveniente, singularum ipsius Baldi partium imagines, ac locorum effigies depictas accipies. Quoniam autem nobilitas, et candor animi tui, mihi jam pridem perspectus est, quo labores hos meos qualescumque amplexari non dedignaberis; pluribus hoc à tua benignitate commendere supervacaneum existimavi. Satius id mihi erit si signum hoc esse meae perpetuae erga te observantiae, pro certo habueris. Interim Deum O. M. ut te quam diutissimè incolu-
mem tueatur, rogo. cura ut valeas. Verona, Idibus Augusti, M. D. XCV.

DESCRIPTIO MONTIS BALDI.



ENSES Vernales cum jam præterissent, qui propter montium qualitates in nostri Baldi regionibus, quam in planitiebus tardius sese manifestant, tempus ad iter nostrum faciendum opportunissimum visum est. Itaque circiter Idus Iulij ab Vrbe discessimus Occidentem versus, & egressi statim per amplam agrorū planitiem, absque vicibus, aliisve arboribus coltam progredimur, in qua abundanter conspicitur

Eryngium montanum, Matthioli: seu vulgare.

Tithymalus Cyparissias Penz: perperam Etula minor Italarum, Lobellio.

Spina seu Stella foliistialis, Penz.

Atractylis multorum: secundum aliquos Caycus sylvestr. Gaza Fusum sylvestrem vocat.

Onopryx, Guilandini: Carduus vulgaris, Lobel.

Acanthium, Diosc. seu Spina alba sylvestr. Fuchsj.

Ornithogalon, Diosc. seu Bulbus Leucanthemus Dodonæi.

Rhamnus tertius, Matthioli: seu Paliurus, Penz: frequentissimus.

Pulegium floribus verticillatis: perperam Calamintha officinarum.

Carlina sylvestr. minor, Clusj.

Gallium luteum, frequentissimum: Verbenaca vulgaris, & Matthioli.

Polygonum minus, Matthioli: à quibusdam Herniaria vocata: ab alijs Herba Turca: Tragus, pro Emperro proponit: Cordus, Millegranam vocat, ab aliquibus, Helleborina Diosc. putata, & Herba Canceri minor etiam nominatur: ab Italis, Centograea.

Verbascum scirmina, Lobellj, seu Verbascum ramulosum candido flore.

Verbascum latius, Dodonæi prius, Matthioli.

Blattaria, Plinij luteo flore.

Hyoisycamus primus, Matthioli.

Mentastrum vulgare, seu Mentæ sylvestr. species.

Plantago aquatica, Herbariorum: nonnulli verò genuinum Alsina: seu Damasconium Diosc. autumant.

Calamintha tertia, seu aquatica, Matthioli.

Et petvenimus ad locum, qui vulgo Clivus dicitur, qui est principij planitiei cujusdam magnæ, faxosæ, & ut plurimum incultæ, latitudinis circiter octo milium passuum, & lōgitudinis quatuor. Hæc omnino æqualis est, aëre saluberrimo, & pervia in qua quasi in quodam æquore peristeres, & per illud permeares, eminus absque impedimento prospicias hinc inde Villas, & ipsum Baldum, in hac autem deambulando adnotatur:

Sideritis prærens rubra, Dalechapij, & Sideritis etiam luteo flore ejusdem conspiciatur.

Eruum sarivum, Cordi: Pisum Græcorum, Tragoe: Matthiolus, pro Clymeno pingit.

Camelina siue Theophr. Erysimum, &

Verbenaca recta Fuchsj: siue mat.

Erythrodanum, Græcorum: Rubia tinctorum in Officinis.

Crotaurium Collinū, Gesneri, Ioachimjungermado: Aphyllāthes quæra, Dodonæi.

Dipsacus sativus, vel Galledragon Xenocratis, Anguillario: seu Spina selectis Theoph. Guilandino.

Dipsacus sylvestr. major, Fuchsj:

Ranunculus Hortensis simplex, seu primus Fuchsj: Ranunc. echinatus sylvestr. tertius, Dodonæi: seu Ranunc. arvensis, Lobellj.

Heliotropium supinum Clusj.

Aothemis, seu Chamæmelum.

Buphtalmum Matthioli.

Sideritis prima Matthioli: Pena verò, Marrubiū aquaticū seu palustre facit.

Stachys Dioscor. & Scordotis Plinij, Lobellio: à Trago Marrubium agreste vocatum: at à Matth. Pseudostachys.

Echium Matthioli, floribus rubris.

Irem albis floribus.

Echium Loniceri, seu Buglossum vulgare officinarum.

Chamazizypha, seu Zizypha sylvestr. frequentissima.

Echium Fuchsj.

Gnaphalium vulgarissimum.

Ægyllops Theophr. seu quarrum genus Roboris, Dalechampi.

Hyoisins flore cādido, siue Iacæz Pannonicæ species, Clusj.

Sideritis prima Fuchsj: perperā Herba Iudæica Avicennæ, Herbariorum.

Sideritis secunda Matthioli.

Lactuca sylvestr. Matthioli: Endivia quarrunda officinarum, Penz.

Diosc. Myagrum Dodonæo: à Matthiolo, Pseudomyagrum dicta, hic abundanter colitur.

Convolvulus minor spitz folijs, Lobellj à quibusdam, Scamonium tenuis Plinij, creditur.

Convolvulus secundus, Clusj: Cantabrica

brica Plioj, secundum aliquos: à Dalechampsio Volvulus terrestris dictus.
 Onosma Matthioli.
 Anchusa lutea Dalechampsij, frequentissima.
 Centaurium parvum Dioscor. à Dodonæo Pânax heptophyllum Plioj vocatur: ab Iralis Biondella: Quibusdam perperam Lymnefium Cordi videtur.
 Martaria flore cæruleo, elegantissima.
 Cyrisus Tragi: à Lobellio Lagopus altera pinnato folio dictus.
 Cistus annuus alter Lobellij.
 Hyacinthus spuij varia genera.
 Ampelopsalum frequentissimum.
 Lagopyrus Dodonæi, seu Lagopus spicatum.
 Pullatilla vulgaris, seu Anemone sylvest. Fuchsj: Ranunculum decemum Cordus facit: Lusitanus perperam, Alopecuron vocat.
 Beronica passim.
 Corinus, Plinij: Cocconelia Theophr.
 Clusio: Coggyria Plinij Camerario: Chrysophyllum Priscorum Lobellij: forte Barba Iovis Plinij Gesnero.
 Glauz Guilandina: Belgis Anthyllus leguminosa, seu Anthyllus prior Dodonæi.
 Tithymalus platiphyllus Penæ: à quibusdam Characias vocatur.
 Holostium Matthioli.
 Muscipula altera flore muscosa, Penæ: seu Sclamoydes magnum Salmanticum quorundam, Clusio: etiam Clusius ipse Lechnidus sylvest. speciem esse putat.
 Aphyllanthes Anguillæ: à Pena pro Bellide cærulea exhibita: Italis Botonaria: à Monspellensibus Globularia.
 Armerius flos tertius, Dodonæi.

In hujus dextera parte prope flumen reperitur

Coluthæa Theophrasti: à quibusdam Cynsus creditus.
 Saxifraga alba, seu quarta Matthioli.
 Polygonatum Diosc. seu Fraxinella Italarum: Secacul Gesnero putatur.

In ejus fluminis opposita parte, copiosè pullulat:

Rhus Obfoiorum, & Corianorum, vel Sumach: sed ramen sterilis est.

Et cum jam pervenimus ad finem spatiosi hujus agri, ad levam manum pagum Buxolærum reliquimus (ita vocatur ex copioso Buxo ibi sponte nascens, cujus sylva etiam in præsentia in fluminis ripa conspicitur) quo in pago inveniuntur plantæ diversæ, videlicet:

Abrotanum mas commune.
 Abrotanum inodoratum, Penæ.
 Abrotanum mas, album.
 Alyssum, Matthioli: an potius Thlaspi species? fortasse Alyssum minimum Clusij.
 Botrys, frequentiss.
 Antirrhoeum sylvest. sive Phytell. Dod.
 Chamænerion Gesneri: à quibusdā Delphinium Diosc. & Linum filiquosum.

Lagopus, seu pes leporis.

Clinopodium Lacunæ, Penæ: idem Penæ Acinon facit: Bertonica Pauli quorundam, seu Clinopodium primum Matthioli.

Clinopodium minus, seu Vulgare, Ocy-mum sylvest. seu Acinos Dodonæi: vel Pulegium petrum Gesneri perperam Calamiotha montana, Tragi.

Trifolium cochlearum, seu Medicæ species, Penæ.

Irem Medica spinoso folliculo.

Symphitum petraeum Penæ: Consolida minor à Matthiolo: Brunella altera Dodonæi.

Irem floribus albis.

Oenanthæ Fuchsj: Filipendula multorum: & dubitat Penæ, an Plioj Molon.

Thalidrum nigrum Cordi: Dodonæus Thalidrum magnum facit: à quibusdam Ruta prateosis, & Saxifraga Gal-lorum.

Ostris, seu Linaria vulgaris.

Sylbium, seu Leucacantha Loniceri.

Aphyllanthes prima Dalechampsij.

Sylfinchio Theophrasti, Cordo: seu Bulbus efculentus, Lacunæ: Bulbus sylvest. Fuchsj: à Lobellio, Ostrith-gallon luteum vocat, qui etiam dubitat an sit Vomitorius Bulbus.

Lactuca sylvest. vera Dalechampsij.

Lactuca sylvest. Fuchsj, & Matthioli, seu Pterisanthistifolia Diosc. Penæ.

Pecten Veneris Ruellij: aut forrasse (ut inquit) Anguillæ, Scandix Vercrum.

Tordylium, Sefeli creticum Lobellij.

Nasturtij species, Gesneri: illa quæ à Trago, Fuchsj, & Cordo pro Scrophio Germanico proposita est: à Pena fortè Thaliætrum Diosc. seu Sophia Chyrurgorum: à Dodonæo etiam pro Thaliæro picta.

Flammula altera Dodonæi, seu Clematis recta.

Srariiores, seu Achilleæ congener Clusij: fortè Helyochrisæ Italica, Matthioli.

Ladanum segetum Plinij Dalechampsio, rubro ac albo flore invenitur.

Anistochia rotunda genuina, frequentissima.

Itè Clematidis, Penæ: perperam aliquæ Officinarij credunt esse genuinā longam.

Thlaspi parvum Hieracifolium, & Leucoion minimum luteum Penæ: à Dalechampsio pro Lunaria lutea picta: Clusius Thlaspi clypeatum vocat, in suis

flus doctiss. Observat. Pannonicis: à quibusdam, Biscutella.

Nepeta, Tragi: Menta Cacti, & Cattaria mulrorum.

Iberis, seu Lepidium Diof.

Tichymalus verrucosus Dalechampi.

Mox descendimus ad Arhesim, inde senis conjunctis navigijs pendentibus ex longo, crasso, & mobili fune, qui alium similem funem amplectitur, magnis arborum truncis in utraque ripa infixis alligatum, in Pagum transvehimur Septimum dictum, quod ab Vrbe distet septem millibus passuum, quod magnam voluptatens spectantium oculis oblectantiam adfert, pergentibus autem per illas semitas reperiuntur hæc plantæ:

Onobrychis Pannonica prima; Clusij:

seu, ut ego dicerem, Cicer Astragaloides.

Heliochrysis sylvestris seu Chrysotome,

Hinc post frugiferos aliquos campos ingredimur in vastum & pariter incultum agrum, parum ab eo dissimilem, de quo in initio itineris ubi adnotantur:

Euphrasia, passim.

Linum perpusillum floribus luteis Lobellij.

Irem sylvest. Linum floribus albis.

Eupatorium Græcorum, seu Agnemonia.

Erygerum magnum, seu Iacobæa Senecium Lobellij.

Helixine Cissampelos.

Filix mas, frequentis.

Iris vulgaris.

Anonis lutea Camerarij: Natrix Plinij,

Quorundam: perperam multi Pharmacoporum pro vero Melioto utuntur.

Lorus grava Matthioli.

Ocymoides Matthioli: flore albo.

Perceper Anglorum Penz.

Saponaria Rec. Cunder Avicennæ Vale-

in quo loco etiam conspicimus,

Cistus annuum flore guttato, nostrum.

Cistus annuus flore guttato.



Esula minor Tragi.

Polypremnum Dalechampi: seu Polygoni species.

Organum sylvest. seu commune in officinis.

Lappa major Matthioli: utraque.

Tragi, vel Amarantici lotes species.

Verbalcum 111. Matthioli.

Cynoglossum Vulgare.

randi, ex Lobellio.

Conyza Helenitis Cordi: seu Baccharis

Monspelliensis Penz: Matthioli pro

Conyza majore pingit, uti etiam Dodi.

Horminum sylvestre Fuchij.

Millefolium luteum, an Agerum species

Polygalla Diof. Dalechampi: seu, Ono-

brychis Dudonæ: vel caput Gallina-

ceum Belgarum Penz.

Sideritis prima Fuchij: Tethraus & her-

ba Iudaica, Herbariorum.

Saxifagon Pauli, & Diof. Guilandino,

& Osteocollum Absyrti: est Saxifra-

gia communis.

Cornuta.

Cicer sylvest. alterum Dalechampi.

Asurgit recto surculo tripalmari,

quadraro, hirsuto, virenti, cui prope

tetram folia multa Oleæ effigie, deinde per

intervals ad opposita latera alternato firu bi-

na, ad medium usque, deinde per aliquos or-

dines tema spectantur, duobus tamen ex his

angustioribus, è quibus flores multi, colore &

forma Helianthemi. Sed hoc amplius in sin-

gulis folijs guttulam sanguineam sortiri, ad

instar Pyropi, auro summa arte excepti, tum

summitati, tum pediculo longiusculo & ca-

pillari calicibus affixi hærent, horum tamen

aliqui sine folijs unicum florem in suprema

parte obrinentes plantam finiunt. quæ radi-

ce unica, exili, lignosa, ac parum fibrata ali-

tur. Floret initio Iulij, tapor, & semina ut in

alijs Chamæcistus; provenit in plano Agro al-

tero, sed frequentior in opido Ciani.

Et hæc inveniuntur Pontonum in quoque: Est

autem Pontonum rus amœnum in quo jam

dictorum Nichelolarum sunt perampla præ-

dia, & egregiæ ædes, aptæ ad excipiendo pro-

pter varia illarum excolta ornamenta, varij

generis supellectilem, & ab solutas commodi-

tates quovis illustri. Viros, uti sæpissimè

congrit; adjuncta huic nobilibus domui duo

pulcherrima Viridaria, in quibus præter varios

ordines frequentissimarum Cupressinum, & in-

fertorum

sertorum selectissimorum, diligenter coluntur istæ nobiles plantæ: (inter quas digniores & magis pretegnæ à Præclarissimo Viro Ioanne Vincentio Pinello transmissæ huc sunt.)

Acanthus aculeatus Lobelij: seu Moth.
Spelliensium Chamæleontha.
Caucasus, seu **Moly Indicum.**
Althæa flore luteo, seu **Theoph. Ibisum**
 Lobelij: seu **Abrionon Avicennæ.**
Sanicula montana Clusij.
Aconitum lycoctonum Matthioli.
Aconitum batrachoides Penz.
Napellus Matthioli.
Napellus Penz.
Napellus racemosus.
Napellus Moysi Avicennæ, Matthioli.
Leucoion creticum pulcherrimum, forte
 Leucoion cæruleum Diosc.
Tamarindus vel **Detelside** Ægyptio-
 rum, Exe. Prospero Alpino.
Acacia Ægyptiæ genuina Antiquorum.
Sacchar altera Penz.
Pasturas Athenæ, seu **Nabca** Ægyptio-
 rum, Alpino.
Aquilina quatuor diversorum colorum
 pleno flore, five degener, hoc est, ex-
 pers corniculorum inflexorum.
 Item, quatuor diversorum colorum, ple-
 no flore rosco, five degener.
Hypomarathrum.
Dictamnium creticum.
Bryonia cretica.
Hedysarum alterum chypearum Lobel.
Thlaspi chypeatum Penz.
Iris bulbosa colore luteo pallescens. (tor.)
Iris bulbosa versicolore angustifolia saturata.
Iris bulbosa versicolor latifolia saturata.
Iris bulbosa violaceo flore.
Iris bulbosa flore rubro.
Iris bulbosa flore rubro elegantior.
Pseudonarcissus pleno flore.
Pseudonarcissus Hispanicus minor.
Mirtilus Germanicus.
Aster præensis, seu **V. Clusij.**
Scabiosa Hispanica Clusij: à **Fabio Co-**
lumna, **Phyteuma** Diosc. credita.
Litio asphodelus albo flore.
Anonymus Buxifolia.
Seseli Massiliense Diosc.
Panax Heracleum Herbariorum.
Panax Asclepium Diosc. **Guilandino.**
Aloë utraque.
Trachelium majus nostrum.
Tragium creticum Bellonij: seu **Andro-**
semum fruticosum Camerarij: vel
Ruta hypericoides Dodonæi.
Isopyrum Matthioli: seu potius ad **Me-**
lanchij sylvest. species referenda.
Eruca peregrina Clusij: seu **Leucoion**
marinum Patavinum.
Impatiens Dodonæi.
Trifolium Alaphitres.
Viola matronalis, vel **Damascena** Rec. à
 Fuchsio pro **Leucoio albo** picta: à qui-
 busdam **Hesperis** Plinii credita.
Centaureum majus generum Diosc.
Smyznium Lacunæ.

Hemerocallis Chalcedonica.
Digitalis lutea, flore amplo.
 Item **purpurea.**
Cytisus Maranthæ.
Bryonia cretica.
Peucedanum magnum Italici Lobelij.
Hieracium incubacum flore carneo.
Verbascum quattuor Matthioli.
Draba Dodonæi, seu **Dryophoræ** Plinii,
 ejusdem: nonnulli vero, **Thlaspi Can-**
dide umbellatum vocant.
Myrrhis parva altera Lobelij.
Superba Austriaca Clusij.
Cacalia Penz.
Leontopetalon, è **Creta.**
Tanacetum acutum album Tragij: seu
Parmica folio Taraconis, Penz: vel
Pyrethrum sylvest. quorundam.
Ocymoides arboreum, seu **fruticosum**
Camerarij.
Cardiaca Melica Penz: seu **Moloca**
aspera.
Tanacerum non odoratum Penz, seu per-
 peram **Sidenitis** Italorum Lobellio.
Chamaethododendros alpina, Penz.
Cotona imperialis, simplici serice florum.
Lilium Sossanum Clusij: quidam **Li-**
lium Persicum vocant.
Poterion Diosc. Penz: à quibusdam **Pim-**
pinella spinosa.
Phora Valdensium.
Lychdis Chalcedonica: **Scadateæ** vulgæ.
Thapsia Matthioli.
Ferula Galbanifera Lobelij.
Ranunc. polyanthos aureo flore.
Datura Turcarum Garzæ: **Solanum** ma-
 nicum **Columna** facit.
Muschari Turcarum: **Matthioli** exhibet
 pro **Bulbo Vomitorio.**
Erythrales, Plinij.
Ocymoides repens polygonifolia, Penz.
Helianthæ flore candido.
Acorum genuinum Antiquorum: per-
 peram **Calamus aromaticus** multorum.
Rhodia radix.
Siliquea.
Isafinum Cathalicum.
Syringa cærulea Lusitanica Penz: **Lilæ**
Turcarum, Matthioli.
Arundo Indica, vel **Cannacorus** quo-
 rundam: à **Cameratio** **Gladiolus** Indi-
 cus vocatur.
Cumyrum sylvestre primum, Diosc.
Calcitrapa candida, & **rubra** flore duplo.
Cnicus alter Clusij.
Cnicus sylvestris primus multorum: **Atra-**
dylis vera Dalechampi.
Chanophyllata montana major.
 Item **Alpina minima** nostra.
Iacobæa II.
 Item, III. **Pannonica** Clusij.
Caltha seu **Calendula**, pleno amplo flo-
 rei **Clymenum** Diosc. **Fabio Columna**
Soldanella

Soldanella alpina Clusij.
Gramen Parnasi Dodonzi.
Primula arborecens flore simplici.
Lygisticum verum Dioecoris.
Pulsatilla flore albo.
Aconitum tertium Dioec.
Alectorolophus primus alpinus Clusij.
Nardus Celtica altera Lobellij.

Scorzonera Hispanica.
Item, V. Pannonica Clusij.
Ornithogalon spicatum.
Dentaria minoris Matthioli, tres ex foliorum numero variates.
Item:
Stoebe Capitata Rosmarini folio nostra; cuius Iconis descriptio sequitur.

Stoebe Capitata Rosmarini folio.



EX albicante radice lignosa, & aliquantulum fibrosa, varij effertur caules teretes, modo coronariæ Lybanothidis, trium circiter cubitorum, quadam canitie aspersi, profert folia uti ipsa Lybanothis, sed longiora multo, & acuminata magis, quæ paululum flaccida facta, ita sese coarctant, ut omnino appareant Pinastris folia, quæque supernè subvirescunt, infernè albicant, cum quadam lanugine, uti & cauliculi: in ramulorum fastigijs edit capitula, quæ admodum Stoebe Salmantica prima Clusij, quasi magnitudinis Centaurij majoris, cui etiam flos simillimus est, nisi quod magis purpurea: semen retinet Cnici, sed nigricans; perennis est planta. Hanc sub nomine Chamæpiperis mihi misit D. Antonius Bertholus Ducis Mantuæ Pharmacopæus pentissimus, observatorque insignis, ut ipsi de hac sententiam meam dicerem: ego verò rationes nullas cur ipsa ita vocati deberet intelligens, imò cum viderem Rosmarinum in folijs æmulari, ac Stœbis formam obtinere, atque temperamentum, (cum adstringens & exsicicans gustu sentiatur,) non esse præter rationem arbitratus sum, nomine Stœbis Capitatæ Rosmarini folio eam insigniri, donec verius aliquod inventum sit, cui me subscribere non recusabo.

Trasit nostrum, vel esculentus Cyperus: Dulcichinû, à Guilandino vocatum: à Dodonæo pro Cypero dulci propositum: Fabius Columna Neapolitanus, Malinathallam Theoph. esse autumat, uti etiam Anthalium Plinij, facit. Hæc planta propriè Veronenûs est, nullibi enim in tota Europa, præterquàm apud nos sponte nascitur. Provenit verò copiosissimè prope Urbem ad meridiem, in qua itidem parte sunt hæc, quæ hic descriptæ sunt:

Chelydonium sylvest. Cordi: seu Caltha palustris, Gessneri: Matthioli pro Farfugio pingit.

Phalangium Crete Salonenis Penæ: seu, Pseudoasphodelus, vel Asphodelus minor Dodonæi. & Asphodelus 112. Clusij.

Lotus tetragonolobus Camerarij. Vbi etiam abundanter conspicitur.

Oleaster Germanicus, Cordi: seu (ut multi existimant) Rhamnus primus Dioecoris.

Rursus v. trajicimus flumen hic præfertim rapidissimum, & aliqua in parte vorticifum vel flexuosum, antedictis annexis anfractis, & sic incedendo relinquimus dextrorsum Athesim, & Arcem illam ratione loci impugnabilem, sitam in faucibus montium, nobis appellatam *La Chiusa*; nam cum olim montis soliditate integri tutissimo lapidosoq; pariete Athesis clauderetur, atque aliò, non autem Veronam perfunderet, mons hominum arte, manûque apertus fuit, parte illa quæ alveo secta opponitur integra relicta, quam ita violentet ipsæ aquæ labentes feriunt, & ab obice montis tejectæ tanto impetu relabuntur, ut rates, quibus merces utriusque Germaniæ advehuntur Venetias, Veronam, & alias in civitates, quandoque omnino ibi submergantur, semper tamen pars anterior in altum per ipsum montem ascendat, posterior autem aquis immergatur; quo fit ut in ea parte morantes cum aliorum risu, nec sine suo periculo ad genua usque madescant: conversum interitum flumen ad dexteram ablabitur, ac denique reconversum, tortuosè angulosq; ipsi petivum, acarte factum os ingreditur, ac sine impedimento perlabitur: Per hæc Arcem petu-

peruo praesidio Serenis. Senatus Veneti custoditam, & per callem hunc montibus adhærentem partim arte, partim natura extructum, iter sit in ipsam Germaniam: in via ista invenitur:

Phyllium, frequentissimum.

Ægyptos Penæ: & prima Matthioli.

Alcea vulgaris.

Alcea Veneta Tragi: Alcea peregrina foliisqua Penæ: secundum aliquos Vescicaria Cordi à Matthiolo pro Hypocoo exhibita.

Bryonia.

Phyteuma Dalechampi frequentis.

Chamædrys, frequentis.

Perfoliata rubra, quorundam, Gesneri: Tamecnemum Cordi: Vaccaria Dodonæi.

Dorycnium Rondelletij, Penæ.

Tribulus sylvest. Dalechampi.

Terebinthus, frequentissimus.

Mahaleb Gesneri, & Matthioli.

Leucoion sylvest. Pannonicum Clusij.

Lycium Italicum, Matthioli: an insectoria Spina altera Clusij.

Lolium Fuchij: Gittago Tragi: Nigellastrum Dodonæi: à quibudā Pleuromelanthium, & Lychnoides segetis.

Clematis altera Matthioli.

Campanula arvensis minima, Dodonæi, quam ipse olim pro vera Onotrichide exhibebat.

Gladiolus vulgaris.

Galega, seu Ruta Capraria: à Clarissimo Philosopho ac celeberrimo Medico, Hieronymo Fracastorio Onotrichus dicta: à quibudam Italis, Lavaneæ.

Trio, seu Erysimum.

Lycopsis Loniceri: sylvest. Buglossi congener.

Vularia Tragi: Cervicaria, & Trachelon multorum: à quibudam Archangelica.

Rhiseda Plinij secundum aliquos: dubitatur an Cantabrica Plinij Penæ: ab Italis Eruca peregrina vocata.

Dentellaria Gesneri: Dodonæus, Erygeron quartum facit: Penæ, pro minima Conyza exhibet: Matthioli pro minore Conyza pingit: & Phyllium, à Cordo.

Veronica femina Fuchij, & Matthioli: Penæ verò pro vera Elacine Dioscorid. pingit.

Lamium Plinij, seu iners, ac mortua Virtica.

Lamium Penæ: perperam à Matthiolo pro Galeopsi Herbariorum pida, ut Lacuna affirmat.

Perfoliata Dodonæi.

POSTEA verò ingredimur Pagum Caprinum, nobilem, multum feracem, pluribus fontibus fecundum, & nobilibus habitationibus exornatum. Hic observantur:

Asplenium Diosc. Cetrach Arabum.

Polytrichum, utrumque.

Phyllis Dioscoridis.

Hydropiper Dioscor. seu Persicaria non

Drypis Dalechampi.

Drypis Loniceri.

Fraxinus.

Populus Lybiea, Nigra, & Leuca.

Rubus.

Prunum sylvestre ex quo fit Acacia vulgaris.

Ligustrum vulgare: à nonnullis Cyprus vocatur: sive Philyrea à Dodonæo.

Phalangium ramosum Lobellij.

Fasium nostrum: Evonymus Theophr. Lobellio: Tragus pro Carpine Theophr. proponit: Cordus verò Anonymon vocat.

Lotus arbor Diosc. à nostris autem Perlaro vocatur.

Fruentone nostrum, seu Theophrasti Erysimum Penæ: vel Ocimum Veterum Tragi: à quibudā Lamplana vocatum, hæc copiosissime colitur.

Melampyrum Theophr. Cordo, Trago, & Dodonæo, seu Vaccinum Trinitum: à Clusio Panetaria sylvest. Pannonica tercia: Alopecurus Plinij Lobellio: & Strephurus Plinij, quibudam.

Telephium Diosc. Anguillario, & Guilandino: Scordiodes Matthioli: seu, Telephium Crateuz, Lobellio.

Brassica campestris Clusij: & Perfoliata filiquosa Anglorum.

Caryophyllata vulgaris, an (ut inquit Penæ) Geum Plinij: à quibudā Chrysogonum Diosc.

Rapunculus sylvest. cæruleo flore: seu sylvest. Tragi: Dodonæus Rapum sylvestre facit.

Ocymastrum Fuchij: Ocimum sylvest. seu Acanos Dodonæi: à Penæ, pro Clynopodio vulgari odore Pulegyi exhibitum: Tragus Calamintham montanam facit, sed male: nam Calamintha montana vera ab ista diversissima est, ut infra adnarrabimus.

Lappa agrestis Tragi: à Penæ, Cæcalis albu flore vocata: Aster Diosc. Penæ: alter Matthiolo: Bubonium Galeni, Dodonæo.

Aster primus Matthioli, seu Amellus Virgilij.

Calcitrapa Cordi.

Chamaemelum Eranthemum, Fuchij.

Consolida regalis, quorundam.

Ruta Canina Rec. an tercia Scrophularia Dodonæi?

Galium floribus albis.

mitifolia: perperam Cratzogonum Cordi, aliqui vocant.

Hydropiper Ruellij, seu, Heparotium Cannabinum vulgò, perperam Heparotium

porium Avicennæ credendum.
 Hydropiper alterum Herbariorum, Dalechampia: à quibusdam Chrysanthemum.
 Androsæmum Matthioli, Penæ, & Lobellij.
 Afcyrum Matthioli, & multorum.
 Lysimachia altera Matthioli: seu (ut Pena inquit) Lysimachia purpurea, an verò Pliniana?
 Nummularia Recentiorum: an (ut inquit ipse Pena) Etestedanū Theoph. à Celsipino Borissâ dicta.
 Artemisia major, seu vulgares.
 Centauroides vel Lymnesium Cordi: fortè (ut inquit Anguillara) Papaver spumens: Gratiola, & Gratiadei vulgò.
 Anagallis utraque, terrestris, ac aquatica.
 Symphitum maius, floribus albis, & purpureis.
 Solanum Halicacabum Diof.
 Hedera terrestris Matthioli.
 Hermodactylus, sive Colchicum nō venenatum Officinarum: quorundam Narcissus Virgilij.
 Symphitum medium, & minus.
 Ophyoglossum, Fuchsi; seu Enophyllon: à Cordo lingua Vulneraria: Ligulacum Plinij Gesnerus autumnaria: quibusdam Ceraria Plinij, Luciola etiam, ac Argentina nuncupata.
 Genistella insectoria vulgarissima: an (ut Pena inquit) Lutea Plinij? à Trago perperam pro Ferula propolita.
 Potentilla minor, seu Arge mone quorundam.
 Vitis sylvest. Matthioli: an (ut idem Pena inquit) Melorton Theoph. seu Cyclaminus altera à Dodonæo: Siliquastrum Plinij Guilandino: à quibusdā Circea, & Dulcisamara vocatur.
 Chrysanthemum Damocaris Fuchsi: Ranunculus verticillatus Apuleij.
 Pericaria pusilla Lobellij.
 Cirsium Matthioli.
 Centaurium luteū vel Citrium, Mesues.
 Vrica Heraclea Tragi: falsò Scorodonia Cordi à quibusdam credita, nam Scorodonia ab ipso Cordo exhibita alia planta non est quàm Salvia sylvest. Tragi, & Splacetus Dodonæi.
 Dryopteris, frequentissima.
 Cassuta Plinij: Linodesmum Gesneri: vel Cuscuta vulgò: quidam, Orobanchen vocant.
 Oxyacantha Fuchsi: perperam Berberis multorum.
 Oxyacantha Diof. & Matthioli, est Berberis genuina Arabum: à Trago Cynosbatos: à Cordo, Sorbus aculeata: Spina Appendix Plinij, à Gesnero.
 Siliqua sylvestris Clusij: an (ut Pena inquit) Cercis Theophrasti? est illa commenticia Acacia prima, à Matthiolo picta.

Condilla major, Dodonæi, & Loniceri, seu Apathe Dalechampi.
 Periclymenum Diofcoridis.
 Periclymenum rectum alterum Clusij.
 Periclymenum non perfoliatum alierum, Lobellij.
 Xanthium, seu Strumaria.
 Caulalis Matthioli.
 Tussilago seu Bechion, vel Farfara.
 Equiseti variz species.
 Phu parvum, seu palustre.
 Acer Montepessulanum.
 Erica major floribus purpurascens, Lobellij: seu Erica altera Clusij.
 Gramen hyrsutum, fortè Gramen Leucanthemum Dalechampi: à quibusdam Combretum Plinij dictum.
 Circea Lutetiana.
 Orvala tertia Dodonæi: seu Colus Iovis, vel Galeopsis lutea, seu Horminum sylvest. quorundam.
 Colurea Scorpioides.
 Cytisus Hispanicus alter, Clusij.
 Item quartus, ejusdem.
 Cytisus alter, Penæ.
 Cytisus albus sylvest. Cordi: an Cytisus, Gesneri?
 Valeriana rubra Dodonæi, & Ocymastrum Valerianthon: an (ut inquit Lobellius) Cōdudum, Plinij? fortè Narcissus Virgilij & Columellæ: Strution ab Excell^{mo} Aldroando: & à quibusdā Ben rubrum credendum.
 Aria Theophrasti, Dalechampio.
 Phyteuma Matthioli: à Pena Campanula persicifolia, vel quæ Iacone à Theopht. credita.
 Viburnū Matthioli, seu Lantana vulgò.
 Daphnoides, seu Laureola.
 Digitalis Lutea parva.
 Iacea montana Narbonensis, Lobellio.
 Anemone tenuifolia Cordi: Eranthemum Gesneri, & Dodonæi: Matthioli, Adonis florem nuncupat: Lobellius φάξ, id est, Philox Theophrasti, autumat.
 Orobis Venetus primus, & alter, Clusij, seu purpureo, & albo flore.
 Galeopsis Diofcoridis cujus radices quia albo Helleboro persimiles sunt, hæcenus pro ipso Helleboro in Officinis perperam exhibuz sunt. hujus effigies à nullo certius relata est, quàm ab Excellentissimo Camerario, in Epitome Matthioli.
 Genistella aculeata: fortè Vlex Plinij, Penæ.
 Pneumonanthe Cordi: Gentianæ minoris species, Penæ: à Dodonæo, Viola Calathiana dicta.
 Geranium Bathrachioides Dodonæi: vel Gratiadei Germanorum, Lobel.
 Geranium Hemathodes: seu Gruciale supinum Lobellij.
 Chamæcistus 111. Pann. Clusij.

Hyssopus

Hyssopus Officinarius, vel potius *Thymbra* species.

Anonymos linifolio Clusij.

Clematis recta Matthioli: seu *Vitis sylvestris Dalechampij.*

Ocymoides repens polygonifolio, Penz.
Juniperus minor, seu vulgaris.

Taxus Milos Theoph. *Pena, seu σμύλας,*
vel *σμάλας, Diof. & Galeni.*

Leucacantha Montpellierensis, Dale-
champio.

Asarum, perperam Baccara multorum.

Polygala Matthioli, non Diof. Astra-
galoidem, Lobellius facit: an potius

ad Loto species referenda est?

Loto sylvest. Anguillarz, & Matthioli:
seu Trifolium Asphakizum, Fuchij,

vel odoratum Trifolium, seu lativa

Loto Dodonzi: an Mel frugum

Theophr. ut Pena inquit?

Calamintha montana, & altera Cala-
mintha, Matthioli.

Lampiana Dodonzi.

Clymenum Plinij quorundam: Dodo-
nzius, Androsolum facit: vel alter-

rum Androsolum Fuchij.

Loc vs Coronæ, est in angustijs duorum montium, qui constant ex solido saxo, semi-

milliariis altitudinis, adamusum perpendiculariter recti, ac aspectu horribiles, supra me-

dium sinistri quorum exposita est magna saxola portio, hortulorum p̄silem tepra sentans,

inaccessibilis, nisi per funem ab altitudine superiori demittaris: aut via hominum industria

parata, aspera, & difficilis circa latus dexteri montis descendendo, ex hoc ad sinistram tran-

cas per ligneum pontem, valida Tiliæ fœminæ arbore bifurcata fultum, quæ Tilia adeo

magna (divinum protectio) ex vivo saxo exoritur, ac alimento à simplici lapide suggestio nutri-

tritur, augetur ac germinat, pandens ira nobiles illos duos ramos, ut ponti viride regumen-

tum pareat, hinc per arcum semitam in montis latere gradatim excisam, & unica personæ

deservientem scanditur ad naturale podium, ubi per pulchrum, neque parvum Templum

Deiparæ, semper Virginij gloriose erectum est, cunctis non solum vicinis pagis, sed etiam

remotionibus oppidis, & viribus venerandum, ad quod præsertim decimo octavo Kal.

& sexto Idus Septembris turbæ hominum copiosissimæ conflunt; quod ab Heremi-

ca quodam venerabiliter custoditur, quare ab aliquo etiam probò viri solitudinis cu-

pido hujuscemodi apta contemplationi loca iniri sumptisse credibile est: hic Omnipo-

tentij Deo mentis elevatione aguntur gratiæ, atque divinæ elementiz beatæ quæ Virginij lo-

corum indagatores semetipsos commendant, subinde benè cultus hortulus religiosi ho-

minis insiditur: jam verò cum superius denuò teditum est, in initio descensus consistendo,

densum prospicientibus sese offert admodum amœna Vallœula Brentini, agris viciferis, &

optimè cultis insignita, qui rapido, flexuosissimæ quæ Athei summa cum voluptate secari

conspiciuntur: in hoc admirabili Coronæ situ hæ plantæ vire scunt:

Ch trephyllum, vel Ch trephyllon Co-
lumellæ, Dodonzi à Manardo, Mir-
rhys credita: Orofelinum Anguil-
larz: & Cerefolium, & Gingidium
multorum.

Marrubium agreste, Tragi: seu Stachys

Diof. (ut Pena inquit) & Scordos,

Plinij.

Herba sacra quorundam Dalechampior:
seu Mellisophyllum Tragi, & Cordi: à

quibusdam perperam Mellisophyllum

Fuchij putatam: (ut mihi videtur)

Mellisoph. Fuchij, est ipsa montana

Calamintha, Penz.

Sphondilium Rec. seu Acanthus Ger-
manica.

Cicuta.

Serpillum, utrumque.

Polium alterum Matthioli: à quibus-
dam Iva molcata.

Anonymos flore Coluteæ, Clusij, sive

prior.

Castanea, atque Carpini sequentijs.

E r hæ plantæ, usque dum ascenden-
do pervenimus ad coronam.

corum ipse putat.

Saxifragia magna Italorum, frequentis-
ex scissuris pullulat.

Polemonia petraæ Gesneri, Ioachimo

Iungermanno.

Fistularia petraæ, seu Alektorolophos

tertia alpina Clusij.

Hyssopus montana.

Parietana sylvest. prima } Pannonicæ

Item sylvest. altera. } Clusij.

Saxifragia Bavarica } Iunger-

Saxifragia hircina elegantissima } manni.

Epimedium Penz. & Dodonzi: Lunaria

media secundum aliquos.

Euphrasia altera, Lobel. & Dodonzi.

Cannabis sylvest. prima Linb.

Conyza minor, & media, Matthioli.

Campanu-

Corydalis Galeni Anguillario: seu Fu-

mana tertia Matthioli: Splith, vel

montana Corydalis quibusdam: an (ut

Lobellius inquit) Phragmires Actij?

Scorzonera latifolia, seu Hispanica: è ti-
mis tantum saxorum erumpens.

Crocodilum Fuchij: à Gesnero, Ech-
inopus vocatur: à Cordo, Carduus

Sphærocephalus: à Trago, pro vero

Chamaeleone pictum: Pena verò, Ri-
tro seu Rutto Theophr. autumat: Dodo-

næus, pro Spina peregrina pinxit:

Spina alba quorundam: seu Sphæro-
cephalus annuus, Camerarij.

Faharia, seu Faba inversa, vel Crassula: à

Trago, pro Scrophularia exhibita, ut

inquit Pena, quam Telephium Græ-

Campanula Elzophyllos, Jungermanni.
Sedum magnum pallido flore.
Phalangium ramosum jam dictum.
Colutea Scorpioides, frequentissima.
Galeopsis aquatica, verticillatis floribus.

Tanacetum non odoratum Penz; frequentissimum.
Androsæmum Marthioli, frequentiss. &
Trachelium petrzum majus nostrum,
etiam hic pullulat, cujus icon hic proponitur.

Trachelium majus petrzum.



A Radice lignosa, & rugosa, colore pallido purpurascente exeunt cauliculi multi striati, subhirsuti, cubitales, & cum rubore virides; qui inordinatè emittunt folia oblonga, crenata, nigricantia, sua pariter hirsutie communita, parte pronà porisissimum, ubi etiam albicant, & Salvie folia referunt, magis tamen angusta, & mucronata; inter quæ parvula quædam foliola prodeunt: in summo caule sunt flores multi acervatim congesti, quædammodum in umbellata Cervicaria Penz; & inferius ex eodem globuli quidam at minori numero, & inferius magis inter caulem, & folia, alij, adhuc pauciores; formam præferunt illorum jam dictæ Cervicariæ, sed minores, albi, & in quinque, & quandoque septem mucronatas scissuras divisi; è quorum centro multa exeunt stamina sublutea, quorum unum modo Proboscideis egreditur, versus cacumen satis crassum, quod dum maturatur, bifurcatum & aduncatum evadit. decedente Augusto flores conspicitur, arque talis per plures dies conservatur, unde hætenus semen minime observari potuit; inter rimas illorum asperimorum lapidum Baldi, solum circa Coronæ Templum pullulat. Trachelium hoc non acre, non amarum, sed tantum adtingens esse sensu dignoscitur, multoque magis ipsa Cervicaria.

Hic contigæ aliquæ domus sunt quorundam hominum urbanorum qui Cruciatii vocantur, in quibus hospitia non incommoda pro locorum ratione haberi possunt: Hinc discedimus ad Vallem frigidam, & primò transimus per quædam præta, vulgò Prata Bazarra dicta: deinde ad Bavianam, & Imco, quæ sunt Vallecule Meridiem spectantes, admodum herbosæ, in quibus greges pecudum, & armentorum pascuntur, eo præsertim temporis initio, cum in montes tendunt, atque etiam, cum ineunte frigore ab alioribus descendunt; & hoc ne quid à frigoris subita mutatione animalia patiantur: Quæ Valles multas caudicibus, Acerum, Ariarum Theoph. Viburnorum, Corylorum, Fagorum, & pullulantium Quercuum abundant, inter quas frequentissima germinat.

Montana Calamintha vera Antiquorum, à Peoa, & Lobellio celebrata, sive Melissophyllon verum Fuchij.

Hic etiam virescunt plantæ hæc:

Bistorta major vulgarissima: à Gesnero
Limonium: à quibusdam, Britannica
existimata.
Caltha alpina Gesneri: Plantago alpina
ab alijs: an Celtica oardus altera Penz: & Rondelletij? fortè Chrysanthemum
Dodonæi: & Doronicum quartum Clusij.
Chamaeleon albus Dioscor. Helxine Plinij,
Anguillariæ: Syllibus Gesneri, & Carlina vulgo.
Martagonis, seu purpurei Lilij, varietas species.

Hyacinthus Germanicus liliflorus, &
Hyacinthus bifolius Theoph. Penz.
Asphodelus albus major, frequentiss.
Verbastrum Tragici: Cyanus major Lobellij.
Cyanus lupinus Lobellij.
Cirsium Pannonicum primum Clusij.
Orobanchæ, varietas.
Panax Hætaeleus Recentiorum.
Myrrhis altera parva Penz: perperam
Daucoides Cordi, Lobellio: quidam
pro vetò Scitli; alij pro Ligustico genus in pharmacopœia ponunt.

ff Aleatorolo.

Alechorolophon, *Plinij*, seu *Cordia* gallicab
aliquibus *Alliana* dicta.

Cistina *Anglicum* *Penz.*

Alephas flore albo, frequentiss.

Helioclytus *Alveticus* *Tragi*: vel *Chry.*

Socome *Germanica*, *Lobellij*: à *Mar-*
thiolo *Pseudoleontopodium* dicta.

Onopordon *Plinij* *Dalechampio*: forte
Carduus *Eriocephalus* *Clusij*: à qui-
busdam *Corona* factum.

Et sic pervenimus in nobilissimam, ac omni laude dignam frigidam Vallē, ortui sola-
ri expositam. hic sunt planities non parvæ herbis abundantes, quibus à Maio, usque ad Sep-
tembrem mensibus animata copiosa nutruntur, hic adfunt cavitates quædam, in quarum
duabus pluviales aquæ conservantur, æstiva autem salientes aquæ perpetuo featurunt:
his armamenta pro potu utuntur. In eisdem copiose luxuriat,

Pótamogetum, seu fontalis: perperam *Malabathrum* *Lusitani*.

Hæc sunt humiles, & pastorales casæ, seu *Tuguræ* ex viminibus contextæ, stantibus ven-
tis pervia, palcis cooperta (*Baito*) ab incolis dicta, sub quæ lac deferretur atque afferretur, &
sub his, & ab imbutibus pastores ipsi sese tuentur: in ista planitie frequentissima est,

Alethimilla, seu *Stellaria* multorum, seu
Leontopodium *Brunselij*: *Drosium* à

Cordo nuncupatum.

Soldanella montana *Clusij*, passim.

Britanica *Fraxastory*: an potius *Hormini*
silvest. species?

Veronica *supina*, *Lobellij*.

Carduus *Condryloides* *Dalechampij*.

Hyperobotanæ mas, & femina, *Dodonæi*.

Bellis *cerulea* magna.

Helleborus albus, floribus pallēcentib.

Primula veris prior, & altera, *Matthioli*:
à *Fabio* *Columna* *Neapolitano*, *Alis-*

ma sylvarum, & pratorum, vocitatur.

Polygala, *Tragi*, & *Dodonæi*: seu *Oro-*
brychis, *Diosc.* *Lobello*.

Item floribus luteis, ab *Excellentiss.* *Ja-*
cobo *Zuinghero* inventa.

Aconitum *Lycodionum* vi. *Clusij*.

Lotus *encephallos* *Dalechampij*: multi
ex nostris pharmaceutis pro vero *Me-*
lilotro utuntur.

Quævis perspectis aggredimur ascensum, (& difficilem sanè, licet talis non videatur)
ad scopulorum latus, atque simul hæc simplicia à nobis collecta,

Loti, variz species.

Helleborus albus floribus atrorubētibus.

Aconita varia.

Pilosella floribus rubris.

Gramen *parnassi*, vel *Lilijconvallij* spe-
cies *Dodonæi* aut *Monophyllon* mul-
tatum: *Cyclamitis* altera *Diosc.* seu

Et cum jam ad eum locum perventum est, vulgè *Saxa Vallis* *Frigidæ* appellatum,
quæ ardua, prærupta, ac asperius valde discissa sunt, laborandum est in ingenti lescetatum
plantarum copia, quæ hic amoenissimè vivunt, atque vascunt, siquidem observantur

Crocodilium *Monspeliensium*, *Dale-*
champia.

Echium montanum *Dalechampij*: seu
ut ego dicerem, *ervicana* montana.

Thurifoides, seu *Trachelium* *Alope-*
curioides.

Scabiosa montana, omnium minima
Penz.

Lonchitis aspera major, *Ghini*, & *Mar-*
thioli.

Centaureum majus alterum, *Clusij*: à
quibusdam (falso) *Centaureum* majus

Dioscor. creditum, & *Rheubaldensis*
quorundam: hic frequentissimum.

Veronica mas *Fuchsij*, & *Dodonæi*: *Lo-*
bellij, *Bethonica* *Pauli* facta.

Veronica *Dalechampij*.

Veronica recta minima, *Lobellij*.

Leontopodium *Loniceræ*: an *Myosotis*?

Allij montani, in species duæ, *Clusij*.

Serratula *Reç.* frequentiss.

Carduus *pratensis*, *Tragi*: seu *Acanthus*
silvest. *Lugdunensium*.

unico folio *Dalechampij*: non redè

Lobellij Gramen *parnassi* *Cordi* fac-
ti: nam (ut ipse *Cordus* scribit) igno-
rari affirmat.

Bethonica alpina albo flore.

Iumperi species minima, fortè *Iumperus*
supina *Clusij*.

Carduus *Arzophyllos* *Dalechampij*.

Chamaelon verus *Tragi*: *Tetralix* *spino-*
sa *Lugdunensium*.

Viola *Martia* fuscis cauliculis *Penz.*: à
quibusdam *Viola* arborea.

Martagon, seu *Lilium* montanum *Ita-*
lori: vel *Hyacinthus* *Poëratum* *Tragi*

seu *Asphodellus* *Termina*, *Fuchsij*: à
Dodonæo, *Lilium* sylvest. vocatum.

Polygonatum latifolium.

Item spinosus, multorum, seu angustifo-

lium, à *Murono*, *Gla* *mixdaphne* *Dio-*
scoridis creditum.

Bellis maxima: flore, *Anthemidis*, seu

Bellis major *Lobellij*.

Antiphthora, frequentissima, à

Napellus verus, *crucis*, *Penz.*

Napellus vulgaris, seu *Lycodionum* lati-

um *Ericarum*, *Cord.*

Jacea nigra, *Dodonæi*.

Panax *Chironium* *Tragi*: seu *Urophyllo-*
n *Cordi*, vel *Bupleurum* alterum *latio-*
rum, *Lobellij*.

Bupleurum

Bupleurum Penz. seu angustifolium.
 Aster luteus, seu Oculus Christi major
 Dalechampi.
 Achillea fidentis Matthioli.
 Jacobea altera Pannonica Clusij.
 Draba Penz.
 Hypoglossum multorum: Fabius Columna, Radicem Idzam facit.
 Lunaria Magorum Arabum Penz: seu
 Oxalis scunformis, vel saxatilis.
 Onagra Rec. an potius Lyfimachiz filiquosæ species? quibuldam Chamæmetis Gesneri putatur.
 Digitalis prima, Tragi, seu amplo flore:
 Dalechampus Verbasci speciē facit.
 Pseudoasphodelus Pann. Clusij.
 Dauci alterum in genus Fuchij: à Lobelio, Lybanothis Theophr. vocata.
 Daucisertia (species Fuchij): seu Lyba-

nothis altera Dodonzi: & minor Lobelij.
 Geleopsis Cortusi: Scrophulariz congener est.
 Linum sylvest. Pann. alterum Clusij, vel Cistoides Linum.
 Lychnis quarta Clusij.
 Flamula, & Clematis recta.
 Trachelium majus, & minus Fuchij.
 Scorzonera v. Pannonica Clusij.
 Succisa Fuchij, seu Morfus Diaboli.
 Ornithopodium Dodonzi.
 Condrilla cœrulea flore pulcherrimo, seu Sonchus lavis primus Clusij.
 Passerina Linarz folio, Lob. seu Chrysocome altera, Muroli.
 Galega montana, Dalechampi.
 Vbi etiam;
 Clematis Cruciata alpina nostra, invenitur, cuius effigies ac descriptio sequuntur:

Clematis Cruciata alpina.



A Sarmentosa radice egerminant multi caules vincti, magis subtiles quàm in alijs Clematidibus; lignosi, angulares, lenti, & tricubiales; è quibus surculi multi adhuc magis subtiles quatuor digitorum altitudinis, qui æqualiter bipartiti ad latera dividuntur, singulq; obtinent tria folia iusto intervallo divisa, & pediculo brevissimo adnexa, forma mirra, tamen majora, satis profunde per ambitum scissa, nervola, rugosa, inæqualis magnitudinis, nigroq; virescentia: est illi flos Crucem representans, folijs mucronatis, lanuginosis, cœruleis albicantibus, cujus medium accrevulo quodam extremulis foliolis (uti in Rosa Alexandrina apparet), decoratur. Est sarmentosa, & perenni radice. Oritur in altioribus Baldi rupibus, quibus Eurus dominatur. Brumæ arescunt folia. Planta aliquantulum acti lapore: radices verò insipide exsunt.

Ex simplicibus cotibus egerminant:

Phyllum Arthenogonum majus Dalech.
 Nardus Celtica, frequentissima.
 Daucus primus, Dioscor. seu Creticus vocatus.
 Saxifraga major, frequentissima.
 Umbilicus Veneris alter, frequentissimus.
 Rapunculus major latifolius, seu Alopecuros Theophr. Dodonzo.
 Rapunculus montanus angustifolius.

Sedum Petrzum montanum, Penz: fortè Phyllum Arthenogonum primum Dalechampi.

Campanula minor rotundifolia, Lobel. frequentissima.

Auricula Vrsi Matthioli: Britanica, seu Arthritica, Anguillar: Lunaria Arthritica à Gesnero: à Fabio Columna,

pro genuino Alij tunc proponitur.
 Aizoon montanum Dalechampi. &
 Cneorum aliud Theophr. Matthioli, in postrema Commentariorum Latnorum editione.

Indidem præterea mirabiliter, ac elegantissimè exsurgunt plantæ hæ nostræ, Icones quarum, & descriptiones, sunt quæ sequuntur:

Trachelium petraeum minus.



Veronica petraea semper virens.



planta. acerbi, & austeri saporis esse gustu percipitur.

Item;

IN ipsius Baldi altioribus summitatibus, cuiusvis alius plantae, à Trachelio petraeo minori, sterilissimis, inter præcipites illas cotes ab eisdem veluti cadentibus pendens, germinat Trachelium istud, lignosa, pallida, ac valde rugula radice, sesquipalmari, à qua folia numerosa pediculus quatuor vel ad summum quinque digitos transversos altis nixa, Cymbariae folia ut plurimum xmulanria, non ita crassa, sed nervosiora, & profundius laciniata, atque in viridi colore nigricantia, & ex qua separatim cauliculi multi, tenues, laeves, nigrovirentes prædictae altitudinis, cum folijs aliquantulum substantia cum superioribus, quantum aliquando unum non longo pediculo circa medium caulem emicat, reliqua florem semper circumvolvunt, sed hæc angustiora, & magis laciniata prioribus existunt, inter quæ umbellæ vice flores calycibus brevissimo pediculo contenti prodeunt in nigro putrescente cartilagi, Chymicæ cucurbitæ vitææ simillimi, quinque incisuras obtinentes in medio corporis tumore, quæ neque ad collum perveniunt, nec totum corpus ad calycem usque discindunt: in cuius medio multa filamenta nutriuntur, quorum unicum illius longitudinis est, ut aliquantulum crassum collum, multum egrediatur, & quod maturitate bifurcatum fit: Floret tempore maioris Trachelij nostri: semen nondum conspicimus: petennis, & astringens est planta.

Item:

Veronica petraea semper virens.

EX scissuris simplicis & omnino nudi saxi Baldi, hæc nascitur, quinque, sex, vel pluribus etiam caulibus rotundis, non ramosis, altitudinis sesquipalmaris, e quibus foliola bina exeunt, (licet aliqua magna repetantur) aequali ordine disposita, uti Chamædrys, tamen non sic profundè incisa, admodum crassa, splendida, supernè virentia & lanugine quadam donata, infernè verò albicantia: fert in summitate multos flores ad instar spicæ, quaternis, quinis, & septenis folijs cæruleo colore, aliquantulum albicantibus, quibus cadentibus relinquitur calyx, in quo semen continetur, ut in alijs Veronicis fit. Habet radices parvas fibrosas ac nigricantes, quæ ita saxi illi horridis paucissima commixta terra includuntur, & adherescunt, ut difficilimè etiam ligonibus evelli possint. Finet initio Iulij, & circa finem maturatur semen. Semper virens est, & elegantissima pulcherrimæque

Veronica minor alpina, Serpilli folio.



Saxifragia alba petraea.



Item:

Veronica Serpillifolia omnium minima.

VERONICA minima folio Serpilli, oritur in aliotibus summitatibus Baldi, Orientem versus, multis ramusculis furculosis, rotundis & laevibus; altitudinis ad summum unius cum dimidio palmi: fert folia Serpilli modo, sed aliquanto longiuscula, in nigro colore virentia, non sestrata, licet aliquando (sed raro) aliqua divisa conspiciantur. in summitate absque aliquo ordine habet flores, cum quinis, aut senis, & quandoque etiam quaternis tantum folijs. simili colore floribus perreza Veronica, sed dilutiori. Calyceem seu Vasculum, dum flores deponit, retinet; in quo clauditur semen rotundum, minutum atque nigrum: radix est lignosa & fibrosa. Floret Julio mense; semen Augusto maturitate perficitur. Perennis naturae planta est; licet frigore depereant eorum: tota planra, & semen gustu adstringenti apprehenditur, nulla percepta acredine, aut mordacitate; unde in fluxibus & in quibus adstringere sine caliditate opus est, aprum esse medicamentum judicari potest.

Item:

Saxifragia alba petraea.

HABET hæc tenerissima planta radicem unicam, tenuem, capillarem, ad semipalmum altam ac rufescentem, à qua plura folia substatia, ac formà albæ Saxifragiæ, molliora tamen, ac profundius divisa, è quorum medio caulis affurgit cæcis, nodosus, leviter hirsutus, dilute purpureus, ac dodrantalis. huic inhærent ramusculi plurimi ab imo ad summum inordinatè dispositi: in summitate frequètes sunt flosculi quinque candidissimis folijs constantes, quorum centrum quædam pallescentia filamenra occupant, istis cadentibus relinquuntur calyx semen continens minutissimum, uti in Saxifragia magna Irallæa. Floret Junio mense ad finem; facillimè languescit, ac deperditur: initio dulcem existimes, postea vero acrimonia percipitur.

Item:

Thlaspi petraeum Myagrodæ; cuius est hæc descriptio.

IN scissis eotibus frigidæ Vallis pullulant à radice capillari folia multa humi sparsa, & per ambitum secta, atque unusquis quadrangularis caulis atrovirescent, ad tres palmos altus, à medio ad summum in varios ramusculos divisi, in cuius summitate flosculi albi foliorum quatuor, quibus do-

Thlaspi petrzum Myagrodes



Pyrolam alteram Pann. Clusij fortè Ambrosiam montanam Dalechampij.
Item quartam Pann. Clusij.
Item Pyrolam Marthioij: & Limonium Fuchij
Hepaticam albam Cordi: seu Gramen Parnassij Hederaceo folio Lobelij.
Salicem Platyphyllos: Leucophyllos Dalechampij.
Salicis Pumilæ genus quartum Clusij.
Balsamum alpinum, & Rosam alpinam,

In medio verò ipsius Vallis ad Orientem provenit frequens.

Filix mas.

Cacalia Penz.

Cacalia prima Pannonica Clusij.

Aconit variæ generis.

M A N S à somno experrecti, oriente jam sole ex hospitio (Baito videlicet) scandimus denovo (levatorum tamen) jam dictas diruptas rupes, ac pervenimus ad verticem montis ubi (quoniam terra nonnihil videtur depressa) & sinum quendam efficit, ideo vulgò Os Navolæ appellatur, expositus autem est locus iste ad Africum sive Lybem, quo circumcirca provenit:

Pulsatilla albo flore Penz: seu Anemone sylvestris altera Pann. Clusij: vel Samolium Plinij Dalechampio: ut in suo Horto medico Camperanus testificatur.

A h hac aliquantulum descendendo venimus in quædam prata ad Occidentem spectantia Viscaria vocata, quæ plantis istis ornantur:

cidentibus relinquuntur vascula omnino referentia Dodonæi Myagrum. Floret ad exitum lunij. saporis acrimonia nulli Thlaspi generi cedens.

ALIQUANTULUM autem supra ipsa non satis celebrata dirupta laxa, in dextera parte scaturiunt aquæ gelidissimæ ad Notum expositæ, quibus Fons Navolæ nomen est, quarum frigiditatem manus vix ferre possunt, imò quandoque vitrea ipsa vasa, ad refrigerandum potum in ipsdem immerfa, quocales propter difficilem ascensum contrarium, leniantur, minimo temporis spatio perfracta sunt, quæ quamvis abundanter satis fluant, per illam Montis partem dimidij miliaris altitudinis ad Vallis frigidæ planitiem, attamen ad hanc non perveniunt, sed totæ ab illa terrarum superficie absorbentur, circa fontem istum nullæ surgunt plantæ, quæ alibi observatæ non sint.

A d dexteram autem Fontis, est Valleculla quædam appellata (la Valle del Bassin) quod olim ibi magnus murus in formam propugnaculi ædificatus, ad transitum Germanorum retardandum. Hanc percurrentes dum descendimus ad diversorium, in parte dextera Navolæ congrua, Zephyro opposita, frequentissima vidimus:

quorundam: an (ut Gesnerus inquit) potius Ledon alpinum: à Dalechampio Evonymon Theophr. creditum: ab Excellentiss. Aldroando Nerium alpinum dictum.

Chamaerododædron Allobrogum, Penz. Idæam Vitem Theophr. Dalechampio: at Clusius in Pannonicis, alteram Vitem Idæam facit: ab Anguliano Vva Vrsi dicta: Dodonæus, Vaccinam nigram vocat: alij, Mithyllum.

Tussilaginis alpinæ Clusij, duas species. Pinguiculam cœruleo, ac albo flore.

Tussilago.

P A R S verò ejusdem sinistra, sterilis existit.

Tormentilla candida frequentissima. Ranunculus 1111. luteo flore Fuchij: sive Ranunc. nemorosus luteus, Dodonæi.

Item Ranunc. glomerosus frequentiss.

Crocum

Crocum vernum minus prim. Clusij.
Ranunculus bulbosus Penz: seu Tuberosus Dodonæi: aut Batrachium Apuleij.
Ornithophora candida Gemmæ fr-

quentissima.
Oenanthe alpina Penz: passim.
Serapias candido flore Lobel. five Cynorchus montana folio maculoso Gemmæ.

Hinc Aquilonem versus per eandem hanc parrem montis, in alia prata amplissima, herbosissimaque transivimus, Baldensibus ea Vallis Vaccaria vocatur, quod illic opimis pascuis aluntur innumerable boum armenta; dives autem est locus iste fonte perenni aquarum salientium, quæ usui sunt non solum pastoribus, atque armentis ad extinguendam sitim, verum & ipsis pascuis ad humum irrigandum: surgunt hic

Major, minor, & minima Gentiana Matthioli.
Pseudorchis, Bifolium Dodonæi: à quibusdam Ophrys Plinij: Gramen Parnassi quorundam Lobellio.
Coriandrum sylvest. Myconi.
Liriasphodellus albo flore: seu Hemetocales Dalechampij.
Thapsia Matthioli.
Aconitum tertium Matthioli.
Aconitum tertium Diosc. frequentiss.
Laserpitium Fuchsij: à Trago Smyt-

nium nuncupatum: Anguillara Lygusticum autumat: Cordus, Struthion facit: ab aliquibus Imperatoria, Ostrutium, & Magistrantia.
Auricula Muris, frequentiss.
Pzoni a femina.
Sphondylium laciniatis folijs.
Orchidis varia genera.
Saxifraga umbellifera Penz.
Galeopsis maxima Pannonica Clusij.
Ornithopodium Dodonæi.
Draba altera Pannonica Clusij.

As istis autem herbosissimis pratis ad Occidentem versus, statim ascendimus (& laboriosè sanè) ad cacumen montis, à Vaccaria valle unius milliaris altitudine perpendiculariter elevatum; cui nomen est, Mons Major. quoniam omnium vicinorum montium altitudinem superat: hic stantes Benacum detegimus, qui à Sarcis Tridentinis initium sumens, desinit in Minurium flumen Pischeriam ingrediens, & eandem in duas partes secans: Hic Pischeriæ locus, micenibus, propugnaculis, & mole tutissimis munitus est: hic numerosè Anguillæ, ac Troctæ maximè abundantissimè capiuntur à piscarionibus: Cernimus subinde Syrmionem peninsulam, natale solum Catulli nostri Poetæ; ubi non longè sub ipsis Benaci aquis, fontes sulphurei creduntur esse; exhalationem cerrè sulphuris, & sentis, & hauris naribus. Vterius est in conspectu Decentianum quarumcumque frugum emporium magnum. Præterea Salodium, quod ad urbis dignitatem proximè accedit, oculis sese offert; hic merx dealbati fili, ejusdemque subtilissimi ad vestes lineas confuendas & acn pingendas, copiosissimè exercetur. Ob oculos quinetiam versatur, Maternum, & Tusculanum. His tribus in locis, ubi vitalis saluberrimæque aura ducitur, omni arte ac industria coluntur Viridaria arborum præstantissimarum, sunt Malus Citria, Malus Medica, & Mafilica. inter quas sunt etiam quedam quæ ingentes fructus ferunt, Poma Adami vocitata, propterea quod in inferiori parte cicatrice obtineant, post morsum primi patris, (ut ferunt) relictam. Hæ quidem celebrandæ plantæ: quovis tempore florent. & totum annum acervarum fructus conservant. horum locorum parietes ex Lauro & Mirto, quasi auleis quibusdam mirè teguntur. his & hortorum vice concinnè admodum exornantur: atque adeo abundant Lauro loca ista, ut hac, vice lignorum, ad instruendum ignem etiam populares utantur. Ex quibus amoenissimis viridarijs, præter delicias, summus quoque proventus excipitur, cum fructus isti non solum nobis, & vicinis civitatibus, verum etiam Germanis ipsis cumularissimè impartiantur. Papyrus scriptoria hic etiam in magna copia conficitur. Hinc conspicitur parva insula Monachorum minorum D. Francisci, in qua abundanter provenit,

Herium albus, & rubris floribus, ex faxis nudis prope aquam pullulans.

Aspectum etiam sese offert, Bojacum, ubi piscatores Carpionum præcipuè degunt. Vterius Vicus Campioni, quo in loco ad excoquendum ferrum, ferramentorumque genera omnia extruenda, ædificia varia fabricata sunt, habent namque hic aquas ipsis intercurrentes, atque fodinas ferrea materia exuberantes; atque ut paucis toram rem perstringam, hic contemplari licet aquas diversicolores: selectarum olearum oliveta frequentia: Naves, (quæ tamen naviculæ apparent,) tum ab aspirantibus ventis, tum nautis respigantibus, Læguifium hanc Veronenis oræ, illam ad oppidum Tridentinæ Ripæ impulsam: prætereo rivulos murmurantium aquarum, Pistrinis ad molendas fruges, ac torcularibus varijs deferrentes: prætereo ut prolixitatem evitem, diversos alios pagos: racco tempestates procellosas, ac repentinas, quibus Lacus iste commoveatur, ob contrarios ventos tempore eodem inter sese concurrentes. Vt jure Virgilius Lacum verbis illis compellat.

Fluctibus & fremitu assurgens Benace marine.

Ad summum, humanis delinjs, ac virg salubritati, ora hæc locupletissima Benacensis opportunitissima existit.

Ex hac etiam specula veluti ab altissima eminentissimæque Arce, Verona, ejus territorium, Athetisque flexuosissimus oculis sese confusè iamen, lubrè, cuncti lumine etiam, setenæque exillente cælo remotiores vrbes, sed adhuc magis in distantiâ, æque et clarescent apparet. hic locus distat à Benaco consueto itinere sex miliaribus, perpendiculariter vero duobus: in hoc itidem montis cacumine planities est herbosa, ubi oves, & capræ tantummodo pascuntur, in qua invenitur Trifolium angustifolium alpinum, quod ita describo.

Trifolij angustifolij alpini icon.



ipsas efferrantes in eis vitescunt. florent & semen ferunt, quod ego ipse mea manu collegi. In hac eadem planitie, ac contiguâ alpinis rupibus exurgunt plantæ infrascriptæ:

- Alectorolophus primus Pann. Clusij.
- Chamaelea Germanica, Tragæ & Dodonæianæ (ut Pena inquit) Chamaedaphne Diofcor. Fuchsius, Daphnoiden facit: à quibusdam, Mezereum Germanicum.
- Tormentilla candida Dalechampi: seu Pentaphyllon alpinum petrosum minimum Lobelij: sive Stellaria argentea, vel Argentaria petraea Gesneri: seu Alchimilla minor Camerarij.
- Lunaria racemosa, seu Lunaria minor Matthioli: à Columna pro Epimedio Diofcor. exhibetur.
- Gnaphalium alpinum Clusij: Matthio-

NASCITUR Trifolium istud in eodem Majori Monte: ea parte, quæ ad Orientem spectat. cujus radix longitudine est ferè quincunciali: exterius quidem colore pallescenti, internus verò albedo: lignosa autem, & multis obiecta comis: sapore subamaro. Surgit ab hac unus tantum cauliculus, omnibus prius folijs nudus, rotundus pariter, cavus, ac lævis, semipedalis longitudinis, qui in summo sine ordine flores emittit, quorum forma ad Vicix flores proximè accedit, in quibus color purpureus admodum venustus emittitur. E summo radice capite exeunt supra terram quinque, ac plures etiam pediculi, ternas ferè uncias longi, quorum singuli, è medio duas barbas emittunt, & in summo folia tria, æquo inter se spatio distincta. Horum verò longitudo sesquicuncialis est: ac forma angusta, acuminata, ac nervosa. Planta ipsa admodum rara est, & perennis. Floret autem mense Iulio. Illius semen nondùm mihi conspectum, neque vires satis cognitæ sunt. parte autem occasum spectante fonticulus perpetuò scaturit, cujus aquæ labentes per montis crepidines in Vaccariam vallem paulatim absorbentur & ad nihilum rediguntur: in parte verò Septentrionem aspiciente semper nives jacent, quas aliquando, cum nimis altæ non sunt, plantæ penetrant, & caput si pra-

- lus Leontopodio proponit.
- Leontopodium parvum Lobelij.
- Pinus Tibulus Plinij: vel Pinastri genus stentle: Itali Mugo vocant.
- Anagyris minor.
- Cneorum Matthioli: an Oleandrum sylvestr. Avicennæ: fortè Thymelea minor Cordi.
- Ranunculi montani primi, species prima } Clusij.
- Item primi, species altera } Clusij.
- Gentianella v. Pannonica Clusij: à Dalechampo, Helleborina vocata.
- Gentianella sexta Clusij, frequentissima.

Væ et etiam plantæ hæ nostræ exurgunt, quarum effigies & descriptiones sequuntur.

Ranuncu-

Ranunculus alpinus Coriandri folio:
Clusio, Rutz folio.



Ocymoides muscosus.



Ranunculus Alpinus Cortian-
dri folio.

EX radicibus longis teretibus, fibro-
sis, candidis & quodam splendore or-
natis, quatuor ad summum scissae sunt
folia semipalmaria à purpurascens pedic-
ulo folia Coriandri referentia, attamen
minora & magis laciniata, & ad similitu-
dinem Fumariae disposita, inter quae ex-
urgit unicus pediculus totidus, levis, pal-
maris, florem continens, circa cujus me-
dium foliolum unicum est, in summitate
autem flos ex duodecim, & pluribus
etiam folijs compositus, (uti in Euphthal-
mo) albis subpurpurascens, ac yenu-
lis sanguineo colore percurrentibus, ab
alijs vinctibus foliis exceptis, calycis vi-
cem gerentibus; in cujus deflorescentis
medio remanent semina congesta ut in
alijs Ranunculis: floret ad Kal. Iulij. Na-
scitur in Majoris montis cacumine, Oc-
cidentem versus. perennis est, & aliquan-
tulum acris.

Item:

Ocymoides muscosus.

EX unica radice lignosa, pallida, supe-
riori parte in plures divisuras secta,
uti in Sedis alpinis Clusij, emergunt fre-
quentissima foliola superficiem terrae æ-
qualiter, densissimeque cooperientia ad
Musci similitudinem, pulcherrima viri-
ditate prædita; inter quae frequentissimi
flosculi, suis pediculis brevissimis
singuli innixi à folijs secundum calycem
tantum elevati sunt, formâ, calyce, & co-
lore Ocymoidis repentis, (minores ta-
men) quare Ocymoidem muscosum ap-
pellare placuit. Sic Muscus iste exornat
terram, ut tapete pulcherrimum referens
oculos summiopere demulceat. In ligo-
rupium Majoris montis provenit. Floret
circa Kal. Iulij. gustu exiccantis facultatis
esse percipitur. perennis est planta.

Item:

Geranium alpinum longius
radiculatum.

HABET hæc planta radicem crassam,
bipalmarem, exterius nigricantem,
intus albam, supernè in plures partes divi-
sam, atque eo in loco, unde folia exeunt,
tuberosam; folia autem unico pediculo
teteti, gracili, lanugine argentea pubes-
centi, palmarique inhzerentia, ex quin-
que,

Geranium alpinum longius radicatum.*Cariophyllata alpina, omnium minima.*

que, aut sex folijs, tribus lacinijs profunde scissis ac mollibus constantia: unico etiam nudoque pediculo folijs ipsius breviori insident flores foliorum quinque, Alceæ colore venis sanguineis depicti, in medio stamina sicuti in Rosis habentes, qui vasculo quinque foliolis mucronatis continentur, & defluentes in breve rostrum desinunt, quemadmodum in reliquis Geranijs. Nasceitur alpinis rupibus Majoris montis Orientem aspicientibus, ac ibi passim. Floret initio Julij. semen Kal. Augusti perficitur. Perennis est planta. Radix amarifuscula, ac quadam subastriptione donata.

Item:

Cariophyllata alpina, omnium minima.

A Radice crassiuscula, in fibras varias divisa semipalmari altitudine, & albicante, pullulant prope terram multa folia trium digitorum altitudine Agrimonie formam æmulantia, (æqualiter tamen inferna foliola veluti alæ utrinque disposita,) serrata per ambitum, multis in locis per ordinem laciniata, molliter lanuginosa, aliquantulum crispa, saturatè viridia, ac splendore quodam nitentia; inter quæ quædam ad hanc perfectam formam haud perveniunt, ex horum medio sese attollit unicus, & elegans flos, folijs quinque aurei coloris conflatus (in quorum centro lutea staminula) calyce non ab simili ab alterius Cariophyllatæ montanæ Clusij continetur, atque pediculo lanuginoso tereti, ac ad summum palmati insidet. Flores profert initio Julij. perennis est; ac facultate exsiccatoria. In Iugo Viticaræ ad Occidentem provenit.

Item:

Clinopodium alpinum.

PULLULANT serpendo ex fibrosissimis radicibus varij cauleculi quadrangulares, hirsuti, ac sesquipalmares; quibus bina folia hirsuta, serrata, Ocimum minus æmulantia, ex adverso & directe sita sunt, inter quæ alia parva foliola exsunt: flores multi atrorubentes, ac Calaminthæ montanæ

Clinopodium alpinum.



tanz genuinæ forma, inter folia commixta, globulum representant, floret in initio Iulij, est acri sapore. Provenit passim non procul à Majori monte, ubi perennat.

HINC ulterius pergentes paulò inferius descendimus in Valleculam æternis nivibus, & glacie majori ex parte cunctatam, cujus inferior pars constat ex contraktis & ita mobilibus saxis, ut super ipsis nullo modo consisti possit, adeò ut lupi, & urti mortui adinventi sint, quando hac transire volentes, saxis sub eorù pedibus motis, nullo cum modo gradu cœinere possent, unà cum conibus præcipientes corruerunt. quæ saxa cum attrita, & candida sint, variisq; fortiantur figuras non absimiles denudatis ossibus, à vicinis Vallis ossium nominata fuit: in hac Valle contiguèque præruptis locis hæc exurgunt simplicia:

Alpigena Chamærhododædros, Penz: à Guilandino, Terionarca Plinij putata: Gesnerus, Vitem Idæam rubris acinis, nuncupavit: Dodonæus, pro Vaccinia rubra proponit: Mihi videtur, Anonymos, Balsami alpini folio.

Cotonaster Gesneri.

Cassia poetarum Penz.

Ilex.

Pthora Valdensium, frequentissima.

Heptaphylon.

Chariophyllata montana altera Clusij.

Seteli præsens Monspelienfium, Lob.

Lilium Convalium, frequentissimum.

Syringa flore albo, an Phylladelphus Athenæi: Ostrya Theoph. quorundam, male tamen: nam Cameranus in doctissimo suo Medico horto, alià non esse Ostryam, vel Ostrya à Theoph. descriptam putat, quàm plantam illam, quæ pro Carpino à Matth. pingitur, hic paululò inferius copiosius conspicitur.

Chamæcerasus montana Gesneri: Xylestem alterum quorundam.

Anemone tuberosa radice Penz: five rerum Dodonæi: vel altera Clusij.

Anemone flore albo Clusij.

Lycotaphylos foemina Cordi: à Pena,

Sambucus aquatica: à quibusdam

Thraupalus Theoph. credita.

Sambucus sylvest. seu Cervina Tragi: vel

Sambucus racemosa Penz.

Sedum alpinum vi. Clusij.

AD HVC paulò inferius huic Vallecule contigua sunt prara in laterè montis latè extensa, admodum delictiosa, cum propter apricum situm, rum quia sunt instar Viridarij, ubi multæ ac raræ plantæ, quæ passim toto in monte surgunt, collectæ visuntur. Cujus rei, ea videretur esse causa; quòd cum in alijs locis, pratijq; editionibus, & his ipsis imminèntibus herbæ quantis emaruerunt, exsiccataq; & in fœnum redactæ, non plaustris, non jumentorù dorso propter locorum difficultates, conveyi domum possint, sed eas trahi per terram necesse sit, & per hæc præcipuè prara transirum habere; hinc fit, ut varia semina decendant, ipsædem quæ mox nascentibus, omnis generis herbis loca redundant. quare etiam per quidam dignitatem, & excellentiam absoluit, & nullo alio adjecto nomine à Mallefinensibus Prara vocantur. numerus autem plantarum in his ipsis luxutianum, hic est:

Alter v. pannon. Clusij: elegantiss.

Linosyphodelus albo flore, frequentiss.

Phlomos Lychnitis altera Syriaca, Lob.

Ocymoides magnum flore purpureo.

Caltha alpina Gesneri, frequentiss.

Jacea montana Narbonensium, Lob.

Verbascum Tragi, copiosissimum.

Otiorhagon spicatum, Jureo pallescente flore.

Clinopodium Austriacum Clusij.

Ranunc. quartus Diosc. seu Aconitum

Batrachoides Penz: hic frequentiss.

Hyacinthus Poetarum, Tragi, copiosus.

Lilium purpureū majus, & primū Penz.

Hieracium v. Pannonicum Clusij.

Condrylla cœrulea purpurea.

Iuncaria Salmanticensis Clusij.

Doronicum v. Pann. Clusij, frequentiss.

Matthys altera parva, Lobel.

Jacobæ Pannonice Clusij, omne genus.

Gentianellæ variz.

Aconita varia.

Sphondylium laciniato folio.

Sanicula montana Clusij.

Panax

Panax Heracleum.
 Genista Nuensis Dalechampij.
 Asphodelus major, frequentiss.
 Aquilea fusco flore.
 Herba Paridis.
 Machaleb Gesneri.
 Lunaria lutea Dalechampij.
 Anagris minor.
 Penclymeni recti duæ species.
 Cytis varia genera.
 Serrata Cordi, ab alijs Recentioribus Solidaago Saracenica nuncupata.

Hic pariter silentio non est prætereunda Via illa Fagorum acclivis valde, triß milliarium longitudine constans, modò hac, modò illac, anguem dum serpit semicontractum referens; ex utroque latere sagis ingentibus sepra, quarum cacumina sese mutuò vincientia veluti fornices effingunt, quæ viacores ab ardentissimi Solis æstu, & impetu pluviarum aliquo modo tueri possint. Ab his verò pratis usque ad montis summum dorsum, Culmen Malfesini vocitatum, infra scriptæ sunt plantæ:

Libanotis Cheryophoros fruticans.
 Item Sterilis.
 Ligusticum Matthioli: nonnulli pro Silece, aut Sefeli Massiliense utuntur.
 Soldanella alpina.
 Tussilaginis alpinæ Clusij duo genera.

In hoc etiam culmine, est planities satis lata herbis reforescentissima, ubi propter varios prospectus jucundè indagatores animum atque oculos pascunt in hac ac circumcirca, germinat frequentiss.

Chariophyllata alpina nostra.
 Cotonaster Gesneri.

Anonymos Balsami alpini folio.
 Pulsatilla flore albo.
 Sefeli genuinum Massiliense.
 Mezereum Germanicum.
 Oenanthe alpina Lob. Item:
 Clematis Crutiana nostra, invenitur.

Ex hoc fastigio descendimus recta versus Septentrionem in semicirculares quasdam fauces, inter jam dictum Culmen, & alium montem Altissimum nominatum, licet ille ad celsitudinem Majoris montis non perveniat quæ montis in Lunæ formam excavata portio, Os Navenæ dicitur. hic Benaci adhuc multa pars cernitur; imò & sonorus bombus aquarum Brasæ fluminis, abundantissime ex Brixiensibus montibus è regione montis altissimi, de quo agimus, in lacum præcipitantum clarissime exauditur, licet inter hæc loca, & illa quatuor milliarium spatium interit. His in locis dicendæ plantæ copiosè, attolluntur:

Sefeli Massiliense genuinum, frequentissimum: fortè Meum Italicum Lobelij.
 Daucus Creticus.
 Panax Asclepium.
 Absinthium montanum odoratissimum.

Ledum alpinum; &
 Soldanella alpina.
 Allium Vrsinum Matthioli: Aristoscrodon Gesneri.
 Lunaria odora, vel Græca major.
 Lunaria Chymistarum: seu Viola latifolia Bolbonach, Dodonæi.
 Orchidis Serapiadis varia genera.

In hoc Altissimo ubi Baldus terminatur, nullæ nascuntur herbæ quarum alibi non meminimus.

A his faucibus ambulamus per montis latus admodum herbosum, & cui Oriens dominatur, pulcherrimas plantas semper observantes alibi, tamen descriptas. In planitie tandem devenimus, ubi aliæ ingens, & pulcherrima fuit tylla, Bretonensis dicta, Abietibus, Pinis, Ilicibus, Quercubus, alijsque innumeris arboribus, ac præcipuè parulis Fagis referta nunc verò, interitum fert vicissitudo, trunci tantum ipsi crassissimi ramis omnibus refectis, nescio quid magnum indicantes, cernuntur.

Impatiens herba Dodonæi: an (ut ipse inquit) Aschynomenes Plinij: Mercurialis sylvestris altera, Tragi: Pena Persicariam siliquosam, & Noli me tangere, facit, perperam Estula sylvestris Tragi, multorū: ab aliquibus Pseudoapocynum dicta.

Radix cava Herbariorum: à Cordo Capnum Actij; & Capnos Phragmites, Plinij: à Fucosio, Pistolochia creditæ: à Pena, Fumaria bulbosa Plinij, vocata. Matthioli, pro altera Fumaria exhibet.

Mutelina Gesneri, & Camerarij: à quibusdam, Meum Alpinum dictum.
 Pulmonaria Lichenis facie.
 Filix saxatilis crispata, fortè Pteridion foemina Cordi.
 Filix saxatilis Tragi.
 Saxifraga aurea Lichenis facie, & Erysimi species Aldroandi, Penz.
 Cacalia Penz.
 Phallus Hollandicus. pro Satyrio primo Diosc. Excello Matthioli tribus folijs Rumicis arte affixis, venditus. prout Clatissimus & Excellentiss. Philosophus, ac

phus, ac Medicus, Ludouicus Fumanellus, qui hunc, & illum qui ad Marthiolum est missus, spectavit, aperte restatur: facile autem fuit decipi, propter summam utriusque, antequam

A hac excisa sylva pergitur per eandem semitam versus Meridiem, ac ingredimur Vallem Artilonem, quæ multis scaruriginibus salubrium aquarum irrigatur. Cujus pinguis herbis copiosissima armenta æstate rota paicunt: referatissima est numerosissimis plantis, quarum multas silentio præteribo, cum alibi adnotatæ sint, eas solum referam, quæ aut copiosiores hic nascuntur, aut digniores relatione sunt. Abundantissime igitur hic nascuntur:

Coralloides Cordi: seu minor **Dentaria Marthioli:** vel **Alabastris nemorosa Alpina,** Penz: & **Viola Dentaria, Dodonzi:** **Penaphyllea,** ac **Epraphyllea,** flore albo, atque purpureo, hic invenitur.

Helleborine, sive Epipactis, Penz: & **Dodonzi.**

Polyrrichum aureum majus, & minus Herbariorum.

Filix femina.

Item, mas.

Primula sylvarum Lobellij.

Cynocrambe, vel Mercurialis sylvestris.

Iacobæa terria Pann. Clusij.

Sanicula femina Fuchij.

Solidago Sarracenia Lobellij.

Mater Violarum Dalechampi: alijs **Viola futechis** cauliculus vocatur: à quibusdam **Viola arborea.**

Barbi Capra, Herbariorum: à **Brunfelsio, Pienemon** credita: ab aliquibus **Rhodeta,** ab alijs **Melandrium Plinij:** **Italys, Viivaria, & Crostofanaria.**

Tanacetum non odoratum Lobellij: **Achanasia Leucanthemos** quorundam.

Virga aurea major Donæ floribus.

Item, minor.

Phellandrium Plinij, Guilandino: ab **Herbarijs Angelica sylv. vocata:** **Cotodus, Smyrium** facit.

Geranium fuscum Clusij.

Geranium Malacoides, Rec.

Geranium Batrachoides Dod. sive Germanorum Gratiædei.

Geraniarum commuioctum, varia genera.

Pulmonaria vulgarissima Borraginis folio, major, & minor, sive cœrulea, atque purpureis floribus: **Cordus, Symphytum sylvestre** facit: & **Pulmonaria Plinij, Gesnerus:** perperam **Potamogetum Diosc. Lusitanis.**

Lysospermum Anchusæ facie, Lobellij: fortè **Pulmonaria major Dalechampi.**

Auricula Muris major Tragi: à **Dalechampio Cœchorus Theophr. Galli, Pulmonariam** vocant.

Alter non Attricus Tragi: perperam **Aconitum Pardalianches Fuchij:** **Gesnerus, Solanum Monococcon** facit: à **Cordo Aconitum Monococcon** vocatur: à **Pena, Solanum tetraphyllum:** ab **Herbarijs, Pandis herba dicta.**

Aconitum alterum Matthioli.

è **terta erumpat, similitudinem.**

Sanicula alpina gurgato flore Gesneri: **Sanicula montana Clusij:** fortè **Chariophyllata folio Hederaceo Penz.**

Item, quartum ejusdem.

Napellus verus cœruleus Lobellij.

Napellus racemosus Dodonzi: an (**ut Pena inquit**) **Actea Plinij?** à quibusdam **Christophoriana dicta:** ab aliquibus, **Helleborus niger.**

Sambucus palustris, Lycostaphyllon femina Cordi.

Rubus Idæus Dioscoridis.

Rubus Idæus lævis.

Rubus alter lævis, an potius Chamærubus: **Rubum Idæum Gesnerus facit, & Rubum saxatile, Clusius.**

Mirrhylus Germanica, frequentissima.

Corruda altera Clusij.

Chariophyllata montana Matthioli.

Item, monrana Dalechampi.

Scelymos Theophrasti, Clusio.

Muscus arboreus: à **Græcis, Bryon.**

Muscus terrestris Tragi: seu **Chamæpice, Gesneri:** vel **clavatus Muscus, Lobellij:** **Dens leoninus, secundum aliquos, Muscus terrestris repens Clusij:** fortè **Mirma, Borussii:** à **Lobellio, Muscus alter denticulatus.**

Muscus terrestris denticulatus prior, Lobellij.

Oxys lutea Clusij: seu **Oxys corniculata repens, Lob.**

Oxys Pliniana.

Virga pastoris, Matthioli: **Labri Veneris species.**

Tithymalus Chatacias v. Dodonzi.

Item, Helioscopius.

Item, Platiphyllos.

Pithyusa Dodonzi.

Mezerium Germanicum.

Solanum majus, Rec. hic non solum frequentissimum est, sed admodum vegetum surgit.

Fragaria.

Myrrhis Fuchij.

Pyrola Matthioli: frequentissima: **Limonium silvestre Tragi.**

Hysopus nemorosus lutea, Lugdunensium.

Nepeta quarta Tragi: seu **Calamintha Mentastriolia, Penz.**

Ranunculus primus

Item, alter

Item, tertius

Item, quintus ejusdem: nonus apud **Cordum:** **Bulbotus Apuleij Dodonæo.**

Item, quartus Diosc. copiosus.

Item,

Item, Glometosus alpinus, Lobel. Flos Trolius, à Gesnero: Sextus, Matthioli: seu, ut ego dicerem, Aeonium tertium Diosc.

Mollugo altera montana Dalechampi. Paralytica alpina angustifolia major, Lobellij: à Fuchσιο, Vербасculum odoratum dictum.

Viola lutea montana Clusij.

Primulae arborescentis varia genera: à Fabio Columna, Alifma sylvarum, & pratorum, vocata.

Amellanchier Gallorum, Penz: Pyrum Cervinum, Gesnerus facit: Clusius, in Observat. Pannon. sub nomine Idææ Vitis defendit.

Abies.

Pinus sylvestris seu Muslo.

Ex dignioribus vetò hæc sunt:

Lamium primum, & alterum Pann. Clusij. Cacalia Pann. seu glabro folio, ejusdem.

Anemone v. } Dodo-

Item, Anemone trifolia } nzi.

Rubra lævis Taurinensium, Lobellij.

Phyllum Thelygonum Dalechampi.

Satyrium Erythronium Herbariorum

Penz, & Dens Caninus: à Dalecham-

pio Satyrium trifolium seu album: à

Clusio (in Pannonicis) Dentali vocatur.

Satyrium abortivum Lobellij: perperam

Orobanches magna quorundam.

Cireza Dalechampi.

Sedum alpinum tertium } Clu-

Item, quartum } sij.

Oreocelinum Clusij: seu nigrum Sefeli,

quorundam.

Abinthium alpinum, seu Umbelliferum

floribus albis.

Sanicula mas, Fuchsi: à Matthiolo Dia-

penfia vocata: Fabius Columna, pro

Siderite tertia Dioscoridis proponit.

VLTERIVS introimus latitudinem quandam quæ Novezia ab incolis appellatur, in

qua frequentissimus est:

Crocus Vernus primus Clusij.

Dentellaria, Gesneri.

Solanum majus: seu Bella Donna Ita-

lorum: vel Mandragora Motion

Theophr. quorundam.

Tussilago.

IN cujus sinistra parte, quædam inæqualitates magnæ saxæ existunt: inter quas variz

cavitates conformatantur, Noveziæ cavitates vulgò dictæ in quibus,

Cicutaria latifolia semidissima Lobellij:

à quibusdam Peloponæuse Sefeli cre-

ditæ.

Eunaria minor Matthioli seu Botrytes.

Trifolium aureum Dod. flore purpureo.

PRÆTER hæc Novezia in montis parte dextrorsum ad Occidentem, tribus dotata

est Valliculis, quarum capita usque ad Majorem ipsum jam dictum montem perveniunt:

harum Vallicularum prima appellatur Lolanoa, quæ licet parva sit, dives tamen est rarissi-

mis plantis, in hujus convexa parte orienti exposita ascendere incipientibus invenitur:

Holostium Camerarij: forrè Holostium,

quorundam Dalechampi.

Carpinus, Matthioli: vel Ostryx Plinij

Camerario.

Fagus.

Betula.

Acer montana, seu Acer major Cordij

Clinorrocha Anguillæ, Lobellio.

Sorbus sylv. alpina Penz, & Matth. Sor-

bus Terminalis secundum aliquos:

Dodonæus, Ornum & Fraxinum syl-

vestrem vocat.

Sorbus Terminalis Matthioli, & Penz:

seu Cratægus Theophrasti, Anguil-

læ.

Aquifolium, vel Agrifolium, & Ruscus

sylv. multorum, Cratægoni Theoph.

Plinij: Lacuna vetò, Paliurum secun-

dum vocat.

Lanx, & Agaricum.

Amblatum Cordij: vel Dentaria majore

Matthioli.

Dentaria rubra Dalechampi.

Solidago Sarracenicæ tertia Clusij.

Petalites magna Dalechampi.

Tussilago montana ejusdem.

Enitalis Dalechampi: perperam Mi-

thridatia Plinij, secundum aliquos.

Baearis Dioscor. Matthiolo.

Ribes Officinarium.

Apium montanum Dalechampi.

Beilis lutea ejusdem.

Thimelæ species, Myconi.

Ranunc. montanus albus, Dalechamp.

Cistus, & Hypocistis.

Aster montanus Penz.

Damasonium nothum: Calceolus Ma-

riæ, & Sacerdotis Crepidæ, Recentio-

rum: Amatus Lusitanus sub nomine

Lonchitidis ptinæ pingit.

Aster montanus hirsutus Penz.

Aizoon serratum primum } Cordij,

Item, alterum }

Petalites alpina.

Jacobæ altera Clusij.

Asphyllanthes.

Batrachij varia genera.

Asphodellus luteus, & alter Plinij Do-

dopæo.

Allium anguinum Matthioli.

Cacalia Penz, copiosissima.

Aconiti-varia genera.

Item:

Clematis cruiata nostra.

Aconitum aliud Dalechampi.

Pfeu doasphodellus Clusij.

Er dum

Et dum magis ascenditur:

Chamecistus quartus Myrtifolius Clusij.
 Nardus Celtica frequentissima.
 Aconitum Pardaseianthes, Plinij.
 Aconitum Pardaseianthes Antriquorum
 Dodonzo.

Phloræ dux species, frequentissima.
 Doronicum vulgatifolium.
 Doronicum Pannon. primum.
 Item Pannon. tertium.
 Clinopodium Austriacum ejusdem.

In dextera verò ejus parte Noro subjecta copiosa reperitur.

Pinguicula, Gescneri cœruleo flore; seu Cūtullara Dalechampi: à quibusdam Chas Apul-
 ley credita.

In sinistra autem quæ Græcum Orientem aspicit, peculiariter proveniunt

Pinguicula flore albo.
 Auricula Vrsi purpureo flore frequentissima.

Item:
 Clinopodium alpinum nostrum.

At circumcirca abundantissima est

Genista Iluensis Dalechampi.
 Tusilago altera alpina Clusij.
 Tusilago montana altera Lobellij.
 Soldanella montana Penz: seu Lunaria
 alia minor Dalechampi: à quibus-
 dam Lunaria di dinari vocata.

Bistorta minor Clusij.
 Verbasculus alpinus cœruleus Dale-
 champij.
 Carum.
 Loochitis aspera major, frequentissi-
 ma.

Dux verum reliquarum Vallearum altera Lonzia vocatur, in qua nihil notatu di-
 gnum detegitur, nisi quod in ea

Phthora major, atque minor frequentis-
 sima.

Doronici Recent. varia genera.
 Salicis saxatilis dux species.

ALTERA verò Bruta nuncupatur, in qua Nives & Glacies perpetuò dominaotur. in
 ipsam præterea feræ diversæ, Lupi præsertim, ac Vrsi sese recipiunt; in hujus summo verti-
 ce inaccessibili, prominenti, & simpliciter saxeo, cavitas quædam existit (Cervæ fante) dicta,
 è cujus rimis,

Trachelium minus petrarum, & } sese exerunt:
 Veronica petraea sempervirens

Quarum Icones, ac descriptiones, habentur in descriptione frigidæ Vallis.

Sedum petrarum Bupleurifolio flore venus.



Item:

Sedum petrarum Bupleuri folior
 flore venus.

Est illi unica tadix crassa, tetes, si-
 ne fibris, sed quibusdam quasi
 tuberculis hinc inde erumpentibus,
 crasso cortice obvolata, intus pallida,
 extra in rubore nigricans, ad sum-
 mum cubitalis, superne partira, (ut
 io Geranio nostro alpino:) folia angu-
 stifolia Bupleuri omnino similia ex
 protuberantibus illis partitionibus co-
 piose emanantia, & in circuitum se-
 le expandentia: flores aurem ex se-
 prem foliolis aliquantulum mucro-
 natis, in luteo pallefcentibus, proferunt
 in summitate caulis teretes, nudi, &
 dodrantalis; in quorum medio semi-
 na umbellæ modo graviter spirantia
 existunt, atque hæc uti in eodem Bup-
 leuro. Floret Idibus Julij: & Idibus
 Augusti colligitur semen: gustu re-
 fert Cynaræ saporem.

Dux

cccxlviij DESCRIPTIO MONTIS BALDI.

DVM autem descenditur ab hac dextrorsum, videre licet,

Centauroidem magnam, Gesneri: for-
tè Centaurium Nothum Dalecham-
pij.
Gentianam folio Asclepiadis.

Cirsium Spinosum.
Cirsium primum Pannonicum, Clusij.
Bupleurum angustifolium.

At nos transeuntes via inter Maonum, & Campedelum pervenimus in Ferrarium pa-
gum, domibus ac hominibus montanis cultissimum: in qua via frequentissimum,

Vincetoxicum albo flore, conspicitur.
Vbi etiam:
Phalangium Matthioli.
Cyclamini duz species.
Chrysolachanum, Dodonæi: Tota bo-

na, & Bonus Henricus Matthioli.
Oxalis rotundi folia frequentissima: à
Rovillio picta, sed non descripta: for-
tè Lunaria Magorum Arabum, Pe-
nz.

Atque ita tandem æterni Motoris favore pulcherrimus fecundissimûsque, naturæ
hortus, Mons Baldus, circulariter perspectus, & cum summa admiratione, & voluptate
diligenter observatus à nobis est.

F I N I S.



INDEX GRÆCVS PLANTARVM
QVÆ IN HAC HISTORIA
CONTINENTVR.

Α	Τοιμαίν	17.	Εκείνου	30.	αίτου	17.17.
Δ	Δρυεν	ccxvij.	Εκείνου	26.	αυτοῦ	11xij.
Ε	Ευρυ	clxv.	Εκείνου	31.	αυτοῦ	208.
Ε	Ευρυ	48.49.	Εκείνου	34.	αυτοῦ	209.
Ε	Ευρυ	13.10.	Εκείνου	326.	αυτοῦ	311.
Ε	Ευρυ	101.	Εκείνου	61.62.	αυτοῦ	clxxij.
Ε	Ευρυ	270.	Εκείνου	46.	αυτοῦ	1xij.
Ε	Ευρυ	87.	Εκείνου	171.	αυτοῦ	126.
Ε	Ευρυ	clvj.	Εκείνου	360.	αυτοῦ	71.
Ε	Ευρυ	86.	Εκείνου	18.	Αυτοῦ	81.
Ε	Ευρυ	93.	Εκείνου	37.	Αυτοῦ	ccxxvij.
Ε	Ευρυ	21.	Εκείνου	201.	Αυτοῦ	35.
Ε	Ευρυ	lxxv.	Εκείνου	clxv.	Αυτοῦ	352.
Ε	Ευρυ	18.	Εκείνου	360.	Αυτοῦ	87.
Ε	Ευρυ	clxv.	Εκείνου	29.	Αυτοῦ	xxvij.
Ε	Ευρυ	54.	Εκείνου	ccxxvij.	Αυτοῦ	lxxvij.
Ε	Ευρυ	61.	Εκείνου	21vj.	Αυτοῦ	15.
Ε	Ευρυ	316.	Εκείνου	18.	Αυτοῦ	48.
Ε	Ευρυ	61.	Εκείνου	ccxlij.	Αυτοῦ	clxxij.
Ε	Ευρυ	93.	Εκείνου	clx.	Αυτοῦ	clxxij.
Ε	Ευρυ	48.	Εκείνου	ccxij.	Αυτοῦ	41.
Ε	Ευρυ	lxxvij.	Εκείνου	lxxvij.	Αυτοῦ	67.
Ε	Ευρυ	260.	Εκείνου	xxvij.	Αυτοῦ	ccxxvij.
Ε	Ευρυ	246.247.248.	Εκείνου	36.	Αυτοῦ	164.
Ε	Ευρυ	197.	Εκείνου	358.	Αυτοῦ	108.
Ε	Ευρυ	clxxvj.	Εκείνου	87.	Αυτοῦ	lxx.
Ε	Ευρυ	104.105.313.314.	Εκείνου	317.	Αυτοῦ	61.63.
Ε	Ευρυ	cc.	Εκείνου	21vj.	Αυτοῦ	clxv.
Ε	Ευρυ	126.	Εκείνου	224.	Αυτοῦ	clvj.
Ε	Ευρυ	ccxxvj.	Εκείνου	ccv.	Αυτοῦ	clxv.
Ε	Ευρυ	lxx.	Εκείνου	320.	Αυτοῦ	xxij.
Ε	Ευρυ	318.	Εκείνου	ccxj.	Αυτοῦ	55.
Ε	Ευρυ	lxxij.	Εκείνου	clv.	Αυτοῦ	55.
Ε	Ευρυ	lxxij.	Εκείνου	clxv.	Αυτοῦ	39.
Ε	Ευρυ	63.	Εκείνου	cx.cxij.	Αυτοῦ	64.
Ε	Ευρυ	ccxxvij.	Εκείνου	31.	Αυτοῦ	172.
Ε	Ευρυ	341.	Εκείνου	14.	Αυτοῦ	ccxxvij.
Ε	Ευρυ	clxij.	Εκείνου	1.4.	Αυτοῦ	clxxvij.
Ε	Ευρυ	clxxix.	Εκείνου	87.	Αυτοῦ	ibid.
Ε	Ευρυ	18.	Εκείνου	70.	Αυτοῦ	126.
Ε	Ευρυ	109.	Εκείνου	14.	Αυτοῦ	289.
Ε	Ευρυ	xv.	Εκείνου	cl.	Αυτοῦ	21vj.
Ε	Ευρυ	197.	Εκείνου	70.	Αυτοῦ	31.
Ε	Ευρυ	121.	Εκείνου	clxij.	Αυτοῦ	ccxxvij.
Ε	Ευρυ	331.	Εκείνου	87.	Αυτοῦ	31.
Ε	Ευρυ	237.	Εκείνου	clij.	Αυτοῦ	18.
Ε	Ευρυ	101.	Εκείνου	86.	Αυτοῦ	364.
Ε	Ευρυ	166.	Εκείνου	17.	Αυτοῦ	ccx.
Ε	Ευρυ	xv.	Εκείνου	27.	Αυτοῦ	108.
Ε	Ευρυ	lxx.	Εκείνου	lxxv.	Αυτοῦ	336.
Ε	Ευρυ	xxxij.	Εκείνου	48.61.	Αυτοῦ	23.
Ε	Ευρυ	xxxvj.	Εκείνου	clxij.	Αυτοῦ	3687.
Ε	Ευρυ	330.	Εκείνου	xxij.	Αυτοῦ	110.
Ε	Ευρυ	ccij.	Εκείνου	clxxij.	Αυτοῦ	110.
Ε	Ευρυ	50.	Εκείνου	28.	Αυτοῦ	110.
Ε	Ευρυ	126.	Εκείνου	28.	Αυτοῦ	110.
Ε	Ευρυ	5.	Εκείνου	28.	Αυτοῦ	110.
Ε	Ευρυ	ccxxvj.	Εκείνου	28.	Αυτοῦ	110.

INDEX

βίαιον	71.	Ζῆν	14.	Θυμάριον	21.
βίαιον	12 v.	Τηροδοί βίαιον	15.	εὐαδ	21.
Σατίον πρίονον	150.	τῆρον	15.	εὐαδ	18.
πικρὸν	29.	πικρὸν	15.	εὐαδ	51.
πικρὸν	21 j.	πικρὸν	ccxliij.	εὐαδ	53.
πικρὸν	217.	πικρὸν	ccxliij.	εὐαδ	212.
πικρὸν	171.172.	πικρὸν	350.	Χαλκίον	109.
πικρὸν	clij.cliij.	πικρὸν	364.	Χαλκίον	cc.
πικρὸν	217.	πικρὸν	186.	Χαλκίον	118.
πικρὸν	21.	πικρὸν	92.	Χαλκίον	352.
πικρὸν	113.	πικρὸν	92.	Χαλκίον	352.
πικρὸν	103.	πικρὸν	316.	Χαλκίον	64.
πικρὸν	ccxliij.	πικρὸν	ccxliij.	Χαλκίον	319.
πικρὸν	217.	πικρὸν	123.	Χαλκίον	117.
πικρὸν	345.	πικρὸν	123.	Χαλκίον	123.
πικρὸν	311.	πικρὸν	123.	Χαλκίον	123.
πικρὸν	123.	πικρὸν	123.	Χαλκίον	123.

INDEX LATINVS PLANTARVM QVÆ IN HAC HISTORIA CONTINENTVR

A Bix pag. 34.	Anchusa	clxv.	Asphodelus	196.197.cclvij.
Abies marina 35.36.	Androsace altera Matthioli	ccxliij.	Aster	xij.xiij.xv.xvj.
Abrotonum femina 341.342.	Androsace Bellonij	92.	Astragalus	ccxxij.cccxxij.
Abundantia 338.339.340.	Anemone horrensis 248.249.		Astrantia	ccxij.
Acacia 46.	250.251.253.254.255.256.		Atropis silvestris baccifera 35.	
Acacia 1. Matthioli cclij.	257.258.259.260.261.262.		Auellana Byzantina 11.	
Acce 9.			Auricula lude cclxxvij.	
Acinos Dioscor. 354.	Anemone Mompelliana 336.		Auricula ussi 302.303.304.	
Aconitum xciiij.xcv.xcvj.	Anemone sil v cstris 144.145.			
Aconitum xciiij.xcv.xcvj.	246.247.248.			
Aconitum bacciferum lxxvj.	Anonis mistoe 99.			
Acorum 230.231.	Anisum ccij.			
Acora Plinij lxxvj.	Anisura xcviij.			
Admirabilis Peruana lxxxvij.	Anisuricus Plinij cxcix.			
lxxxix. xc.	Anisyllis clxxvj.			
Adonis flos 263.335.336.	Anisyllis leguminosa ccxxij.			
Adrachne 48.49.	Apharca 48.			
Agriomelea 63.	Apocynum 124.125.126.			
Alaternus 50.51.	Apocynum Syriacum lxxxvij.			
Alcea xxv.xxvj.xxvij.	Aquilina cciiij.ccv.			
Alchimilla cvij.308.	Arabis ccxvj.			
Alectorolophos alpina ccx.	Arachidna lxxix.			
ccxj.	Arbor filici similis 37.			
Allium alpinum 190.	Arbor Gadenus 2.			
Allium urinum ibid.	Arbor lude 13.			
Alnus 12.	Arbor sancta 30.			
Alœ clx.clx.	Arbor vize 36.			
Alopecuros nonnullorum xlv.	Arbutus 47.48.			
Alpigena 64.	Archangelica ccxv.			
Alpine clxxxiij.clxxxiiij.	Aria 11.			
Alphaca xxiiij.xxiiij.xxv.	Arifarum lxxiiij.lxxxij.			
Alypum quercundam 91.	Artisochia lxxix.lxxj.lxxxj.			
Alyssum Galeni lxxxiiij.	Armetus flos 287.			
Alyssum minimum ccxiiij.	Artemisia tenuifolia 340.			
Amanita Pauli cclxxij.	Arum Byzantinum lxxiiij.			
Ambradulcis 356.	Asafina ccxij.			
Amellus Virgilij xvj.	Asclepias 126.cclv.			
Anabasis 92.	Aspalathus alter 105.106.			
Anagallis clxxxiij.clxxxiiij.	Asperula odorato flore clxxv.			
Anagyris 93.				

Carduus

I N D E X.

Carduus erioccephalus	clij.	Coccus infectoria	24.25.	Erica	41.42.43.44.45.46.
Carduus mollis	cl.cij.	Coggygia	16.17.	Eriuscea	107.
Carduus muricatus cap.	vij.	Colchicum	199.200.201.202.	Erym Cordi	ccxxx.
Casina	clv.clvj.clvj.	celvij.		Eryngium	clij.clvj.clvj.
Caryophyllus flos	284.285.286.287.	Colocasia	lxxv.	Eryngium	clvij.clix.
Caryophyllata	cij.cij.cij.	Colutea Theophr.	14.	Eryngium	36.37.38.
Cassia quorundam	97.	Colutea scorpioides	97.98.		
Cassia equina	7.	Colytea Theophr.	14.	FABAGO	13.
Cassia peruana	89.	Condittia	clxiiij.cxl.	Faba Egyptia	lxxv.
Catanance	cij.cij.	Connarus Alexandrinorum	27.	Faba sulca	lxxv.
Cattaria tenuifolia	xxxij.	Consolida regalis	ccv.	Fagulus	35.
Caucalis	ccj.cij.	Convolvulus althea fol.	xlx.1.	Filipendula	ccj.
Caucon	92.	Convolvulus minor	1.	Filix pumila	ccj.cclj.
Cedrelate	39.	Conyza	xix.xx.xxj.	Flammula Matthioli	114.
Cedrus lycis	ibid.	Corallitbor	clxij.	Flor canceri	lxxij.
Cedrus phosilitica	38.	Corallina latifol.	cd.	Flos Persicus Sisyntichio con-	
Celastrus	51.	Corallodes	ccxij.	gener	217.
Centaurium f. s. v. flore	clxxx.	Coris quorundam	clxiiij.	Feniculum tortuosum	ccix.
Centaurium majus	x.vj.	Cornus	13.	Fenugrum Tragici	ccxxx.
Cepaea	lxxij.lxxij.	Corona fratrum	clxij.		
Cerasus avium	65.	Corruca	clxxvij.cclxxvij.	Fraxinella	100.
Cerasus lanrea	5.	Corruca Matthioli	307.	Fricillaria	152.153.cclvij.
Cerasus Macedonia	64.	Corylus	10.	Frux coronarius	35.
Cercis	13.	Cotinus Plinij	16.	Pumus terre	ccvij.
Cetrus	20.	Coronaster	61.63.	Fungi esculenti	clxiiij.cclxv.
Cerinth quorundam	clxvij.	Coryledon	lxxij.lxxij.	et sequentibus paginis vsque	
		Crasagus Theophr.	9.	ad clxxvj.	
Chamaeblanus	ccxxiiij.	Cratogeomom	xlv.	Fangi perniciosis	clxxvj. et seq.
Chamaecerasus	64.	Crista gallinacea	ccj.	pag. vsques d	ccxv.
Chamaecistus	74.75.76.	Crocum montanum	208.	Fungus Latinis linteris inferi-	
Chamaedaphne Diof.	278.		209.	pais	clxxvj.
Chamaedrys	351.352.	Crocum vernum	101.204.205.		
Chamaenis	103.104.		206.207.208.cclix.	G A L E G A	ccxxij.cclxxx.
Chamaeleon	clxij.clv.	Croton Anguillaræ	91.	vij.	
Chamaeleuce Plinij	cxij.	Cuci	3.	Galeopsis	lxxv.lxxvj.
Chamaelinum	319.	Cupressus marina	36.	Gallium rubro flore	clxxv.
Chamaemepilus	60.61.	Cyclaminus	263.164.265.	Genista Plinij	102.
Chamaemorus	18.19.	Cydono	62.	Genista vulgaris	103.
Chamaepeuce Cordi	81.	Cynoglossum	clxj.clxij.clxij.	Genista tinctoria	101.
Chamaepitys Aufriaca	clxxx.	Cytisus	93.94.95.96.97.	Genista	318.319.320.321.322.
		ccxlvj.		316.	
Chamaerodendron	82.			Geranium	ccix. c. c.
Chamaeyce	clxxvij.	D A C T Y L U S Plinij	ij.ij.ij.	cij.	
Chamelea	80.	Drosera montana	clxvij.	Gerum Plinij	clj.
Chamelatfolia	82.	Delphinium	ccv.ccvj.ccvj.	Glandes terrestres	ccxxij.
Chara radix	ccij.	Dens caninus	166.	Glaux	ccxxij.ccl.cclj.
Chelidonium	ccij.	Dentaria	cxix.cxx.cxxj.cxxj.	Globularia	vj.
Chrysanthemum	331.332.		cxvij.	Glycerhiza fol. Gelsed	cc.
	333.334.335.	Dentularia	ccxiiij.		
Chrysooome	326.327.	Dolichus Bellonij	ccxxvij.	Gnaphalium	327.328.329.
Cicer silv. Matthioli	ccxxiiij.	Doronicum	xvj. xvij. xvij.	330.	
Cicerons Egyptica	ccxxvij.	Doryenium	100.cclxij.	Gramen	ccxvij. ccxvij.
Cichorium veraccarium	clxij.	Doryenio congener planta	100.	ccix.	
Cicutaria	cc.		101.	Gratiularia	120.
Cinnaberis Diof.	2.	Draba	ccxxij.cclx.cclxj.	Guayava	clxij.
Cisium	clxvij.clix.cl.	Draco arbor	1.		
Cistus annuus	76.77.	Dracosis sanguis	2.	H A L I M Y S	51.52.
Cistus femis	70.71.72.73.	Dryophanon Plinij	17.	Hedera ciliata	113.
Cistus ledon	77.78.79.80.81.	Dryopitros	62.	Helenium Egyptium	ccxiiij.
Cistus mas	68.69.			Heliotropium	xlvj.xlvij.
Clematis altera	121.122.123.	E C H I N U M	clxij.cclxij.cclx.	Hemerocallis	129.
Clematis daphnoides	221.	Eleagnus Cordi	86.	Hemerocallis Valentina	167.
Clinopodium	353.354.356.	Elechrysum	325.326.	Hemionitis	ccxiiij.
Clymenum Matthioli	ccxxx.	Elleborine recentiorum	271.	Hepatica trifolia	ccxlvj.co-
		171.273.		xlviij.	
Cnecum Matthioli	89.90.	Elleborus	274.	Hepaphyllum	ccvij.
Cnicus	clj.clj.	Elleborus niger Diof.	Dodo-	Herba cervi	351.
Congulum terre Plinij	270.	nro	308.	Herba iudaica	xlj.
		Ephedra	92.	Hermodytylus Syriacus	202.
				Helpetis	296.297.
				gg 2	Hiera-

Hieracium cxxix. cxcxij.
 cxcij. cxcx.
 Hippoglossum Valentinum 50.
 Hippophaes viij.
 Hippophaestum 300. viij.
 Holostem cxcxij.
 Hieronimum silvestre xxvij.
 xxix. xxx. xxxj.
 Hyacinthus 174. 175. 176. 177.
 178. 179. 180. 181. 182. 183.
 184. 185. cclvij.
 Hydraphyllum 77.
 Hyoscyamus Plinij viij.
 Hyoscyamus lxxxij. lxxxij.
 lxxxv.
 Hyppocum leguminum xcij.
 Hypericum lupinum cxcxij.
 Hyposcitis 68. 79.
 Hypoglossum 279.
 Hyssopus vulgaris 356.

I A C T A vj. vij. viij.
 Iacoba xxj. xxij. xxxij.
 Iasone Plinij 4.
 Ictebra 12.
 Ilex 21. 22.
 Iris 117. 118. 119. 120. 121.
 122. 123. 124.
 Iris angustifolia 118. 129. 250.
 Iris bulbosa 209. 120. 111.
 112. 113. 114. 115.
 Iris tripolitana 127.
 Icharmon Plinij cxcvij.
 Icthas cxc. cxcj.
 Iuglandis genus 109.
 Iuncaria cxcxij.
 Iquiperus 37. 18.

I A C A T H A Theophr 65.
 Lachryma Iob ccvj.
 Lada 81.
 Lagopus cxcxij. cxcxij.
 Lamium lxxvij. lxxvij.
 Latix 34. 35.
 Lathyrus fil. cxcxix. cxcxx.
 Lavendula multifida folio 345.
 Lautocerasus 4. 5.
 Laurus Alexandrina 278.
 Laurus silvestris 50.
 Laurus lxx.
 Ledon 77. 78. 79. 80. 81.
 Ledum alpinum 81. 82.
 Ledum Sibiacum 82. 83.
 Leimodorum 270.
 Lemniscia resina 15.
 Lentiscus 14.
 Leonopodium 328. cxcxij.
 Lepidium Nebrisi cxcxij.
 Ledacanthemum alpinum 315.
 Leucas montana 352.
 Leucoid bulbosum 168. 169. 170.
 Leucoidum maritimum 298. cxcxij.
 Leucoidum silvestre 299.
 Leucophaeos Dalechamp. 85.
 Lichen marinus ccl.
 Lili-asphodelus 137.
 Lilio-narcissus 137. 138. 139.
 140. & aliquot paginis se-
 quentibus.
 Lilium album Byzant. 135.

Lilium Byzantinianum 131.
 132.
 Lilium convallium 190.
 Lilium sativum 135.
 Lil. Perficum 123. 128. 129.
 Lil. punicum 136.
 Lil. rubrum 133.
 Lil. silv. live montan. 133. 134.
 cclvj.
 Lil. Sulianum 129. 130.
 Lipoz 6.
 Limones ibid.
 Limonium peregrinum lxxxij.
 Linaria 319. 320. 321. 322. 323.
 Linum silvestre 117. 318. 119.
 Ligonarcissus Hemerocallidis
 facie 167. 168.
 Lirium alterum Theoph. 163.
 Litholpermum cxcij.
 Locustale in ulmi radicibus 13.
 Lophitis cxcij. cxcij.
 Lotus Egypt. lxxvj.
 Lotus Athenas 29.
 Lotus Lybia 27.
 Lotus Pharisidis 29.
 Lotus sec. Theoph. 5.
 Lotus silvestris cclij.
 Lunaria cxcij. cxcj.
 Lupi 214.
 Lupinus cxcxvij.
 Lupulus 126.
 Lychois silvestris 288. 289.
 290. 291. 292. 293. 294.
 Lycium 111.
 Lyfimachia l. ij. l. ij.

M A L V A trimestris xxiij.
 Malum terre lxxij.
 Malus acer 6.
 Malus medica 5. 6. 7.
 Mandragora femina lxxxvj.
 Mandragoras Theoph. lxxv.
 Marrubium xxcxij.
 Marragon 136. 137.
 Marva lanata xxcxij.
 Marum 356.
 Mastiche 14.
 Medica cclij. cclij.
 Melampyrum xlv.
 Melandrium Plinij 293. 294.
 Melanthium cxcij. cxcij.
 Meliophyllum xxcxij.
 Menestrium xxcxij. xxcxij.
 Millefolium 331. cclj.
 cclj.
 Mimulus Plinij cxcj.
 Mollugo cxcxij.
 Moly 191. 192. 193. 194. 195.
 196.
 Molybdena cxcxij.
 Muscari 178. 179.
 Muscipula 294. 295.
 Muscus marinus ccl.
 Muscus terrestris cclx.
 Myrica 36. 39. 40.
 41.
 Myriophyllum pelagicum cclj.
 Myriocistus 68.
 Myrtocallis 62.
 Myrtus 65. 66. 67.

N A P E L L I S vulgaris xcvj.
 Narcissus 154. 155. 156. & ali-
 quot paginis subsequentibus
 & cclvj.
 Nardus celtica & moosna lvi
 lvi.
 Nasturtium cxcxij.
 Nasturtium Valentinum cxcx.
 cxcx.
 Narix Plinij 100.
 Nepa 106.
 Nerion alpinum 82.
 Nymphaea lxxvj. lxxvj.

O C I M A S T R U M Valentinum
 xlij.
 Ocimum Indicam 352.
 Oculus Christi 352.
 Odontus Plinij 292.
 Oenambe 190. cxcj.
 Oenoplia Bellonij 27.
 Olea 25. 26.
 Oleaster 26.
 Onobrichis cxcxij. cxcxij.
 cxcxvij. cxcxix. ccl.
 Opuntia marina 62.
 Orchis 267. 268. 269. 270.
 Oriocelinum cxcv.
 Ornithogalum 186. 187. 188.
 189. cclvj. cclvj.
 Orobanche 270. 271.
 Orobus cxcxij. cxcxij. cxcxij.
 Ostris 54.
 Ostris 91. 345.
 Oxalis maxima lxx.
 Oxycantha 64.
 Oxycodrus 39.
 Oxymyphyllos cclxij.
 Oxya cclxij.

P A D U S Theoph. 65.
 Paegetotis 350.
 Paeonia 279. 280. 281.
 Palma marina ccl.
 Pancratium 176.
 Panicum cxcv. cxcvj.
 Papaver corniculatum xci.
 xci.
 Papaver spinosum xci.
 Parietaria silvestris xliij. xlv.
 Paronychia Hispanica cxcxij.
 Parthenium 316. 337.
 Peplis cxcxij.
 Perdicion cclx.
 Periclymenum 57. 58. 59.
 Persea 23.
 Petasites cxcvj.
 Petromelia 62.
 Peucedanum cxcvj.
 Persea frugos cclxvj. cclx.
 Phallus lunij cclxvij. cclx.
 Phoscolus cxcxij. cxcxij. & ali-
 quot sequentibus pag.
 Phylirea 51. 52. 53.
 Philyca 51.
 Phlomis xxcvj.
 Phrynon 108.
 Phyllis cxcxij.
 Phylum xlvij.
 Phytocoma Diofca. v.

I N D E X.

Picea	33.34.	Rubus Idæus & Saxatilis	117.	TANACETUM inodorum	
Pilosella minor	350.	Rumex lanifolius	118.	Teda	337.338.
Pimpinella	cxviij.	Ruta canina	ccix.	Telephium	ly. lxxvj. lxxvj.
Pimpinella (pinofa)	109.	Ruta montana	cxix.	Terebinthina resina	15.
Pinaliter	31.32.13.			Terebinthus	15.16.
Pinguicula	310.	SARINA bacifera	137.	Terratil	14.
Pinustibulus	34.	Salix	85.86.	Terrallix	46.
Piperitis furcus	ccae	Salicortex	13.	Teucrium	348.349.350.
Pistofechia	lxxij. celix. celix.	Salvia	342.343.	Tbapia	cxix.
Pisum silvestre	cxix.	Saximunda	88.89.	Thalpi	cxix. cxix. cxix.
Ptyides	51.	Sanguisorba	cxix.	Thoma italica	cxv.
Planago	cix. cx.	Sanicula montana	306.307.	Thymbra	358.
Platanus	9.	Sanicula trifolia	cxix.	Thymelæa	87.
Plumbago	cxix. cxix.	Saxifraga	308. cxix. cxix.	Thymum	357.
Polum	361. 362. 361.	Seabiosa	j. iij. iij. v. v.	Tinus	49.50.
Polygala	98.99.124.125.	Stammonea Valens.	126.	Tipha	cxiv.
Polygonatum	275.176.277.	Scilla	171.	Tithymalus	clxxxvij. clxxxix.
Polygonum quarum Plinij	91.	Scyllurus	clij. clij.	Tre	cx.
Polytricha	clxxx.	Scorodoprasum	290.291.	Trachelium	clxx. clxx. clxx.
Poeritium Dalechampi	108.	Scorpius	106.107.	Tragacantha altera	107.108.
Primula veris	300.301.302.	Scorfonera	cxix. cxix.	Tragum alterum Dioscorid.	cxv.
Pruna	4.	Serofularia	celix. cex.	Tragoriganum	352.
Promella	xlj. xliij.	Securidaca	cxix. cxix.	Tragum vulgare	329.
Prunus myrobalanus	46.47.	Sedum	vij. vij. lxx. lxx. lxx.	Tribulus aquarius minor	celij.
Pseudo-apios	cxix.	Selinum	cxix. cc.	Tribulus terrestris	celij. celij.
Pseudo-alphodelus	158.	Senecio foetidus	xxij.	Trifolium	100.101. cxix.
Pseudochamaepitys	clxxx.	Serpillum silvestre	358.359.	Tuberes	28.
Pseudononopodium	330.	Serratula Matthioli	vij.	Tulipa	137.38. & sequenti-
Pseudonarcissus	164.165.166.	Sertularia	cel.	bus aliquot paginis usque ad	151.
Pulmonaria	clxx. clxx.	Sesamoides quorundam	295.	Turcia	cxix.
Pyraethra	64.	Seled	cxix. cxix. cxix.	Tusilago	cxix. cxix. cxix.
Pyraethra Idæ	62.	Sideritis	xxxix. xl. xli.	VACCINIUM Plinij	65.
Pyrola	cxix. cxix. cxix.	Siler	85. cex.	Valeriana	liij. lvi. lvi.
Pyraethra cerva & petra	62.	Siliqua silvestris	13.	Veratrum nigrum J. ij. iij. iij.	
		Sinapi pumulum	cxix.	Verbaicum silvest.	xxvij.
QUERCUS latifolia	20.	Sisyriachium	216.217. celij.	Verben	xlvi. xlvj.
Quercus marina	20.21.	Sisylax aspera	112.113.	Veronica	346.347.
Quercus semper virens	18.	Solanum	lxxx.	Vicia	cxix.
Quercus folium	cx. cx. cx.	Soldanella alpina	358.359.	Victorialis longa	129.
		Sonehus	cxlv. cxlv.	Viola Mariana	clvj.
		Sorbus	9.	Viola montana	309.310.
RAOIX cava	278.	Sparganium Plac	164.	Viscum	20.23.26.34.29.35.
Ranunculus grumosa radice	257.238. & paginis aliquot	Spartium Græcorum	102.	Vitis Idæa	61.62.
sequeotibus.		Spartium Plinij	cxix. cxix.	Vitis silvestris	122.
Ranunculus montanus	254.			Vlmaria	cxv.
255.256.257.		Spina appendix Plinij	121.	Vva marina	91.92.
Ranunculus præcox	232.233.	Spina infectoria	111.	Vva minima	122.
Ranunculus silvarum	246.	Spiræa	84.	Vva uris	63.
247.248.		Spongiosus fungi	clxiiij.	XYPHIVM	190.
Rapunculus	clxiiij.	Stachys (pinola)	clxix.	ZIZYPHUS alba	29.30.
Rhamnus	109.110.111.	Stelis	34.	Zizyphus rutila	28.
Rhodia radix	137.	Stoebe Salmantica	ix. x.		
Rhus	17.	Strachas	344.345.		
Ribes	119.120.	Stratioses millefolia	330.		
Robur	18.19.	Suber	21.22.		
Rosa	113.114.115.116.	Suilli fungi	clxx. cxix.		
Ros marinus silvestris	83.84.	Symphitum tuberosum	clxv.		
Rubia	clxxvj. clxxvj.	Syringa frutex	55.56.		

INDEX CONTINENS PEREGRINA
PLANTARVM NOMINA QVÆ IN HAC
HISTORIA DESCRIBVNTVR.

[illegible]

I N D E X

[illegible]

D N D' E X:

Lengua de buri Salvaje	elav.	Mafal	18.	Raisins de mar	92.
Lengua de perro	elav.	Myra, Myrric, Myrzo	67.	Rapana	xij.
Leopar	204.	Myrtos baum	64.	Raschid	lxvij.
Lerneraha	196.	NASCA Alpini	28.	Raschi	81.
Lernagone	96.	Nap & Napcia	27.	Recama	113.
Leont-jaca	99.	Natanja	56.	Rething	cxlvii.
Lenquo	14. 53.	Natasse	162.	Rickay, fa	87.
Lesnyque	14.	Natassen edlin	162.	Retana	103.
Leptaf	ccxv.	Natassen schwammen	cxlviii.	Rexelle matin	cxvi.
Leutenbaum	15.	Natter (schwammen)	cxlviii.	Rexle bay	213.
Lige	21.	Nep	27.	Rexblumen	176.
Lima y Limones	67.	Neurina	39.	Rha	17.
Linteraut	335.	Niwilack fia	297.	Roble	18.
Linterna	52.	Niwil gomba	cxix.	Kobel und haum Kofel	609.
Lino	213. 217. 224.	Nogercia	clxxvj.	Rocero	20.
Livio cardeno	224.	Nombel de Venus	clivj.	Romero warro	327.
Livio epadolial	218.	Nuzabha	217.	paraji Rosa	117.
Livio azules	ibid.	Nuzabha pequena	208.	Rojella	70.
Liffo	114.	Napha	lxxvj.	erb Rosen	127.
Lobere	cxlvii.	Nyfa gomba	clxxx.	bunnen Rosen	316.
Lo ke We Wschin	245.	wildes Schfningung	clxx.	herden Rosen	117.
Longer drapt	clxx.	Selbaum	26.	pimpernelle Rosen	116.
Loure Endugi	xxvj.	Onditi jaurages	286.	Rosen von Teicho	57.
Luarata del grapo	cxix.	Oke Zim	332.	Rosenwurz	fr. 8.
Lyon	122.	Olayfa	26.	weide Rohmarin	364.
MAGYCAS	217.	Olayfite	30.	Rospitzel	301.
Madriña	48.	Oliviera	86.	Runga werbe	xlv.
Magury	clvj.	Olivier	26. 27.	Haw Kudartja	86.
Maguro salata	cxli.	Olovo	27.	Rada	cxlviii.
Majstewurz	cxlv.	Operado	lxxx.	SAAR foz	85.
Majstewurm	9.	Ormechoorte	cxlvj.	Sabbars fa	cxvij.
Majerbaum	xxij.	Orgon	lxvij.	Sadar Scraphion	27.
Majory	3.	Orvale	xxvj. lxxxvj.	Saffas	30.
Mancanilla	327.	Ofuna	364.	Saffan haffard	clvj.
Mamio trece	clir.	Oferlutger	brill.	saftig Safran	cliv.
Mami de N. Señora	lxxv.	PALMA di Nettano	clvj.	Saffo faracne fa	ibid.
Mastadell del Pir	xc.	Palomilla & Palagona	cxix.	nith Salben	xxxi.
Marefina	54.	Papa	lxxx. lxxx.	Salgarmaria	14.
Margendoben	170.	Pancant	clxx.	Saher	85.
Marguerite vides	vj.	Passiflora	260.	Salmon pichetti	277.
Marienfisch	172.	Pessitney	cxix.	Salstro	357.
Masabet	9.	Penacho delle Niasie	clvj.	Sandalula	cxlvij.
Maspas am	15.	Pempico Persiano	130.	Sanguedo	51.
Mata	14.	131.		Santen blanc	ibid.
Matulera	xxvj.	Pyrcelin	clj.	werff Santfel	cxvii.
Moutachien	cxlvii. cxlviii.	Perduera	74.	Sant Gony schwammen	cxlvij.
Ma'zela	xxvj.	Perleo	30.	Sant Johano biot	14.
Mazza de cavalliere	cxlvij.	Pezricc	clxx.	Sant Pietro wurzel	cxlvij.
Melise	35.	Pflastering	cxlv.	Sap	14.
metzen wenen Melch drapt	clxx.	Pikiera	53.	Sapon	ibid.
Mien hera	xxvj.	Pico de Cignas	cx.	Sarga yelo	299.
Miel	clvj.	Por de burro	209.	Sarla	316.
Mentze	67.	Piment	17.	Sarragina	lxxxvj.
Meyriack fia	286.	Pincel	clxxvj.	der Sars	cxlvij.
Misculan	327.	Pine alret	35.	Sauile	85.
Mordacenz	88.	Puncarax	33.	Sauce	ibid.
Morgedica	206.	Pfegget	clxxxvj.	Sambrot	264.
Misje verthya	271.	Poisetes	7.	Samariden	clxxx.
Mistodswannen	cxlvii.	Perrion	166.	Sekak	179.
Mobiltge	513.	Poirien	clxxvj.	Stambironi	110.
Mokoffe	50.	Pissaka	281.	Scheveling	cxlvii.
Molon	107.	QUEIRO	46.	Schiffham	cxlv.
Molla e breten	119.	mischer Cuendel	317.	Schiffel blumen	307. 105.
Mollen Prant	clir.	Quercitia	392.	dicht turgighe rot Schmalzholz	244.
Mollendunen	clx.	Qexigo	18.	Echmerwurzel	lxvii.
Montan	218.	Quenne	lxxx. lxxxj.	Echmowurtz	267.
Mouyato alya gomba	clxxxvj.	Quishuela	46.	Echmubichen	60.
Morilles	clxxxvj.	Quirafa	73.	Echwalbenkraut	clxlv.
Mort an chien	201.	Cuiffel	180.	Echyperiet	214.
Mortalla	67.	Quiza merienda	201.	Echwinde Kraut	301.
Motteffil	170.			Stritto de Nettano	clvj.
Moyes	70.			Scoba bedende	326.
Mufchio, recu, & Mufchio roma	179.			Sebam	103.
				Scopa	101.

A N T V E R P I A E,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
APVD IOANNEM MORETVM.
A N N O C L O . I O C I .

PRIGANETKA
DOKUMENTALNI ANGILOZI ZA
KUPUJON PĚNJOI CIVIL
LOI CO CIVIL



F.I.

